



Anuario Ornitológico de Castellón
Volumen V
Año 2007

ANUARIO
ORNITOLÓGICO
DE
CASTELLÓN
2007
Volumen 5

Anuari Ornitològic de Castelló
2007 Volum 5

COORDINACIÓN

Josep Bort y Juan L. Bort

COMITÉ EDITOR

Josep Bort
Juan L. Bort
Vicente Esteller

Manolo García
Enrique Luque
Miguel Tirado

PORTADA

Petirrojo europeo
(*Erithacus rubecula*)

Autor: Vicente Esteller

CONTRAPORTADA

"Aves del bosque"

Autor: Vicente Esteller

DEPÓSITO LEGAL

CS-407-2005

Imprime: Innovació Digital
Castelló

ISSN

1885-6624

(Ed. impresa)

DIRECCIÓN DE CONTACTO

Anuario Ornitológico de Castellón
Apdo. de correos 237
12500 Vinaròs
E-mail: info_aocs@internatura.org

Citación recomendada:

Bort, J., Bort, J.L. (Coord.) 2009. Anuario Ornitológico de Castellón 2007, Vol. 5.
<http://www.internatura.org/aocs>

Patrocinadores:



Grup AU
d'ornitologia



Indice

EDITORIAL	5
LISTA DE COLABORADORES	7
LISTA SISTEMÁTICA	9
Anexo I. Artículos.....	167
- Mortalidad en la población de águila-azor perdicera (<i>Hieraaetus fasciatus</i>) en la provincia de Castellón (período 1971-2006)	168
- La gaviota cabecinegra (<i>Larus melanocephalus</i>) en la comunidad valenciana	177
- El chorlitejo chico (<i>Charadrius dubius</i>) en Castellón. Distribución y población nidificante. 4º censo provincial 2007.	183
Anexo II. Notas ornitológicas	191
- El llueret (<i>Carduelis spinus</i>) (cas: lugano)	191
- Aguilucho papialbo (<i>Circus macrourus</i>). El caso de Castellón.....	194
- Informe de rarezas nacionales y provinciales 2007	202
- Seguimiento de aves rapaces en el noroeste de la provincia de Castelló 2007	212
Anexo III. Reseñas bibliográficas	215
INFORMACIÓN	218
Relación de municipios (UTM)	234

EDITORIAL

De nuevo es grato anunciar un nuevo Anuario Ornitológico de Castellón, el quinto en poco más de tres años y esta vez, corresponde a las citas aportadas por los distintos colaboradores durante el 2007.

Prácticamente, el objetivo que nos marcamos al iniciar esta aventura, publicar el Anuario correspondiente al año anterior, está aquí. Esperamos cumplir este objetivo durante este año, que pretendemos publicar el correspondiente al 2008 en el primer semestre.

Pero ahora, tenéis en vuestras manos el del 2007. Como podéis comprobar, el número de ornitólogos o aficionados a las aves que colaboran con este anuario cada vez es mayor, lo que implica una mejor cobertura de todas las comarcas castellonenses y una mayor calidad de las citas aportadas; ENHORABUENA A TODOS, sin vuestro esfuerzo, esta obra nunca habría visto la luz.

Metiéndonos en este anuario, se han seguido manteniendo los diferentes apartados, aumentando en dos fundamentales: uno respecto a las especies exóticas y otro a las rarezas nacionales y locales citadas este año. En el primer apartado destaca la presencia por primera vez del cisne negro (*Cygnus atratus*) o la presencia de la artiga ñanday (*Nandayus nenday*), informadas al Comité de Aves Exóticas de SEO-BirdLife. En el segundo apartado, Castellón se ha colocado en una de las provincias con mayor número de rarezas nacionales durante este año, destacando las de aguilucho papialbo, guión de codornices, mosquitero de Pallas, papamoscas papirrojo y locales como malvasía cabeciblanca, gaviota de Delaware, alcaudón dorsirrojo, mosquitero ibérico, y un probable híbrido de alcaudón dorsirrojo x común.

Pero son muchas las especies y las observaciones peculiares incluidas en este anuario que ahora os presentamos, como la buscarla pintoja (*Locustella naevia naevia*) en Prat de Cabanes, o el mirlo acuático (*Cinclus cinclus*), la focha moruna (*Fulica cristata*) ya asentada de Els Estany d'Almenara, y una muy buena oportunidad para observar a esta especie, el enigmático quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*), citado en muy pocas ocasiones en nuestra provincia, o la gran concentración de grullas (*Grus grus*), con más de 300 ejemplares en la Marjal d'Almenara, una lista interminable y muy interesante que hace muy ilustrativo a este anuario 2007.

Por último agradecer a las personas que han mandado trabajos, estudios, así como notas ornitológicas que ha hecho abrir un nuevo apartado muy interesante. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento y aprovechamos para que muchos más colaboradores aporten redacciones para ir consolidando este apartado.

Para finalizar, recordar que este anuario 2007 se cierra pero se abre la construcción, redacción y maquetado de un nuevo Anuario Ornitológico de Castellón, 2008, en el que esperemos que todos los que somos y muchos más, aporten ese granito de arena que va haciendo montañas a favor del conocimiento y conservación de nuestra avifauna y los hábitats que ocupan.

El Comité.

LISTA DE COLABORADORES

AAC	Antonio Alcocer Cordellat	JMB	Javier Marchamalo Blas
ABC	Ángel Bel del Castillo	JMZ	José Miguel Mercé Zamora
ACC	Álvaro Camiña Cardenal	JPF	Juanjo Palomo Ferrer
ADP	Angel de Paz Collantes	JPH	Josep Puentes Higuera
AFP	Alejandro F. Pascual Pérez	JTC	Jesús Tena Caballer
AGC	Agustín Gasulla Carbó	LGB	Lucía Gimeno Berga
AGR	AE-Agro: Enric Amer i David Olmos	LPC	Luis Pereda Cruz
AGS	Antonio García Sanz	LPP	Leopoldo Pérez Pérez
ALR	Ana Llopis Raimundo	MAG	Miguel Ángel Gómez Serrano
AMG	Alberto Martín Gil	MAM	Miguel Agueras Moreno
AOC	Colaboradores de AOCS	MAS	Miguel Angel Simón
ASG	Alberto Seco Garcia	MCM	M. Carmen Molina Ayala
BFV	Beatriz Fernández Vilar	MGT	Manolo García Tarrasón
CFA	Carlos Fabregat Llueca	MMM	Miguel Moya Montolio
CGR	Clara García Ripollés	MMO	Miguel Angel Monsalve
CSP	Carles Sales Pascual	MMX	Manolo Marco
CTH	Conselleria de Territori i Habitatge	MSU	Martí Surroca
DES	Des Norden	MTB	Miguel Tirado Bernat
DOC	David Olmos Corral	MVB	Miguel E. Vilar Bernat
EAB	Enric Amer Blanch	MVV	Mercè Vilalta Vilanova
ELL	Enrique Luque López	NAG	Neus Avilés García
EMO	Elvira Mondragón Ortíz	PLL	Pascual López López
FGB	Paco González	RAF	Ricardo Álvaro Fuster
FGM	Francisco Javier Gil Moreno	REK	Renata Kenmore
FJS	Francisco Javier Sánchez	RNC	Autores Informes Rapaces NO de Castelló
FOF	Ferdinand Oyen	RPB	Ramón Prades i Bataller
FRB	Fernando Ramia	RPM	Rubén Piculo Mateo
GAU	Grup Au d'Ornitologia	SEO	Sociedad Española de Ornitología
GDO	Guillermo Doval	SFE	Sara Ferreras
GRM	Gregorio Ros Montolio	SMS	Sergi Marzà Sebastià
GRN	Guardes Reserva Natural	TCP	Teresa Camps Porter
IBR	Isabel Bischooping Rosagaray	VAD	Vicent Agustí Diago
JAM	Juan Antonio Muyas Bercet	VET	Vicent Esteller Turlo
JAR	Juan Manuel Aparicio Rojo	VJH	Victor J. Hernández Navarro
JBC	Josep Bort	VOC	Vicent Ortí Cotino
JCB	José Colom Barreda	VOO	José Vte. Ortiz Olmos
JCS	Juan V. Capella Sancho	XBC	Xavier Barreda Carbó
JLB	Juan Luis Bort Cubero		

LISTA SISTEMÁTICA

Anas clypeata

Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler

ESTATUS: Invernante y migrante moderado localizado. **Conservación:** EC **Criterio:** Citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Araya:

04-mar: 4 ej. (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

28-ene: 1 ej. (RPB)

Estany de Nules:

15-nov: 2 h. (JBC)

Marjal de Almenara:

16-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

06-abr: 4 ej. 2 parelles (DOC)

03-oct: 2 ej. (JBC)

21-nov: 16 ej. (JBC)

Sant Jordi:

17-abr: 1 m. ad. (ELL)

Muy pocas aves en invernada, algo más abundante en los pasos. Ausencia de citas entre el 17 de abril y el 3 de octubre.

Anas crecca

Cerceta común - Sarset - Common Teal

ESTATUS: Invernante y migrante moderado. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 100 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

03-abr: 48 ej. (JBC)

31-dic: 290 ej. (JBC,ILB)

Marjal de Almenara:

14-nov: 32 ej. (JBC)

Invernada numerosa en la desembocadura del Mijares, donde invernán una media de 76 aves (período 1984-2004) Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006. Ausencia de citas entre el 3 de abril y el 30 de septiembre.

Anas platyrhynchos

Ánade azulón - Coll-verd - Mallard

ESTATUS: Residente e invernante común. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; citas de interés.. **Categoría:** A,E2.

Araya:

23-ene: 75 ej. posados en el mar (ALR,RPB)

Cabanes:

05-may: 12 juv.+ ad. hembra y 11 pollitos en pequeña balsa de lona sin vegetación en las orillas. (VET)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 138 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

12-dic: 139 ej. (JBC)

2007: 10 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)

Marjal de Almenara:

16-ene: 3 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

2007: 120 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Peñíscola:

12-ene: 57 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 59 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

2007: 20 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Sant Jordi:

12-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

10-may: 39 par. ad. (ELL)

Sant Mateu:

10-may: 10 par. (MAM)

24-dic: 17 ej. (ALR,RPB)

En algunas localidades, como Almenara, ha resultado más abundante durante la reproducción que en invernada cuando es sometido a una fuerte presión cinegética. Al número de parejas detectadas en los principales humedales hay que sumar otras que se reproducen en pequeñas zonas húmedas de todo tipo.

Anas querquedula

Cerceta carretona - Roncadell - Garganey

ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Desembocadura río Mijares:

06-dic: 10 ej. (ALR,RPB)

Marjal de Almenara:

17-mar: 8 ej. (DOC)

01-may: 1 ej. mascle (DOC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

12-mar: 11 ej. (2 hembras) (FGB)

20-mar: 17 ej. en un "lluient" (MTB)

Sant Mateu:

10-may: 2 ej. (MAM)

22-may: 2 par. (ALR,RPB)

De gran interés la cita de la desembocadura de Millars ya que escasean las citas invernales, apareciendo en los anuarios solo otra, justamente en la misma localidad, de 14 aves el 14-1-95 Gómez-Serrano, M., Jiménez, M., Dies, J., Dies, B. & Monsalve, M. (Eds.). 2000.

Anas strepera

Ánade friso - Ascle - Gadwall

ESTATUS: Nidificante raro muy localizado. Invernante escaso muy localizado. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Araya:

04-mar: 2 ej. (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

06-dic: 2 h. juv.+ ad. (ALR,RPB,VOO)

Marjal de Almenara:

01-may: 1 ej. (DOC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 2 par. nidicantes mínimo, máximo 4 parejas. (JTC,TCP,GRM,CTH)

El Prat de Cabanes-Torreblanca continúa siendo la única localidad de reproducción en Castellón. Muy pocas aves en invernada.

Anser anser

Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose

ESTATUS: Migrante e invernante raro. **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A,E3.

Marjal de Almenara:

18-mar: 1 ej. (DOC)

21-nov: 1 ej. (JBC)

Aunque algún año se han detectado ejemplares invernantes (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006) las dos únicas citas recibidas en 2007 corresponden a migrantes.

Aythya ferina

Porrón europeo - Boix - Common Pochard

ESTATUS: Migrante e invernante moderado. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

26-may: 3 ej. machos (DOC)

07-jul: 1 ej. una hembra a la Torbera Sud. Alça el vol en direcció N (DOC)

Al igual que el año pasado se observan ejemplares en la Marjal de Almenara en época estival, no obstante no se observan indicios de reproducción y hay que considerar la cercanía de la Marjal dels Moros (Valencia) donde sí se reproduce (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006).

Aythya fuligula

Porrón moñudo - Morell capellut - Tufted Duck

ESTATUS: Migrante e invernante raro. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

02-nov: 4 ej. están todos junto en una pequeña balsa de agua, se fotografian. (JBC)

Una única cita recibida de esta anátida rara en nuestra provincia. No se ha detectado ningún ejemplar en invernada este año.

Mergus serrator

Serreta mediana - Bec de serra mitjà - Red-breasted Merganser

ESTATUS: Invernante raro. **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 41/62 (Ene,Feb,Mar,Abr,Oct,Nov,Dic) .

Alcossebre:

14-nov: 1 ej. (DES)

13-dic: 1 ej. (DES)

Serra d'Irta:

14-ene: 3 ej. presencia hasta el 23/01 (ALR,RPB)

Todas las citas recibidas este año se producen en el entorno de la Serra d'Irta.

Netta rufina

Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard

ESTATUS: Residente y nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. **Conservación:** EC **Criterio:** Citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A,E3.

Marjal de Almenara:

16-ene: 25 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

2007: 6 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Peñíscola:

12-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

2007: 17 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Sant Jordi:

10-may: 1 par. ad. (ELL)

De nuevo se produce un aumento en el número de parejas nidificantes en el Prat de Cabanes-Torreblanca pasando de 11 en 2006 a 17 esta año, acercándose al máximo de 22 parejas censadas en esta localidad para el periodo 1984-2004 (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006). Muy pocas aves en invernada.

Oxyura leucocephala

Malvasía cabeciblanca - Ànec capblanc - White-headed Duck

ESTATUS: Rareza local. **Conservación:** PE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A,E2. **Rango:** 4/10 (Ago,Oct) .

Marjal de Almenara:

26-ago: 1 ej. femella de fase fosca (DOC)

Interesante observación de 1 ej. de esta anátida en peligro de extinción que probablemente procede de la Marjal dels Moros (Valencia) donde nidifica una pareja. VER INFORME DE RAREZAS.

Tadorna tadorna

Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck

ESTATUS: Migrante e invernante escaso. **Conservación:** SAH **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

17-abr: 7 ej. (DES)

21-jul: 8 ej. (DES)

Marjal de Almenara:

23-ene: 3 ej. (JBC)

04-feb: 6 ej. (JBC,JLB)

17-mar: 5 ej. (DOC)

21-nov: 11 ej. (JBC)

16-dic: 21 ej. (ALR,RPB)

Muy buen año de citas para esta especie, la Marjal de Almenara es la única localidad donde inverna en nuestra provincia.

Alectoris rufa

Perdiz roja - Perdiu comuna - Red-legged Partridge

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** EC **Criterio:** Citas de interés. **Categoría:** A,E1.

Chert/Xert:

24-jun: 14 ej. 1 adulto y 13 pollos (MAM)

24-jun: 12 ej. 1 adulto y 11 pollos (MAM)

Marjal de Almenara:

16-sep: 10 ej. adults amb immadurs (DOC)

Morella:

03-ago: 7 ej. 1 adulto y 6 pollos (MAM)

Tirig:

31-jul: 6 ej. 1 adulto y 5 pollos (MAM)

Todolella:

19-jul: 22 ej. 1 adulto y 9 pollos 1 adulto y 11 pollos (MAM)

Dado su amplia distribución tanto en la costa como en el interior incluimos solamente citas referentes al tamaño de las nidadas.

Coturnix coturnix

Codorniz común - Guatlla - Common Quail

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A₁E2.

Alcossebre:

17-abr: 1 ej. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

15-abr: 1 ej. sale del suelo en un herbazal. (MTB)

Borriol:

24-jul: 2 ej. se levantan al pasar; primero una y veinte metros más lejos la segunda. En matorrales claros y arbustos (LPC)

Islas Columbretes:

30-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Nules:

24-feb: 1 ej. en pista cercana a la playa (JBC)

25-feb: 1 ej. en zona de cultivo abandonado. (JBC)

Las observaciones de Nules dado lo temprano de las fechas podrían corresponder a migrantes muy tempranos aunque probablemente se trate de aves liberadas por cazadores.

Phasianus colchicus

Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant

ESTATUS: Escapado. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** C1. **Rango:** 13/15 (Abr,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Marjal de Almenara:

27-sep: 1 m. (JBC)

Moncofa:

21-nov: 1 m. (JBC)

En nuestra provincia no existe ningún núcleo reproductor estable, produciéndose la mayoría de las citas durante la temporada de caza o poco después.

Gavia arctica

Colimbo ártico - Agullat àrtic - Black-throated Diver

ESTATUS: Rareza local. Invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 3/3 (Feb,Dic) .

Alcossebre:

06-feb: 1 ad. (DES)

Tercera cita para la provincia de Castellón y segunda para Alcossebre siendo la primera para el mes de febrero pues las otras dos se produjeron en Diciembre: 1-12-1994 en el Prat de Cabanes-Torreblanca (Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1997) y 6-12-2005 en Alcossebre.

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe

ESTATUS: Nidificante raro muy localizado. Migrante moderado e invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 15-ene: 5 ej. máximo invernal. (DES)
- 14-abr: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)
- 30-nov: 1 ej. primera observación postnupcial. (DES)

Burriana:

- 09-ene: 1 ej. sobre el mar (JBC)

Marjal de Almenara:

- 13-ene: 1 ej. sobre el mar (JBC,JLB)
- 2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 11-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
- 2007: 9 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Sant Jordi:

- 12-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
- 17-may: 3 ad. se observa parada nupcial de una pareja (ELL)

Vinaròs:

- 13-ene: 5 ej. posados en el mar y pescando por los alrededores. Observación realizada desde la costa norte de Vinaròs (junto al río Senia) (ELL, RAF)
- 15-ene: 24 ej. (RPB)

Continúa el aumento de parejas reproductoras en el Prat de Cabanes-Torreblanca pasando de 6 parejas en 2006 a 9 en 2007. Se detecta de nuevo la reproducción en Almenara donde ya se confirmó en 2004 y se producen indicios de cría en Sant Jordi. En invernada se localiza también en zonas húmedas pero principalmente en la costa.

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro - Cabussó coll-negre - Black-necked Grebe

ESTATUS: Invernante y migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Desembocadura río Mijares:

- 10-dic: 2 ej. (JBC)
- 24-dic: 3 ej. (JBC)

Marjal de Almenara:

- 20-jul: 1 ej. en finca la Ponderosa. (FRB)
- 27-sep: 3 ej. (JBC)
- 21-nov: 5 ej. (JBC)

Sant Jordi:

- 17-abr: 1 ad. en plumaje nupcial (ELL)

Pese a la observación estival en la Marjal de Almenara no se han producido indicios de reproducción, aunque se detectó criando con anterioridad en esta localidad y en la desembocadura del Millars (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006).

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe

ESTATUS: Residente moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; Censos destacados; Citas de interés..

Categoría: A.

Alcossebre:

06-feb: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)

27-ago: 1 ej. última observación postnupcial. (DES)

Benicarló:

07-jun: 1 ej., 1 par. (ALR,RPB)

Burriana:

03-abr: 1 par. (JBC)

18-jul: 5 juv.+ ad. (JBC)

Desembocadura río Chinchilla:

31-may: 3 par. (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

12-dic: 9 ej. (JBC)

2007: 4 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)

Laguna de Sant Mateu:

15-jun: 2 par. (MAM)

Marjal de Almenara:

16-ene: 13 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

2007: 25 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Moncofa:

21-mar: 16 ad. número excepcional de ejemplares en tan pequeño enclave. (FRB)

29-may: 1 par. (RPB,VOO,EMO)

Morella:

08-sep: 3 juv.+ ad. 2 ad y 1 pollo (ALR)

Nules:

29-may: 1 par. (RPB,VOO,EMO)

Onda:

07-jun: 1 ej., 1 par. (VAD)

Oropesa del Mar/Orpesa:

30-may: 1 par. (ALR,RPB)

Palanques:

07-sep: 1 juv. nueva localidad de cría no citada en AARE (ALR)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 64 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

2007: 90 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Sant Jordi:

12-ene: 5 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Tirig:

12-jul: 1 par. (VOC)

Mucho más abundante durante la reproducción que en invernada, recibimos datos de un mínimo de 130 parejas, la mayoría en el Prat de Cabanes-Torreblanca que alberga una excelente población de esta especie. Se cita la cría en la cuadrícula UTM YL31 donde no se detectó durante la realización del Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.) 2003).

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta - Baldriga cendrosa - Cory's Shearwater

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. **Conservación:** PE **Criterio:** Citas de cría e invernada; Censos destacados; Citas de interés.. **Categoría:** A.

Islas Columbretes:

2007: 50 par. estimadas. (CTH)

La colonia de Columbretes se mantiene estable (entre 34 y 50 en 2006)

Puffinus mauretanicus

Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater

ESTATUS: Invernante y migrante común. **Conservación:** PE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

15-ene: 1632 ej. máximo mensual (DES)

15-may: 16 ej. máximo mensual (DES)

15-jun: 6 ej. máximo mensual (DES)

15-nov: 7 ej. primera cita postnupcial (DES)

15-dic: 1230 ej. máximo mensual (DES)

Benicarló:

23-ene: 38 ej. (ALR,RPB)

Islas Columbretes:

01-nov: 10 ej. entre Castelló i les Illes, en el camí d'anada. En solitari o en grups de 2. (FRB)

Marjal de Almenara:

13-ene: 220 ej. en la mar (JLB,JBC)

24-feb: 1200 ej. volen i descansen molt a prop de la eixida d'aigües dolces de la Gola d'Almenara. (FRB)

25-feb: 400 ej. davant la Gola. (FRB)

19-mar: 110 ej. direcció S baix fort vent de Llevant. En 15' d'observació (DOC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

05-may: 343 ej. direcció S, se posan en el agua cerca granja de peces. En 3,5 h. de censo (JBC,JLB)

Peñíscola:

23-ene: 18 ej. (ALR,RPB)

Serra d'Irta:

14-ene: 282 ej. (ALR,RPB)

Vinaròs:

15-ene: 15 ej. (RPB)

Buen año para la especie en la costa castellonense, con varias citas por encima de los 1.000 ej. y algunas más con varios cientos implicados. El resto de las citas todas dentro del patrón típico de invernada. Es igualmente destacable la cita del mes de mayo en Oropesa por las aves implicadas y por ser esta ya época de reproducción de la especie.

Puffinus yelkouan

Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater

ESTATUS: Invernante y migrante escaso **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

13-ene: 241 ej. en paso sobre el mar hacia el S. Censo durante toda la mañana (JBC,JLB)

El hecho de que sea mucho mas escasa que su pariente balear, y que requiera de observaciones cercanas para su correcta identificación, han provocado que no recibiéramos observaciones de esta especie desde hace varios años. Esta cita se aparta algo de su patrón habitual, ya que al S de sus mejores zonas mediterráneas, en el N de la costa catalana, tiende a dejar citas sobre todo durante el paso primaveral (Feliu, P. 2007).

Hydrobates pelagicus

Paño europeo - Escateret - European Storm-petrel

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado. **Conservación:** VUL **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Islas Columbretes:

28-jul: 4 ej. siguiendo al barco a lo lejos. (MGT, DOC)

2007: 30 par. parejas estimadas. (CTH)

Morus bassanus

Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet

ESTATUS: Migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Cesos destacados; Citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

(DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
7	5	5	11	3	4	2	1	2	7	2	7

Islas Columbretes:

10-nov: 9 juv.+ ad. 7 ad. i 2 juv. de camí a les illes. (FRB)

Marjal de Almenara:

13-ene: 1 ad. sobre el mar, realizando picados (JLB,JBC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

05-may: 7 inm.+ ad. de ellos 2 ad. (JBC,JLB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

02-jun: 3 inm. en día con viento f.4., 2 ej. de 1º verano y 1 de 3º (MTB)

De nuevo y por cuarto año consecutivo recibimos citas para todos los meses del año. Este aumento

de las citas estivales, que ha resultado generalizada en todo nuestro entorno, ha tenido como consecuencia que por primera vez se haya constatado la cría de esta especie en el Mediterráneo hace pocos años, una pareja que crió con éxito en el Puerto de Marsella.

Phalacrocorax aristotelis

Cormorán moñado - Corba marina emplomallada - European Shag

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, invernante y migrante escaso. **Conservación:** VUL **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

(DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	1.V	15.VI	15.VII	1.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
1	1	2	1	0	2	2	0	1	7	2	7

Benicarló:

23-ene: 4 ej. (ALR,RPB)

Burriana:

24-dic: 1 ej. ave de 1º invierno sobre boya en medio del puerto (JBC)

31-dic: 1 ej. (JBC,JLB)

Grau de Castelló:

10-nov: 1 ej. (FRB)

Islas Columbretes:

2007: 23 par. parejas estimadas. (CTH)

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant

ESTATUS: Migrante e invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; Citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

(DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	1.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
25	180	821	119	19	1	0	1	20	465	188	56

Araya:

23-ene: 220 ej. en turberas (ALR,RPB)

Burriana:

11-oct: 1 ej. (JBC)

16-nov: 35 ej. máximo anual (JBC,JLB)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 246 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

- 01-mar: 69 ej. en posadero (JBC)
 03-abr: 34 ej. migrando al N (JBC)
 29-nov: 250 ej. en posadero (JBC,JLB)
 07-dic: 301 ej. gran concentración en posadero a las 18,30 h. (JBC)

Grau de Castelló:

- 10-nov: 40 ej. (FRB)

Marjal de Almenara:

- 13-ene: 106 ej. (JBC,JLB)
 27-feb: 293 ej. de ellos 237 en posadero (JBC)
 04-mar: 30 ej. (DOC)
 01-abr: 20 ej. (DOC)
 02-may: 1 ej. pescant (DOC)
 27-sep: 2 ej. primera cita enguany (EAB)
 28-oct: 12 ej. en posadero. (JBC)
 01-nov: 50 ej. volant per damunt la platja. Formació en V en direcció S (DOC)
 21-nov: 1195 ej. gran concentración. De ellos 195 en posadero (JBC)
 07-dic: 1200 ej. enorme concentración en el posadero a las 8,30 h. de la mañana. (JBC,JLB)

Moncofa:

- 07-nov: 98 ej. en distintos grupos volando hacia el S. (JBC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

- 05-may: 2 ej. al N (JBC,JLB)

Peñíscola:

- 12-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 11-ene: 241 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
 20-feb: 320 ej. en los árboles del camping. (FGB)
 01-dic: 68 ej. (JBC,JLB)

Sant Jordi:

- 12-ene: 84 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Vinaròs:

- 15-ene: 53 ej. (RPB)

Ardea cinerea

Garza real - Agró blau - Grey Heron

ESTATUS: Residente no nidificante, migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; Citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
7	1	14	9	4	9	19	26	27	37	14	11

Castellón de la Plana:

- 14-ene: 11 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

15-ene: 5 ej. (JBC)

31-dic: 8 ej. (JBC,JLB)

Marjal de Almenara:

Máximos mensuales. (EAB,JBC,JLB,MMO,MVV,CTH,DOC)

16.I	1.II	3.III	20.IV	8.V	12.VI	1.VII	1.VIII	15.IX	14.X	9.XI	11.XII
141	96	20	10	7	13	0	0	37	50	54	87

Oropesa del Mar/Orpesa:

05-may: 6 ej. migrando al N, sobre el mar (JBC,JLB)

06-oct: 13 ej. volando al N. (JBC)

Peñíscola:

12-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 13 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

12-sep: 32 ej. volando hacia el SO al atardecer (MTB)

Viver:

22-jul: 1 ad. muerta por atropello en la autovía mudéjar a la altura de los Ojos del Prado (JAR)

Se presenta durante todo el año en nuestra provincia pero de momento sin ninguna cita de cría conocida. Los máximos se producen durante la invernada siendo la principal localidad la Marjal de Almenara con censos superiores al centenar de ejemplares.

Ardea purpurea

Garza imperial - Agró roig - Purple Heron

ESTATUS: Nidificante raro ocasional muy localizado, migrante escaso. **Conservación:** VUL **Criterio:** Citas de cría; Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

24-mar: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)

27-sep: 1 ej. última observación postnupcial. (DES)

Desembocadura río Mijares:

03-abr: 1 ej. (JBC)

Forcall:

10-sep: 1 ej. (ALR)

Islas Columbretes:

06-abr: 1 ej. en paso, nueva cita prenupcial el día 10. (GRN)

16-sep: 1 ej. en paso, citada de nuevo ininterrumpidamente desde el 19 al 24 del mes. (GRN)

Marjal de Almenara:

31-mar: 1 ej. (JBC,JLB)

29-abr: 6 ej. molt distribuida en tota la marjal, pareix anar en augment. (FRB, DOC)

29-may: 5 ej. (RPB,VOO,EMO)

19-jun: 5 ej. (JBC)

16-sep: 2 ej. (DOC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Año pobre de citas, este año no se detecta ningún ejemplar invernante (como ocurrió el año anterior) observándose entre el 24 de Marzo y el 27 de Septiembre, fechas habituales de llegada y partida para este migrante transahariano.

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron

ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: PE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..

Categoría: A.

Alcossebre:

19-abr: 1 ej. (DES)

14-sep: 1 ej. (DES)

Marjal de Almenara:

08-ene: 1 ej. (JBC,JLB)

13-ene: 1 ej. (JBC)

16-ene: 5 ej. (JBC)

01-feb: 1 ej. (JBC)

29-abr: 10 ad. 9 en jonquera, 1 en Peris. (FRB, DOC)

18-may: 4 ej. (JBC)

16-ago: 9 ej. en els arroçars. (DOC)

Sin grandes concentraciones este año, destacan las citas de invernada en Almenara, principal localidad donde se producen los registros invernales de este migrante transahariano.

Botaurus stellaris

Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern

ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Rango: 23/24 (Feb,Mar,Abr,May,Jun,Jul,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Marjal de Almenara:

19-jun: 1 ej. vuela sobre un extenso carrizal en dirección N a escasos 30 m. por delante del observador. Sigue sobre coto Ferrer y se pierde de vista en finca de Peris. Cerca de él vuela 1 ej. Ardea cinerea. Posiblemente un macho no reproductor. (FRB)

08-dic: 1 ad. adulto alimentándose en una pequeña acequia entre los campos de arroz, segados e inundados de La Llosa, donde se esconde. Se observa al ave a pocos metros y se fotografía. Llama la atención la lentitud en la que se desplaza para esconderse entre la vegetación quedando inmóvil hasta que nos vamos y totalmente camuflado, en ningún momento hizo intención de volar. (JBC)

Las de este año son la quinta y sexta cita para la Marjal de Almenara, una atribuible al paso prenupcial y otra a la invernada. La especie se ha citado durante todos los meses del año excepto

agosto en nuestra provincia, si bien nunca se ha comprobado su reproducción de forma fehaciente. Hay que tener en cuenta además lo dilatado de su período migratorio.

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret

ESTATUS: Migrante e invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; dormideros; citas de interés. **Categoría:** A,E2.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
13	3	15	25	4	3	26	12	5	31	9	7

Castellón de la Plana:

14-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

07-dic: 55 ej. (JBC)

Marjal de Almenara:

16-ene: 200 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

23-feb: 150 ej. (JBC)

Nules:

09-feb: 100 ej. (JBC)

03-nov: 200 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 93 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

Sant Jordi:

28-mar: 13 ad. posadas en la orilla aguantando la constante lluvia (ELL)

Villanueva de Viver:

08-abr: 1 ej. ejemplar solitario por los campos inundados por la lluvia. Muy rara en esta zona del interior. (MGT)

Presente todo al año, rarificándose durante la época de reproducción. Sin grandes números detectados en comparación a años anteriores.

Egretta alba

Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret

ESTATUS: Migrante e invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Castellón de la Plana:

23-oct: 1 ej. (XBC)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

28-ene: 1 ej. (RPB)

Marjal de Almenara:

16-ene: 1 ej. (JBC)
 16-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
 03-feb: 2 ej. 1 ex. a la Palafanga i l'altre als arroçars (DOC)
 23-feb: 4 ej. (JBC)
 24-feb: 4 ej. en Peris. (FRB)
 08-mar: 4 ej. sobrevolando la marjal (MTB)
 26-ago: 1 ej. (DOC)
 01-sep: 2 ej. (DOC)
 06-nov: 1 ej. (EAB)
 21-nov: 1 ej. (JBC)
 05-dic: 1 ej. (JBC,JLB)

Marjal de Xilxes:

02-feb: 1 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

20-mar: 1 ej. volando sobre las turberas de Torreblanca (MTB)

Sant Jordi:

17-may: 3 ad. (ELL)

Un año más la Marjal de Almenara constituye la principal localidad para esta especie en la provincia aunque no se alcanzan las cifras del año pasado. El aumento de las observaciones año a año nos permite ver que los máximos en nuestra provincia se producen en marzo y diciembre, siendo posible observarla a lo largo de todo el año aunque no se reproduce, encontrándose la colonia de cría más cercana en el Delta del Ebro.

Egretta garzetta**Garceta común** - Garseta blanca - Little Egret

ESTATUS: Residente no nidificante, migrante moderado, invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; dormideros; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	1.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
1	1	2	6	7	0	8	12	27	17	4	6

Chilches:

13-nov: 14 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

La Jana:

15-may: 18 ej. (MAM)

Marjal de Almenara:

Máximos mensuales. (JBC,JLB,MMO,MVV,CTH,EAB,DOC)

8.I	13.II	18.III	20.IV	1.V	19.VI	7.VII	1.VIII	15.IX	3.X	2.XI	5.XII
433	435	70	27	40	14	1	0	108	7	79	36

Morella:

10-may: 1 ej. 10 y 11/05 (ALR)

Oropesa del Mar/Orpesa:

06-oct: 8 ej. volando al N. (JBC)

Ortells:

03-jun: 2 ej. (ALR,RPB)

Peñíscola:

12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

05-may: 20 ej. (JBC,JLB)

Presente todo el año (aunque no se reproduce) con máximos en septiembre y en invernada, con muy buenos registros este año en enero y febrero en la Marjal de Almenara.

Ixobrychus minutus

Avetorillo común - Gomet - Little Bittern

ESTATUS: Nidificante escaso localizado, invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría e invernada; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Castellón de la Plana:

13-nov: 1 ej. (XBC)

20-nov: 1 ej. (XBC)

31-dic: 1 ej. (XBC)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

06-dic: 1 m. (ALR,RPB,VOO)

2007: 4 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)

Grau de Castelló:

09-ene: 1 ej. (XBC)

02-mar: 1 ej. (XBC)

Marjal de Almenara:

03-abr: 1 ej. mascle a l'Estany Nord (AGR)

2007: 31 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Peñíscola:

09-feb: 1 m. ad. se mueve constantemente entre carrizos (JAM)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

08-dic: 1 ej. captura tardía (GAU)

2007: 20 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Buen número de citaciones invernales para lo que es habitual en esta especie eminentemente estival en Castellón.

Nycticorax nycticorax

Martinete común - Martinet - Black-crowned Night-heron

ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: VUL Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

17-abr: 5 ej. primera observación prenupcial. (DES)

18-sep: 6 ej. última observación postnupcial. (DES)

Burriana:

12-sep: 1 ej. (JBC)

Islas Columbretes:

20-sep: 1 ej. única cita anual (GRN)

Marjal de Almenara:

24-ene: 2 ej. posados en árbol (JBC)

02-feb: 2 ej. (JBC)

26-mar: 12 ej. descansant en mata de boba just al costat de la comporta de la Sèquia del braç. Volen al passar un arpellot i tornen restant tota la vesprada. (EAB)

27-mar: 31 ej. descansant a les branques de desmais secs en la mota de l'estany sud (EAB)

04-abr: 15 ej. volen des dels Estanys cap a la zona central asustats per una excursió d'escolars (DOC)

16-ago: 30 ej. de S a N, cap als arrossars, com altres vesprades, possiblement cap algún dormider situat més al S de la marjal (DOC)

16-sep: 40 ej. sobrevolant en direcció S el Lluent dels hivernacles i el jonqueral de Magraners (DOC)

19-sep: 2 ej. (EAB)

La observación invernal en Almenara supone de las primeras conocidas para Castellón, sin embargo mantiene una pequeña población invernante de 50-100 ej. desde mediados de los 90 en la Albufera de Valencia (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006).

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork

ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcora/L'Alcora:

09-feb: 1 ej. posada en la chimenea de la fábrica Gaya. Al día siguiente salio fotografiada en el periódico Mediterráneo (JBC)

Alcossebre:

10-feb: 1 ej. hacia el NE. (DES)

Almenara:

04-feb: 25 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)

Benicasim/Benicàssim:

01-mar: 4 ej. 2 ej. remontando y dirigiéndose al NE y otros 2 a baja altura hacia el S (MTB)

15-abr: 9 ej. pasando al atardecer hacia el NO (MTB)

16-abr: 1 ej. remontando sobre el pueblo (MTB)

Cabanes:

22-mar: 28 ej. volando hacia el N. (SMS)

05-may: 1 ej. volando hacia el N. (VET)

Castellón de la Plana:

01-mar: 2 ej. elevándose en térmica desde una altura de poco más de cincuenta metros. (LPC)

El Toro:

16-mar: 35 ej. (CGR)

13-abr: 3 ad. (JAR)

Marjal de Almenara:

23-feb: 1 ej. (JBC)

07-mar: 9 ej. baixen a dormir a Palafanga. (FRB)

08-mar: 11 ej. al coto Ferrer. 2 anellades. (FRB, JBC)

01-may: 3 ej. 2 ex provinents del S es junten en un altre als arroçars per a passar la nit (DOC)

06-jun: 1 ad. posado en arrozal La Llosa y volando hacia el N (JBC)

06-jun: 1 ej. volando muy baja hacia el N (JBC)

02-sep: 20 ej. grupet migratori sobrevolant la Marjal. Donen uns cercles i continuen cap al S. El segueix un mascle d'arpellot de marjal. (DOC)

Nules:

29-sep: 2 ej. una con anilla blanca con inscripción "ATUN" (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

16-may: 1 ej. (FGB)

Vilanova d'Alcolea:

Subespecie: **CICONIA**

19-ago: 21 ej. volando dirección S. (PLL, CGR)

Paso prenupcial muy dilatado, observada este año entre el 9 de febrero y el 6 de junio. En migración postnupcial desde el 19 de agosto al 29 de septiembre. El número de citas y ejemplares implicados se recupera tras el descenso del año anterior.

Ciconia nigra

Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork

ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Benlloch:

30-abr: 2 ej. remontando y subiendo en dirección N. (MSU)

Desert de Les Palmes:

27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (VET, MTB)

17-sep: 2 ej. última cita en migración. (VET, MTB)

Marjal de Almenara:

21-nov: 1 ej. migrando al S (JBC)

Muy mal año de citas para esta especie en Castellón con solo 4 observaciones recibidas, 1 del paso prenupcial y 3 del paso postnupcial.

Platalea leucorodia

Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 10/19 (Mar,May,Jun,Sep,Oct,Dic) .

Prat de Cabanes-Torreblanca:

25-mar: 1 ej. volando cerca de la línea de costa a media altura, se dirige hacia el interior del Prat. (MTB)

Curiosamente la única cita corresponde como el año anterior al Prat de Cabanes-Torreblanca en marzo.

Plegadis falcinellus

Morito común - Picaport - Glossy Ibis

ESTATUS: Migrante e invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

05-ene: 8 ej. dos de ellos con anillas amarillas -5PR- (JBC)

08-ene: 7 ej. dos con anillas: -5PR-, -2N9- (JBC,JLB)

10-ene: 7 ej. (JLB)

01-feb: 27 ej. volando y posados en marjal. (JBC)

04-feb: 1 ej. herido en pata (JBC,JLB)

21-abr: 6 ej. es posen a les llacunes provinents del N (DOC)

22-abr: 5 ej. alcen el vol en direcció N (a les 11h) (DOC)

19-may: 2 ej. (AGR)

11-dic: 20 ej. (JCS)

Peñíscola:

03-nov: 2 juv. posados en una cala cerca del barranco del Volante (REK)

Nuevamente recogemos la invernada en la marjal de Almenara. La observación de 27 ejemplares es la que implica un mayor número de aves para la provincia publicadas en anuarios.

Phoenicopterus roseus

Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo

ESTATUS: Migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

29-abr: 8 ej. (DES)

26-may: 24 ej. (DES)

15-sep: 6 ej. (DES)

Marjal de Almenara:

20-jul: 140 ej. volen en direcció S. (FRB)

16-sep: 2 ej. dirigint-se al S (DOC)

16-sep: 1 ej. juvenil posat i alimentant-se al lluent dels hivernacles (DOC)

19-sep: 1 ej. (EAB)

Oropesa del Mar/Orpesa:

12-mar: 35 ej. volaban a las 21.30 de la noche desde el N hacia el S, por el mar a la playa de Moro de Gos/Marina d'Or, Oropesa, Castellón. (FOF)

Aunque hemos recibido muy pocas citas el grupo de 140 ej. en Almenara es el más grande registrado hasta ahora para la provincia de Castellón.

Accipiter gentilis

Azor común - Astor - Northern Goshawk

ESTATUS: Nidificante escaso, migrante e invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas de migración e invernada; Citas de interés. Categoría: A,E3.

Alcossebre:

22-ago: 1 m. primera cita en la zona. (DES)

19-sep: 1 juv. (DES)

Almenara:

04-feb: 1 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)

Barracas:

18-may: 2 ad. (JAR)

Benicasim/Benicàssim:

13-sep: 1 ej. se detecta al observar un bando de estorninos que sale con notas de alarma de un campo abandonado de naranjos. Viene con vuelo batido raso a gran velocidad.

Falla el intento de caza y sigue rumbo a las montañas. (MTB)

Cabanes:

27-ago: 1 h. ad. se observa un ejemplar hembra ad. en zona muy abierta de cultivos desde la ctra. Cabanes-Vilanova d'Alcolea. (AAC)

Caudiel:

03-mar: 1 ej. en zona de pinar en regeneración (JBC)

Desembocadura río Mijares:

01-feb: 1 m. ad. sobrevuela la desembocadura, acercándose en su vuelo a gallinetas y fochas. (XBC)

El Toro:

22-feb: 1 ej. volando hacia el N por la ladera oeste de Mazorra (ELL)

Islas Columbretes:

25-ago: 1 ej. única cita anual (GRN)

La Salzadella:

01-ene: 1 m. (MAM)

Portell de Morella:

17-mar: 1 juv. (MAM)

Sant Mateu:

18-mar: 2 ej. (MAM)

Tales:

23-dic: 1 ej. (JBC)

Se observa un aparente aumento de las aves observadas en la costa en relación a años anteriores (anuario ornitológicos 2003 – 2006), tanto en la migración prenupcial como en la postnupcial, pero sobre todo en invierno. Muy curiosa es la cita postnupcial de Illes Columbretes. Sigue observándose durante todo el año en las zonas interiores de reproducción.

Accipiter nisus

Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk

ESTATUS: Nidificante e invernante moderado, migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Cifras máximas en migración e invernada; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

28-feb: 1 ej. máximo mensual. (DES)

30-oct: 2 ej. máximo mensual. (DES)

Betxi:

06-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

12-sep: 7 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

18-sep: 11 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

02-oct: 2 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

Burriana:

22-dic: 1 ej. (JBC)

Caudiel:

19-ene: 1 par. volando juntos por la zona (JBC)

Chert/Xert:

30-mar: 3 ej. primera cita. (ALR,RPB)

Chilches:

09-nov: 1 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

08-oct: 1 ej. posible migrante postnupcial. (JBC)

31-dic: 1 ej. (JBC,JLB)

Desert de Les Palmes:

24-ago: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB, VET)

19-sep: 32 ej. máximo en 3 horas de censo. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 362 ej. (MTB, VET)

30-dic: 1 ej. volando sobre el pinar en el Bco. de les Santes. (VET)

El Toro:

27-ago: 1 ej. (MGT)

Islas Columbretes:

05-abr: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

05-abr: 1 ej. citado igualmente el día 5 y el 16 del mes. Ausente en migración postnupcial (GRN)

La Salzadella:

11-sep: 1 h. ad. volando en el Bovalar. (SMS)

La Vall d'Uixó:

24-sep: 1 ej. (JBC,JLB)

Les Coves de Vinromà:

15-abr: 1 ej. migrando. (VET)

Marjal de Almenara:

04-feb: 1 ej. (JBC,JLB)

23-mar: 1 ej. (JBC)

03-nov: 1 ej. (JBC)

09-nov: 1 ej. (JBC)

20-nov: 1 ej. (JBC,JLB)

05-dic: 1 ej. atrapa un mirlo común (JBC,JLB)

22-dic: 1 ej. (JBC)

Moncofa:

07-nov: 1 ej. (JBC)

Tales:

19-mar: 2 ej. (JBC)

Tirig:

18-ago: 1 h. (MAM)

Vall d'Alba:

30-abr: 3 ej. hacia el NE en 2 horas y media. (VET)

17-nov: 1 ej. se lanza en vuelo rasante intentando sorprender los passeriformes que acuden a beber a una acequia. (VET,JPH)

Viver:

04-abr: 3 ej. migrando al N (JBC)

Una vez más esta pequeña rapaz, presenta pasos migratorios postnupciales realmente importantes (un total de 362 ej. en la zona de control Desert de les Palmes), observando que el inicio de esta migración se produce a final de agosto teniendo el máximo a mediados de septiembre (32 ej. el 19/09/07 en tres horas de control) prolongándose hasta final de octubre. Durante los meses invernales se observa un número considerable de aves invernantes en las zonas litorales y prelitorales, siendo más abundantes en las zonas húmedas costeras y en las zonas de cultivo abandonadas. La migración prenupcial se inicia a mediados de marzo prolongándose hasta mediados de abril, destacando la cita del 5 de abril en Illes Columbretes.

Aegypius monachus

Buitre negro - Voltor negre - Eurasian Black Vulture

ESTATUS: Rareza local procedente del interior de la Península Ibérica. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A,E3. **Rango:** 7/7 (Feb,May,Jun) .

Forcall:

08-feb: 1 ej. (RNC)

Una nueva cita de un ejemplar junto a *Gyps fulvus*, en la parte noroccidental de la provincia. Parece que no lleva ninguna señal en las alas (marcas alares, decoloración de plumas, etc.), por lo que posiblemente sea distinto al observado en la misma zona durante el año 2000 (Polo, et al. 2007; García en De la Puente et al. 2001).

Aquila chrysaetos

Águila real - Àguila reial - Golden Eagle

ESTATUS: Residente escaso. **Conservación:** VUL **Criterio:** Citas de interés. **Categoría:** A,E3.

Albocácer:

12-sep: 1 juv. hacia el Puig y Pou de Nosca (MAM)

Barracas:

12-sep: 1 ej. (BFV)

Bejís:

19-ene: 2 juv.+ ad. dispersión (JBC,ELL)

28-may: 1 inm. volando sobre los barrancos (JBC)

Betxí:

21-sep: 1 ej. volando al S a media altura. (JBC,JLB)

Castell de Cabres:

18-sep: 1 ad. volando por barranco de la mina. (SMS)

Caudiel:

03-mar: 1 juv. volando al SO (JBC)

Cervera del Maestre:

19-mar: 2 subad. con fuerte viento del N, se mantienen en la zona, durante 4 horas, cicleando y cazando. Finalmente vuelan hacia Xert (ELL)

18-abr: 1 subad. (JMZ)

Desert de Les Palmes:

30-sep: 1 juv. ciclea cerca de la zona de censo, se dirige hacia en NE (VET, MTB)

04-oct: 1 juv. remonta sobre Sulfera y se dirige hacia en O (VET, MTB)

El Toro:

19-ene: 1 ad. comiendo carroña (un perro muerto) en la zona Mazorral (ELL)

04-abr: 1 juv. volando al S (JBC)

Embalse de Arenós:

11-nov: 2 juv.+ ad. (JBC)

La Vall d'Uixó:

18-ene: 1 ad. adulto sobrevolando las montañas cercanas a la población sin ninguna dirección predominante. (JBC)

Ludiente:

08-jul: 2 pollo (JLB)

Montán:

01-jun: 1 juv. (JBC)

Morella:

03-abr: 1 ad. (MAM)

01-jun: 1 subad. (MAM)

12-dic: 1 ad. (MAM)

Pina de Montalgrao:

03-ene: 1 par. ad. (JBC)

Sant Mateu:

16-mar: 1 ad. (MAM)

18-ago: 1 ej. caza (MAM)

Tirig:

18-ago: 1 ad. caza (MAM)

Vall d'Alba:

13-may: 1 ej. de 4º-5º año calendario. Vuela por la zona. (VET)

Vilanova d'Alcolea:

16-nov: 1 subad. volando cerca del pueblo. (SMS)

Villafranca del Cid:

19-may: 3 juv.+ ad. 2 adultos y un joven de unos 2 años (MAM)

Zorita del Maestrazgo:

14-sep: 3 subad.+ ad. (MAM)

Se citan principalmente las observaciones de jóvenes e inmaduros en dispersión, detectando el desplazamiento de los jóvenes hacia las zonas litorales. Respecto al seguimiento de la reproducción realizado en la parte noroccidental de la provincia destaca al gran número de parejas nidificantes que han fracasado, prácticamente el 50 % de las controladas (n = 9 pp), una de las

causas apuntadas de este fracaso es la colocación de parques eólicos en las zonas de cazaderos de algunas de estas parejas. Sin embargo el seguimiento realizado en las parejas situadas en la parte media de la provincia el fracaso reproductor no es tan acusado como en la parte norte (J. Bort obs. pers.).

Buteo buteo

Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzard

ESTATUS: Residente y migrante escaso, invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

(DES)

30.I	28.II	30.III	1.IV	1.V	1.VI	1.VII	1.VIII	1.IX	21.X	30.XI	30.XII
2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	2

Almenara:

27-feb: 3 ej. (JCS)

Alquerías del Niño Perdido:

21-feb: 4 ej. en distintos puntos de la carretera (JBC)

Artana:

15-abr: 1 ej. cicleando (JBC)

Benicasim/Benicàssim:

16-ene: 1 ej. posado en un cable. (LPC)

Betxí:

27-ene: 5 ej. (JBC,JLB)

19-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

31-oct: 2 ej. (JBC,JLB)

Burriana:

18-ene: 3 ej. posados en postes entre huertos. Uno muy blanco, se hacen fotos. (JBC)

20-feb: 6 ej. en distintos puntos (JBC)

Castellfort:

12-sep: 1 ej. posado en Mas de Gil. (SMS)

Chilches:

21-nov: 3 ej. (JBC)

Desembocadura río Belcaire:

21-nov: 2 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

11-ene: 1 ad. me salta del suelo, estaba posado. (SMS)

15-ene: 2 ej. (JBC)

23-abr: 2 ej. (JLB)

29-nov: 2 ej. (JBC,JLB)

13-dic: 2 ej. (JBC)

Desert de Les Palmes:

01-may: 1 ej. cicleando. Observación prenupcial tardía. (VET)

06-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 8 ej. (VET, MTB)

El Toro:

05-abr: 1 ej. (MGT)

Forcall:

26-mar: 2 ej. (MAM)

Islas Columbretes:

24-may: 1 ej. única cita prenupcial (GRN)

20-sep: 1 ej. única cita postnupcial (GRN)

20-sep: 2 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es continua. (VET)

La Mata de Morella:

15-mar: 1 ej. (MAM)

La Vall d'Uixó:

12-mar: 5 ej. migración prenupcial, dirigiéndose hacia el N (JBC)

Marjal de Almenara:

(JBC,JLB,DOC,EAB)

8.I	13.II	23.III	1.IV	2.V	1.VI	1.VII	1.VIII	27.IX	29.X	14.XI	7.XII
7	7	3	4	1	0	0	0	3	1	8	4

Nules:

26-mar: 1 ej. migrando al N (JBC)

06-nov: 2 ej. (JBC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

17-feb: 3 ej. remontando juntos cerca del casco urbano (MTB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

17-feb: 2 ej. remontando junto a 3 laguneros (MTB)

01-dic: 1 ej. (JBC,JLB)

Tales:

30-dic: 1 ej. (JBC)

Traiguera:

01-ene: 1 ej. (MAM)

09-mar: 1 ej. perseguido por 1 Falco tinnunculus (SMS)

Vall d'Alba:

13-may: 1 ej. cazando. ¿Cita tardía o reproductor?. (VET)

Villarreal/Vila-real:

28-mar: 1 ej. migrando al N, cerca del Hospital de la Plana (JBC)

21-dic: 1 ej. posado junto a la vía del tren. (VET)

Zorita del Maestrazgo:

05-ago: 1 ej. (JBC,MAM)

Especie muy observada durante la época invernal siendo mayoritariamente citada en las zonas litorales y prelitorales, tanto en las zonas húmedas como en zonas con extensas zonas de cultivo de naranjos. En las zonas de interior es, como el cernícalo vulgar, citada cerca de granjas o carreteras donde el aporte de alimento pueda ser más fácil. La migración prenupcial se inicia a final de febrero, prolongándose hasta el mes de abril, con máximos en marzo. La migración postnupcial se inicia en el mes de septiembre, más tarde que otras especies como el abejero europeo, la última cita a principios de octubre, que aunque se siguen observando ej, no podemos asegurar si son

últimos migrantes postnupciales o primeros invernantes. En les Illes Columbretes se observa el mismo patrón migratorio que en la zona continental.

Circaetus gallicus

Culebrera europea - Àguila serpera - Short-toed Snake-eagle

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración; fechas extremas; Citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

14-sep: 1 ej. posiblemente la misma que permanece desde el 4-oct. (DES)

Arañuel:

06-abr: 1 ad. cernida junto al río Mijares (ELL, JAR)

Barracas:

18-may: 5 ad. volando a baja altura por el pico Limbo (JAR)

16-jul: 1 ej. (JBC)

22-ago: 1 ej. (MGT)

10-sep: 1 ej. (BFV)

Betxí:

24-feb: 1 ej. posada lado carretera en T.e. (JBC)

10-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

11-sep: 3 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

13-sep: 2 ej. migración postnupcial, en 3 horas de censo. (JBC)

25-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

Borriol:

27-jul: 1 par. ad. posible táctica de caza conjunta: La hembra gira en círculos sobre la divisoria de los barrancos; mientras el macho toma térmica en el valle del río y se eleva por encima de la sierra para después tomar la cabecera de uno de los barrancos y descender raseando las laderas hasta el río; seguidamente repite el ciclo mientras que la hembra continua sus giros controlando ambos barrancos. Levantan un bando de perdigones que huyen escondiéndose en el coscojar. Mínimo consumo energético aprovechando las térmicas para luego descender y retomarlas de nuevo; planeos y giros alares sin apenas aletazos. (LPC)

Castellfort:

03-mar: 1 ej. primera cita. (RNC)

Catí:

05-sep: 1 ej. (MAM)

Chert/Xert:

19-mar: 2 ej. parada nupcial (ALR,RPB)

Chilches:

27-feb: 1 ej. migrando al N. (JCS)

Cálig:

18-abr: 1 ad. cernida cerca de la Ermita del Socos (JMZ)

Desembocadura río Mijares:

03-abr: 1 ej. atrapa una serpiente en medio del cauce (JBC)

Desert de Les Palmes:

04-mar: 3 ej. pareja y individuo solitario. (VET)

12-may: 2 ej. en el Bco. de les Santes. (VET)

11-oct: 1 ej. última cita anual. Total de aves observadas en la campaña de migración

postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 41 ej. (MTB, VET)

Forcall:

14-sep: 1 ej. (MAM)

Herbeset:

01-ago: 1 ej. volando en la entrada al pueblo. (SMS)

La Llosa:

23-feb: 1 ej. posada en T.e. (JBC)

27-feb: 1 ej. (JCS)

La Salzadella:

19-abr: 1 ej. volando por la zona. (SMS)

Laguna de Sant Mateu:

15-abr: 3 ej. (VET)

Marjal de Almenara:

05-abr: 2 ej. passen per la Muntanya Blanca, provinents de la marjal. Un exemplar es posa al cim de la Muntanya Blanca (DOC)

20-abr: 2 ej. (JBC)

30-abr: 1 ej. adult (DOC)

Montán:

15-mar: 3 ej. migrando al N (JBC)

Morella:

04-sep: 3 ej. 2 adultos y 1 joven. (SMS)

Pina de Montalgrao:

13-mar: 12 ad. en vuelo migratorio hacia el N (ELL)

Portell de Morella:

17-mar: 1 ej. (MAM)

Rossell:

20-sep: 2 ej. 1 adulto y 1 joven. (SMS)

Tales:

19-mar: 7 ej. migrando al N (JBC)

Torrechiva:

23-jul: 2 juv.+ ad. posible pollo volandero piando detrás del adulto. (JLB,JBC)

Vall d'Alba:

13-may: 4 ej. 3 juntas y una cerca de ellas. (VET)

Vallibona:

15-mar: 1 ej. posada en un sabina. (SMS)

Villafranca del Cid:

05-sep: 5 ej. (MAM)

01-oct: 1 ej. última cita en la zona. (RNC)

Villamalur:

04-mar: 1 ej. en vuelo alto dirigiéndose al N. (LPC)

Villarreal/Vila-real:

27-feb: 1 ej. planeando por la zona de Porcelanosa. Migrante prenupcial. (JCS)

Villavieja:

23-feb: 1 ej. (JBC)

Vinaròs:

09-may: 1 ad. (JMZ)

Viver:

17-abr: 3 ej. volando hacia en NE (JBC)

04-may: 6 ej. (JBC)

Pocas cosas podemos aportar de las comentadas en otros anuarios sobre esta especie. La primera cita de esta rapaz en la provincia es a finales de febrero (23-febr.), teniendo sus máximos en marzo, ya durante este mes se observan a las parejas en las zonas de nidificación aunque la migración prenupcial se prolonga hasta mediados del mes de abril. La migración postnupcial iniciada a final de agosto tiene sus máximos a mediados de septiembre, siendo la última cita el 11 de octubre. Según los datos aportados sobre las parejas nidificantes (noroeste de la provincia) parece que se mantiene el número de parejas.

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero occidental - Arpellot de marjal - Western Marsh-harrier

ESTATUS: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante moderado. **Conservación:** PE **Criterio:** Citas estivales; cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcalá de Chivert:

22-mar: 1 m. ad. volando hacia el N. (SMS)

Alcossebre:

(DES)

5.I	1.II	1.III	16.IV	1.V	1.VI	1.VII	1.VIII	1.IX	21.X	1.XI	11.XII
1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1

Araya:

04-mar: 2 ej. una hembra + un joven macho (ALR,RPB)

Benicasim/Benicàssim:

19-mar: 2 ej. migrantes durante toda la mañana. macho y hembra adultos. (MTB)

20-mar: 1 ej. migrando al NE al amanecer (MTB)

Betxí:

10-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

12-sep: 6 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Destacan dos machos. (JBC)

13-sep: 2 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Un macho. (JBC)

Chilches:

05-ene: 6 juv.+ ad. 3 jov. + 1 hembra ad. + 2 machos (JBC)

09-feb: 1 m. (JBC)

09-nov: 1 juv. (JBC)

20-nov: 5 ej. dos jóvenes, Una hembras, y Dos machos subadultos. (JBC,JLB)

08-dic: 1 m. subad. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

15-ene: 1 juv. (JBC)

20-ene: 1 ej. (JLB)

03-abr: 1 h. ad. le faltan varias plumas en ambas alas y cola (JBC)

30-abr: 1 juv. le falta una pluma en el ala izquierda (JBC)

26-sep: 1 juv. (JBC)

08-oct: 3 juv. (JBC)

13-dic: 4 ej. uno macho. (JBC)

Desert de Les Palmes:

- 14-abr: 2 ej. cicleando sobre las agujas (MTB)
 27-ago: 3 ej. primera cita postnupcial (VET, MTB)
 07-sep: 57 ej. primer máximo anual en 3 horas de censo (MTB, VET)
 19-sep: 51 ej. segundo máximo anual en 3 horas de censo (MTB, VET)
 15-oct: 3 ej. última cita anual. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 238 ej. (MTB, VET)
 11-nov: 2 h. ad. (MTB)

Islas Columbretes:

- 15-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (GRN)
 23-abr: 1 ej. última cita prenupcial. Citado ininterrumpidamente desde el día 11. (GRN)
 30-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (GRN)
 19-sep: 11 ej. grupo numeroso en migración. (VET)
 20-sep: 24 ej. en paso en 5 horas, la observación no es continua por lo que el número habrá sido superior. (VET)
 24-sep: 1 ej. última cita postnupcial. 5 citas mas durante el mes de septiembre (GRN)

La Vall d'Uixó:

- 03-nov: 1 ej. (JBC)

Laguna de Sant Mateu:

- 15-abr: 1 m. inm. volando bajo. (VET)

Les Coves de Vinromà:

- 15-abr: 3 ej. migrando. (VET)

Marjal de Almenara:

- 10-ago: 1 ej. posat en una antena de TV de Casablanca, vola cap al S. (DOC)
 15-ago: 2 ej. als arrossars. (DOC)
 17-ago: 1 ej. als arrossars. (DOC)

(JBC,JLB,MMO,MVV,CTH,DOC,EAB,FRB, DO)

8.I	1.II	7.III	6.IV	2.V	1.VI	1.VII	13.VIII	1.IX	3.X	9.XI	11.XII
7	5	3	3	1	0	0	1	0	7	13	6
16.I	27.II	17.III	29.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	16.IX	28.X	27.XI	22.XII
15	5	3	3	0	0	0	0	6	1	9	4

Marjal de Xilxes:

- 02-feb: 1 m. ad. (JBC)

Moncofa:

- 07-nov: 1 juv. (JBC)
 12-nov: 1 juv. (JBC)

Morella:

- 07-abr: 1 m. ad. en migración hacia el N. (PLL, CGR)

Oropesa del Mar/Orpesa:

- 06-oct: 1 juv. migrando al S. (JBC,JLB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 11-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
 13-ene: 2 m. subad. (MTB)
 03-mar: 2 ej. en las turberas. (VET)

- 20-mar: 8 ej. mínimo en turberas de Torreblanca. 1 h. ad. captura un pez, aparentemente muerto, y para en un salicornial a comérselo. (MTB)
 25-mar: 156 ej. ej. salen del Prat al amanecer de un dormidero muy abierto y se pierden rápidamente hacia el NE en vuelo batido. (MTB)
 01-dic: 4 juv. (JBC,JLB)
 2007: 3 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Especie cada vez más citada por los distintos observadores en la práctica totalidad de los meses del año. Un año más la reproducción de la especie es confirmada con 3 parejas nidificantes en el Prat de Cabanes-Torreblanca. A principio de marzo (4/03/07) se pueden observar los primeros migrantes prenupciales en zona del interior, alejadas de las zonas de invernada de la costa. Esta migración se mantienen hasta el mes de abril, destacando la gran concentración que se produjo en el Prat el 25 de marzo con más de 150 ej., a partir de entonces prácticamente sólo es citado en el Prat de Cabanes-Torreblanca. La migración postnupcial se inicia a final de agosto con máximos a mitad de septiembre con 57 ej., el 7/09/07, los últimos citados en migración postnupcial son observados a mediados de octubre (21-oct.). A partir de estas fechas, las observaciones se centran en las zonas húmedas provinciales destacando por su número la Marjal d'Almenara con 15 ej., invernando. En les Illes Columbretes los pasos migratorios pre y postnupcial coinciden con el observado en tierra, observando un paso importante a mitad de septiembre.



Aguilucho lagunero melánico macho – Marjal de Almenara – 11 diciembre. Autor: Josep Bort

Circus cyaneus

Aguilucho pálido - Arpellot pàl·lid - Hen Harrier

ESTATUS: Migrante e invernante muy escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas en migración; máximos en invernada; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

- 01-dic: 1 ej. primera cita. (DES)
 07-dic: 1 ej. posible el mismo del 1-dic. (DES)

Almenara:

16-dic: 1 m. (ALR,RPB)

Borriol:

24-abr: 1 m. ad. obispillo blanco muy conspicuo. En vuelo de caza a ras de las matas arbustivas de coscojas y algarrobos rebrotados. Continúa su campeo por el barranco Botalaria para después remontarse y alejarse por el SO. (LPC)

Chilches:

05-ene: 1 h. ad. (JBC)

08-ene: 1 h. ad. (JCS)

09-feb: 1 h. ad. (JBC)

15-nov: 1 h. ad. (JBC)

08-dic: 1 h. ad. (JBC)

Desert de Les Palmes:

19-sep: 1 h. ad. primera cita postnupcial (VET, MTB)

26-sep: 1 h. ad. (VET, MTB)

04-oct: 1 m. ad. (VET, MTB)

El Toro:

19-ene: 1 m. ad. comiendo carroña (un perro muerto) en la zona Mazorral (ELL)

La Ribera de Cabanes:

29-sep: 1 h. (JBC)

Marjal de Almenara:

24-feb: 1 m. (FRB)

08-mar: 1 h. (FRB, JBC)

Pina de Montalgrao:

19-ene: 2 h. volando en direcciones opuestas por el valle de Pina dirección pico Limbo y dirección pico Pina (ELL)

San Rafael del Río:

24-feb: 1 m. ad. volando a baja altura por campos de olivos y almendros (ELL)

Serra d'Irta:

29-mar: 1 m. ad. (JMZ)

Especie que se localiza durante el invierno en zonas litorales, como los humedales y zonas de cultivo abandonadas, así como en el interior provincial. Está presente a partir del mes de septiembre con los primeros migrantes postnupciales, para continuar con los invernantes que permanecen en la zona hasta marzo, con los últimos migrantes prenupciales. Es significativo que casi la totalidad de los datos aportados son citados como hembras adultas, siendo muy escasos los machos y los jóvenes / inmaturos, aunque algunas de las hembras ad, podrían estar en este grupo. La coincidencia de esta especie en la misma zona que el aguilucho papialbo, ha provocado cierta confusión debido a su aparente similitud, aspecto que se ha solucionado con el análisis del amplio material fotográfico y filmaciones que se han realizado a las dos especie, en el enclave de la marjal de Xilxes.

Circus macrourus

Aguilucho papialbo - Arpella pàl·lida russa - Pallid Harrier

ESTATUS: Rareza nacional. Divagante del extremo NO de Europa. **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 35/4 (Ene, Feb, Mar, Sep, Nov, Dic) .

Chilches:

13-ene: 1 inm. comiendo entre los carrizos de la marjal. Posible hembra entre dos y tres

años de edad (JCS)

23-ene: 1 ej. mismo de las otras observaciones. Se fotografía (JBC)

09-feb: 1 inm. es el mismo ejemplar que permanece en esta zona todo el invierno. (JBC)

Por tercer invierno consecutivo esta rareza nacional ha estado presente en la zona húmeda, conocida como marjal de Xilxes, desapareciendo el 9 de febrero. Destaca por su plumaje de hembra adulta, este ejemplar que pensamos es el mismo que el observado en inviernos anteriores (Anuario de Castellón 2005, 2006), ha sido ampliamente fotografiado y filmado para su correcta identificación y análisis del plumaje. VER INFORME DE RAREZAS.

Circus pygargus

Aguilucho cenizo - Arpellot cendrós - Montagu's Harrier

ESTATUS: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría; todas las citas de migración; citas de interés. Categoría: A.

· Censos provinciales:

2007: 145 par. interior, parejas estimadas. (CTH)

Albocácer:

01-may: 1 m. (JBC)

03-jun: 1 m. ad. (MAM)

Alcossebre:

13-abr: 1 ej. vuelo al E. (DES)

27-jun: 1 m. (DES)

07-ago: 1 ej. última cita. (DES)

Ares del Maestre:

03-abr: 1 par. primera cita en la zona. (RNC)

06-ago: 2 juv.+ ad. (MAM)

Barracas:

09-jun: 4 par. sobrevolando el matorral y entrando a los nidos con pollos. (JBC)

27-jun: 6 ad. alimentando a los pollos en los distintos nidos. (JBC)

13-jul: 5 juv. adultos aportando presas a los jóvenes volantones (JBC)

Cabanes:

30-jun: 1 m. ad. volando bajo junto al polígono industrial de Cabanes. (VET)

Catí:

25-abr: 3 m. (MAM)

01-may: 1 ej., 7 par. ad. (JBC)

Cervera del Maestre:

19-may: 1 m. ad. (ELL)

Chert/Xert:

21-abr: 1 ej. (ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

14-jul: 1 ej. en vuelo de caza por el Bco. de Miravet, se va hacia el N. (VET)

20-sep: 1 h. última cita anual (VET, MTB)

El Toro:

27-ago: 1 m. migrante probablemente. Atacado por dos cernícalos hasta que se va. (MGT)

Figueroles:

25-may: 1 h. ad. intentando cazar sobre matorral de coscoja (JBC)

Islas Columbretes:

- 29-ago: 1 h. ad. se observa 1-2 ejemplares sobre la Illa Grossa en migración y acosados por un halcón de Eleonor. (AAC, IBR, FRB)
- 29-ago: 1 ej. en paso sobre la Isla (GRN)
- 02-sep: 1 ej. última cita postnupcial. Sin citas en primavera. (GRN)

La Jana:

- 23-abr: 1 h. en vuelo sobre olivares, posiblemente cazando. (LPC)

La Vall d'Uixó:

- 20-mar: 1 m. migrando al NO (JBC)

Laguna de Sant Mateu:

- 15-abr: 1 m. volando bajo. (VET)
- 20-abr: 2 m. ad. observados con una diferencia de cinco minutos entre sí. Uno de ellos devoraba en vuelo una pequeña presa que sujetaba con las garras. Los dos aparecieron desde el E y después de varios vuelos sobre el lugar se perdieron por el NO. (LPC)

Marjal de Almenara:

- 13-ago: 1 ej. als arrossar de Peris. (DOC)
- 14-ago: 1 ej. als arrossars de Peris. (DOC)

Morella:

- 10-jul: 3 juv.+ ad. posible zona de nidificación. (RNC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 29-abr: 2 par. ad. (JLB)
- 2007: 15 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Vall d'Alba:

- 30-abr: 1 par. vuelos nupciales. (VET)

Vinaròs:

- 28-mar: 1 m. ad. (JMZ, JAR)
- 29-mar: 3 ej. paso primaveral (ALR,RPB)

Viver:

- 09-mar: 1 m. ad. migrando al N (JBC)
- 30-mar: 1 h. ad. en vuelo migratorio hacia el N (JAR)
- 09-abr: 5 ej. (JBC)
- 17-abr: 1 ej., 3 par. tres machos y tres hembras, más una hembra inmadura con anilla PVC en pata izquierda (JBC)
- 15-may: 6 ej. tres hembras + 2 machos + 1 macho inmaduro (JBC)
- 21-jun: 7 inm.+ ad. se observan 5 ad. + 1 inmaduro macho, nido con 3 pollos y 1 huevo (JBC)

Se observa un pequeño aumento de las parejas reproductoras en el interior provincial, principalmente por el aumento de las parejas situadas a gran distancia del aeropuerto de Castellón como el caso de Barracas, Catí,... que sigue contrastando con la población del Prat de Cabanes-Torreblanca, muy inestable debido a los grandes problemas que padece (inundación de las zonas de nidificación, incendios provocados anualmente, molestias humanas, etc.), lo que hace que la población no sobrepase las 20 – 25 pp. Los primeros aguiluchos cenizos en migración prenupcial han aparecido el 9 de marzo para posteriormente distribuirse las citas por toda la provincia. La migración postnupcial se ha detectado desde primeros de agosto hasta mitad de septiembre. Destaca la observación en Illes Columbretes, que aunque no es rara si son escasas estas observaciones en las islas.

Gypaetus barbatus

Quebrantahuesos - Trencalòs - Bearded Vulture

ESTATUS: Rareza local. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 2/2 (May) .

· Censos provinciales:

2007: 1 ej. del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía, nacida en febrero de 2006 y liberada con radiotransmisor en mayo de 2006, emprende un viaje de dispersión a finales de mayo de 2007 subiendo rápidamente por la Comunidad Valenciana donde da 13 localizaciones. 8 de ellas en Castellón: 1 en el Alto Palancia, 1 en el Alcalatén, 1 en la Tinença y 5 en els Ports. Actualmente (finales de 2008) ha regresado a la Sierra de Cazorla donde fue liberada tras haber estado sedimentada en la provincia de Álava durante casi 1 año. Mas información en www.gypaetus.org (ACC, MAS)

Se considera que en el siglo pasado (s. XIX) nidificaba en la parte noroccidental de la Comunidad Valenciana. Existen 2 citas en este lugar una de 1.908 y más recientemente se observo un joven en sus movimientos erráticos en este mismo lugar en 1.983 (GER, 1985). Existe otra observación homologada por SEO, el 16/09/2002, de 1 ej., de tercer año en Desert de les Palmes (MTB) (Ardeola 50 (2), 2003: 339-355).

Gyps fulvus

Buitre leonado - Vultur comú - Eurasian Griffon

ESTATUS: Residente y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas de migración; citas de interés. Categoría: A,E3.

· Censos provinciales:

2007: 208 par. nidos localizados. (CTH)

Araya:

26-abr: 2 ej. (PLL, CGR)

Argelita:

17-jun: 1 ej. volando por delante de las peñas de Fuente de los Ignacios. (JLB)

Atzeneta del Maestrat:

01-may: 2 ej. (JBC)

Barracas:

27-jun: 19 ej. prospectando la zona en busca de alimento (JBC)

18-ago: 40 ej. sobre la cantera. Uno de ellos con marcas alares amarillas. (MGT)

Bejís:

19-ene: 12 ej. (JBC)

03-mar: 6 ad. (ELL, RAF)

Benasal:

03-jun: 8 ej. (MAM)

Castillo de Villamalefa:

10-abr: 3 ej. volando cerca de dormidero (JCS)

Caudiel:

03-mar: 14 ej. se contabilizan 7 nidos, se observa un nido muy accesible con un huevo (JBC)

Cervera del Maestre:

22-abr: 2 ad. volando a baja altura por la pista d'en Xaudí (ELL)

Chert/Xert:

30-abr: 9 ej. (MAM)

Desert de Les Palmes:

23-jun: 1 ej. sobrevuela el Bco. de les Santes dirección SE. (VET)

26-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB, VET)

13-oct: 1 ej. segunda y última cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct (MTB, VET)

El Toro:

03-ene: 41 ej. (JBC)

09-mar: 195 ej. comiendo el cadáver de una vaca brava (JBC)

13-abr: 65 subad.+ ad. acuden a comer una oveja muerta (JAR)

Embalse de Arenós:

30-jul: 10 pollo se contabilizan hasta diez pollos grandes en nido. (JLB)

02-ago: 50 ej. volando y posados en los distintos cortados. (JLB,JBC)

11-nov: 28 ej. (JBC)

Forcall:

15-feb: 39 ej. (MAM)

08-mar: 15 ej. (MAM)

01-may: 23 ej. (MAM)

La Salzadella:

15-abr: 2 ej. (VET)

La Torre d'En Besora:

01-may: 11 ej. (JBC)

Laguna de Sant Mateu:

15-abr: 1 ej. volando a baja altura. (VET)

Ludiente:

08-jul: 1 ad. (JLB)

Montanejos:

16-mar: 50 ej. se calculan alrededor de 50 nidos entre todos los cortados. Se observan buitres incubando en nidos de águila-azor perdicera y águila real. (JBC)

Montán:

15-mar: 14 ej. se siguen contabilizando 7 nidos, sigue habiendo un nido con un huevo (JBC)

17-may: 13 ej. (JBC)

Morella:

16-feb: 80 ej. (MAM)

Ortells:

16-may: 98 ej. (MAM)

Pina de Montalgrao:

03-ene: 31 ej. (JBC)

04-abr: 36 ej. (JBC)

Portell de Morella:

15-mar: 16 ej. (MAM)

Sant Mateu:

16-mar: 2 ej. (MAM)

18-ago: 1 ej. (MAM)

Torrechiva:

16-mar: 8 ej. cuatro buitres incubando en nidos de águila azor-perdicera (JBC)

19-jul: 12 ad. permanecen los 4 pollos muy grande en nido. (JLB)

08-ago: 11 ej. aún se observan tres pollos totalmente plumados en el nido. (JLB)

26-ago: 2 pollo aún quedan dos pollos totalmente plumados en el nido. Uno presenta una alteración en una de las alas que puede impedirle el vuelo en condiciones adecuadas. (JLB)

04-sep: 1 ej. joven hallado en mitad de la carretera, posible caído del nido en intento de su primer vuelo. No se observa ningún pollo en los nidos. (JLB)

Torás:

04-abr: 10 ej. (JBC)

Vall d'Alba:

30-abr: 3 ej. hacia el S por separado en 2 horas y media. (VET)

05-may: 5 ej. vuelo al S en tres horas. (VET)

Vallibona:

07-ene: 46 ej. (MAM)

Villafranca del Cid:

07-jul: 2 ej. descienden al vertedero. (VET)

Villavieja:

14-may: 1 ej. volando alto hacia el SE (JBC)

Viver:

21-mar: 3 ej. (JBC)

04-abr: 13 ej. (JBC)

04-may: 5 ej. (JBC)

21-jun: 250 ej. posados en el suelo cerca de una oveja moribunda. Dos de los buitres presentan marcas alares de color amarillo, no se pueden leer las inscripciones. (JBC)

Destaca la observación de este carroñero por todas las comarcas castellonenses, lo que indica una continua expansión de la especie tanto a nivel de ampliación de las zonas de campeo como de nuevos lugares de cría. Aunque durante este año en la parte NO de la provincia se ha observado una disminución de las parejas nidificantes y del éxito reproductor ($Ex = 0,46$ p/p/a), efecto que podría tener alguna relación con la instalación de aerogeneradores y su elevada mortandad. Se observa un interesante seguimiento del proceso de desarrollo de los pollos de buitre leonado en una buitrera de nueva instalación en Torrechiva. Estos mismos cortados incluso los mismos nidos han sido utilizados por varias especies rupícolas (halcón peregrino, águila real, águila-azor perdicera y el último buitre leonado) (Bort, J. obs. pers.), lo que demuestra la alternancia no sólo de los cortados sino de los mismos nidos para ser utilizados por las distintas especies, indicando que el lugar presenta unas características adecuadas para la nidificación por grandes rapaces. Es también llamativo, el que un pollo que desde el punto de observación se detecta que presenta algún problema en el ala izquierda (ala colgando), es alimentado diariamente por los padres mientras permanece en nido, posiblemente el joven encontrado en la carretera podría corresponder a este pollo.

Hieraetus fasciatus

Águila-azor perdicera - Àguila de panxa blanca - Bonelli's Eagle

ESTATUS: Residente escaso. Conservación: VUL Criterio: Citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

02-sep: 2 ad. volando al N sobre la N340. (DES)

Ares del Maestre:

19-may: 1 ad. (MAM)

Chert/Xert:

17-mar: 1 subad. (MAM)

Desert de Les Palmes:

04-abr: 1 ad. hostigada en vuelo durante más de 10min. por un halcón peregrino.

Repetidos picados y cruces de garras. (PLL)

25-nov: 2 ad. remontan en el B° de les Santes. (VET,JPH)

Els Rosildos:

09-oct: 1 ad. (JBC)

Les Coves de Vinromà:

24-jun: 1 pollo (MAM)

Oropesa del Mar/Orpesa:

11-feb: 1 par. ad. realizando vuelos nupciales muy cerca de la CN-340 (JBC)

Tales:

06-abr: 2 ad. (JBC,JLB)

Pocos datos importantes de esta especie, siendo normal no localizar nuevas parejas nidificantes, lo que puede indicar un estancamiento y quizás un retroceso de las parejas en la provincia. Los resultados obtenidos por el Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires (GER) para el año 2007 se resumen en: Se controlan 26 parejas de las que 18 inician la reproducción y tan sólo 14 consiguen reproducirse, sacando un total de 21 pollos volanderos, lo que implica una productividad de 0,80 pv/pp/año, inferior a años anteriores y una tasa de vuelo de 1,5 pv/pp (Bort, J. et al. 2007).

Hieraetus pennatus

Aguililla calzada - Àguila calçada - Booted Eagle

ESTATUS: Nidificante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)

30.I	28.II	1.III	17.IV	14.V	1.VI	1.VII	1.VIII	1.IX	21.X	5.XI	15.XII
2	1	0	4	1	0	0	0	0	1	6	2

Almenara:

27-feb: 3 ej. una de fase oscura, en la montaña de Almenara (JCS)

Betxí:

06-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

12-sep: 3 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Una de fase oscura. (JBC)

25-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

13-oct: 1 ej. migrando al S (JBC)

Borriol:

18-nov: 1 ej. en vuelo de caza muy bajo, en la confluencia del barranco con el río Borriol. Individuo de fase clara. (LPC)

Cabanes:

28-jul: 1 ad. de fase oscura. Remontando sobre la CV-10 junto a la población. Esta mudando primarias. (VET)

Castellfort:

30-mar: 1 ej. primera cita anual. (RNC)

08-ago: 1 ej. (SMS)

Castellón de la Plana:

20-mar: 1 ej. (XBC)

29-mar: 1 ej. fase clara. Elevándose en térmica en la vertical del peaje sur de la autopista A7. (LPC)

Chert/Xert:

05-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)

Chilches:

25-ene: 1 ej. fase clara (JBC)

21-nov: 1 ej. de fase clara (JBC)

Cálig:

09-may: 1 ad. ejemplar en fase pálida volando direccion N. (JMZ)

Desembocadura río Belcaire:

21-nov: 1 ej. de fase clara (JBC)

Desembocadura río Mijares:

11-ene: 2 ad. volando por la zona. (SMS)

20-ene: 1 ej. de fase clara (JLB)

03-abr: 2 ej. de fase clara (JBC)

06-dic: 1 ej. (ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

24-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (VET, MTB)

04-oct: 1 ej. última cita postupcial. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 4 ej. (VET, MTB)

Grau de Castelló:

23-ene: 1 ej. (XBC)

Marjal de Almenara:

(JBC,JLB,DOC,FRB)

13.I	1.II	3.III	1.IV	1.V	1.VI	1.VII	1.VIII	1.IX	1.X	9.XI	1.XII
3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0
24.I	17.II	31.III	21.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	27.IX	15.X	17.XI	15.XII
3	1	3	2	0	0	0	0	2	0	1	0

Moncofa:

21-nov: 1 ej. de fase clara, atacando a una gallineta (JBC)

Montanejos:

17-may: 1 ej. de fase clara (JBC)

Montán:

17-may: 2 ej. de fase clara (JBC)

Morella:

04-sep: 2 ej. (MAM)

10-oct: 1 ej. última cita en la zona. (RNC)

Olocau del Rey:

23-oct: 1 ej. última cita en la zona. (RNC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

01-dic: 2 ej. las dos de fase oscura. (JBC, JLB)

Vall d'Alba:

13-may: 2 ej. de fase clara. Cazando por la zona. (VET)

Vilafamés:

17-abr: 1 ad. volando N de fase oscura. (SMS)

Villarreal/Vila-real:

28-feb: 1 ej. fase clara. En vuelo de caza sobre naranjal. (LPC)

07-jun: 1 ej. fase clara. Cicleando a baja altura sobre los naranjos (MTB)

Aumento de las citas durante el periodo invernal, citándose por todo el litoral. Respecto a los movimientos migratorios, durante este año han sido muy escasos sobretodo en la postnupcial. Estos pasos se concentran mayoritariamente en el mes de septiembre siendo la última cita el 23 de octubre en Olocau del Rei.

Milvus migrans

Milano negro - Milà negre - Black Kite

ESTATUS: Migrante común. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

25-mar: 2 ej. volando al E (DES)

11-abr: 3 ej. volando al E. (DES)

04-sep: 1 ej. volando al S. (DES)

Ares del Maestre:

09-mar: 30 ej. primeras citas en la zona. (RNC)

15-abr: 4 ej. (RNC)

Barracas:

21-mar: 25 ej. se descubre dormitorio de milano negro, posados en encinas y sobre montones de piedras. (JBC)

05-may: 1 ej. (ELL)

28-jul: 1 ej. un solitario milano intentando cazar sobre zona de cultivo de trigo ya cortado. Posible primer migrante en la zona. (JBC)

Benicasim/Benicàssim:

21-ago: 1 ej. volando alto hacia el SE (MTB)

Betxí:

17-sep: 4 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. Vuelo al SO (JBC)

Borriol:

29-abr: 1 ej. plumaje de cola y remeras muy deteriorados. Vuelo como desorientado rumbo a la costa. Tormentas fuertes. (LPC)

13-jul: 1 ej. procedente del corredor Puebla Tornesa-Borriol asciende por el barranco y tras coronar continua hacia el S aunque, en apariencia, no con actitud migratoria. (LPC)

Castellfort:

03-may: 3 ej. (RNC)

Catí:

20-mar: 1 ej. primera cita (ALR)

25-may: 1 ej. (MAM)

Caudiel:

20-mar: 157 ej. (CGR)

Chert/Xert:

21-mar: 5 ej. volando hacia el N. (SMS)

24-mar: 30 ej. paso primaveral (ALR,RPB)

09-may: 1 ej. volando alto por Anroig. (SMS)

Desert de Les Palmes:

13-feb: 15 ej. según el vigilante del Bartolo, Rosa, es el primer avistamiento del año, vuelo hacia el N (JBC)

30-ago: 1 ej. primera y única cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct (VET, MTB)

El Toro:

21-mar: 2 ej. migrando al N (JBC)

Fuentes de Ayódar:

19-mar: 18 ej. migrando hacia en NO (LPP)

Jérica:

24-mar: 27 ad. varios grupos en vuelo migratorio cerca del embalse del Regajo (ELL, JAR)

La Salzadella:

15-abr: 11 ej. volando hacia el N. (VET)

Morella:

07-may: 4 ej. (RNC)

21-jul: 1 ej. (MAM)

26-jul: 2 ad. se observa una pareja sobre el citado barranco (AAC, FRB)

Navajas:

21-mar: 17 ej. migrando al N (JBC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

20-mar: 1 ad. volando a baja altura siguiendo la AP-7 (ELL)

Ortells:

22-jul: 2 ej. (MAM)

Pina de Montalgrao:

22-feb: 2 ad. vuelo migratorio hacia el N (JAR)

21-mar: 51 ej. volando al N (JBC)

24-mar: 23 ad. en vuelo migratorio hacia el N y pasando cerca del pico Limbo (ELL, JAR)

San Rafael del Río:

19-mar: 14 ad. paso migratorio con fuerte viento del N (AGC)

Sant Mateu:

20-mar: 387 ej. en dirección NE (MAM)

Segorbe:

21-mar: 19 ej. migrando al N (JBC)

Sot de Ferrer:

23-mar: 8 ej. migrando al N (JBC)

Tales:

19-mar: 89 ej. en 9 grupos. Rango: 3 - 32 ej. Migrando a las 17 h. hacia el NO. Tres aves se posan en el vertedero, sobre las 19 h. siguen vuelo al NO. (JBC)

20-mar: 28 ej. migrando al N (JBC)

20-mar: 34 ej. migrando al NO (JBC)

22-mar: 17 ej. migrando al NO (JBC)

Vall d'Alba:

13-may: 2 ej. hacia el N de 10,30 a 13,30. (VET)

Vilanova d'Alcolea:

29-abr: 3 ej. (RPB)

Villafranca del Cid:

25-may: 1 ej. (MAM)

07-jul: 3 ej. en el vertedero. (VET)

Villarreal/Vila-real:

24-mar: 1 ej. volando bajo (MTB)

Vinaròs:

26-sep: 1 ej. i ej. pasa dirección S (ALR,RPB)

Viver:

21-mar: 132 ej. migrando al NE (JBC)

08-may: 2 ad. (ELL)

Zorita del Maestrazgo:

20-mar: 11 ej. (MAM)

08-abr: 1 ej. (RNC)

02-jun: 2 ej. (MAM)

06-ago: 1 ej. (MAM)

Importantes pasos prenupciales entre 100 y 400 ej., en varias localidades del interior provincial. Concertándose todo este paso a mediados de marzo. Existen distintas citas en el mes de febrero encontrando la observación más temprana el día 13/02/07 con 15 ej. Este paso se prolonga hasta finales de abril aunque hay alguna cita aislada en mayo. A final de julio se observan las primeras aves en paso postnupcial, las últimas citas en septiembre. Sigue aumentando las parejas nidificantes del NO provincial, un total de 13 pp.

Milvus milvus

Milano real - Milà reial - Red Kite

ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A,E3. Rango: 79/140 (Mar,Abr,May,Jun,Jul,Ago,Sep,Oct,Nov) .

Alcossebre:

18-abr: 1 ej. volando al NE. Única cita anual. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

06-may: 1 ej. en paso hacia el NE (MTB)

Benlloch:

28-sep: 1 ej. (ALR,RPB)

Catí:

02-nov: 1 ej. (MAM)

Desert de Les Palmes:

06-oct: 1 ej. única cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct (MTB, VET)

El Toro:

25-abr: 1 ad. sobre el pico Mazorral (ELL)

30-abr: 1 ad. volando por el pico Mazorral (JAR)

Islas Columbretes:

05-may: 1 ej. posiblemente el mismo sedimentado hasta el día 8 (GRN)

Segorbe:

07-abr: 3 ej. (LGB)

Vinaròs:

09-oct: 1 ej. vuelos de oteo, dirección S (RAF)

Muy pocos ejemplares observados en paso prenupcial como postnupcial y prácticamente todos en solitario. Se localizan las citas en abril y la última postnupcial el 6 de octubre. Este año no se detecta ninguna observación en noviembre, cosa poco común. Siendo escasos las observaciones de esta especie es muy importante la cita de 1 ejemplar en les Illes Columbretes.

Neophron percnopterus

Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture

ESTATUS: Nidificante raro, migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría; todas las citas de migración; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

· Censos provinciales:

2007: 11 par. nidos localizados. (CTH)

Ares del Maestre:

09-mar: 1 ej. primera cita (RNC)

25-jul: 1 ad. se observa un ejemplar ad. posado sobre los cortados del barranco. (AAC, FRB)

05-sep: 1 ej. (MAM)

Barracas:

30-jun: 1 ej. (BFV)

Catí:

09-may: 1 ad. (JMZ)

Desert de Les Palmes:

26-ago: 1 ej. primera y única cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct (MTB, VET)

El Toro:

13-abr: 1 ad. (JAR)

15-may: 1 ad. vuela a baja altura por el llano cerealista de Barracas-El Toro y sobrevuela el pueblo de El Toro a las 16,00 h. (ELL, JAR)

Embalse de Arenós:

30-jul: 1 pollo grande aún en el nido. (JLB)

11-ago: 1 pollo totalmente emplumado aún en el nido siendo alimentado por los adultos. (JLB, JBC)

Montanejos:

16-mar: 1 ad. primer adulto observado en la zona de cría (JBC)

09-abr: 1 par. ad. cerca del embalse de Arenós (ELL, JAR)

Morella:

03-ago: 2 ej. (MAM)

Ortells:

26-mar: 1 ej. (MAM)

16-may: 1 ej. (MAM)

Portell de Morella:

15-mar: 1 ej. (MAM)

Rossell:

12-abr: 1 ad. volando N desde Sant Marc. (SMS)

Viver:

08-may: 1 subad. vuela dirección N por el llano cerealista (ELL)

Zorita del Maestrazgo:

20-mar: 1 ej. (MAM)

23-jun: 2 ad. (MAM)

22-jul: 1 ej. (MAM)

A principio de marzo se observan las primeras aves en la provincia, y a mediados de marzo son detectadas en las zonas de cría del noroeste provincial. Es notorio que a mediados de agosto aun se encuentren pollos en el nido siendo alimentado por los adultos. Mientras que la migración postnupcial prácticamente se concentra a mediados de agosto principio de septiembre.

Pernis apivorus

Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard

ESTATUS: Migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

04-sep: 9 ej. volando al S. (JBC)

20-sep: 3 ej. volando al SO. (JBC)

Ares del Maestre:

06-may: 30 ej. (RNC)

26-may: 5 ej. dirección el N (MAM)

17-sep: 5 ej. (RNC)

Barracas:

05-may: 30 ad. paso migratorio en día de fuerte viento; ejemplares contabilizados en 3 horas de observación. Vuelo hacia el NE (ELL)

28-ago: 3 ej. cicleando a baja altura. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

01-may: 4 ej. única cita primaveral (MTB)

Betxí:

11-sep: 11 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

18-sep: 81 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. Paso importante. (JBC)

25-sep: 2 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

Borriol:

27-may: 1 ad. cicleando a poca altura en Centineles. (LPC)

Cabanes:

05-may: 35 ej. 5 por la mañana y el resto por la tarde. (VET)

Castellfort:

03-may: 10 ej. (RNC)

Castellón de la Plana:

09-jun: 2 ej. volando a baja altura en una zona de huertos de naranjos (MTB)

Cinctorres:

05-may: 21 ej. (RNC)

23-sep: 1 ej. (RNC)

Desert de Les Palmes:

01-may: 75 ej. hacia el NE en apenas media hora muy altos. (VET)

30-ago: 11 ej. primera cita en paso postnupcial (VET, MTB)

17-sep: 57 ej. máximo en 3 horas de censo (VET, MTB)

07-oct: 5 ej. última cita en paso postnupcial. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 199 ej. (VET, MTB)

Islas Columbretes:

20-sep: 10 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es continua por lo que el número habrá sido superior. (VET)

Marjal de Almenara:

01-may: 3 ej. (DOC)

18-may: 4 ej. (JBC)

16-sep: 2 ej. migrant cap al S (DOC)

Montán:

07-jun: 1 ej. (JMB, GDO)

Morella:

07-may: 42 ej. (RNC)

19-ago: 1 ej. hacia el O (MAM)

03-sep: 52 ej. (RNC)

Navajas:

04-may: 5 ej. migrando al N (JBC)

Sant Jordi:

09-may: 30 ad. volando en grupo por el bco. de Aiguadoliva (JMZ)

Tales:

15-abr: 36 ej. volando altos hacia el N (JBC)

Vall d'Alba:

30-abr: 2 ej. primeras observaciones prenupciales. En 2 horas y media de observación. (VET)

05-may: 435 ej. en paso hacia el N de 10,30h. a 13,30h. con viento moderado del NW. (VET)

13-may: 145 ej. hacia el N de 10,30 a 13,30. (VET)

Villafranca del Cid:

01-oct: 6 ej. última cita en la zona. (RNC)

Viver:

04-may: 209 ej. migrando en distintos grupos al N (JBC)

08-may: 5 ad. en vuelo hacia el N (ELL)

15-may: 1 ej. (JBC)

Año con importantes citas en paso prenupcial, concentrándose prácticamente todas las citas en mayo, destacan las citas de más de 200 aves en Viver y más de 400 en Vall d'Alba. Sin embargo este año no se han detectado pasos importantes postnupciales a final de agosto, ni en los otros meses, tan sólo el máximo de 81 ej. detectados a mediados de septiembre en Betxí. Un año más se ha detectado la presencia de esta rapaz migrando hacia el sur en les Illes Columbretes.

Pandion haliaetus

Águila pescadora - Àguila pescadora - Osprey

ESTATUS: Migrante escaso, invernante raro. **Conservación:** PE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

(DES)

1.I	1.II	1.III	4.IV	1.V	1.VI	1.VII	15.VIII	20.IX	1.X	1.XI	1.XII
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0

Almenara:

04-feb: 1 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)

Ares del Maestre:

20-mar: 1 ej. (RNC)

15-abr: 1 ej. (RNC)

Betxi:

11-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

Castellón de la Plana:

19-may: 1 ej. (RPB,VOO,CSP)

Chert/Xert:

14-abr: 1 ej. volando a baja altura (MTB)

Desert de Les Palmes:

04-abr: 1 ej. en migración dirección N. (PLL, MAG)

31-ago: 2 ej. primera cita en paso postnupcial (MTB, VET)

07-oct: 1 ej. última cita en paso. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 14 ej. (MTB, VET)

Forcall:

16-abr: 1 ej. volando hacia el NE (MTB)

Islas Columbretes:

20-sep: 1 ej. única cita anual (GRN)

20-sep: 1 ej. en paso hacia el S. (VET)

Marjal de Almenara:

04-abr: 1 ej. ejemplar en migració cap al N (DOC)

06-abr: 1 ej. menjant un peix (llisa) posat a eucalyptus mort. S'observa com pesca un altre peix (DOC)

20-abr: 1 ad. posada en árbol. (JBC)

21-abr: 1 ej. pescant (DOC)

16-sep: 1 ej. (DOC)

19-sep: 1 ej. (EAB)

20-nov: 1 ej. posada en árbol seco en l'estany, salta i pesca en aguas cercana a la carretera playa. Consume parte de la presa sobre cable de teléfono, al parar levanta el vuelo y regresa al árbol seco. (JBC)

20-nov: 1 ej. posada en árbol seco de l'Estany (JBC,JLB)

21-nov: 1 ej. posada en árbol seco. (JBC)

24-nov: 1 ej. posada en tendido eléctrico. (JBC,JLB)

27-nov: 1 ej. volando y posada. (JBC,JLB)

- 05-dic: 1 ej. posada en el árbol seco de siempre. (JBC,JLB)
 08-dic: 1 inm. comiendo un pescado sobre una torre de tendido eléctrico (CFA)
 08-dic: 1 ej. posada en árbol. (JBC)
 11-dic: 1 ej. con un pez en las garras. (JBC)

Nules:

- 26-oct: 1 ej. muy baja sobre naranjos dirigiéndose al S. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 19-mar: 1 ej. pescando cerca de la orilla del mar al amanecer (MTB)
 20-mar: 1 ej. posado en una zona recientemente quemada (MTB)

Sant Mateu:

- 29-abr: 1 ej. (ALR,RPB)

Villafranca del Cid:

- 07-abr: 1 ad. en migración dirección N. (PLL, CGR)

Aumenta el número de citas en zonas interiores, situadas prácticamente todas en la zona norte provincial. Las primeras citas prenupciales se citan a final de marzo- abril. Las postnupciales a final de agosto. Destaca la presencia en varias localidades durante los meses invernales de Noviembre a Febrero. Siendo un ave marinas es sorprendente la cita de 1 sólo ejemplar en Illes Columbretes.

Falco columbarius

Esmerejón - Esmerla - Merlin

ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:

- 02-feb: 1 ej. (DES)
 30-dic: 1 ej. (DES)

Cabanes:

- 03-feb: 1 h. (MAM)

Canet lo Roig:

- 01-ene: 1 h. (MAM)

Catí:

- 12-feb: 1 ej. (ALR)
 27-nov: 1 ej. primera cita (RPB)

Desert de Les Palmes:

- 06-oct: 1 ej. única cita en migración postnupcial. 24-ago / 06-oct (MTB, VET)

Es la rapaz menos citada de todos los observadores en la provincia, esto debe ser debido a dos motivos, uno por el hábitat que ocupan en zonas interiores y prelitorales y otro por la morfología del ave, pequeño y con plumaje poco llamativo, sobre todo la hembra, así como por la conducta, posándose generalmente en puntos bajos como montones de piedras o suelo más que en árboles y tendidos eléctricos, mucho más visibles.

Falco eleonora

Halcón de Eleonora - Falcó de la reina - Eleonora's Falcon

ESTATUS: Nidificante y migrante escaso. **Conservación:** VUL **Criterio:** Concentraciones; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

08-jun: 1 ej. (DES)

12-ago: 1 ej. (DES)

04-sep: 1 ej. (DES)

07-oct: 1 ej. (DES)

10-oct: 1 ej. (DES)

Desert de Les Palmes:

04-oct: 7 ej. última cita anual. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 23 ej. (VET, MTB)

Grau de Castelló:

29-may: 1 ej. sobrevolando las acequias, individuo en fase oscura. (XBC)

Islas Columbretes:

23-abr: 1 ej. primera cita anual (GRN)

02-oct: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

2007: 56 par. nidos localizados. (CTH)

La Pobla Tornesa:

29-jun: 1 ej. visto a las 8:30 desde la carretera. (VET)

30-jun: 13 ej. observados cazando insectos en vuelo hasta que anochece. Probablemente habrá algún ejemplar más. Al menos 1 de fase oscura. (VET)

05-jul: 14 ej. alimentándose en vuelo al atardecer. (VET)

06-jul: 14 ej. se observa hasta 14 ejemplares cazando al atardecer en los alrededores de la población. Sólo se observan 2 ejemplares de morfo oscuro, el resto son todos claros.

Segunda observadora: Isabel Bischooping Rosagaray (IBR) (AAC, IBR)

25-jul: 9 ej. cazando al atardecer. (VET)

Morella:

17-ago: 1 ej. de fase oscura. (RNC)

Villorres:

03-jun: 1 ej. de fase oscura. (RNC)

Destaca un año más la concentración de aves en la misma localidad del interior provincial (La Pobla de Tornesa), alimentándose al atardecer de insectos voladores. Y los dos ejemplares vistos en Villorres (3/06/07) y Morella (17/08/07). Las últimas citas en la provincia se sitúan en la primera semana de octubre. En les Illes Columbretes la primera cita se da a finales de abril, mucho antes que en la zona continental, encontrando las últimas en octubre. Respecto a la reproducción observa un aumento de las parejas nidificantes, respecto al año anterior que fue de 48 parejas (CTH).

Falco peregrinus

Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon

ESTATUS: Residente moderado, migrante escaso. **Conservación:** VUL **Criterio:** Todas las citas de migración; citas de interés. **Categoría:** A,E3.

Ares del Maestre:

26-may: 1 m. ad. (MAM)

Bejís:

03-mar: 2 ad. (ELL, RAF)

Desert de Les Palmes:

11-may: 1 ej. (VET)

20-sep: 1 h. de 2º año en paso hacia el S. Único ej. en migración en campaña de migración postnupcial 24-ago / 16-oct (MTB, VET)

El Toro:

16-feb: 1 ej. posado sobre nido de águila real (JBC)

Embalse de Arenós:

30-jul: 2 juv.+ ad. un joven volantón alimentado por adulto. (JLB)

Islas Columbretes:

17-may: 1 ej. última cita prenupcial. Presente de manera regular durante enero, febrero y marzo, esporádico en abril y mayo. (GRN)

30-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. Presente esporádicamente durante el resto del año, ausente en octubre. (GRN)

Sant Mateu:

18-mar: 1 par. ad. (MAM)

Tales:

17-jun: 2 ej. posibles jóvenes volando encima del pueblo (JBC)

Viver:

12-jun: 1 ad. cazando por la zona de Cuesta de Ragudo (ELL)

Sólo se han considerado algunas citas de jóvenes y algunas zonas poco utilizadas por la especie. Se siguen detectando algunas parejas nuevas a nivel de toda la provincia, y la presencia de la especie en les Illes Columbretes.

Falco subbuteo

Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby

ESTATUS: Nidificante escaso, migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Cifras máximas y recuentos en migración; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

04-may: 1 ej. volando al N (DES)

15-oct: 1 ej. volando al SO. (DES)

Barracas:

30-jun: 1 ej. (BFV)

18-ago: 1 ad. volando a baja altura sobre la antigua vía minera. (MGT)

29-sep: 1 ej. (BFV)

Betxí:

11-sep: 2 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

21-sep: 10 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC,JLB)

25-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

Castellón de la Plana:

05-may: 1 ej. migrando al N (JBC,JLB)

Chert/Xert:

02-oct: 1 ej. i ej. pasa dirección S (ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

30-ago: 1 ej. primera cita en migración postnupcial (MTB, VET)

20-sep: 19 ej. máximo en 3 horas de censo (MTB, VET)

07-oct: 1 ej. última cita postnupcial. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 65 ej. (MTB, VET)

Eslida:

13-abr: 1 ej. migrando al N (JBC)

Islas Columbretes:

20-sep: 1 ej. única cita anual (GRN)

20-sep: 4 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es continua. (VET)

La Salzadella:

15-abr: 1 ej. remontando. (VET)

Morella:

18-abr: 1 ej. primera cita (RNC)

19-ago: 1 m. (MAM)

Nules:

23-abr: 1 ej. migran al NO (JBC)

Tirig:

15-abr: 1 ej. vuelo al N. Primera observación prenupcial. (VET)

Vall d'Alba:

30-abr: 1 ej. hacia el NE en 2 horas y media. (VET)

Se han recibido muy pocas citas de esta pequeña rapaz. Las primeras observaciones se citan a final de abril (13/04/07) prolongándose hasta mayo. Las únicas citas de cría recibidas corresponden a la parte noroccidental de la provincia (comarca de Els Port – Alt Maestrat), con 22 pp reproductoras. La migración postnupcial, mucho más abundante, se inicia a final de agosto, teniendo el máximo a mediados de septiembre, siendo la última cita el 15 de octubre. Aún con datos escasos, destaca la presencia en Illes Columbretes en el paso postnupcial.

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel

ESTATUS: Residente, migrante e invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A,E3.

Alcossebre:

(DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
3	2	2	2	1	3	2	2	3	4	3	3

Artana:

13-mar: 1 par. realizando vuelos nupciales de persecución (JLB)

Barracas:

07-jul: 7 ej. 5 pollos y 2 adultos (BFV)

Benicasim/Benicàssim:

21-abr: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)

23-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Betxi:

06-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

07-sep: 12 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

13-sep: 14 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)

19-sep: 16 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

25-sep: 24 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

02-oct: 5 ej. (JBC)

Burriana:

29-ene: 4 ej. (JBC)

28-feb: 6 ej. (JBC)

Castellón de la Plana:

02-mar: 6 ej. entre Castellón y Benicàssim a medio día. Remontes y planeos hacia el NE. (MTB)

Chilches:

05-ene: 4 ej. (JBC)

13-nov: 3 ej. (JBC)

Desembocadura río Belcaire:

21-nov: 3 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

(JBC,JLB,SMS)

9.I	1.II	1.III	3.IV	3.V	1.VI	1.VII	1.VIII	22.IX	8.X	1.XI	10.XII
1	0	2	3	5	0	0	0	18	3	0	6

Desert de Les Palmes:

27-ago: 1 ej. primera cita en migración (VET, MTB)

19-sep: 48 ej. máximo en 3 horas de migración. Total de aves observadas en la campaña de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 165 ej. (VET, MTB)

El Toro:

27-ago: 2 ej. atacando a Circus pygargus. (MGT)

Islas Columbretes:

12-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

20-sep: 54 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es continua por lo que el número habrá sido superior. Paso destacado. (VET)

La Vall d'Uixó:

24-sep: 3 ej. (JBC,JLB)

Marjal de Almenara:

(DOC,JBC,JLB,EAB)

8.I	1.II	31.III	1.IV	27.V	19.VI	1.VII	1.VIII	29.IX	3.X	9.XI	11.XII
3	4	3	3	1	6	0	0	3	12	5	3

Moncofa:

15-nov: 6 ej. gran concentración (JBC)

Morella:

01-oct: 1 h. muy grande y de color muy claro (MAM)

Segorbe:

06-may: 3 ej. (JBC)

Destaca el gran número de aves observadas en migración postnupcial. Prácticamente el paso se concentra durante el mes de septiembre. Como se ve en las citas, las zonas húmedas son las utilizadas como puntos de descanso (Desembocadura del Millars y Marjal d'Almenara). Un año más durante todo el invierno las aves se distribuyen principalmente por las zonas litorales y cercanas a granjas en las zonas interiores, consideradas como zonas de alimentación. Destada el gran paso postnupcial en Illes Columbretes con más de 50 ejemplares.

*Falco vespertinus***Cernícalo patirrojo** - Falco cama-roig - Red-footed Falcon

ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 16/17 (Abr,Jun,Jul,Sep,Oct) .

Islas Columbretes:

20-sep: 1 h. ad. migrando hacia el S. (VET)

Una sola cita de esta bella rapaz, y curiosamente en les Illes Columbretes, que aún es más llamativa. Llama la atención no haber recibido ninguna cita continental, pudiendo ser este año uno de los peores para esta especie.

*Grus grus***Grulla común** - Grua - Common Crane

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

25-abr: 4 ej. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

19-mar: 25 ej. remontando y planeando hacia el NE por la línea de costa (MTB)

12-oct: 5 ej. volando hacia el S (MTB)

Cervera del Maestre:

02-dic: 22 ad. 12,00 h. pasan cerca del pueblo. En vuelo migratorio hacia el O. Fuerte griterío. (ELL)

Chert/Xert:

21-dic: 1 ej. (ALR,RPB)

Marjal de Almenara:

07-mar: 330 ej. volen en grups i baixen a dormir a Coto Ferrer i Palafanga. Fort vent del W. (FRB)

08-mar: 32 ej. dos grups de 12 i 20 ex (EAB)

08-mar: 350 ej. totes juntes en terra en un grup compacte al coto Ferrer. (FRB, JBC)

08-mar: 15 ej. sobrevolando la marjal al atardecer buscando lugar de descanso (MTB)

17-nov: 1 ej. (JBC)

17-nov: 1 ej. la observamos volando asustada por las avionetas, vuela hacia la Finca de Peris y después hacia el S. (JBC,JLB)

05-dic: 3 ej. volando al S (JBC,JLB)

08-dic: 1 ej. (JBC)

Sant Mateu:

07-oct: 1 ej. vuela en dirección a la Laguna de Sant Mateu (MAM)

Villamalur:

02-dic: 19 ej. proceden del NE y se dirigen al SO. Avistamiento a las 13.45 horas aproximadamente. Podría tratarse del mismo bando observado por el compañero Quique en Cervera del Maestre un par de horas antes. (LPC)

Viver:

09-mar: 397 ej. suma total de los 6 grupos que pasaron hacia el N desde las 9 a las 14 h. (JBC)

21-mar: 1 ad. migrando al N (JBC)

Este es el año en que más grullas se han observado en Castellón, destacando el elevado número de ejemplares detectados en la Marjal de Almenara y Viver, propiciado por un episodio de fuertes vientos de componente oeste.

Crex crex

Guión de codornices - Guatlla maresa - Corn Crane

ESTATUS: Rareza nacional. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 2/3 (Sep) .

Islas Columbretes:

21-sep: 2 ej. restos de dos ejemplares encontrados en nidos de halcón de Eleonor. (CTH)

Tercera cita para Castellón, las dos anteriores también en Columbretes: 1 ejemplar anillado el 25-09-1990 (Dies Jambrino J.I. & Dies Jambrino B. (Eds.) 1991) y otro encontrado muerto el 2-10-2002 en las mismas circunstancias que los de la presente cita (Polo, A. & Polo, M. (eds.). 2007).
VER INFORME DE RAREZAS.

Fulica atra

Focha común - Fotja - Common Coot

ESTATUS: Nidificante e invernante común localizado. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Burriana:

15-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,TCP,AGS,GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 36 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

06-dic: 63 ej. (ALR,RPB,VOO)

2007: 9 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)

Marjal de Almenara:

16-ene: 43 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

29-ene: 300 ej. unes 60 a la Calçada, 15 als Estanys, unes 200 a la finca del Frances (Darrere de La Quadra de Casablanca), un centenar a la Palafànga (EAB)

09-feb: 67 ej. (JBC)

27-mar: 97 ej. tres grups. El més gran de 70 exemplars amb dues banyudes amb collar entre elles. (EAB)

03-abr: 40 ej. alimentant-se d'asprella junt a 4 ex de Fulica cristata amb collar (AGR)

02-may: 10 ej. (DOC)

19-jun: 9 juv.+ ad. se observan 2 pollos pequeño junto adultos (JBC)

07-jul: 3 ej. (DOC)

27-sep: 9 ej. (JBC)

05-dic: 179 ej. (JBC,ILB)

2007: 22 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Oropesa del Mar/Orpesa:

30-may: 1 par. (ALR,RPB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 177 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

2007: 50 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Sant Mateu:

22-may: 4 ej. (ALR,RPB)

Segorbe:

06-jun: 4 pollo 1 AD+ 3 pollos (ALR,RPB,MMX)

La Marjal de Almenara y el Prat de Cabanes-Torreblanca albergan la mayor parte de la población tanto nidificante como invernante.

Fulica cristata

Focha moruna - Fotja banyuda - Red-knobbed Coot

ESTATUS: Reintroducido. Residente y nidificante raro muy localizado. **Conservación:** PE **Criterio:** Citas de interés. **Categoría:** A,E3. **Rango:** 28/61 (Ene,Febr,Mar,Abr,May,Jun,Ago,Oct,Nov,Dic) .

Desembocadura río Mijares:

13-dic: 2 ej. una con collar la otra sin collar. (JBC)

Marjal de Almenara:

13-ene: 1 ej. collar -OUX- (JBC)

- 19-feb: 2 ej. amb collar (EAB)
 23-feb: 3 ej. dos en collar (JBC)
 06-mar: 7 ej. (EAB)
 04-abr: 6 ej. 4 ex amb collar (16C, 17L, 177 o 17T, 17P) i 2 ex sense collar. El collar amb codi 17P és difícil de llegir (sembla en males condicions) (DOC)
 29-may: 1 ej. anillada, collar blanco "16C" (JBC)
 19-jun: 4 ej. se ven 3 con collar blanco y 1 sin collar (JBC)
 02-nov: 4 ej. la 17T amb parella sense collar un hora davant l'eixida d'aigua de l'ullal.
 Un grup mixte menjant asprella nova en l'estany nord (EAB)
 05-dic: 1 ej. con collar (JBC,JLB)
 2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

La Marjal de Almenara continua siendo la única localidad donde se reproduce en Castellón (1 pareja). Empiezan a producirse observaciones de ejemplares sin collar, anteriormente prácticamente todos los ejemplares observados procedían del proyecto de reintroducción llevado a cabo por la Conselleria de Medi Ambient en zonas húmedas cercanas (Marjal dels Moros y Albufera de Valencia).

Gallinula chloropus

Gallineta común - Polla d'aigua - Moorhen

ESTATUS: Nidificante e invernante común. **Conservació:** EC **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
22	14	18	14	14	10	13	7	10	23	27	29

Burriana:

- 15-ene: 41 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,TCP,AGS,GRM,CTH)
 09-jun: 18 pollo 5 adulto con 14 pollos pequeños. (JLB)

Castellón de la Plana:

- 14-ene: 45 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

- 12-ene: 78 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
 2007: 14 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)

Marjal de Almenara:

- 16-ene: 29 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
 21-abr: 50 ej. (DOC)
 2007: 125 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Peñíscola:

- 12-ene: 18 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 11-ene: 10 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

Sant Mateu:

- 22-may: 35 ej. (ALR,RPB)

Ubicua, ocupa todo tipo de zonas húmedas. Tal y como se aprecia en el seguimiento de Alcossebre en invierno se produce la entrada de ejemplares invernantes.

Porphyrio porphyrio

Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen

ESTATUS: Nidificante escaso localizado. **Conservación:** PE **Criterio:** Todas las citas de cría; censos destacados; citas de interés.. **Categoría:** A,E3.

Desembocadura río Mijares:

2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)

Marjal de Almenara:

16-ene: 12 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

27-sep: 3 ej. un adult amb dos polls (EAB)

2007: 28 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 29 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

2007: 16 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Continúa el aumento de parejas reproductoras el Prat de Cabanes-Torreblanca pasando de 7 en 2006 a 16 este año. Las dos únicas localidades donde también se reproduce en Castellón son la Desembocadura del Millars y la Marjal de Almenara.

Porzana parva

Polluela bastarda - Picardó - Little Crane

ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 9/9 (Mar,Abr,Nov) .

Peñíscola:

16-abr: 1 h. ad. se la observa durante toda la mañana. Se encuentra junto al puente de madera de l'Assagador de la creu, picoteando y desplazándose sobre la vegetación flotante y entre eneas. Invernante? Migración? (JAM)

Novena observación publicada en los anuarios para Castellón. Esta polluela que aunque se cita su invernada en Cataluña (Chacon G. 1991), solo cuenta con citas, en nuestra provincia, durante las migraciones, principalmente la prenupcial (8 registros frente a una sola observación en la migración postnupcial).

Porzana porzana

Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crane

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 18/43 (Mar,Abr,Jun,Jul,Sep,Oct) .

Alcossebre:

18-abr: 1 ej. en la depuradora, primera observación en la zona. (DES)

Marjal de Almenara:

17-mar: 1 ej. (DOC)

Dos nuevas observaciones, ambas del paso prenupcial.

Rallus aquaticus

Rascón europeo - Rascló - Water Rail

ESTATUS: Residente escaso localizado. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Almazora/Almassora:

22-may: 3 pollo (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

Marjal de Almenara:

16-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 72 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Aunque a la vista de las citas se podría pensar que en invierno se rarifica mucho su presencia hay que tener en cuenta lo difícil que resulta detectar esta especie si no es por medio de sus vocalizaciones.

Haematopus ostralegus

Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher

ESTATUS: Migrante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 31/47 (Mar,Abr,May,Jun,Jul,Ago,Sep,Oct) .

Alcossebre:

14-may: 1 ej. hacia el NE (DES)

07-ago: 1 ej. hacia el NE (DES)

08-ago: 1 ej. hacia el NE (DES)

Marjal de Almenara:

05-ago: 1 ej. volant sobre la mar cridant (de S a N) (DOC)

Buen año de citas de ostrero. Destaca la importante concentración de ejemplares postnupciales en el mes de agosto.

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Censos de colonias; citas de invernada; máximos en migración; censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

15-jul: 36 subad.+ ad. máximo anual (DES)

Almenara:

16-dic: 44 ej. (ALR,RPB)

Castellón de la Plana:

20-mar: 5 ej. (XBC)

Desembocadura río Belcaire:

19-may: 6 ej. (JBC,JLB)

Desembocadura río Mijares:

22-mar: 1 ej. (JBC)

03-abr: 15 ej. (JBC)

2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)

Grau de Castelló:

08-jun: 1 ad. en las acequias próximas a la depuradora. (LPC)

Islas Columbretes:

17-may: 1 ej. primera cita. Varias observaciones hasta el día 12 de junio, última observación el 10-07. (GRN)

La Jana:

15-may: 2 ej. (MAM)

Marjal de Almenara:

01-feb: 61 ej. (JBC)

03-feb: 50 ej. (DOC)

17-mar: 50 ej. (DOC)

01-abr: 80 ej. (DOC)

01-may: 40 ej. (DOC)

08-may: 67 ej. se localizan 22 nidos entre arrozal de La Llosa (JBC)

18-may: 38 ej. en la zona de arrozar de La llosa, hay un tractor trabajando y no contabilizo ningún nido de los de la último recuento, en campo siguiente hay solo 4 nidos. (JBC)

26-may: 1 ej. pollet correguent per vora camí de Cantarrana (DOC)

26-may: 40 ej. 12 nius (DOC)

19-jun: 75 inm.+ ad. se observan 2 nidos + 1 pollo pequeño (JBC)

13-dic: 47 ej. se observan alimentándose junto a gaviotas reidoras y avefrías en la finca de V. Peris, al lado de la carretera. (JBC)

22-dic: 56 ej. (JBC)

2007: 88 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Moncofa:

02-abr: 36 ej. volando en grupo al S (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 28 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Sant Jordi:

12-abr: 10 ad. (ELL)

17-may: 1 par. ad. (ELL)

Tercer invierno consecutivo con una población invernante de cierta entidad en la Marjal de Almenara, situación que continúa siendo única en el litoral mediterráneo al norte de las localidades del S de Alicante donde es históricamente un invernante regular. Aumentan considerablemente las poblaciones de Almenara y del Prat de Cabanes-Torreblanca, aquí gracias a las labores de limpieza de algunos juncales, y continúa raquítica la histórica colonia de la desembocadura del Millars. Patrones habituales de paso en el resto de las localidades.

Recurvirostra avosetta

Avoceta común - Alena - Pied Avocet

ESTATUS: Migrante escaso, invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.
Rango: 28/79 (Feb,Mar,Abr,May,Jul,Sep,Nov,Dic) cita invernal.

Marjal de Almenara:

18-may: 1 ad. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

29-jul: 8 ej. volando en grupo sobre turberas (MTB)

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew

ESTATUS: Residente escaso localizado, migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

15-ene: 2 ej. máximo mensual (DES)

15-feb: 50 ej. máximo mensual (DES)

18-feb: 1 ej. última cita (DES)

17-nov: 2 ej. primera cita invernal (DES)

15-dic: 46 ej. máximo mensual (DES)

Almenara:

01-jun: 1 ej. (RPB,EMO,NAG)

Barracas:

09-abr: 4 ad. posados en un campo labrado junto a Cerro Larios. Vuelan dirección O (ELL)

Chert/Xert:

06-abr: 1 ej. se escuchan cantos del 6 al 9 del 4. (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

06-dic: 3 ej. (ALR,RPB)

Viver:

21-jun: 1 ej. salta del nido y se posa en las cercanías (JBC)

Continúa mejorando el seguimiento de esta especie en la provincia, con citas estivales en el interior y interesante en la Marjal de Almenara donde parece haberse reproducido por primera vez en la localidad.

Glareola pratincola

Canastera común - Carregada - Collared Pratincole

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. **Conservación:** VUL **Criterio:** Todas las citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

03-abr: 15 ej. alimentant-se sobrevolant el lluent a baixa alçada junt a centenars d'oroneta comuna (AGR)

06-abr: 25 ej. volant del S cap al N (DOC)

19-jun: 2 ej. (JBC)

2007: 75 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 56 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

la suma de parejas nidificantes de las dos localidades de cría en la provincia sobrepasan las 260, dando un máximo histórico de esta especie. De este espectacular ascenso es responsable principalmente la colonia de la Marjal de Almenara que se ha multiplicado por 5 en 4 años, de donde provienen igualmente las primeras citas anuales. El ascenso en el Prat de Cabanes-Torreblanca es más modesto y aunque por las condiciones del entorno, los censos exactos son complicados, posiblemente se sitúe entorno al 40 o 50% para el mismo periodo de 5 años.

Charadrius alexandrinus

Chorlito patinegro - Corriol camanegre - Kentish Plover

ESTATUS: Nidificante moderado, invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría; fechas extremas; censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

14-may: 1 ad. única cita anual (DES)

Burriana:

16-mar: 1 ej. primer observado en la zona (JBC)

16-mar: 1 ej. (JBC)

20-jun: 1 par. ad. (JBC)

23-nov: 1 ej. en la arena de la playa (JBC)

Desembocadura río Mijares:

22-mar: 1 ej. (JBC)

Marjal de Almenara:

08-ene: 5 ej. (JBC,JLB)

16-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

17-mar: 20 ej. (DOC)

2007: 32 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 3 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Este año no disponemos de datos de censos completos de la provincia, aunque destacan los datos de la Marjal de Almenara con muy buenos números. También son importantes los datos de aves invernantes, siempre escasas, y la entrada bien sincronizada en varias localidades a mediados de marzo.

Charadrius dubius

Chorlito chico - Corriole - Little Ringed Plover

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado, invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría destacadas, citas de invernada; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Araya:

04-mar: 9 ej. (ALR,RPB)

Benicasim/Benicàssim:

06-jul: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Burriana:

- 16-mar: 1 ej. (JBC)
- 03-abr: 1 par. (JBC)
- 20-jun: 7 juv.+ ad. se ven 4 ad. + 3 pollos volanderos (JBC)
- 08-oct: 3 ej. (JBC)

Islas Columbretes:

- 03-abr: 1 ej. otro ejemplar en paso el día 9 del mes (GRN)

Marjal de Almenara:

- 05-ene: 12 ej. en finca de Peris (JBC)
- 17-mar: 60 ej. (DOC)
- 11-jun: 35 juv.+ ad. 20 adultos con 15 pollos pequeños (JBC)
- 15-sep: 4 ej. (JBC)
- 2007: 24 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 15-mar: 2 ej. (FGB)
- 20-mar: 42 ej. en varios grupos entre la Gola del Trenc y el Camping (MTB)
- 2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Zorita del Maestrazgo:

- 31-oct: 1 ej. (MAM)

Charadrius hiaticula

Chorlito grande - Corriol gros - Great Ringed Plover

ESTATUS: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:

- 25-abr: 1 ad. única cita anual (DES)

Marjal de Almenara:

- 21-abr: 10 ej. (DOC)
- 08-may: 5 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 11-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover

ESTATUS: Invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Máximos en invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

- 31-dic: 12 ej. máximo mensual (DES)

Almenara:

- 16-dic: 70 ej. (ALR,RPB)

Castellón de la Plana:

- 14-ene: 22 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

- 12-ene: 10 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

Marjal de Almenara:

- 05-ene: 85 ej. (JBC)

16-ene: 83 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

14-nov: 144 ej. (JBC)

21-nov: 220 ej. (JBC)

Pluvialis squatarola

Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover

ESTATUS: Migrante escaso e invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

02-oct: 1 ad. primera cita para Alcossebre. (DES)

Vanellus vanellus

Avefría europea - Merita - Northern Lapwing

ESTATUS: Nidificante raro muy localizado, invernante común. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

06-oct: 6 ej. volando hacia en NO (DES)

07-nov: 26 ej. volando hacia el E. máximo anual (DES)

Benlloch:

02-feb: 57 ej. (RPB)

26-dic: 30 ej. junto a la carretera, en cultivos de árboles de secano parcialmente anegados. (LPC)

Castellón de la Plana:

14-ene: 13 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 52 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

15-ene: 70 ej. (JBC)

06-dic: 73 ej. (ALR,RPB)

El Toro:

13-abr: 20 ad. (JAR)

Islas Columbretes:

20-sep: 1 ej. nuevas citas el 23 y 24 del mes (GRN)

Marjal de Almenara:

05-ene: 700 ej. en dos grandes grupos (JBC)

16-ene: 449 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

01-feb: 700 ej. (JBC)

13-feb: 345 ej. en distintos grupos (JBC)

20-abr: 1 par. posible nidificación (JBC)

26-may: 2 ej. en plomatge nupcial (DOC)

06-jun: 1 par. ad. pareja, en arrozal de La Llosa, posible reproducción? (JBC)

11-jun: 1 par. la hembra posada en posible nido ¿cría?, se levanta al acercarnos con el coche, el macho cerca de la zona del nido. (JBC)

18-jun: 1 ej. emite sonidos de alarma en el arrozal, muy cerca de la zona donde aparentemente cría. (FRB)

20-jul: 1 ej. en finca de Raga. (FRB)

15-ago: 1 ej. en arrossars de Raga (La Llosa) (DOC)

29-sep: 13 ej. (JBC)

03-nov: 120 ej. (JBC)

21-nov: 450 ej. (JBC)

05-dic: 450 ej. grandes grupos por toda la marjal, grupos más grandes en Finca de V.

Peris (JBC,JLB)

Moncofa:

21-nov: 117 ej. (JBC)

Morella:

09-oct: 1 ej. (MAM)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 56 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

01-dic: 11 ej. (JBC,JLB)

2007: 4 ej. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)

Sant Mateu:

24-dic: 24 ej. (ALR,RPB)

Buenas concentraciones de avefría en el área de la marjal de Almenara aunque de menor importancia que durante año pasado cuando se alcanzaron los 1.500 ej., donde al igual que el año pasado, se sospecha la nidificación de una pareja. En el Prat la pequeña población repite máximos con 4 parejas localizadas. En la parte fenológica destaca el bando tardío localizado en El Toro (aunque la última cita invernante corresponde a un ave el 20 de abril en la desembocadura del Mijares) mientras que la cita de octubre de Alcossebre es la más temprana que tenemos registrada en AOCS fuera de las zonas húmedas en las que cría.

Actitis hypoleucos

Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper

ESTATUS: Visitante estival, migrante común, invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

23-abr: 1 ej. primera cita primaveral (DES)

15-may: 21 ej. máximo anual (DES)

08-ago: 1 ej. última cita anual (DES)

Bovalar de Ortells:

02-jun: 1 ej. en el río Bergants (MAM)

Cabanes:

05-may: 6 ej. 4 en cultivos inundados por las lluvias y 2 en la depuradora. (VET)

Desembocadura río Belcaire:

26-feb: 2 ej. (JBC)

07-may: 10 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

La Jana:

15-may: 4 ej. (MAM)

Marjal de Almenara:

29-abr: 1 ej. (DOC)

29-abr: 2 ej. (FRB, DOC)

08-may: 5 ej. (JBC)

11-jun: 3 juv. (JBC)

15-sep: 4 ej. (JBC)

Sant Jordi:

17-may: 12 ej. (ELL)

Sant Mateu:

07-may: 1 ej. en el río que pasa por el pueblo (MAM)

29-dic: 3 ej. (MAM)

Vinaròs:

27-feb: 1 ej. (MAM)

Especie que está presente durante todos los meses del año dispersa aquí y allá siempre en bajas densidades, por lo que resulta interesante destacar la concentración de 21 ej. en Alcossebre para el mes de mayo, que ha dejado este año una gran concentración de citas. Tan solo dos citas invernales. Entre las citas estivales, junto a la del Río Bergantes destaca una interesante cita de 3 juveniles en Almenara en el mes de junio, que por lo temprano de la fecha parecía indicar que estos ej. han nacido bien cerca, aunque como se indica en el Atlas de las Aves Reproductoras de España, tan sólo deben de considerarse reproducciones seguras aquellas en las que se observan maniobras de distracción sin huida con chillidos de alarma repetitivos (Balmori, A. 2005) situación que a pesar de aparecer en 4 cuadrículas en el citado Altas, no se ha dado nunca, que sepamos, en la provincia de Castellón.

Arenaria interpres

Vuelvepedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 51/112 (Ene, Feb, Abr, May, Ago, Sep, Oct, Nov) .

Alcossebre:

01-may: 14 ej. todavía 1 ej. el día 6 (DES)

14 ejemplares de vuelvepedras es una cita más propia de localidades S alicantinas, donde es relativamente abundante tanto en paso como en invernada, que de la provincia de Castellón, donde nunca se habían visto más de 5 ejemplares juntos. Este año de todos no tenemos ninguna cita invernal ni en paso postnupcial lo que tampoco es habitual.

Calidris alba

Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling

ESTATUS: Migrante e invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Máximos en invernada y migración; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Castellón de la Plana:

28-ene: 6 ej. (RPB)

Nueva cita de un pequeño grupo en la que es su única localidad de invernada en la Provincia. Curiosamente desde 1994 no se cita fuera de las playas de Castellón.

Calidris alpina

Correlimos común - Territ variant - Dunlin

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Almenara:

01-jun: 2 ej. (RPB,EMO,NAG)

Araya:

23-ene: 2 ej. (ALR,RPB)

Marjal de Almenara:

27-sep: 6 ej. (JBC)

Calidris ferruginea

Correlimos zarapitín - Territ bec-llarg - Curlew Sandpiper

ESTATUS: Migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

29-abr: 5 ej. (DOC)

29-abr: 16 ej. en Ferrer, plomatge nupcial. (FRB, DOC)

30-abr: 5 ej. (DOC)

Calidris minuta

Correlimos menudo - Territ menu - Little Stint

ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

08-ene: 4 ej. (JBC,JLB)

16-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

17-mar: 5 ej. (DOC)

Gallinago gallinago

Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe

ESTATUS: Migrante común e invernante moderado. **Conservación:** EC **Criterio:** Máximos en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Cabanes:

27-dic: 10 ej. en 300 metros de barranco canalizado. (VET)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

Marjal de Almenara:

24-ene: 40 ej. posadas juntas en las charcas comiendo (JBC)

08-mar: 8 ej. (FRB, JBC)

17-mar: 10 ej. (DOC)

04-abr: 1 ej. (DOC)

20-jul: 1 ej. en finca de Raga. (FRB)

27-sep: 7 ej. (JBC)

17-nov: 32 ej. (JBC)

22-dic: 1 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

19-feb: 4 ej. en zona abierta por cazadores (FGB)

20-mar: 20 ej. en un pequeño "lluent" (MTB)

Limosa lapponica

Aguja colipinta - Tètol cuabarrat - Bar-tailed Godwit

ESTATUS: Migrante e invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 34/168 (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Sep, Oct, Nov) .

Marjal de Almenara:

08-may: 1 ej. (JBC)

06-jun: 2 ej. (JBC)

La de junio es la cita mas tardía de esta especie para la localidad y para toda la provincia.

Limosa limosa

Aguja colinegra - Tètol cuanegre - Black-tailed Godwit

ESTATUS: Migrante moderado, invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Almenara:

04-feb: 1 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)

Marjal de Almenara:

06-jun: 2 ej. comiendo en arrozal de La Llosa. Cita tardía (JBC)

15-ago: 4 ej. als arrossars de Peris (DOC)

Lymnocyrtus minimus

Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe

ESTATUS: Invernante raro, migrante escaso. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 33/55 (Mar, Abr, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic) .

Prat de Cabanes-Torreblanca:

03-mar: 2 ej. entre decenas de agachadizas comunes. (VET)

Nueva cita de este escaso escopacido en nuestros humedales que correspondería ya a ejemplares en paso prenupcial.

Numenius arquata

Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew

ESTATUS: Migrante e invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

13-abr: 9 ej. volando hacia el E (DES)

12-jul: 2 ej. volando hacia el N (DES)

Marjal de Almenara:

17-ago: 5 ej. als arrossars de Peris (DOC)

09-nov: 1 ej. (JBC)

15-nov: 2 ej. (JBC)

17-nov: 1 ej. (JBC)

22-dic: 1 ej. (JBC)

Numenius phaeopus

Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel

ESTATUS: Migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

13-abr: 1 ej. (DES)

10-may: 1 ej. (DES)

13-jun: 1 ej. (DES)

12-jul: 2 ej. volando hacia el N (DES)

08-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (DES)

Almazora/Almassora:

22-may: 1 ej. (ALR,RPB)

Araya:

28-ago: 1 ej. (RPB)

Burriana:

12-ene: 2 ej. (JBC)

Marjal de Almenara:

08-may: 7 ej. (JBC)

13-ago: 1 ej. alimentant-se en finca sense aigua (DOC)

14-ago: 1 ej. als arrossars de Peris (DOC)

17-ago: 1 ej. als arrossars de Peris (DOC)

Serra d'Irta:

14-ene: 1 ej. (ALR,RPB)

Philomachus pugnax

Combatiente - Redonell - Ruff

ESTATUS: Migrante moderado e invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

24-feb: 1 ej. en finca de Raga entre merites. (FRB)

- 17-mar: 30 ej. un exemplar amb plomatge blanc al cap i pit (DOC)
29-abr: 8 ej. (DOC)
29-abr: 8 ej. en Ferrer. (FRB, DOC)
19-may: 1 ej. en plomatge nupcial negre (incomplet) (AGR)

Scolopax rusticola

Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock

ESTATUS: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Barracas:

- 25-dic: 1 ej. muerta por cazadores. En zona de coscojar. (MGT)

Islas Columbretes:

- 17-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

La Vall d'Uixó:

- 31-dic: 1 ej. muerta por los cazadores de La Vall (JBC,JLB)

Tringa erythropus

Archibebe oscuro - Xuït - Spotted Redshank

ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Marjal de Almenara:

- 29-abr: 5 ej. plomatge nupcial (DOC)
29-abr: 9 ej. plomatge nupcial, en Ferrer. (FRB, DOC)
01-may: 2 ej. en plomatge nupcial (DOC)
16-ago: 1 ej. als arrossars de Peris (DOC)

Tringa glareola

Andarríos bastardo - Xerlovita camagrosa - Wood Sandpiper

ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Cabanes:

- 11-may: 2 ej. en cultivos inundados por las lluvias. (VET)

Marjal de Almenara:

- 17-mar: 10 ej. (DOC)
29-abr: 20 ej. (DOC)
29-abr: 23 ej. (FRB, DOC)
30-abr: 40 ej. (DOC)
29-sep: 8 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 20-mar: 2 ej. en un "lluient" (MTB)
21-jul: 1 ej. volando sobre las turberas de Torreblanca emitiendo reclamos (MTB)

Tringa nebularia

Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

21-abr: 2 ej. (DES)

12-sep: 1 ej. (DES)

21-oct: 1 ej. última cita anual (DES)

Desembocadura río Belcaire:

07-may: 7 ej. (JBC)

La Jana:

15-may: 1 ej. (MAM)

Marjal de Almenara:

29-abr: 14 ej. en coto Ferrer. (FRB, DOC)

30-abr: 6 ej. (DOC)

08-may: 8 ej. (JBC)

07-jun: 1 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

05-may: 2 ej. comiendo en acequias naturales parte sur del Prat. (JLB,JBC)

Sant Jordi:

17-may: 2 ad. (ELL)

Son rarísimas las citas en el mes de junio de esta especie de bosques abiertos que no cría en la Península. Tan solo tenemos noticia de un ej. el 3 de junio en esta misma localidad en el año 1993. Aunque unos pocos ejemplares invernán, de modo irregular en el S de Alicante y la Albufera de Valencia, en nuestra provincia su presencia tan solo se hace patente a principios de abril. La última cita del año, a finales de octubre en Alcossebre es acorde con su patrón de migración aunque es la primera que recibimos en este mes.

Tringa ochropus

Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper

ESTATUS: Visitante estival e invernante escaso, migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Cabanes:

30-jun: 1 ej. primera cita postnupcial. En el canal de la depuradora. (VET)

05-jul: 1 ej. en pequeña charca entre cultivos de secano muy cerca del monte. (VET)

Chilches:

16-ene: 5 ej. (JBC)

Marjal de Almenara:

16-ene: 3 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

27-feb: 3 ej. (JBC)

29-abr: 1 ej. (DOC)

15-sep: 4 ej. (JBC)

29-sep: 17 ej. (JBC)

03-nov: 14 ej. (JBC)

07-dic: 12 ej. (JBC,JLB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

Este año no hemos recibido citas durante la época de cría de la especie (de mediados de mayo a mediados de junio), con una última cita prenupcial a finales de abril en Almenara y una primera postnupcial a finales de junio en Cabanes. Buen paso postnupcial el registrado este año en la Marjal de Almenara.

*Tringa totanus***Archibebe común - Tifort - Common Redshank**

ESTATUS: Migrante común. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..

Categoría: A.

Almazora/Almassora:

22-may: 2 ej. (ALR,RPB)

Almenara:

01-jun: 2 ej. (RPB,EMO,NAG)

Araya:

02-jul: 2 ej. (RPB)

Desembocadura río Belcaire:

07-may: 16 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

03-abr: 8 ej. (JBC)

Islas Columbretes:

17-may: 1 ej. en paso sobre la isla (GRN)

Marjal de Almenara:

08-mar: 2 ej. (JBC)

23-mar: 35 ej. (JBC)

04-abr: 25 ej. (DOC)

29-abr: 61 ej. en Ferrer y Peris (FRB, DOC)

01-may: 60 ej. (DOC)

15-sep: 1 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

18-mar: 1 ej. con plumaje de invierno en un "lluert" (MTB)

Torreblanca:

30-may: 6 ej. (ALR,RPB)

Las citas de finales de mayo y principios de junio pueden considerarse plenamente estivales, ya que las puestas en la colonia más cercana (Delta del Ebro) se producen entre el 19 de mayo y el 8 de junio (Bertolero, 2002), sin embargo, esta presencia debe corresponder a parte de la población no reproductora o a migrantes tardíos, ya que nunca se ha constatado la cría del archibebe común en nuestra provincia. Muy buenas concentraciones primaverales en la marjal de Almenara, dando censos de hasta 60 ej. por primera vez desde 2003, siendo además una de las citas con mayor número de ej. implicados de la provincia. Muchísimo más escaso en paso postnupcial, este año tan solo una cita en julio y una en septiembre. Ausente en invernada a pesar de que mantiene en esta época muy buenas poblaciones en el Delta del Ebro, aunque es igualmente raro o muy escaso en estas fechas el resto de humedales levantinos.

Stercorarius parasiticus

Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua

ESTATUS: Invernante y migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A. **Rango:** 20/28 (Ene,Mar,May,Jun,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Alcossebre:

21-oct: 1 ad. sobre el mar (DES)

Islas Columbretes:

01-nov: 2 ej. entre Castelló i les Illes, en el camí d'anada. (FRB)

Stercorarius skua

Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua

ESTATUS: Invernante y migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A. **Rango:** 13/18 (Feb,Jul,Ago,Nov,Dic) .

Islas Columbretes:

28-jul: 1 ej. entre Peñíscola y las Columbretes. Individuo estival no reproductor.

Probablemente un joven. (MGT, DOC)

10-nov: 1 ej. entre Castelló i les illes. (FRB)

Larus audouinii

Gaviota de Audouin - Gavina corsa - Audouin's Gull

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante común, invernante escaso, común solo en Columbretes.

Conservación: PE **Criterio:** Todas las citas de cría; censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

23-ene: 48 ej. (ALR,RPB)

Araya:

23-ene: 73 ej. posados en el mar (ALR,RPB)

Burriana:

12-ene: 28 ej. (JBC)

26-ene: 50 ej. (JBC)

20-feb: 13 ej. anillas: S1F, AMNJ, NOI, ACSX, ALPT, ACRY, AFS6, ALXS, 26Z, AL87, AS3Y, ALXS, X37 (JBC)

21-feb: 298 ej. anillas: ABAV, X37, ZPX, AA4R, AL58, M4L, AA2P, UY3, AAS6, ZFN, XSS, AA7Z, AM3Z, ACSX, ABOX, AA2B, SUP, ABSJ, ZFN, ADFS, AA2B, ACAD, AMZ4, ABDX, 6AM, AFTR, ATPY, 2FO?, AN5F (JBC)

06-mar: 379 ej. muchas anilladas "ver programa de anillas de este anuario" (JBC)

03-abr: 106 ej. (JBC)

05-jun: 120 ej. una blanca (leucística), se hacen fotos (JBC)

22-jun: 351 ej. gran concentración de inmaduros en el puerto, de ellas 78 estaban posadas sobre el agua, el resto posadas en los distintos embarcaderos del muelle. (JBC)

22-jun: 350 ej. anillos: AL19; ANHC; AT7P; APT8; ALF9; AWF6; AL8S; AP54; AR77; ATAD; ANLS; AS3D; ATFH; AP54; ASYX; AS1S; AM5W; ATAN (JBC)

11-oct: 158 ej. (JBC)

21-nov: 74 ej. (JBC)

20-dic: 50 ej. anillas: ADFS, ATD4 (JBC)

Chilches:

03-dic: 1 ej. anilla: AMZ4 (JBC,JLB)

Grau de Castelló:

11-jun: 64 ad. descansando en el muelle de Levante. Once están anilladas, algunas en ambas patas. (LPC)

Islas Columbretes:

2007: 79 par. nidos localizados. (CTH)

Marjal de Almenara:

08-ene: 43 ej. (JBC,JLB)

01-feb: 17 ej. (JBC)

19-mar: 20 ej. (DOC)

22-abr: 40 ej. en direcció al N (DOC)

01-may: 550 ej. (DOC)

06-jun: 259 ej. gran concentración en la marjal (JBC)

07-jul: 50 ej. (DOC)

21-nov: 45 ej. (JBC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

11-feb: 8 ej. (JBC)

Vinaròs:

09-ene: 16 ej. cITA INVERNAL (ALR,RPB)

La invernada que se apreciaba en diciembre del año pasado, recordamos, con una cita de 260 ej. a principios de diciembre en Almenara, y otras buenas concentraciones durante el resto del mes, continuó en enero. A estas citas se suman de nuevo buenas concentraciones a finales de diciembre en Burriana, aunque aparentemente en menor medida que el año pasado. Quizás se venga a producirse con la gaviota de Audouin un fenómeno de cambio de fenología similar al que viene observándose en especies como al cigüeñuela, que han pasado de invernantes raros a invernantes comunes en muy poco tiempo. Sigue aumentando la colonia de Columbretes con 20 parejas más que el año pasado.



Gaviota de Audouin leucística, Playa de Burriana, 5-6-07. Autor: Josep Bort

Larus delawarensis

Gaviota de Delaware - Gavina de Delaware - Ring-billed Gull

ESTATUS: Rareza local. Divagante Neártica. **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 28/2 (Ene, Feb, Mar, Abr, Jun, Ago, Nov, Dic) .

Burriana:

- 09-ene: 1 ad. adulto con plumaje invernal entre grupo de gaviotas cabecinegras. (JBC)
- 24-feb: 1 ad. adulto posado junto a gaviotas de Audouin (JBC)
- 25-feb: 1 ad. de nuevo observada junto a Audouines en el embarcadero del puerto pescando. (JBC)
- 26-feb: 1 ad. (JBC)
- 02-mar: 1 ad. posada en puerto junto a gaviotas de audouin. (JBC)
- 06-mar: 1 ad. se observa de nuevo en el mismo lugar junto a gaviotas de Audouin (JBC)
- 12-mar: 1 ad. (JBC)
- 16-nov: 1 ej. junto gaviotas de Audouin. (JBC)
- 16-nov: 1 ad. posada al atardecer junto a patiamarillas y sombrías, sobre la arena. (JBC, JLB)
- 21-nov: 1 ej. (JBC)
- 23-nov: 1 ej. junto a un grupo de gaviotas de Audouin. (JBC)
- 26-nov: 1 ej. (JBC, JLB)
- 15-dic: 1 ej. adulto posado junto gaviotas de Audouin. (JBC)
- 19-dic: 1 ad. de nuevo se observa entre las Audouin. (JBC)

Interesante caso de sedimentación de esta especie neártica que se ha citado durante 3 años ininterrumpidamente en las inmediaciones del Puerto de Burriana. Tras un primer año en el que se observó durante los meses de verano en el cercano puerto de Castellón, las citas presentan un patrón claramente invernal, apareciendo a mediados de noviembre y dejando multitud de citas hasta principios de marzo. Curiosa igualmente su asociación a gaviotas de Audouin quizás mas tolerantes a la presencia de una especie distinta que las agresivas patiamarillas o sombrías. VER INFORME DE RAREZAS.

Larus fuscus

Gaviota sombría - Gavinot fosc - Black-backed Gull

ESTATUS: Invernante y migrante abundante. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Burriana:

- 12-ene: 400 ej. (JBC)
- 29-mar: 49 ej. (JBC)
- 03-abr: 2 ej. (JBC)
- 11-oct: 16 ej. (JBC)
- 17-oct: 113 ej. una con anilla blanca en pata izquierda. (JBC)
- 19-dic: 300 ej. gran concentración sobre la playa. (JBC)

Marjal de Almenara:

- 05-ene: 75 ej. (JBC)
- 03-mar: 4 ej. (DOC)

Larus genei

Gaviota picofina - Gavina capblanca - Slender-billed Gull

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** VUL **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 14/34 (May,Jun,Jul,Ago,Sep,Nov) .

Prat de Cabanes-Torreblanca:

29-jul: 1 ej. juv. volando hacia el SO por la línea de costa (MTB)

29-jul: 1 ej. volando hacia el SO (MTB)

30-sep: 1 ej. sale de las turberas de Torreblanca hacia el mar (MTB)

Tres nuevas citas en el entorno del Prat de Cabanes-Torreblanca donde quizás es más detectable debido a que posiblemente acoja hábitats favorables para la especie.

Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra - Gavina capnegra - Mediterranean Gull

ESTATUS: Invernante y migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Burriana:

29-ene: 185 ej. (JBC)

21-feb: 205 ej. (JBC)

13-mar: 1 ej. (JBC)

29-mar: 17 ej. (JBC)

01-ago: 1 ad. primera observación después del paso prenupcial de marzo. Junto a gaviotas audouin y patiamarillas. (JBC)

17-oct: 13 ej. anilla roja HNH1 (JBC)

18-oct: 15 ej. (JBC)

21-nov: 35 ej. anilla: azul IVLA" en pata izquierda. (JBC)

19-dic: 2000 ej. gran concentración sobre la playa. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 12 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

02-jun: 2 ej. pasan bordeando la costa hacia el N, luego entran en el Prat sobre Turberas (MTB)

Primera cita para el mes de junio en Castellón, con lo que completa citas para todos los meses del año. Continúan las importantes concentraciones de Burriana, donde se observa un primer migrante el las fechas típicas, a principios de agosto.

Larus michahellis

Gaviota patiamarilla - Gavinot argentat mediterrani - Yellow-legged Gull

ESTATUS: Nidificante moderado muy localizado, migrante e invernante abundante. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Censos provinciales:

2007: 463 par. parejas estimadas. (CTH)

Artesa:

18-jul: 300 ej. en balsa de riego (JBC)

Burriana:

31-ene: 341 ej. el 70% inmaturos (JBC)

20-feb: 305 ej. (JBC)

13-mar: 371 ej. (JBC)

29-mar: 594 ej. el 70% inmaturos (JBC)

03-abr: 288 ej. el 98% inmaturos (JBC)

22-may: 35 inm. (JBC)

22-jun: 38 inm. (JBC)

22-jul: 15 ej. (JBC)

01-ago: 107 inm.+ ad. posiblemente también g. sombría inmaturos (JBC)

26-sep: 154 ej. (JBC)

08-oct: 170 ej. (JBC)

17-oct: 673 ej. anilla amarilla 2MJ, (JBC)

23-nov: 150 ej. (JBC)

22-dic: 300 ej. (JBC)

La Jana:

15-may: 15 ej. (MAM)

Marjal de Almenara:

08-ene: 484 ej. el 60% adultos (JBC,JLB)

16-ene: 729 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)

09-feb: 557 ej. (JBC)

01-may: 200 ej. (DOC)

11-jun: 40 ej. (JBC)

Nules:

18-ene: 700 ej. a las 7:30 h. Diversos grupos entre 30 y 50 ej. volando en formación hacia el NO, donde se sitúan los vertederos, pasando por encima de la CN-340 (JBC)

23-ene: 300 ej. prácticamente todas con plumaje adulto (JBC)

02-mar: 500 ej. paso al NO sobre CN-340, dirección basureros de S^a d'Espadà i Pantà Sitjar (JBC)

31-mar: 500 ej. volando y posadas sobre la basura (JBC,JLB)

Peñíscola:

12-ene: 110 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 35 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

Sant Jordi:

12-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

17-abr: 189 ad. se observan 2 cadáveres en las inmediaciones (ELL)

Tales:

06-abr: 500 ej. volando y posadas sobre la basura (JBC,JLB)

17-jul: 500 ej. gran concentración de gaviotas en el basurero (JBC)

23-dic: 500 ej. (JBC)

La colonia de Columbrete se reduce respecto a la del año pasado (550 parejas). En el resto de la provincia siguen detectándose grandes cantidades de aves tanto cerca de vertederos como cerca de la costa. Interesantes los conteos de aves volando hacia los vertederos, en un trasiego que se produce diariamente desde la costa a los lugares de alimentación preferentes de la especie.

Larus ridibundus

Gaviota reidora - Gavina vulgar - Common Black-headed Gull

ESTATUS: Migrante e invernante abundante. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Burriana:

- 15-ene: 75 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,TCP,AGS,GRM,CTH)
- 20-feb: 250 ej. (JBC)
- 16-mar: 240 ej. (JBC)
- 29-mar: 50 ej. (JBC)
- 18-jun: 2 ej. (JBC)
- 18-jul: 25 ej. (JBC)
- 16-oct: 300 ej. (JBC)
- 12-nov: 370 ej. (JBC)
- 21-nov: 400 ej. (JBC)
- 19-dic: 3000 ej. gran concentración sobre la playa. (JBC)

Castellón de la Plana:

- 14-ene: 24 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

- 12-ene: 85 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

Grau de Castelló:

- 18-jul: 83 ej. descansando en el muelle de Levante con charranes patinegros. (LPC)

Marjal de Almenara:

- 08-ene: 3000 ej. (JBC,JLB)
- 16-ene: 401 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
- 23-feb: 3000 ej. cientos posadas en zonas de cultivo y finca de Peris (JBC)
- 19-mar: 20 ej. (DOC)
- 07-jul: 15 ej. volant en direcció S. Aprox 50% juvenils (DOC)
- 15-sep: 109 ej. (JBC)
- 27-nov: 5000 ej. miles, detrás del tractor que prepara la tierra para el cultivo de arroz. (JBC,JLB)
- 22-dic: 2000 ej. (JBC)

Peñíscola:

- 12-ene: 328 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 02-jun: 8 ej. volando cerca de la costa hacia el S (MTB)

5 conteos con más de 2.000 ejemplares implicados supone un importante contingente de aves invernantes. Como viene siendo habitual los máximos se producen en la Marjal de Almenara, de nuevo rondando los 5.000 ejemplares, además en las mismas fechas, lo que marca un paso postnupcial tardío estabilizándose la invernada durante los meses de diciembre y enero. La cita del Prat corresponda probablemente a aves no nidificantes en dispersión o quizás a los primerísimos migrantes postnupciales que normalmente se ven hacia finales del mes como marca la cita de Burriana.

Chlidonias hybrida

Fumarel cariblanco - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. **Conservación:** VUL **Criterio:** Citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

- 03-abr: 1 ej. (DOC)
- 21-abr: 160 ej. 120 ex posats als hivernacles i 40 ex volant (DOC)
- 29-abr: 210 ej. en el coto Ferrer. (FRB, DOC)
- 02-may: 50 ej. 35 posats i 15 pescant (DOC)
- 26-may: 25 ej. en colònia de cria (DOC)
- 03-jun: 0 ej. 3 pollets en un niu. (EAB)
- 19-jun: 25 ej. (JBC)
- 07-jul: 20 ej. cridant en actitud molt territorial (DOC)
- 2007: 32 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)

Sant Jordi:

- 17-abr: 2 ad. (ELL)

Chlidonias niger

Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern

ESTATUS: Migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 30-abr: 20 ad. sobre el mar (DES)

Marjal de Almenara:

- 29-abr: 8 ej. (DOC)
- 29-abr: 7 ej. (FRB, DOC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 21-may: 3 ej. (FGB)

Sterna albifrons

Charrancito común - Mongeta - Little Tern

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. **Conservación:** VUL **Criterio:** Citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Almazora/Almassora:

- 22-may: 1 ej. (ALR,RPB)

Marjal de Almenara:

- 01-may: 3 ej. pescant en sèquia (DOC)
- 29-may: 4 ej. con cebas. Nidifican en playa de Canet (RPB,VOO,EMO)
- 12-jun: 2 ej. volando sobre cultivos de arroz y acequias (JBC)
- 19-jun: 4 ej. (JBC)
- 23-jun: 20 ej. pescant peixos a vora mar (DOC)
- 09-ago: 2 ej. pescant en sèquia del Molí de Baix (La Llosa) (DOC)

Sterna caspia

Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern

ESTATUS: Migrante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 9/14 (Feb,Mar,Abr,May,Jun,Oct) .

Alcossebre:

20-abr: 1 ad. única cita anual (DES)

Burriana:

16-oct: 1 ad. en migración postnupcial junto a grupo de gaviotas reidoras y charranes patinegros. (JBC)

Marjal de Almenara:

06-abr: 1 ej. un migrant volant del S cap al N. Pesca un peix a la zona central de la marjal. (DOC, MVB, JCS)

Sterna hirundo

Charrán común - Xatrac d'albufera - Common Tern

ESTATUS: Migrante moderado. **Conservación:** VUL **Criterio:** Censos destacados; citas de interés; fechas extremas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

15-may: 30 ej. máximo mensual (DES)

15-jun: 6 ej. máximo mensual (DES)

15-jul: 100 ej. máximo mensual (DES)

Burriana:

28-mar: 3 ej. entre charranes patinegros (JBC)

18-oct: 3 ej. (JBC)

Islas Columbretes:

29-ago: 1 ej. primera cita, nueva observación el día 3.09 (GRN)

Sterna sandvicensis

Charrán patinegro - Xatrac bec-llarg - Sandwich Tern

ESTATUS: Migrante abundante, invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

(DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
44	38	10	10	150	26	140	30	23	65	80	54

Burriana:

20-feb: 23 ej. (JBC)

01-mar: 150 ej. en escollera (JBC)

28-mar: 224 ej. (JBC)

02-abr: 14 ej. (JBC)

18-jun: 1 ej. (JBC)

26-sep: 92 ej. gran concentración (JBC)

17-oct: 117 ej. (JBC)

12-nov: 47 ej. (JBC)

21-nov: 47 ej. varios con anillas metálicas tanto en la pata izquierda como derecha. (JBC)

19-dic: 60 ej. (JBC)

Grau de Castelló:

18-jul: 38 juv.+ ad. descansando en el muelle de Levante junto a reidoras; al menos siete jóvenes que piden insistentemente alimento. (LPC)

Marjal de Almenara:

24-feb: 23 ej. peixquen prop de la gola. (FRB)

19-mar: 20 ej. (DOC)

23-jun: 5 ej. (DOC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

05-may: 1169 ej. volando en grupos continuos al S. En 3,5 h. de censo (7,30 a 11 h.) (JBC,JLB)

06-oct: 152 ej. volando al S. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

02-jun: 180 ej. volando en grupos alimentándose por la zona (MTB)

Alca torda

Alca común - Cauet - Razorbill

ESTATUS: Migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Benicarló:

21-abr: 1 ad. dentro del puerto comercial, por la tarde, posada sobre el agua junto con gaviotas (AGC)

Burriana:

09-ene: 1 ej. muerta en la playa (JBC)

Islas Columbretes:

10-nov: 1 ej. (FRB)

Marjal de Almenara:

24-feb: 1 ej. entre baldrigues i gavines. (FRB)

Serra d'Irta:

14-ene: 2 ej. (ALR,RPB)

Vinaròs:

15-ene: 18 ej. (RPB)

Columba oenas

Paloma zurita - Xixella - Stock Dove

ESTATUS: Residente, migrante e invernante escaso. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Benlloch:

15-abr: 1 ej. posada en cable. (VET)

Castellfort:

10-jun: 1 ej. presencia estival en cuadrícula no citada, y el 13/08 se observan 6 ej.
(ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

19-sep: 3 ej. en paso hacia el S (MTB, VET)

Solo tres citas recibidas de la más escasa de las palomas presentes en Castellón, a destacar la observación de Castellfort por producirse en una nueva zona. La cita de Benlloc corresponde a una zona de presencia habitual con citas todos los años. La del Desert de les Palmes implica a individuos en migración postnupcial.

Columba palumbus

Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon

ESTATUS: Nidificante e invernante común, migrante abundante. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)

1.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
0	1	1	3	6	10	6	15	13	8	2	1

Benicasim/Benicàssim:

14-mar: 1 ej. primera cita prenupcial, ausente en invierno (MTB)

27-sep: 2 ej. última cita postnupcial (MTB)

Castellón de la Plana:

06-feb: 1 ej. en la Font de la Reina. Ausente en invierno (MTB)

Desembocadura río Mijares:

30-abr: 23 ej. (JBC)

Forcall:

19-feb: 120 ej. (MAM)

Islas Columbretes:

10-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Morella:

07-ago: 36 ej. (MAM)

Villamalur:

22-abr: 25 ej. bando que se desplaza al amanecer a gran altura hacia el NE. (LPC)

Zorita del Maestrazgo:

20-mar: 50 ej. (MAM)

Este año no hemos recibido apenas citas de bandos migratorios. Tal y como reflejan las observaciones de Benicàssim en invierno se puede ausentar en zonas donde si esta presente durante la reproducción.

Streptopelia decaocto

Tórtola turca - Tórtola turca - Eurasian Collared-dove

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
70	112	57	46	35	41	46	64	88	103	61	56

Benicasim/Benicàssim:

26-feb: 3 ej. primeros cantos nupciales (MTB)

13-sep: 2 ej. últimos cantos nupciales (MTB)

Islas Columbretes:

06-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

Interesante la cita de Columbretes probablemente de un joven dispersivo, en los que no resultan raros movimientos de hasta alrededor de 500 km., mientras que en los adultos resultan muy escasos movimientos de más de 10 km. (Glutz B. & Bauver K.M. 1980).

Streptopelia turtur

Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove

ESTATUS: Nidificante moderado, migrante común. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. Presente entre el 9 de Abril y el 9 de Octubre. (DES)

1.I	1.II	1.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	1.XI	1.XII
0	0	0	23	21	2	5	5	4	5	0	0

Benicasim/Benicàssim:

26-feb: 2 ej. primera cita prenupcial (MTB)

05-may: 5 ej. máximo prenupcial en 1 Km. de censo en campos abandonados. (MTB)

21-sep: 1 ej. última cita anual (MTB)

Benlloch:

28-abr: 6 ej. bando. (VET,MTB,IBR,AAC)

Desert de Les Palmes:

21-abr: 1 ej. cantando. Primera cita prenupcial. (VET)

18-ago: 2 ej. (VET)

Islas Columbretes:

11-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

31-ago: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

02-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

2007: 47 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Sant Mateu:

19-abr: 1 ej. primera cita (RPB)

Vall d'Alba:

30-abr: 4 ej. bando. (VET)

La observación de Benicàssim el 26 de febrero es extraordinariamente temprana y se adelanta más de un mes a las fechas de llegada habituales que se producen en abril. Hay otra observación en fechas similares, el 4-03-95 en Segorbe (Gómez-Serrano et al. 2000). Asimismo existe una cita invernal de 2 aves anilladas el 16-01-93 en Vinaròs (Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1995). Ninguna cita postnupcial especialmente tardía.

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer - Cotorra de Kramer - Rose-ringed Parakeet

ESTATUS: Residente escaso. Escapado, origen del S de Asia. Conservación: ET Criterio: Citas de interés.

Categoría: C1.

Alcossebre:

31-dic: 1 ad. 02-01-2007 hasta 04-03-2007. (DES)

Castellón de la Plana:

31-dic: 2 ej. observaciones del año en la Pda. Patos. Igual número de ejemplares los días 10.10, 23.10, 13.11 y 27.11. Un sólo ejemplar el día 25.09. (XBC)

Censo máximos mensuales en Parque Ribalta (XBC)

28.I	17.II	10.III	29.IV	25.V	1.VI	15.VII	13.VIII	16.IX	21.X	10.XI	29.XII
6	5	4	2	4	6	1	2	3	5	3	5

Desembocadura río Mijares:

03-abr: 2 ej. (JBC)

30-abr: 1 ej. (JBC)

Marjal de Almenara:

07-jul: 3 ej. criden mentres volen cap al S (DOC)

Es curiosa la escasez de citas para esta especie exótica que se suele observar en urbanas y humedales, y que está perfectamente adaptada a nuestro entorno. Tras dos años sin citas, este anuario publica todas las citas recibidas dado que siguen siendo esporádicas sus observaciones y muy relevantes para saber cual es su situación actual en la provincia.

Clamator glandarius

Críalo europeo - Cucut reial - Great Spotted Cuckoo

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Datos de cría; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximo mensual. Presente entre el 11 de Febrero y el 22 de Agosto. (DES)

1.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	1.IX	1.X	1.XI	1.XII
0	5	6	3	2	3	2	1	0	0	0	0

Benlloch:

15-abr: 4 ej. en zona de cría. (VET)

Betxí:

30-mar: 1 ej. posado en cable de teléfono. Camino Vila-real - Betxí (JBC)

Cabanes:

11-may: 4 ej. en cultivos 1 km. al W de la población, presencia estival todas los años en esta zona. (VET)

18-may: 1 ej. oído en zona de presencia habitual junto al término municipal de Benlloc. (VET)

Cálig:

13-mar: 3 ad. chillando por los alrededores de la Ermita del Socós (JMZ)

Islas Columbretes:

07-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

La Vall d'Uixó:

06-jun: 1 ej. 1 ejemplar en naranjal (ALR,RPB)

Sant Jordi:

29-mar: 2 ad. se ve un ejemplar y se oye otro (JMZ)

Tales:

02-jul: 1 juv. parado en el suelo, en la cuneta de la carretera que lleva al basurero, al amanecer; un grupo de urracas le rodean entre curiosas y acosantes. (LPC)

Torreblanca:

15-mar: 1 ad. cruza las N-340 a la altura del cruce con el peaje de la autopista AP-7 (ELL, JAR)

06-jun: 4 ad. (FGB)

Villafranca del Cid:

30-ago: 2 ej. (ALR,RPB)

No son raras las observaciones en febrero como la de Alcossebre aunque la llegada de la mayoría de aves se produce en marzo.

Cuculus canorus

Cuco común - Cucut - Common Cuckoo

ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE **Criterio:** Datos de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Algimia de Almonacid:

13-abr: 1 ej. (LGB)

Ares del Maestre:

05-abr: 1 ej. primera cita (RPB)

Benicasim/Benicàssim:

07-abr: 1 ej. oído un ej. cantando (MTB)

Cervera del Maestre:

08-abr: 1 ad. se oye un canto y se ve un ejemplar en vuelo por la partida Servereta (ELL)

Chert/Xert:

17-abr: 1 ej. primeros cantos (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

25-abr: 1 ej. (JBC)

Desert de Les Palmes:

10-abr: 1 ej. primera observación prenupcial. (VET)

El Toro:

09-abr: 1 ad. se oye canto (ELL)

Eslida:

19-abr: 2 ej. cantos al mediodía. (LPC)

Marjal de Almenara:

29-abr: 1 ej. femella (DOC)

Pina de Montalgrao:

17-abr: 1 ej. posado en rama (JBC)

Sant Mateu:

23-abr: 1 ej. canto desde olivar próximo a la laguna. (LPC)

Torás:

27-abr: 2 ej. (JBC)

Vilafamés:

18-abr: 1 ej. escuchado casi a media mañana. (LPC)

Villamalur:

09-abr: 1 ej. oído al amanecer. Primer contacto de este año. (LPC)

22-abr: 1 ej. canto. (LPC)

Villanueva de Viver:

07-abr: 1 ej. cantando al atardecer (MGT)

Buenos registros de primeras citas prenupciales, todas en abril sin ninguna cita en marzo este año. Pocas citas postnupciales recibidas sin ninguna de interés fenológico.

Tyto alba

Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl

ESTATUS: Nidificante moderado, invernante. **Conservación:** IE **Criterio:** citas de interés. **Categoría:** A,E3.

Benicarló:

03-mar: 1 ad. en la noche del eclipse, se observa un ejemplar sobrevolando el casco urbano y posándose en una grúa de la zona norte (ELL)

Cabanes:

07-dic: 1 ej. volando sobre almendros cerca del borde del monte. (VET)

Castellón de la Plana:

02-nov: 1 ej. muerta por atropello en el arcén de la CS-22, en el Km. 3.9 (LPC)

15-nov: 1 ej. vista muerta por atropello en el arcén de la Ronda Norte de Castellón, a unos 200 metros del Hospital General. (LPC)

El Toro:

11-ago: 1 ej. sobrevuela la plaza de madrugada una noche de fiestas en el pueblo. (MGT)

San Rafael del Río:

18-mar: 1 h. ad. se localiza una hembra y un nido con 4 huevos en una masía abandonada de la zona Molí Canet (AGC)

Vilafamés:

29-ago: 1 ej. se observa 1 ejemplar dentro del casco urbano volando durante la noche. (AAC)

Vinaròs:

23-feb: 1 ej. se observa un ejemplar volando por el polígono industrial Capsaes a las 22,00 h. (ELL)

Asio flammeus

Búho campestre - Mussol marí - Short-eared Owl

ESTATUS: Migrante e invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 44/46 (Ene, Feb, Mar, Abr, Sep, Oct, Nov, Dic) .

Chilches:

08-ene: 1 ej. (JCS)

Sólo una cita de esta lechuza invernante en nuestras comarcas. Posiblemente la escasez de citas venga más por el hábitat utilizado pero sobretudo por la falta de seguimiento de la especie.

Asio otus

Búho chico - Duc petit - Northern Long-eared Owl

ESTATUS: Nidificante escaso localizado, invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** citas de interés. **Categoría:** A.

La Vall d'Uixó:

25-ene: 1 ej. (JBC)

03-nov: 2 ej. en pinar saltan al entrar. (JBC)

Otra rapaz nocturnas con muy pocas citas invernales, sólo dos en la misma zona. Las parejas nidificantes parecen tener un seguimiento más adecuado en el norte provincial.

Athene noctua

Mochuelo europeo - Mussol comú - Little Owl

ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

31-dic: 2 ej. max.mensual.2-Ene.2-Feb.2-Mar.5-Abr.2-May,3-Jun. 2-Jul.4-Ago.4-Sep.6-Oct.2-Nov.2-Dic. (DES)

Burriana:

05-jun: 7 ej. (JBC)

Cabanes:

13-ene: 4 ej. oídos en una estación del programa NOCTUA. (VET)

Castellón de la Plana:

10-jul: 1 ej. atropellado en la N-340 junto al Hospital de La Magdalena. Zona con cultivos de frutales de secano y naranjales además de herbazales altos; hay casetas abandonadas. (LPC)

17-ago: 1 ej. muerto en la N-340 a la altura de las taquillas de la A7, a unos 2 Km. de otras citas iguales. (LPC)

04-sep: 1 ej. muerto por atropello en el arcén de la CS-22, justo en el Km. 6. (LPC)

04-oct: 1 ej. muerto por atropello; visto en el arcén en el Km. 3.2 de la CS-22. (LPC)

16-nov: 1 ej. visto muerto por atropello en mitad de la calzada en la carretera que une el Grao de Castellón con Almazora, a la altura de la refinería de BP. (LPC)

Desembocadura río Mijares:

24-sep: 5 ej. (JBC,JLB)

El Toro:

15-mar: 1 ad. volando a plena luz del día por un campo cerealista (ELL)

La Vall d'Uixó:

19-abr: 1 ej. muerto en mitad de la carretera delante de la gasolinera (JBC)

Nules:

20-jun: 1 ej. atropellado en CN-340 km. 959 (JBC)

25-jul: 1 ej. atropellado en CN-340 km. 958 (JBC)

Onda:

25-jul: 1 ej. atropellado en la carretera (JBC)

Villamalur:

20-may: 1 ej. oído en varias ocasiones a lo largo de la mañana en bosque mixto de alcornoque y pino rodeno. (LPC)

Villarreal/Vila-real:

01-ago: 1 ej. atropellado en la carretera Hospital de la Plana (JBC)

Viver:

04-abr: 1 ej. atropellado en km. 47 Autovía Sagunto - Teruel (JBC)

De nuevo se detecta un elevado número de ejemplares atropellados en la carretera, principalmente en los meses de verano (de junio a septiembre) cuando los jóvenes han salido del nido.

Bubo bubo

Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** IE **Criterio:** citas de interés. **Categoría:** A,E3.

Borriol:

22-oct: 1 ej. reclamos a las seis de la mañana; podría tratarse de una hembra. (LPC)

Chert/Xert:

22-ene: 1 ej. cantos 22/01 y 01/02 (ALR,RPB)

03-jul: 2 pollo cantos (ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

14-dic: 1 ej. cantando en el Bco. de les Santes. (VET)

Ortells:

02-jun: 1 ej. (MAM)

Portell de Morella:

10-may: 1 pollo se localiza nido con un pollo. (RNC)

Segorbe:

20-ene: 2 ej. es una pareja que anida en una formación de rocas de por allí. (LGB)

Otus scops

Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl

ESTATUS: Nidificante común, invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de invernada; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Borriol:

14-sep: 1 ej. emitiendo reclamos a las 18.00 en zona de regenerado de pino carrasco y roquedos, en Les Centineles. (LPC)

Castellfort:

03-abr: 1 ej. primeros cantos. (RNC)

10-ago: 1 ej. últimos cantos en la zona. (RNC)

Cervera del Maestre:

18-mar: 2 ad. primeras escuchas (ELL)

Chert/Xert:

10-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)

Fuentes de Ayódar:

03-ago: 2 ej. en la pinada en regeneración que ocupa la ladera dcha. del río, en la entrada del pueblo. Se contestan entre ellos. Inician el canto a las 19.00 y se desplazan río abajo sin dejar de emitir reclamos. (LPC)

Islas Columbretes:

23-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

Sant Mateu:

11-feb: 1 ej. (MAM)

22-abr: 2 ej. (MAM)

Villafranca del Cid:

25-abr: 1 ej. (MAM)

Villanueva de Viver:

07-abr: 1 ej. cantando al anochecer desde una chopera (MGT)

Parece confirmarse la invernada de esta especie en Sant Mateu. Los primeros cantos de migrantes prenupciales se escuchan a mediados de marzo, aunque el 60% de las citas se localizan en abril. La migración postnupcial suele terminar en octubre (última cita el 23/10/07), aunque en el interior provincial puede iniciarse y terminarse mucho antes que en las zonas prelitorales.

Strix aluco

Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** IE **Criterio:** citas de interés. **Categoría:** A.

Castellfort:

25-may: 1 ej. (MAM)

Desert de Les Palmes:

13-ene: 3 ej. oídos en 2 estaciones del programa NOCTUA. (VET)

Eslida:

19-abr: 1 ej. contacto visual a una distancia de veinte metros. Posado en una rama de un alcornoque; mimetizado perfectamente con el bornizo del árbol. Delatado por un grupo de páridos que se movían en su proximidad alborotando. A pesar del acoso de los pájaros y de mi presencia, sin inmutarse, se limitó a seguir con la cabeza sus movimientos. (LPC)

Montán:

03-mar: 1 ej. se escucha un canto, a plena luz del día, en el bco. de Beltota (ELL, JAR)

Zorita del Maestrazgo:

21-jul: 1 ej. (MAM)

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar

ESTATUS: Nidificante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..

Categoría: A.

Desert de Les Palmes:

22-abr: 1 ej. cantando al amanecer en el Bco. de les Santes. Primera cita prenupcial. (VET)

02-sep: 1 ej. en el Bco. de les Santes. Última cita postnupcial. (VET)

Islas Columbretes:

20-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

2007: 2 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Fechas extremas dentro de lo habitual.

Caprimulgus ruficollis

Chotacabras cuellirrojo - Saboc coll-roig - Red-necked Nightjar

ESTATUS: Nidificante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..

Categoría: A.

Alcossebre:

10-may: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)

15-jun: 5 ej. máximo estival. (DES)
25-jul: 1 ej. última observación estival. (DES)

Cabanes:

27-may: 3 ej. posados en 500 metros de carretera en zona de cultivos de secano. (VET)

Islas Columbretes:

02-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

Vinaròs:

11-oct: 1 ej. (VOC)

Todas las citas dentro de la fenología habitual con presencia entre mayo y octubre.

Apus apus

Vencejo común - Falcia - Common Swift

ESTATUS: Nidificante y migrante abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; máximos en migración; citas de interés. **Categoría:** A.

Almazora/Almassora:

12-abr: 100 ej. (JBC)

Alquerías del Niño Perdido:

12-abr: 500 ej. desplazándose en grupo hacia el N (JBC)

Artana:

09-abr: 75 ej. migrando al N (JBC)

Benicasim/Benicàssim:

28-mar: 3 ej. (MTB)

01-may: 10 par. primeras cópulas aéreas de la colonia del pueblo (MTB)

02-may: 740 ej. paso destacado al SO (MTB)

05-oct: 2 ej. última cita anual (MTB)

Betxí:

20-sep: 18 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

Borriol:

06-abr: 17 ej. sorprendente similitud con la cita de la misma fecha del pasado año, incluida la hora del avistamiento y la conducta de varios de ellos: tras varios minutos de giros a gran altura se lanzan en picado sobre el casco viejo del pueblo, donde nidifican, sin volverse a elevar de nuevo. Primera observación prenupcial. (LPC)

29-jul: 3 ej. únicos individuos que se aproximan al pueblo, y a la zona de cría, al anochecer. El grueso del bando abandonó el lugar entre ayer y hoy. (LPC)

Burriana:

03-abr: 15 ej. migrando al N (JBC)

Castellón de la Plana:

17-mar: 1 ej. (FRB)

04-abr: 20 ej. primer día con presencia de ej. en las colonias (MTB)

Chert/Xert:

08-oct: 4 ej. (ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

13-oct: 2 ej. última cita anual (VET, MTB)

La Vall d'Uixó:

29-jul: 0 ej. ausencia de vencejos en las calles del pueblo (JBC)

Laguna de Sant Mateu:

20-abr: 200 ej. concentración sobre la laguna. A pesar de que en un radio de 15/20 km. consta la existencia de colonias de cría de vencejo pálido, no se observa en el grupo ningún individuo de esa especie. (LPC)

Marjal de Almenara:

01-abr: 10 ej. (DOC)

01-may: 300 ej. (DOC)

Onda:

29-jul: 0 ej. ausencia total de vencejos en el pueblo. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

02-jun: 350 ej. volando a unos 5-6 Km. de la costa hacia el S (MTB)

Sant Mateu:

11-abr: 100 ej. (MAM)

Segorbe:

09-abr: 100 ej. cicleando encima de la ciudad (JBC)

Tales:

06-abr: 7 ej. migrando al N (JBC,JLB)

12-abr: 200 ej. volando al N. Dentro del pueblo veo el 1º vencejo entrar en nido del año pasado (JBC)

29-jul: 1 ej. único ejemplar volando sobre el pueblo a las 21 h., antes de esta hora ninguno. (JBC)

Villarreal/Vila-real:

05-abr: 7 ej. entre edificios pueblo (JBC,JLB)

12-abr: 300 ej. desplazándose hacia el N (JBC)

29-jul: 0 ej. ausencia total de vencejos en la zona de cría del pueblo (JBC)

Villores:

09-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)

Vinaròs:

22-mar: 1 ad. sobrevolando la ciudad (RAF)

Primera observación prenupcial el 22 de marzo (Vinaròs) y última el 13 de Octubre (Desert de les Palmes), ambas dentro de lo normal para la especie aunque en septiembre resulta ya muy escaso. Las colonias de cría se abandonan muy pronto, finales de julio, y al parecer con una gran sincronía entre localidades.

Apus melba

Vencejo real - Falcia de panxa blanca - Alpine Swift

ESTATUS: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración; Fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

17-mar: 1 ad. una NE 1a pre (DES)

15-sep: 3 ad. 3S (DES)

Artana:

14-may: 20 ej. realizando vuelos de persecución en parejas (JBC)

Benicasim/Benicàssim:

20-mar: 2 ej. volando a baja altura hacia el NE al amanecer (MTB)

25-mar: 18 ej. en un bando volando bajo hacia el NE (MTB)

04-abr: 35 ej. volando en un bando abierto contra el viento (MTB)
09-jul: 3 ej. en el Cuadro de Santiago. Primera cita en zona típica de dispersión postnupcial (MTB)
25-ago: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Betxí:

18-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

Borriol:

09-abr: 8 ej. papeando y desplazándose lentamente al NE. Hay tormentas. (LPC)
23-ago: 5 ej. alimentándose en el tramo final del barranco, especialmente aquerenciados sobre el tejado y patio del almacén de algarrobas. (LPC)

Chert/Xert:

09-jun: 17 ad. concentraciones máximas observadas en roquedos de la pista al Turmell (ELL)

Desert de Les Palmes:

12-sep: 3 ej. última cita en paso (MTB, VET)

Embalse de Arenós:

02-ago: 22 ej. (JLB,JBC)

La Vall d'Uixó:

09-abr: 50 ej. migrando al N (JBC)

Marjal de Almenara:

08-mar: 1 ej. (FRB, JBC)
31-mar: 13 ej. (JBC,JLB)
06-abr: 30 ej. (DOC)

Torrechiva:

19-jul: 19 ej. (JLB)

Vinaròs:

29-mar: 5 ad. en migración hacia el N volando raso por una finca de naranjos del polígono industrial Capsaes (ELL)

Fechas extremas este año 8 de marzo en Almenara (cita algo temprana) y 13 de septiembre en el Desert de les Palmes (no especialmente tardía, hay observaciones en octubre otros años).

Apus pallidus

Vencejo pálido - Falcia pàl·lida - Pallid Swift

ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcalá de Chivert:

11-may: 4 ej. cuatro nidos situados en las rendijas de las cajas de las persianas de madera de un casón antiguo, bien conservado y deshabitado, situado en el centro del pueblo. Por el número de ventanas existentes con persianas en el edificio, éste podría albergar de doce a quince nidos en total. A los vencejos no parece importunarles el mercadillo montado a menos de diez metros de los nidos. (LPC)

Benicasim/Benicàssim:

04-abr: 3 ej. volando hacia el NE a baja altura (MTB)
25-may: 4 ad. dos nidos en estructura de edificio en construcción parada desde hace varios años; en los huecos de las bovedillas en el lateral NE de la construcción; en el lateral SO dos nidos de vencejo común. Zona playa Heliópolis, a unos ochenta metros

de la línea de costa. Varias decenas de huecos susceptibles de ser utilizados para anidar, aunque muchos los ocupan gorriones. (LPC)

24-sep: 2 ej. última cita postnupcial (MTB)

Cabanes:

10-abr: 10 ej. volando junto a colonia de cría al anochecer. (VET)

Desert de Les Palmes:

30-sep: 5 ej. última cita anual (VET, MTB)

Les Coves de Vinromà:

25-abr: 2 ad. colonia de cría situada en los huecos de un tejado de "uralita" en nave de almacén antigua, en buen estado y aparentemente sin uso continuado, en una de las entradas del pueblo. Muchos huecos susceptibles de servir para anidar si bien bastantes los ocupan los gorriones. Fácilmente aun restan de 6 a 8 espacios posibles no ocupados por gorrion. (LPC)

Oropesa del Mar/Orpesa:

06-oct: 2 ej. en migración. (JBC,JLB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

24-nov: 1 ej. (VET,MTB)

Vilafamés:

28-mar: 1 ej. callejeando a ras de los tejados. (LPC)

07-jul: 4 ad. se localizan tres nidos, todos en los aleros debajo de las tejas, en casas deshabitadas y mal conservadas en diferentes calles del pueblo: cercanías de la cooperativa, calle del cementerio y en la calle de "La Pedra" en su último tramo. (LPC)

Interesantes apuntes sobre la nidificación de esta especie que hasta hace poco era muy desconocida pero que gracias a trabajos específicos (Pereda L.A. 2005) se ha descubierto que esta bien distribuida por la franja litoral y prelitoral.

Alcedo atthis

Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher

ESTATUS: Residente, migrante e invernante moderado. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcudia de Veo:

09-jun: 1 ej. captura estival (GAU)

14-ago: 1 ej. capturado para anillamiento. Última captura estival. (GAU)

Castellón de la Plana:

14-ene: 1 ej. (GRM,CTH)

Desembocadura río Mijares:

12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)

24-dic: 1 ej. (JBC)

Embalse de M^a Cristina:

05-jun: 1 ej. (ALR,RPB)

Marjal de Almenara:

23-ene: 2 ej. (JBC)

08-mar: 2 ej. (JBC)

21-abr: 1 ej. (DOC)

08-may: 1 ej. (JBC)

15-sep: 3 ej. (JBC)

27-sep: 7 ej. (JBC)

15-nov: 6 ej. (JBC)

05-dic: 4 ej. (JBC,JLB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

11-ene: 3 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

23-ago: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)

13-oct: 1 ej. última captura postnupcial (GAU)

Zorita del Maestrazgo:

18-ago: 1 ej. con un pez en el pico (MAM)

Fuera de las zonas donde nidifica desaparece normalmente entre abril y agosto (este año última cita prenupcial el 8 de mayo en Almenara y primera postnupcial el 23 de agosto en el Prat de Cabanes-Torreblanca).

Merops apiaster

Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater

ESTATUS: Nidificante común, migrante abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados de cría y migración; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

15-abr: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)

17-sep: 1 ej. última observación postnupcial. (DES)

Betxí:

11-sep: 245 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Se contabilizan 13 grupos (rango: 7 - 50 ex.). (JBC)

17-sep: 25 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)

Borriol:

27-jul: 8 ej. ordenadamente, uno tras otro, hasta cuatro individuos se lanzan sobre una chicharra que he levantado; el último logra atraparla. (LPC)

Desert de Les Palmes:

11-sep: 189 ej. máximo en paso en 3 horas de censo (VET, MTB)

20-sep: 110 ej. en tres bandos en tres horas. (VET)

24-sep: 5 ej. última cita anual (VET, MTB)

Forcall:

16-abr: 4 ej. pasan volando altos hacia el NE (MTB)

Marjal de Almenara:

03-may: 40 ej. fils de la llum de la Finca del Racó (EAB)

Morella:

10-abr: 10 ej. primera cita (RPB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

05-may: 73 ej. en tres grupos al N (JBC,JLB)

Ninguna cita especialmente temprana o tardía este año con ausencia de registros en marzo y octubre.

Coracias garrulus

Carraca europea - Cavaller - European Roller

ESTATUS: Nidificante raro ocasional, migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Categoría: A. **Rango:** 40/43 (Feb,Abr,May,Jun,Jul,Ago,Sep,Oct,Dic) .

Castellón de la Plana:

28-may: 1 ej. posada en un cable caza en el prado junto al río. (XBC)

Morella:

11-jun: 1 ej. (RPB)

Solo 2 citas recibidas, ambas correspondientes al paso prenupcial.

Upupa epops

Abubilla - Puput - Hoopoe

ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas invernales; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)

15.I	15.II	15.III	15.IV	15.V	15.VI	15.VII	15.VIII	15.IX	15.X	15.XI	15.XII
6	9	10	15	8	6	5	15	20	12	5	6

Benicasim/Benicàssim:

13-ene: 1 ej. en campos de cultivo abandonados (MTB)

02-feb: 1 ej. posada en cable. (LPC)

12-dic: 1 ej. varias citas en diciembre, escaso. (MTB)

Burriana:

08-nov: 3 ej. (JBC)

Castellón de la Plana:

07-feb: 1 ej. (LPC)

Chert/Xert:

10-ene: 1 ej. 1ª cita anual (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

24-dic: 6 ej. (JBC, JLB)

Desert de Les Palmes:

14-ene: 1 ej. (VET)

El Toro:

15-mar: 1 ad. posada, en actitud de alarma, en un camino rural (ELL)

Islas Columbretes:

29-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

2007: 37 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Les Coves de Vinromà:

15-abr: 9 ej. en 4 estaciones del programa SACRE. (VET)

27-may: 19 ej. en 13 estaciones del programa SACRE. (VET)

Marjal de Almenara:

26-feb: 5 ej. (JBC)

21-nov: 2 ej. (JBC)

Morella:

09-mar: 1 ej. primera cita. (ALR)

Oropesa del Mar/Orpesa:

24-feb: 1 ej. (LPC)

Peñíscola:

22-ene: 1 ej. desplazándose entre algarrobos. (LPC)

Pina de Montalgrao:

21-mar: 2 ej. (JBC)

Portell de Morella:

15-sep: 1 ej. (MAM)

Tales:

25-dic: 1 ej. (JBC)

Buen número de observaciones invernales en zonas costeras. En el interior desaparece durante los meses más fríos. El seguimiento de Alcossebre permite ver como los máximos migratorios se producen en abril y septiembre.

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck

ESTATUS: Residente y migrante común, invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas invernales; fechas extremas; censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

06-ene: 1 ej. en un campo abandonado de almendros (MTB)

18-dic: 1 ej. en un campo abandonado de almendros (MTB)

Desert de Les Palmes:

05-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (VET)

Islas Columbretes:

12-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

20-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

2007: 3 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Un par de citas de invernada en el litoral, hecho que no resulta excepcional en esta especie aunque el grueso de la población inverna al sur del Sahara.

Picus viridis

Pito real - Picot - Eurasian Green Woodpecker

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Barracas:

29-dic: 3 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

15-jun: 2 ej. pareja con vuelo algo errático hacia le NE, sobre campos de secano y por encima de las villas y junto al caso urbano. Muy raro en esta zona. (MTB)

24-ago: 2 ej. única cita anual (MTB)

Desert de Les Palmes:

02-sep: 1 ej. oído varias veces en el Bco. de les Santes, escasas observaciones anuales. (VET)

Incluimos citas en zonas de presencia escasa.

Alauda arvensis

Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark

ESTATUS: Residente, migrante e invernante común. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; máximos en invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

16-abr: 1 ej. última cita invernal. (DES)

07-oct: 1 ej. primera cita invernal. (DES)

2007: 160 ej. noviembre. Censo máximo anual. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

12-ene: 1 ej. única cita anual en un campo de almendros abandonado. (MTB)

Desert de Les Palmes:

07-oct: 1 ej. volando hacia el S, primera observación postnupcial. (VET)

El Toro:

25-abr: 6 par. ad. (ELL)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

17-feb: 2 ej. salen volando de la playa al amanecer; escaso en la zona, quizás en paso. (MTB)

Sant Mateu:

15-ene: 29 ej. (MAM)

Calandrella brachydactyla

Terrera común - Terrerola - Greater Short-toed Lark

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; máximos en migración; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

03-abr: 1 ej. primera cita para Alcossebre. (DES)

Ares del Maestre:

07-may: 23 ej. (MAM)

Barracas:

18-ago: 4 ej. (MGT)

26-ago: 8 ej. (MGT)

Islas Columbretes:

20-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Pina de Montalgrao:

21-mar: 4 ej. (JBC)

Pocas observaciones recibidas. Todas las citas de este aláudido serían interesantes, en especial las que hagan referencia a una posible reproducción puesto que en algunos lugares como Catalunya se ha rarificado mucho en los últimos años. Buena agrupación detectada en Ares del Maestre

Galerida cristata

Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark

ESTATUS: Residente común, migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Barracas:

29-dic: 24 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

12-may: 1 ej. última cita prenupcial. no ha criado en la zona (MTB)

09-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (MTB)

Laguna de Sant Mateu:

14-ene: 17 ej. (MAM)

Marjal de Almenara:

16-ene: 15 ej. todas en un solo grupo (JBC)

Lullula arborea

Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark

ESTATUS: Residente común. Migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de migración; citas de interés. **Categoría:** A.

Chert/Xert:

09-jun: 3 par. ad. nidificaciones en los alrededores de la Ermita de Sto. Domingo (ELL)

La Jana:

17-ene: 16 ej. (MAM)

Sant Mateu:

15-ene: 18 ej. (MAM)

Tirig:

15-abr: 6 ej. en estaciones del programa SACRE. (VET)

Buenas citas de agrupaciones invernales, las cuales suelen escasear en los anuarios.

Delichon urbicum

Avión común - Oroneta cua-blanca - Northern House Martin

ESTATUS: Nidificante y migrante abundante. Invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados de cría; fechas extremas; cifras máximas en migración; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

15-feb: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

21-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

- 01-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
- 21-sep: 190 ej. paso destacado en 40 minutos (MTB)
- 14-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)

Desert de Les Palmes:

- 17-feb: 1 ej. entre un grupo de Aviones roqueros. (IBR)

Grau de Castelló:

- 03-abr: 4 ej. primeros ejemplares este año. Han llegado con un retraso de más de tres semanas con respecto a las observaciones efectuadas en el mismo lugar en los últimos cinco años. (LPC)

Islas Columbretes:

- 19-feb: 1 ej. primera cita prenupcial (GRN)
- 13-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
- 2007: 14 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Marjal de Almenara:

- 02-nov: 10 ej. junt a roquers volant entre l'agüelet i la pampa (Muntanya del Castell d'Almenara) (DOC)

Tirig:

- 01-nov: 3 ad. (AGC)

Todos los años se dan primeras llegadas durante febrero (como este año en Alcossebre, Columbretes y el Desert de les Palmes). Sin embargo las observaciones se generalizan durante marzo. Última cita este año el 2.XI en la Marjal de Almenara.

Hirundo daurica

Golondrina dáurica - Oroneta cua-rogenca - Red-rumped Swallow

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría; fechas extremas; máximos en migración; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 17-feb: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
- 30-sep: 3 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

- 07-abr: 3 ej. primera cita prenupcial (MTB)
- 06-jun: 1 ej. cita estival en un campo de almendros abandonado junto al pueblo (MTB)

Desert de Les Palmes:

- 03-ago: 5 ej. en el Bco. de les Santes. (VET)

Islas Columbretes:

- 04-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Montán:

- 12-jun: 1 par. ad. criando bajo un puente (ELL, JAR, JMB, GDO)

Peñíscola:

- 20-sep: 5 ej. (MCM)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 29-mar: 1 ej. (FGB)
- 05-may: 2 ej. vuelo al N (JBC,JLB)

Villamalur:

30-sep: 6 ej. el grupo pasa parte de la mañana moviéndose por la zona a bastante altura. (LPC)

Zorita del Maestrazgo:

01-may: 3 ej. (MAM)

Primer registro prenupcial de Alcossebre el 17.II, muy temprano ya que las llegadas suelen ser en marzo. Últimas citas este año a finales de septiembre (30.IX Alcossebre y Villamalur).

Hirundo rustica

Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow

ESTATUS: Nidificante y migrante abundante, invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; máximos en migración; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

15-ene: 3 ej. volando al Noreste. Cita invern. (DES)

01-dic: 1 ej. última cita. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

02-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)

14-oct: 55 ej. última cita postnupcial (MTB)

Betxí:

16-sep: 10000 ej. paso masivo de miles de golondrinas al S, con mayor concentración hacia el anochecer. (JBC)

25-sep: 2000 ej. centenares migrando al S. (JBC)

Castellón de la Plana:

14-feb: 1 ej. un ej. sobrevolando la ronda Magdalena acosado por dos aviones roqueros. (XBC)

Islas Columbretes:

25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

16-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (GAU)

2007: 112 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 16 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

19-feb: 1 ej. (FRB)

03-mar: 2 ej. (DOC)

07-mar: 60 ej. en un bando alimentándose sobre la marjal (MTB)

03-abr: 700 ej. incontables exemplars alimentant-se a baixa alçada mentres es fa de nit (AGR)

04-nov: 1 ej. volant junt a roquers (DOC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

13-feb: 1 ej. (FGB)

Sant Jordi:

28-mar: 800 ad. concentraciones máximas en día de fuerte aguacero (ELL)

Tales:

11-mar: 2 ej. primeras observadas en la población (JBC)

Vinaròs:

01-mar: 1 ad. en vuelo migratorio por la zona del hospital comarcal (AGC)

Este año las llegadas han sido tempranas para esta especie, con varias citas a mediados de febrero y destacando por encima de ellas la de Alcossebre el 15.I. También en Alcossebre se registra una citación invernal el 1.XII. También buenos conteos postnupciales en Betxí.

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin

ESTATUS: Nidificante e invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

14-mar: 1 ej. última cita invernal. (DES)

16-oct: 1 ej. primera cita invernal. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

13-oct: 8 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Bovalar de Ortells:

02-jun: 17 ej. (MAM)

Desert de Les Palmes:

01-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB, VET)

Marjal de Almenara:

03-feb: 500 ej. (DOC)

22-dic: 500 ej. (JBC)

Ortells:

16-may: 56 ej. (MAM)

Portell de Morella:

15-mar: 25 ej. (MAM)

Riparia riparia

Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante común. **Conservación:** VUL **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en migración; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

14-abr: 1 ej. primera cita estival. (DES)

13-oct: 1 ej. última cita estival. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

27-mar: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)

27-sep: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Islas Columbretes:

2007: 4 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Marjal de Almenara:

05-abr: 100 ej. alimentant-se en vol junt a oroneta vulgar (DOC)

Especie estival, este año presente desde el 27.III (Benicàssim) al 13.X (Alcossebre)

Anthus campestris

Bisbita campestre - Titeta d'estiu - Tawny Pipit

ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Albocácer:

15-abr: 1 ej. en zona de cría. (VET)

Barracas:

25-abr: 1 ad. (ELL)

09-jun: 4 ej. (JBC)

22-ago: 3 ej. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

29-abr: 1 ej. primera y única cita prenupcial (MTB)

Desert de Les Palmes:

08-jun: 1 ej. en el Alto del Colomer, cantando y reclamando. Al menos hasta el 25-6. (IBR)

Islas Columbretes:

12-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

17-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Anthus pratensis

Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit

ESTATUS: Migrante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

04-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

09-oct: 1 ej. primera cita de invernada (DES)

Barracas:

29-dic: 32 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

02-abr: 4 ej. última cita prenupcial (MTB)

20-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Desert de Les Palmes:

19-sep: 4 ej. primera cita postnupcial. En paso (MTB, VET)

14-oct: 7 ej. migrando hacia el S en 2 horas. (VET)

Islas Columbretes:

22-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

11-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 4 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 3 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

05-ene: 25 ej. (JBC)

Tirig:

15-abr: 2 ej. observación prenupcial tardía. (VET)

Invernante muy común en cultivos y demás zonas abiertas. Llega a nuestras tierras a finales de septiembre y principalmente en octubre (este año primera postnupcial el 19.IX Desert de les Palmes). En primavera los últimos migrantes prenupciales se dejan ver en abril (22.IV Columbretes).

*Anthus spinoletta***Bisbita alpino** - Titeta de muntanya - Water Pipit

ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso localizado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Ares del Maestre:

14-abr: 4 ej. (ALR,RPB)

Marjal de Almenara:Subespecie: **SPINOLETTA**

17-mar: 3 ej. (DOC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

13-ene: 2 ej. en la playa al amanecer (MTB)

19-feb: 3 ej. (FGB)

15-mar: 2 ej. uno en plumaje estival (FGB)

18-mar: 27 ej. en un "luent" (MTB)

29-mar: 20 ej. todos en plumaje estival. (FGB)

Especie alpina que inverna principalmente en humedales. La mayor parte de las citas que recogemos son de migrantes en paso prenupcial, que se da principalmente entre marzo y abril.

*Anthus trivialis***Bisbita arbóreo** - Titeta dels arbres - Tree Pipit

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

14-abr: 2 ej. en paso en un campo de almendros (MTB)

Gaibiel:

29-ago: 1 juv. individuo capturado para su anillamiento. (RPM)

Islas Columbretes:

24-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

03-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)

2007: 26 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 16 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Migrante escaso en la provincia con un reclamo diagnóstico que suele ser lo primero que lo delata. En su paso prenupcial se deja ver a partir de marzo-abril y el postnupcial finaliza a principios de octubre.

Motacilla alba

Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail

ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; dormideros; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcudia de Veo:

07-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Benicasim/Benicàssim:

14-oct: 34 ej. máximo postnupcial en 1 Km. en campos abandonados (MTB)

Chert/Xert:

09-jun: 4 juv.+ ad. adultos con varios jóvenes nacidos este año en una balsa junto a Mas de Basilio (ELL)

Islas Columbretes:

23-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

2007: 3 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Marjal de Almenara:

23-mar: 100 ej. alrededor de un centenar de aves esparcidas por la marjal (JBC)

09-nov: 44 ej. (JBC)

Onda:

07-mar: 1 ej. picoteando una carroña de perro en el margen de la carretera. No se puede precisar si pretendía alimentarse de la propia carroña o de larvas que se desarrollaban sobre ésta. El animal muerto se encontraba en avanzado estado de descomposición. (LPC)

Tales:

19-mar: 70 ej. entre 50 y 70 aves sobre la basura (JBC)

Interesante comportamiento registrado en Onda.

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail

ESTATUS: Nidificante migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

25-feb: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

08-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Alcudia de Veo:

07-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Benicasim/Benicàssim:

13-oct: 1 ej. primera cita postnupcial en una rambla junto al pueblo. (MTB)

09-dic: 1 ej. última cita postnupcial en una rambla junto al pueblo. Ausente el resto del invierno (MTB)

Desert de Les Palmes:

02-jul: 1 ej. joven anillado en el Bco. de les Santes. (VET)

Islas Columbretes:

02-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 4 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Segorbe:

15-abr: 1 par. es una pareja que ha anidado en una ventana de una caseta, puso cinco huevos de los cuales salieron cuatro. (LGB)

Motacilla flava

Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail

ESTATUS: Nidificante moderado muy localizado, migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

04-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

20-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)

22-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)

06-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Cabanes:

05-may: 10 ej. en cultivos inundados por las lluvias. (VET)

Islas Columbretes:

13-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

05-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)

2007: 6 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 26 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

17-mar: 1 ej. (DOC)

29-abr: 50 ej. 2 ex de la subespecie thunbergi (DOC)

15-nov: 1 ej. (JBC)

Morella:

16-feb: 1 ej. (MAM)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

25-mar: 18 ej. saliendo de un dormidero al amanecer (MTB)

Villanueva de Viver:

08-abr: 30 ej. alimentándose por los campos inundados. La mayoría machos. (MGT)

Especie tempranera en llegar, a veces citada ya a finales de febrero (como la cita del 16.II de Morella). Sin embargo el paso es más abundante en marzo y abril. La cita de la Marjal de Almenara del 15.XI es algo tardía, ya que los últimos registros otoñales suelen ser en octubre.

Cinclus cinclus

Mirlo acuático europeo - Merla d'aigua - White-throated Dipper

ESTATUS: Residente escaso localizado. **Conservación:** VUL **Criterio:** Citas de cría; citas de interés.. **Categoría:** A.

Villahermosa del Río:

15-mar: 1 ej. (PLL, MAG)

04-jun: 1 par. ad. (PLL, CGR)

Troglodytes troglodytes

Chochín común - Caragolet - Northern Wren

ESTATUS: Nidificante común, invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de interés. **Categoría:** A.

Cabanes:

09-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Islas Columbretes:

10-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

24-dic: 1 ej. en la Isla Grande (GRN)

Vilafamés:

27-dic: 1 ej. en la vegetación de una acequia entre campos de secano. Observación invernal, no cría en la zona. (VET)

Interesantes registros de movimientos para esta especie en Columbretes. La cita del 24.XII indica que aún en pleno invierno las aves se siguen moviendo dependiendo de las inclemencias meteorológicas, disponibilidad de alimento etc.

Prunella collaris

Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor

ESTATUS: Invernante escaso localizado. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Rango: 33/72 (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Oct, Nov, Dic) .

Ares del Maestre:

03-dic: 4 ej. primera cita (RPB)

Caudiel:

26-feb: 1 ad. comiendo semillas en la pista Collado Arenillas-Canteras de Gullirno (ELL, JAR)

Desert de Les Palmes:

30-ene: 4 ej. frecuentan mucho las zonas altas como el pico del Bartolo, el Alto del Colomer y Les Moletes. (IBR)

Islas Columbretes:

14-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Pina de Montalgrao:

13-mar: 1 ad. (CGR)

03-abr: 1 ad. (CGR)

Sacañet:

28-abr: 1 ad. en el arcén de la carretera hacia Alcublas (ELL, JAR)

Villahermosa del Río:

30-mar: 2 ad. (CGR)

Vistabella del Maestrazgo:

21-abr: 2 ej. en la misma canal situada entre las dos cimas. (PLL)

Excelente año de citas para esta especie alpina que todos los años se deja ver en la provincia en pequeño número. Llama la atención el anillamiento en Columbretes de un ejemplar el 14.V por producirse en una isla en mitad del mar, pero cabe reseñar que se ve con regularidad en Baleares por lo que al menos algunos individuos cruzan el Mediterráneo. Todas excepto una hacen referencia al invierno-paso prenupcial 2006-2007 lo que indica que por alguna causa fue mucho

más abundante que en el invierno 2007-2008. Especie tardía en criar (junio-julio) debido a que se reproduce en zonas muy altas y frías, de ahí que haya avistamientos aparentemente tardíos como el de Columbretes.

Prunella modularis

Acentor común - Rossarda - Dunnock

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas de cría; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcudia de Veo:

11-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Última captura invernal (GAU)

Borriol:

27-feb: 6 ej. grupo establecido durante todo el invierno en el barranco de Atzavara. (LPC)

Cabanes:

03-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita invernal (GAU)

Desert de Les Palmes:

16-dic: 10 ej. concentración, en sólo 100 metros. (VET)

El Toro:

06-dic: 7 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)

Islas Columbretes:

24-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

16-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 24 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 55 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Aparece citado como reproductor en el interior provincial pero en realidad son muy escasas esas referencias en los anuarios (como también pasa con el zorzal común, el colirrojo real...). Los invernantes llegan a nuestras tierras en octubre (16.X Columbretes) y se marchan en marzo-abril (24.IV Columbretes).

Erithacus rubecula

Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin

ESTATUS: Nidificante común, migrante e invernante abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

16-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

08-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Barracas:

29-dic: 21 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

30-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)

07-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)

23-oct: 45 ej. concentración destacada en censo de 1 Km. en campos abandonados de almendros (MTB)

Castellón de la Plana:

25-sep: 1 ej. (XBC)

El Toro:

26-ago: 5 juv.+ ad. jóvenes sin mudar, jóvenes mudando a plumaje adulto y adultos. (MGT)

06-dic: 13 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)

Islas Columbretes:

03-may: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

19-sep: 2 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 598 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 1421 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

21-abr: 1 ej. (DOC)

12-oct: 2 ej. (DOC)

Reproductor abundante, pero con gran influjo de invernantes. Los invernantes se dejan de ver en abril-mayo (con una cita muy tardía este año del 30.V) y vuelven a aparecer en septiembre.

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale

ESTATUS: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

04-abr: 1 ej. primera cita estival. (DES)

02-sep: 1 ej. última cita estival. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

05-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)

21-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)

14-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

03-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Cabanes:

22-abr: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita anual en área de cría. (GAU)

02-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)

Grau de Castelló:

14-abr: 1 m. oído cantando en un sauce. (XBC)

Islas Columbretes:

25-mar: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

09-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)

2007: 101 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 22 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Les Coves de Vinromà:

27-may: 22 ej. en 16 estaciones del programa SACRE. (VET)

Especie estival que cada primavera nos invade con su canto día y noche. Primera cita este año el 25.III y última cita el 9.X, ambas de Columbretes.

*Luscinia svecica***Ruiseñor pechiazul** - Pit-blau - Bluethroat

ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de invernada; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

17-mar: 1 ej. cita en paso en un campo de almendros abandonado. Nueva cita el 24 del mismo mes. (MTB)

Desembocadura río Mijares:

03-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)

25-sep: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)

Islas Columbretes:

10-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

08-oct: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

2007: 9 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Marjal de Almenara:

17-nov: 1 ej. primer invernate observado por nosotros (JBC,JLB)

Peñíscola:

15-sep: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita postnupcial (GAU)

29-oct: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita postnupcial (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

29-mar: 2 ej. (FGB)

15-sep: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)

Invernante y migrante en la provincia, principalmente en zonas húmedas. Últimas citas prenupciales en marzo-abril (10.IV Columbretes) y primeras postnupciales en septiembre (15.IX Peñíscola y Prat de Cabanes-Torreblanca).

*Monticola saxatilis***Roquero rojo** - Merla roquera - Common Rock-thrush

ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Citas de cría; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Barracas:

25-abr: 1 m. ad. en el vallado de la cantera (ELL)

Borriol:

29-abr: 1 m. ad. toma como percha las ramas secas de un algarrobo quemado junto a una collalba rubia, sin interferencias entre ambos. (LPC)

Bovalar de Ortells:

02-jun: 1 m. ad. (MAM)

Chert/Xert:

09-jun: 1 m. ad. (ELL)

Morella:

27-jun: 2 ej. hembra y pollo (MAM)

Portell de Morella:

15-sep: 1 h. (MAM)

Viver:

11-may: 1 m. ad. (JBC)

Especie estival citada sobre todo en el interior. Bastante tardía en llegar a nuestras tierras, sobre todo a partir de mediados-finales de abril. Poco detectada en el paso postnupcial. Este año primera cita el 25.IV (Barracas) y última el 15.IX (Morella).

Monticola solitarius

Roquero solitario - Merla blava - Blue Rock-thrush

ESTATUS: Residente común, migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés.

Categoría: A.

Alcossebre:

16-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

06-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

19-mar: 1 ej. en paso, única cita anual (MTB)

Islas Columbretes:

25-mar: 1 m. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

04-abr: 1 m. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Tales:

07-abr: 1 ej. (JBC)

Villamalur:

13-may: 1 m. ad. sobre las tapias de los corrales en la entrada del pueblo. (LPC)

Interesantes registros de movimientos en Alcossebre y Columbretes.

Oenanthe hispanica

Collalba rubia - Còlbit ros - Black-eared Wheatear

ESTATUS: Nidificante y migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

13-abr: 1 ej. única cita de 2007. (DES)

Barracas:

06-abr: 1 m. macho de garganta oscura (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

02-abr: 2 ej. macho y hembra deambulando por un campo de almendros (MTB)

Burriana:

26-sep: 1 ej. (JBC)

Herbés:

09-abr: 2 ad. (PLL, CGR)

Marjal de Almenara:

27-sep: 2 ej. (JBC)

Viver:

21-jun: 1 par. (JBC)

Primeras llegadas como la collalba gris, a principios de abril (2.IV Benicàssim) y última cita a finales de septiembre (27.IX Marjal de Almenara).

Oenanthe leucura

Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear

ESTATUS: Residente moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de interés. Categoría: A.

Borriol:

05-sep: 1 juv. se trata de una cría de la pareja citada el 25 de abril; se ha visto junto a sus padres en el núcleo de su territorio. (LPC)

Cabanes:

06-jul: 4 ej. pareja con al menos 2 jóvenes junto a la carretera Cabanes-Ribera de Cabanes. (VET)

Chert/Xert:

09-jun: 1 ad. (ELL)

La Salzadella:

30-may: 1 ej. (ALR,RPB)

Oenanthe oenanthe

Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear

ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

01-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

27-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)

12-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)

23-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Barracas:

06-abr: 3 ej. por las rocas y los campos de cultivo. (MGT)

18-ago: 11 ej. muy abundantes entre los montones de piedras que delimitan los cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

02-may: 1 ej. única cita primaveral (MTB)

09-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)

Burriana:

25-oct: 5 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

03-abr: 1 ej. (JBC)

Herbés:

09-abr: 3 ej. primeros avistamientos de la temporada por la zona. (PLL, CGR)

Islas Columbretes:

12-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

07-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)

2007: 13 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 11 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Oropesa del Mar/Orpesa:

06-oct: 1 ej. (JBC,JLB)

Torás:

04-abr: 2 ej. (JBC)

Nidificante abundante en algunas zonas del interior. Los primeros individuos suelen llegar a nuestras tierras a principios de abril (1.IV Alcossebre) y nos abandonan en octubre (25.X Burriana).

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón - Cua-roja fumada - Black Redstart

ESTATUS: Residente común, migrante e invernante abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

27-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

08-ago: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

20-ene: 1 ej. con caracteres de la ssp. aterrimus (MTB)

29-mar: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)

12-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Castellón de la Plana:

17-sep: 1 m. (XBC)

Chert/Xert:

01-may: 1 ej. última cita invernada (ALR,RPB)

09-oct: 1 ej. primera cita invernada (ALR,RPB)

Islas Columbretes:

17-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

07-oct: 5 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 121 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 213 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

29-abr: 1 h. (FRB, DOC)

Nidificante bien distribuido por la provincia, en invierno ocupa las zonas más bajas con movimientos altitudinales y gran aporte de aves europeas. En los lugares donde invernara, últimas citas prenupciales en abril y primeras postnupciales en octubre. La cita postnupcial de Alcossebre

el 8.VIII quizás hace referencia a algún desplazamiento de reproductores de zonas cercanas al tratarse de una cita muy temprana.

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real - Cua-roja reial - Common Redstart

ESTATUS: Nidificante moderado, migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 18-abr: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
- 11-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
- 27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
- 05-nov: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

- 27-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
- 09-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
- 07-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
- 14-oct: 3 ej. última cita anual (MTB)

Castell de Cabres:

- 07-ago: 1 h. se observa un ejemplar hembra en los alrededores de la población (AAC)

Chert/Xert:

- 01-abr: 1 ej. se ven por la zona el 1 y 2 del 4. (ALR,RPB)
- 08-oct: 1 m. (ALR,RPB)

El Toro:

- 09-abr: 1 m. ad. (ELL)

Grau de Castelló:

- 30-mar: 1 ej. (XBC)

Islas Columbretes:

- 25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
- 15-oct: 2 ej. última captura postnupcial (GAU)
- 2007: 157 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
- 2007: 108 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Escaso como reproductor, mucho más abundante en los pasos migratorios. La cita de Castell de Cabres el 7.VIII es bastante temprana, pero probablemente hace referencia a un migrante temprano más que a un posible reproductor. Paso prenupcial del 25.III al 11.V y paso postnupcial del 7.VIII al 5.XI.

Saxicola rubetra

Tarabilla nortea - Bitxac rorenc - Whinchat

ESTATUS: Migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 18-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

08-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
 03-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
 30-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Araya:

02-nov: 1 ej. (ALR)

Benicasim/Benicàssim:

13-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
 02-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
 27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
 13-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)

Cabanes:

05-may: 2 ej. en cultivos inundados por las lluvias. (VET)

El Toro:

27-ago: 1 ej. migrante (MGT)

Islas Columbretes:

11-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
 08-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)
 2007: 8 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
 2007: 15 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

21-abr: 1 ej. mascle (DOC)

Exclusivamente migrante en la provincia. Buen seguimiento que nos dibuja un paso prenupcial que se ha extendido del 11.IV (Columbretes) al 8.V (Alcossebre) y el postnupcial del 27.VIII (El Toro, Benicàssim) al 2.XI (Araya).

Saxicola torquatus

Tarabilla común - Cagamànecs - Common Stonechat

ESTATUS: Residente, migrante e invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

04-abr: 1 ej. última cita invern. (DES)
 22-sep: 1 ej. primera cita invern. (DES)

Barracas:

06-abr: 2 par. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

26-mar: 1 ej. última cita invern. (MTB)
 30-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Islas Columbretes:

16-mar: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
 16-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
 2007: 8 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
 2007: 4 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

30-abr: 1 ej. mascle posat en una canya (DOC)

15-sep: 1 juv. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

16-sep: 1 ej. primera captura postnupcial (MTB)

Residente, pero con movimientos invernales. Paso prenupcial en marzo principalmente, y postnupcial a finales de septiembre-octubre.

Turdus iliacus

Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing

ESTATUS: Migrante e invernante moderado. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Desert de Les Palmes:

03-feb: 1 ej. oído cantando en el Barranco de les Santes. (VET,MTB)

30-dic: 3 ej. oídos reclamos en olivar en el Bco. de les Santes. (VET)

El Toro:

07-dic: 3 ej. en un bebedero, junto con zorzaes charlos, comunes y mirlos. (MGT)

28-dic: 12 ej. el zorzal más abundante durante la excursión del Anuario, aumento de efectivos a medida que ha pasado el invierno. (AOC)

Islas Columbretes:

15-oct: 1 ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

La Jana:

17-ene: 4 ej. (MAM)

Tales:

12-oct: 5 ej. en paso. (JBC)

13-oct: 8 ej. en paso. (JBC)

Invernante repartido en por toda la provincia, pero quizás se presenta en mayor número en el interior (ej. El Toro). Llegadas a partir de mediados de octubre (Tales, Columbretes). Suele abandonarnos antes que el Zorzal común, sobre febrero-marzo, para volver a sus cuarteles de cría en el norte de Europa.

Turdus merula

Mirlo común - Merla - Common Blackbird

ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:

29-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

20-abr: 1 juv. primero del año (MTB)

02-oct: 21 ej. máximo postnupcial en 1 Km. de censo en campos abandonados de almendros (MTB)

Cabanes:

23-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

El Toro:

06-dic: 19 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)

Islas Columbretes:

- 13-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
- 13-oct: 5 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
- 2007: 67 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Importantes movimientos postnupciales como denotan las citas de Benicàssim y Columbretes.

Turdus philomelos

Zorzal común - Tord - Song Thrush

ESTATUS: Nidificante escaso localizado, migrante e invernante abundante. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 13-abr: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
- 31-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
- 2007: 43 ej. diciembre. Máximo anual. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

- 17-abr: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
- 02-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

El Toro:

- 06-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)

Islas Columbretes:

- 20-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
- 02-oct: 4 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
- 2007: 63 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
- 2007: 429 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

La Jana:

- 17-ene: 37 ej. (MAM)

San Rafael del Río:

- 31-mar: 2 ad. ultimas observaciones invernales (AGC)

Se comporta principalmente como invernante común en la provincia, ya hace tiempo que no recibimos citas de posibles casos de nidificación. Los invernantes llegan a nuestras tierras principalmente a finales de septiembre y sobre todo octubre, por lo que la primera cita del 31.VIII de Alcossebre se adelanta un mes al patrón normal. Las últimas citas postnupciales se dan en abril.

Turdus pilaris

Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare

ESTATUS: Invernante raro. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 12-dic: 1 ej. primera cita para Alcossebre. Visto también el 31-12 (DES)

El Toro:

- 06-dic: 1 ej. en una sabina junto a zorzaes charlos. Relocalizado al día siguiente. (MGT)

El zorzal menos abundante de la provincia con diferencia, con poblaciones invernantes que fluctúan según los años. Se presenta principalmente en el interior (como la cita de El Toro), y es mucho más raro en zonas costeras (importante la cita de Alcossebre).

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel

ESTATUS: Migrante e invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 20/24 (Mar,Abr,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Ares del Maestre:

26-nov: 1 ej. primera cita (RPB)

El Toro:

06-dic: 1 ej. en un pinar-sabinar a unos 1500 m. de altura. (MGT)

Islas Columbretes:

14-mar: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

26-mar: 2 m. ad. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

16-oct: 1 h. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

23-oct: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

Túrdido migrante e invernante en la provincia. Durante los pasos migratorios (principalmente en octubre y marzo) se puede presentar en cualquier punto de la provincia. Pero durante el invierno se presenta casi exclusivamente en los sistemas montañosos del interior, ya que su principal área de invernada en la Península ha sido descrita en las Sierras de Gúdar y Javalambre (Teruel), relativamente cerca de la provincia. Con todo, escasean estas citas puramente invernales por lo que son interesantes los registros de El Toro y Ares del Maestre.

Turdus viscivorus

Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush

ESTATUS: Residente común, migrante moderado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

El Toro:

06-dic: 26 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)

Islas Columbretes:

20-oct: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

26-oct: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

Morella:

01-oct: 25 ej. (MAM)

Villafranca del Cid:

27-feb: 45 ej. (MAM)

Residente en la provincia pero con aportes de individuos migradores de zonas más norteñas, como pone de manifiesto la cita de migrantes de Columbretes.

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal - Xitxarrot - Great Reed-warbler

ESTATUS: Nidificante moderado localizado, migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

24-abr: 1 ej. en una zona de matorral denso con zarzas en unos campos abandonados de naranjo. Única cita anual (MTB)

Castellón de la Plana:

17-sep: 1 ej. (XBC)

Islas Columbretes:

01-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Marjal de Almenara:

20-abr: 3 ej. (JBC)

22-abr: 15 ej. (DOC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

01-abr: 1 ej. primera captura anual (GAU)

16-oct: 1 ej. última captura anual (GAU)

2007: 40 ej. total capturas (GAU)

Citas dentro del rango habitual para esta especie estival. Primera cita el 1.IV (Columbretes y Prat de Cabanes-Torreblanca) y última postnupcial el 16.X (Prat).

Acrocephalus melanopogon

Carricerín real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler

ESTATUS: Nidificante moderado muy localizado, migrante moderado, invernante escaso. **Conservación:** VUL **Criterio:** Todas las citas de cría; censos destacados; citas de migración; citas de interés. **Categoría:** A.

Marjal de Almenara:

17-feb: 2 ej. se senten cantar (DOC)

18-mar: 20 ej. (DOC)

26-may: 10 ej. (DOC)

Peñíscola:

10-nov: 1 ej. capturado para anillamiento. (GAU)

01-dic: 1 ej. capturado para anillamiento. (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 217 ej. total capturas anual (GAU)

El Prat de Cabanes-Torreblanca sigue siendo una de las mejores zonas para la especie en toda la Comunidad Valenciana junto a la Marjal de Pego-Oliva

Acrocephalus schoenobaenus

Carricerín común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler

ESTATUS: Migrante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Alcossebre:

03-abr: 1 ej. en Capycorp. Primera cita para Alcossebre. (DES)

Desembocadura río Mijares:

15-abr: 1 ej. única captura anual (GAU)

Grau de Castelló:

20-feb: 1 ej. (XBC)

Islas Columbretes:

13-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

2007: 4 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Peñíscola:

08-abr: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita prenupcial (GAU)

16-abr: 2 ej. capturado para anillamiento. (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial (GAU)

26-jul: 1 ej. primera y única captura postnupcial (GAU)

Migrante en la provincia, muy temprano en sus pasos tanto prenupciales como postnupciales. Sin embargo, la primera cita prenupcial recogida del 20.II en el Grau de Castelló es muy temprana (quizás la más temprana para la provincia) ya que las primeras llegadas se producen a partir de mediados de marzo. Existen otros registros similares en El Hondo (Alicante) el 10.II.1993 y el 20.II.1993. En julio ya comienzan a pasar los migrantes rumbo a África.

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler

ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

29-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

09-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

13-may: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)

14-jun: 1 ej. última cita primaveral. Regular durante el mes de mayo en campos abandonados de naranjos (MTB)

09-ago: 1 ej. joven buscando insectos en una higuera. (MTB)

13-oct: 1 ej. última cita anual. Paso regular en agosto, mas escaso en septiembre y octubre. (MTB)

Cabanes:

13-may: 1 ej. cantando en cañar junto a una charca. (VET)

Castellón de la Plana:

03-abr: 1 m. cantando; primera cita del año. (MTB)

Desembocadura río Mijares:

01-may: 1 ej. primera captura anual (GAU)

05-nov: 1 ej. última captura anual (GAU)

Grau de Castelló:

16-abr: 1 m. oído cantando . Primero primaveral. (XBC)

Islas Columbretes:

20-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

24-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)

2007: 12 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 23 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Peñíscola:

08-abr: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita anual (GAU)

29-oct: 1 ej. capturado para anillamiento. Última captura anual (GAU)

2007: 115 ej. capturados para anillamiento. Total campaña (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

03-abr: 1 ej. primera cita prenupcial (GAU)

27-oct: 1 juv. captura del último joven de año (GAU)

2007: 338 ej. total capturas (GAU)

Especie estival, todas las citas encajan dentro de su fenología. Primera cita el 3.IV (Castellón y Prat de Cabanes-Torreblanca) y última postnupcial el 5.XI (Desembocadura del Mijares).

Cettia cetti

Cetia Ruiseñor - Rossinyol bord - Cetti's Warbler

ESTATUS: Nidificante e invernante moderado, migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

27-feb: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

17-sep: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

16-ago: 1 ej. primera cita postnupcial en un campo de naranjos abandonado (MTB)

25-dic: 1 ej. en una zona con densa cobertura en un campo abandonado de naranjos, varias citas durante el mes de diciembre (MTB)

Desembocadura río Mijares:

2007: 25 ej. total capturas anual (GAU)

La Pobla Tornesa:

05-jul: 3 ej. al menos 3 machos cantando. (VET)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

13-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)

13-ago: 1 ej. oído en un carrizal en Turberas (MTB)

2007: 287 ej. total capturas anual (GAU)

Reproductor bien repartido por todas las zonas húmedas siempre que encuentre un estrato arbustivo idóneo (sotos, zarzales, cañaverales...). En invierno se desplaza a zonas más atemperadas, apareciendo en agosto-septiembre y desapareciendo en febrero-marzo como ponen de manifiesto los seguimientos de invernantes.

Cisticola juncidis

Cisticola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola

ESTATUS: Residente y migrante común, invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

26-mar: 1 ej. aportando material al nido (MTB)

Marjal de Almenara:

16-ene: 25 ej. (JBC)

18-mar: 30 ej. (DOC)

*Hippolais icterina***Zarcero icterino** - Bosqueta icterina - Icterine Warbler

ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 23/36 (May,Sep,Oct) .

Islas Columbretes:

19-may: 2 ej. capturados para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

El zarcero icterino es un migrante muy escaso en la provincia, se reproduce en la mitad oriental de Europa donde sustituye a nuestro zarcero común. Predominan los registros primaverales, sobre todo en mayo ya que esta especie es bastante tardía en volver de sus cuarteles de invierno en África. En Columbretes podría ser anual, es el lugar que más registros acumula en la provincia. En la costa es mucho más irregular, dependiendo de los temporales de levante que los empujen y acerquen al litoral.

*Hippolais polyglotta***Zarcero poliglota** - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler

ESTATUS: Nidificante y migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

18-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

02-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Alcudia de Veo:

08-sep: 8 ej. capturados para anillamiento. 7 juv. máximo anual (GAU)

Benicasim/Benicàssim:

04-may: 2 ej. primera cita primaveral (MTB)

09-sep: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Borriol:

14-sep: 1 ej. alimentándose en zona de garriga y olivares incultos, en Les Centineles. (LPC)

Castellón de la Plana:

17-abr: 1 ej. (XBC)

Desert de Les Palmes:

01-may: 1 ej. primera observación prenupcial. (VET)

Islas Columbretes:

02-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

2007: 15 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

La Salzadella:

15-abr: 2 ej. primera observación prenupcial. (VET)

Villamalur:

09-sep: 3 ej. alimentándose en el alcornocal. (LPC)

Primera llegada bastante temprana (2.IV Columbres) ya que suelen llegar de África a partir de mediados de abril. Última cita estival dentro del rango normal (14.IX Borriol).

Locustella luscinioides

Buscarla unicolor - Boscarler comú - Savi's Warbler

ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas de cría; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Desembocadura río Mijares:

10-sep: 1 ej. única captura anual (GAU)

Peñíscola:

07-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

27-may: 1 ej. primera captura prenupcial (GAU)

09-sep: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)

2007: 19 ej. total capturas anual (GAU)

Locustella naevia

Buscarla pintoja - Boscarler pintat - Western Grasshopper-warbler

ESTATUS: Migrante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 46/57 (Abr,May,Ago,Sep,Oct) .

Alcossebre:

01-abr: 1 ej. (DES)

29-abr: 2 ej. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

29-abr: 1 ej. canta desde la espesura en un campo de almendros abandonado (MTB)

Islas Columbretes:

28-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

10-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

25-sep: 1 ej. única captura anual (GAU)

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo - Mosquiter pàl·lid - Western Bonelli's Warbler

ESTATUS: Nidificante y migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

04-abr: 1 ej. en Capycorp. Primera cita para Alcossebre. (DES)

Ares del Maestre:

28-abr: 1 ej. primera cita (RPB)

Barracas:

25-abr: 2 ad. oigo los primeros cantos en un carrascal (ELL)

Benicasim/Benicàssim:

- 04-may: 1 ej. única cita prenupcial en un campo de almendros abandonados. (MTB)
- 19-jul: 3 ej. primera cita postnupcial. (MTB)

Chert/Xert:

- 09-jun: 16 ad. máximos en un trayecto en coche durante 8 km. Se oyen cantos en los encinares (ELL)

El Toro:

- 26-ago: 3 ej. en el Pico Salada (1.600m) (MGT)

Islas Columbretes:

- 19-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
- 2007: 29 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Especie estival, reproductor en un amplio espectro de masas forestales (pinos, encinares, quejigares, sabinas...). Primeras llegadas normalmente a finales de marzo (este año 19.III Columbretes) y sobre todo en abril. Ninguna cita postnupcial tardía ya que suele permanecer en nuestras tierras hasta septiembre o incluso octubre.

Phylloscopus collybita

Mosquitero común - Mosquitero común - Common Chiffchaff

ESTATUS: Nidificante raro localizado. Migrante abundante, invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 04-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
- 16-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

- 02-abr: 2 ej. última cita primaveral (MTB)
- 07-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
- 12-nov: 13 ej. máxima concentración en 1 Km. en campos de almendros abandonados. (MTB)

Chert/Xert:

- 07-may: 1 ej. última cita invernada (ALR,RPB)
- 30-ago: 1 ej. primera cita invernal (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

- 2007: 121 ej. total capturas anual (GAU)

El Toro:

- 26-ago: 2 ej. reclamo de collybita (no ibericus) (MGT)

Islas Columbretes:

- 22-may: 1 ej. última captura prenupcial (la campaña finaliza ese día). (GAU)
- 06-oct: 2 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
- 2007: 574 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
- 2007: 212 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Subespecie: TRISTIS

- 25-abr: 1 ej. subespecie tristis. Capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Marjal de Almenara:

27-sep: 5 ej. (JBC)

05-dic: 50 ej. muchos dispersos por las acequias de barro. (JBC,JLB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2007: 284 ej. total capturas anual (GAU)

Invernante en la provincia, con muy pocos casos donde se haya constatado la reproducción. Las últimas citas se dan en abril-mayo (una muy tardía el 22.V en Columbretes cuando acaba la campaña de anillamiento, por lo que el paso prenupcial se pudo prolongar todavía más) y los primeros individuos vuelven en septiembre-octubre. A veces se adelantan a este patrón y las primeras llegadas se pueden dar en agosto como es el caso de la cita de Xert. La cita de El Toro de finales de agosto también podría implicar primeros migrantes, pero dado el hábitat (Sierra del Toro, a bastante altitud) y que se refiere a más de un ejemplar no se puede descartar que puedan ser posibles reproductores. Destacar también el anillamiento de un ejemplar de la subespecie siberiana "tristis" en Columbretes el 25-IV (rareza nacional).

*Phylloscopus ibericus***Mosquitero ibérico** - Mosquiter ibèric - Iberian ChiffchaffESTATUS: Rareza local. Migrante raro. **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 3/3 (Abr,Jun) .**Gaibiel:**

15-jun: 1 m. individuo capturado para su anillamiento. Más grande que un mosquitero común. Macho reproductor con protuberancia cloacal. (RPM)

VER INFORME DE RAREZAS.

*Phylloscopus proregulus***Mosquitero de Pallas** - Mosquiter reiet - Pallas's Leaf WarblerESTATUS: Rareza nacional. **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.**Islas Columbretes:**

29-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

13-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

VER INFORME DE RAREZAS.

*Phylloscopus sibilatrix***Mosquitero silbador** - Mosquiter xiulaire - Wood WarblerESTATUS: Migrante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 34/157 (Abr,May,Ago,Sep,Nov) .**Alcossebre:**

30-abr: 1 ej. única cita 2007. (DES)

Islas Columbretes:

14-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

2007: 13 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Migrante escaso en la provincia, casi exclusivamente en el paso prenupcial (los registros otoñales son muy raros). Es más probable encontrarlo en las zonas más orientales, especialmente las Islas Columbretes donde es anual. En la costa es más irregular y depende mucho de los vientos de levante que acerquen a la costa los migrantes, los cuales muchas veces llegan exhaustos casi sin grasa ni músculo (según las observaciones de anillamiento). Como es habitual, las citas se suceden a partir de mediados de abril y durante mayo.

Phylloscopus trochilus

Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler

ESTATUS: Migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.

Categoría: A.

Alcossebre:

- 13-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
- 13-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
- 27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
- 25-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

- 24-feb: 1 ej. buscando insectos en un almendro (MTB)
- 17-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
- 14-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
- 08-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Chilches:

- 09-nov: 2 ej. (JBC)

El Toro:

- 26-ago: 2 ej. migrantes (MGT)

Grau de Castelló:

- 02-mar: 2 ej. (XBC)

Islas Columbretes:

- 24-mar: 10 ej. primeras capturas prenupciales. (GAU)
- 22-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)
- 2007: 905 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
- 2007: 385 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial (GAU)
- 07-oct: 1 ej. última captura postnupcial (GAU)

Migrante transahariano muy abundante en los pasos. Suele realizar las primeras llegadas a nuestro territorio a mediados-finales de marzo, por lo que la cita de un ejemplar el 24.II es muy temprana y uno de los pocos registros conocidos en febrero (corroborado por el autor). También merece mención la tempranera cita el 2.III en el Grao de Castelló. El paso prenupcial se prolonga hasta el mes de mayo (17.V) y el postnupcial se reanuda en agosto (14.VIII) hasta bien entrado octubre (25.X).

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest

ESTATUS: Residente e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

29-oct: 1 ej. única cita de 2007. (DES)

Chert/Xert:

09-jun: 6 juv.+ ad. pareja alimentando a cuatro pollos volanderos en una zona de encinar-pinar (ELL)

El Toro:

26-ago: 7 ej. la especie más abundante del encinar pinar. (MGT)

06-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)

Fuentes de Ayódar:

04-mar: 15 ej. entre el pinar (JBC)

Islas Columbretes:

13-sep: 1 m. juv. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 5 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 8 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Reproductor en nuestra provincia pero con movimientos postnupciales y aporte de individuos de zonas más al norte, como pone de manifiesto el paso por Columbretes y Alcossebre.

Regulus regulus

Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest

ESTATUS: Inverante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:

05-nov: 1 ej. única cita de 2007. (DES)

Barracas:

29-dic: 2 ej. los reyezuelos sencillos suelen aparecer en pinares puros y con poco sotobosque, mientras que los listados en pinares mixtos con carrascales y más sotobosque. (MGT)

Desert de Les Palmes:

18-nov: 2 ej. uno oído y otro visto alimentándose en pinos en el Bco. de les Santes. (VET,MTB)

El Toro:

06-dic: 4 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)

28-dic: 1 ej. durante la excursión del Anuario. Reclamando en un pino a 1.500 metros. (AOC)

Islas Columbretes:

16-mar: 1 m. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

14-oct: 1 m. ad. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 12 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

01-nov: 2 ej. pareja (DOC)

Migrante e invernante en Castellón, los núcleos de cría más cercanos están en Sierra de Gúdar y Javalambre (Teruel). Hasta ahora, el Anuario de Castellón solo había recibido una cita para el reyezuelo sencillo. Sin embargo, solo en el 2007 hemos recibido citas para nada menos que 25 ejemplares. De ellas, 24 se refieren al período postnupcial/invierno 2007-2008 lo que nos indica la irrupción que ha habido, sin precedentes con otros años (además de un mayor número de observadores). Durante octubre y noviembre se detectan migrantes en zonas costeras, mientras que las citas puramente invernales son en zonas más elevadas y el interior. Muy interesante el apunte de Barracas-El Toro sobre utilización del hábitat del reyezuelo sencillo en invernada, ocupando más los pinares puros y con poco sotobosque que el reyezuelo listado (que prefiere pinares-encinares con sotobosque).

Sylvia atricapilla**Curruca capirotada** - Busquereta de casquet - Blackcap

ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

10-may: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

30-sep: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Alcudia de Veo:

14-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Benicasim/Benicàssim:

19-feb: 26 ej. máximo prenupcial en 1 Km. de censo en campos de almendro abandonados. (MTB)

28-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)

17-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Cabanes:

23-jun: 1 ej. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Castellón de la Plana:

25-sep: 1 m. (XBC)

Islas Columbretes:

03-may: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

21-sep: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 123 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 165 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

La Pobla Tornesa:

02-jul: 1 ej. cantando en cultivos de secano cerca del pinar en la pista de la ermita de les Santes a la Pobla Tornesa. (VET)

Onda:

2007: 177 ej. total anual de capturas (GAU)

En los lugares costeros donde no cría desaparece en el mes de mayo y vuelve a aparecer en septiembre.

Sylvia borin

Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler

ESTATUS: Migrante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

- 20-feb: 1 ej. posada en un árbol (MTB)
- 29-may: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
- 03-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
- 03-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Castellón de la Plana:

- 05-sep: 2 ej. (XBC)
- 09-oct: 1 ej. (XBC)

El Toro:

- 27-ago: 1 ej. migrante (MGT)

Gaibiel:

- 16-ago: 1 ej. individuo capturado para su anillamiento. (RPM)

Islas Columbretes:

- 03-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
- 09-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
- 2007: 50 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
- 2007: 25 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 13-oct: 1 ej. última captura anual (GAU)

Principalmente migrante en la provincia. Es realmente excepcional esta primera cita de Benicàssim el 20.II, corroborada por el autor. Supone la cita prenupcial más temprana que tenemos constancia para Castellón y probablemente la Comunidad Valenciana ya que las primeras llegadas se suelen producir en abril. Quitando esta cita extrema el paso prenupcial nos queda dibujado del 4.IV (Columbretes) al 29.V (Benicàssim), y el postnupcial del 19.VIII (Gaibiel) al 13.X (Prat de Cabanes-Torreblanca), dentro del rango normal para la especie.

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler

ESTATUS: Nidificante común, migrante abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

- 03-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
- 04-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
- 28-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
- 01-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

- 19-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
- 17-abr: 1 m. con caracteres de la ssp. moltonii (MTB)

- 11-may: 1 m. última cita prenupcial (MTB)
- 05-ago: 1 m. primer adulto postnupcial (MTB)
- 14-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

El Toro:

- 25-abr: 3 par. ad. criando en el coscojar (ELL)

Gaibiel:

- 29-ago: 1 m. juv. individuo capturado para su anillamiento. (RPM)

Islas Columbretes:

- 05-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
- 07-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
- 2007: 160 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
- 2007: 30 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 29-mar: 1 ej. (FGB)
- 13-oct: 1 ej. última captura anual (GAU)

Tales:

- 08-abr: 1 m. ad. (JBC)

Migrante transahariano, bien distribuido como reproductor en la provincia. Primera cita bastante temprana (5.III Columbretes) ya que suelen llegar a finales de marzo, sin embargo existe otra de Columbretes todavía más temprana el 28.II.2002. Última cita postnupcial el 14.X (Benicàssim).

Sylvia communis

Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat

ESTATUS: Nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:

- 03-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
- 29-abr: 14 ej. máxima concentración en 1 Km. de censo en campos abandonados (MTB)
- 11-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
- 21-ago: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
- 06-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)

Borriol:

- 24-nov: 2 ej. uno en garriga espesa en la divisoria con el barranco de Las Ermitas y el otro en regenerado de pino carrasco y espesar de garriga cerca de la fuente. (LPC)

Islas Columbretes:

- 02-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
- 25-sep: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
- 2007: 95 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
- 2007: 27 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Laguna de Sant Mateu:

- 15-abr: 1 ej. (VET)

Torralba del Pinar:

15-mar: 2 ej. (JBC)

Vinaròs:

18-abr: 1 h. ad. encontrada exhausta en una acera del polígono Capsaes. Se revisa su estado (no se encuentra nada anormal) y se deja en unos matorrales cercanos (AGC)

Reproductor solamente en el interior, principalmente en las zonas más húmedas y con abundante estrato arbustivo. Con las citas de este año, el paso prenupcial queda dibujado desde el 2.IV al 29.IV, y el postnupcial del 21.VIII al 6.X. La cita invernal de Borriol de 2 ex el 24.XI es excepcional y se aleja totalmente del patrón general, implicando además a más de un ejemplar. Se disponen de muy pocos registros invernales para esta especie, pero sin embargo curiosamente existe un registro en Valencia de 1 ex el 24.XI.2002.

*Sylvia conspicillata***Curruca tomillera** - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler

ESTATUS: Nidificante moderado localizado, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Ares del Maestre:

25-jul: 1 m. ad. se observa un macho ad. en zona apropiada para la reproducción. (AAC, FRB)

Benicasim/Benicàssim:

26-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)

23-abr: 1 ej. última cita prenupcial. 5 citas a lo largo del mes en campos abandonados de almendros y naranjos. (MTB)

30-ago: 1 ej. primera y única cita postnupcial. (MTB)

Islas Columbretes:

28-abr: 1 h. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

02-may: 1 h. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Pocas citas recibidas de esta curruca distribuida de forma dispersa por la provincia, siempre que encuentre la cobertura vegetal idónea (prefiere zonas mucho más abiertas que el resto de curruca). Tan solo una de reproductores (Ares del Maestre), el resto corresponde a migrantes. Primera cita prenupcial el 26.III (Benicàssim), ninguna cita tardía.

*Sylvia hortensis***Curruca mirlona** - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler

ESTATUS: Nidificante algo localizado, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Desert de Les Palmes:

02-jul: 1 ej. macho cantando en el Bco. de les Santes, no ha estado presente en la zona en toda la primavera por lo que seguramente se habrá desplazado desde algún territorio cercano. (VET)

Islas Columbretes:

19-abr: 1 m. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Les Coves de Vinromà:

27-may: 3 ej. en 3 estaciones del programa SACRE. (VET)

Morella:

08-ago: 1 h. ad. se observa un ejemplar hembra ad. en una zona apropiada para la reproducción, zonas de mosaico con abundantes setos de rosáceas, Crataebus, etc..
(AAC)

Curruca de hábitos retraídos y que tradicionalmente ha sido poco conocido su estatus en la provincia. Únicamente su característico canto la suele delatar. Con toda seguridad su distribución en la provincia es mayor que lo que refleja el último Atlas de las Aves Reproductoras de España. Aquí se aportan algunos datos de posibles reproductores en zonas ya citadas (Morella, Desert de les Palmes) y una localidad nueva (Les Coves de Vinromà BE57).

Sylvia melanocephala**Curruca cabecinegra** - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler

ESTATUS: Residente abundante, migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

30-may: 1 juv. primero del año (MTB)

26-oct: 17 ej. máximo postnupcial en 1 Km. en campos abandonados (MTB)

Borriol:

29-abr: 13 ej. en transecto de 1300 m. anotando indiv. situados hasta 30m. del observador. (LPC)

Cabanes:

09-jun: 1 ej. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Islas Columbretes:

19-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

25-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 36 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 7 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Les Coves de Vinromà:

15-abr: 102 ej. en 19 estaciones del programa SACRE. (VET)

Onda:

17-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer ej. juv. (GAU)

Interesantes los datos de Columbretes para discernir los migrantes puros, ya que esta especie está presente todo el año en la provincia. Últimos migrantes prenupciales a mediados de abril y primeros postnupciales a finales de octubre.

Sylvia undata**Curruca rabilarga** - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler

ESTATUS: Residente abundante, migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

12-feb: 1 ej. última cita de invernada. (DES)

06-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)

Barracas:

29-dic: 7 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

03-feb: 1 ej. única cita invernal (MTB)

24-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Borriol:

24-abr: 5 juv.+ ad. grupo familiar que explota territorio a 300 m. de cita en mismo barranco de días pasados. (LPC)

08-jun: 5 inm.+ ad. grupo familiar, dos jóvenes y pareja. Se mueven en espesar de lentisco y aladierno en el paraje de Les Centineles. (LPC)

Buen seguimiento en Alcossebre y Benicàssim donde la especie es invernante. Podemos apreciar como desaparecen de estas zonas en el mes de febrero, para volver a invernar en ellas a partir de finales de septiembre-principios de octubre. En las zonas interiores donde cría (como Barracas) en invierno tiende a ocupar en mayor medida las zonas más bajas de cultivos.

Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher

ESTATUS: Migrante común. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

16-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

11-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)

31-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)

09-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

18-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)

11-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)

30-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

07-sep: 14 ej. máxima concentración en 1 Km. de censo en campos abandonados de almendros (MTB)

08-oct: 2 ej. última cita postnupcial (MTB)

Castellón de la Plana:

17-sep: 1 m. (XBC)

Catí:

05-abr: 1 ej. primera cita (RPB)

Cervera del Maestre:

22-abr: 2 h. ad. (ELL)

Desert de Les Palmes:

27-ago: 1 ej. primera observación postnupcial. (VET)

El Toro:

26-ago: 2 ej. paso postnupcial (MGT)

Islas Columbretes:

11-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

08-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (GAU)

2007: 54 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)

2007: 121 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Especie principalmente migrante en la provincia. Fue detectada como reproductor en algunas zonas del interior pero todas las citas recibidas este año (como viene siendo habitual) hacen referencia a individuos migradores. Sería interesante volver a evaluar su estatus reproductor en la provincia. Primeros ejemplares normalmente a partir de mediados de abril, pero este año el paso prenupcial se extiende desde una temprana cita el 5.IV (Catí) al 11.V (Alcossebre y Benicàssim). El paso postnupcial se ha detectado desde el 26.VIII (El Toro) al 9.X (Alcossebre).

Ficedula parva

Papamoscas papirrojo - Papamosques menut - Red-breasted Flycatcher

ESTATUS: Rareza nacional. Divagante del E de Europa **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 14/19 (Oct,Nov) .

Islas Columbretes:

11-oct: 1 h. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

VER INFORME DE RAREZAS.

Muscicapa striata

Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher

ESTATUS: Nidificante y migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

18-abr: 1 ej. primera cita estival. (DES)

19-sep: 1 ej. última cita estival. (DES)

Barracas:

15-mar: 1 ad. cazando insectos en una zona de maquia mediterránea (ELL)

Benicasim/Benicàssim:

21-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)

07-jul: 1 ej. 1er pollo del año, un ejemplar que apenas se mantiene estable en las ramas, curiosamente es hostigado por un zarcero que le hace varias pasadas intentando expulsarlo, también una hembra de curruca cabecinegra se mantiene cerca saltando de rama en rama. (MTB)

06-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)

Burriana:

08-oct: 10 ej. (JBC)

Chert/Xert:

05-may: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)

03-oct: 1 ej. última cita (ALR,RPB)

Islas Columbretes:

13-abr: 3 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

03-oct: 1 ej. última captura postnupcial (GAU)

2007: 55 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)

2007: 3 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Montán:

15-mar: 1 ej. (JBC)

Tales:

07-abr: 2 ej. (JBC)

Citas de primeras llegadas muy tempranas, el 15.III en Barracas y Montán. Lo normal es que las primeras llegadas se generalicen a partir de mediados-finales de abril. Última cita el 8.10 en Burriana.

Aegithalos caudatus

Mito común - Senyoreta - Northern Long-tailed Tit

ESTATUS: Residente e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:

29-dic: 19 ej. grupos de 11 y 8, en pinar-encinar. (MGT)

Desert de Les Palmes:

24-feb: 1 ej. transportando material para el nido. (VET)

19-may: 2 juv. primeros jóvenes observados. (VET)

24-jun: 20 ej. grupo numeroso desplazándose por pinar disperso en solana del Bco. de Miravet. (VET)

El Toro:

19-feb: 12 ej. (JBC)

Fuentes de Ayódar:

04-mar: 13 ej. (JBC)

Marjal de Almenara:

27-sep: 8 ej. (JBC)

La cita de fenología reproductora del Desert de les Palmes es muy interesante, ya que se produce en fechas muy tempranas (finales de febrero). Lo normal es que comiencen la construcción de sus particulares nidos un mes más tarde.

Parus ater

Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit

ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcudia de Veo:

14-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Barracas:

29-dic: 11 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar. (MGT)

Cabanes:

02-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)

El Toro:

06-dic: 19 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en pinares. (MGT)

Buenas cifras en los censos invernales de El Toro y Barracas.

Parus caeruleus

Herrerillo común - Ferrerolet - Common Blue Tit

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.

Categoría: A.

Alcudia de Veo:

17-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Barracas:

29-dic: 8 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar. (MGT)

Betxí:

11-sep: 1 ej. me llama la atención esta especie en esta zona. (JBC)

Desert de Les Palmes:

11-abr: 1 ej. cantando. (VET)

El Toro:

06-dic: 2 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. En encinas. (MGT)

Eslida:

30-jun: 1 ej., 1 par. es una pareja de herrerillos con un pollo volantón al que van alimentando en el mismo árbol. (LGB)

Parus cristatus

Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcudia de Veo:

14-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Cabanes:

02-jun: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)

El Toro:

06-dic: 5 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. En pinares. (MGT)

Parus major

Carbonero común - Totestiu - Great Tit

ESTATUS: Residente abundante. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Barracas:

29-dic: 3 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

30-may: 1 ej. primer joven del año (MTB)

22-nov: 1 ej. abriendo una almendra. (MTB)

Burriana:

08-oct: 15 ej. (JBC)

Cabanes:

02-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)

Marjal de Almenara:

27-may: 4 ej. 1 adult alimentant a 3 pollets amb trocets de nísper (DOC)

Sitta europaea

Trepador azul - Pica-soques blau - Eurasian Nuthatch

ESTATUS: Residente moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

El Toro:

07-dic: 2 ej. en un pinar de una umbría. Escaso en la zona. (MGT)

Villamalur:

18-mar: 1 ej. en bosque mixto de pino rodeno y alcornoque se alimenta selectivamente sobre los últimos. (LPC)

Certhia brachydactyla

Agateador europeo - Raspinell comú - Short-toed Treecreeper

ESTATUS: Residente abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:

29-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Cabanes:

17-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)

Remiz pendulinus

Pájaro moscón europeo - Teixidor - Eurasian Penduline-tit

ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: SAH Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

20-nov: 1 ej. en la laguna de Capycorp. Única cita 2007. (DES)

Desembocadura río Mijares:

03-mar: 2 ad. individuos comiendo en los "puros". (JLB)

05-nov: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)

2007: 18 ej. total capturas anual (GAU)

Peñíscola:

04-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita invernal (GAU)

01-dic: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita invernal (GAU)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 14-mar: 7 ej. (FGB)
- 25-mar: 3 ej. se escuchan los reclamos de un pequeño grupo en el carrizal. (MTB)
- 16-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (MTB)
- 2007: 38 ej. total capturas anual (GAU)

Siguiendo el patrón habitual para la especie, últimas citas prenupciales en marzo (25.III Prat de Cabanes-Torreblanca) y primeras postnupciales a finales de octubre (26.X Prat de Cabanes-Torreblanca).

Oriolus oriolus

Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole

ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:

- 25-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
- 19-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
- 13-jul: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
- 10-sep: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Cervera del Maestre:

- 15-abr: 1 m. ad. cruza la carretera a la altura del Molino restaurado (ELL)

Chert/Xert:

- 28-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

- 22-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (VET)

Islas Columbretes:

- 14-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
- 2007: 6 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Todas las citas dentro del patrón general para esta especie, con llegadas a partir de mediados de abril y últimas citas en septiembre (Rango: 14.IV Columbretes - 10.IX Benicàssim).

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo - Capsot d'esquena roja - Red-backed Shrike

ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 13/16 (May,Jun,Ago,Sep,Oct) .

Alcora/L'Alcora:

- 05-jun: 1 m. ad. sale volando de detrás de unos arbustos y se posa en unas cañas cercanas. Muy inquieto. (MTB)

VER INFORME DE RAREZAS.

Lanius collurio x senator

Alcaudón dorsirrojo x común

Categoría: A.

Alcossebre:

29-abr: 1 ej. (DES)

VER INFORME DE RAREZAS.

Lanius meridionalis

Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike

ESTATUS: Residente e invernante común. **Criterio:** Censos destacados y de invernada; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

16-abr: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)

29-jul: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)

Almazora/Almassora:

06-ago: 1 ej. adulto en un campo de naranjos (MTB)

Catí:

15-jul: 1 juv. un joven del año en cuadrícula no citada en el Atlas de las Aves

Reproductoras de España. (ALR,RPB)

Desembocadura río Mijares:

31-dic: 2 ej. (JBC,JLB)

El Toro:

09-abr: 3 ad. posados en el alto de encinas realizando cantos (ELL)

Marjal de Almenara:

11-dic: 5 ej. (JBC)

Morella:

12-ago: 1 ej. presencia estival en cuadrícula no citada en AARE (ALR)

Nuevas localidades de cría no citada en el último Atlas de las Aves Reproductoras de España (Morella BE59, Catí BE58).

Lanius senator

Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike

ESTATUS: Nidificante y migrante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

01-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)

22-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

06-may: 5 ej. máximo prenupcial en 1 Km. de campos de cultivo abandonados (MTB)

03-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)

Subespecie: **SENATOR**

27-mar: 1 m. ad. cazando insectos en vuelo. (MTB)

Cabanes:

05-jul: 1 ej. primer joven del año observado. (VET)

Castellón de la Plana:

05-abr: 1 ej. alimentándose en herbazal de solar en la Ciudad del Transporte. (LPC)

Desert de Les Palmes:

17-jun: 1 par. nido con 5 huevos en la horquilla central de un almendro pequeño a 1,8 metros de altura. (VET)

Islas Columbretes:

01-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)

2007: 94 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Marjal de Almenara:

06-abr: 1 ej. posat en cable de telèfon (DOC)

15-nov: 1 ej. (JBC,JLB)

20-nov: 1 ej. (JBC,JLB)

Moncofa:

02-abr: 2 ej. (JBC)

Olocau del Rey:

25-jun: 1 par. nueva localidad de cría no citada en AUNE (ALR,RPB)

Peñíscola:

06-abr: 1 ad. cazando en un campo de cultivo (ELL)

La cita de un ejemplar sedimentado en la Marjal de Almenara el 15 y 20.XI es muy tardía, en período invernal. Sería pues la 3ª cita en período invernal que tenemos constancia en la Comunidad Valenciana, aunque quizás hace referencia a un ejemplar en paso muy tardío más que a un ejemplar invernante (muy raros en la Península). Por lo demás, primeras llegadas a finales de marzo y principios de abril y últimos registros a finales de septiembre o principios de octubre (Rango: 27.III al 3.X en Benicàssim).

Corvus corax

Cuervo - Corb - Common Raven

ESTATUS: Residente y migrante común, invernante moderado. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Barracas:

29-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Marjal de Almenara:

04-abr: 2 ej. en zona de cria (DOC)

Pina de Montalgrao:

03-ene: 55 ej. (JBC)

Tirig:

26-ene: 120 ej. (MAM)

Viver:

17-abr: 11 ej. en grupo (JBC)

Excepcional la agrupación de 120 ejemplares en Tirig.

Corvus corone

Corneja común - Cornella negra - Carrion Crow

ESTATUS: Residente común, migrante e invernante moderado Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:

26-ago: 47 ej. juntas en un solo campo. Gran concentración. (MGT)

29-dic: 30 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Pina de Montalgrao:

03-ene: 15 ej. (JBC)

Viver:

21-mar: 43 ej. (JBC)

El Alto Palancia recoge este año las mayores agrupaciones para la provincia, aunque se distribuye por toda la zona interior. En invierno pueden aparecer ejemplares en zonas costeras, pero son escasas estas observaciones.

Corvus monedula

Grajilla - Gralla - Eurasian Jackdaw

ESTATUS: Residente moderado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Portell de Morella:

15-mar: 11 ej. (MAM)

Todolella:

19-jul: 5 ej. (MAM)

Villafranca del Cid:

19-may: 15 ej. (MAM)

Garrulus glandarius

Arrendajo - Gaig - Eurasian Jay

ESTATUS: Residente común. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:

29-dic: 5 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

El Toro:

06-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar. (MGT)

Sueras/Suera:

17-jun: 3 juv.+ ad. pareja con pollo volandero en pinar. (LPC)

Pica pica

Urraca - Garsa - Magpie

ESTATUS: Residente abundante. **Conservación:** EC **Criterio:** Censos destacados; dormideros; citas de interés.

Categoría: A,E3.

Castellón de la Plana:

- 16-feb: 62 ej. grupo disperso que se desplaza desde los dormideros en el NO de la localidad a sus zonas de campeo en el O y el S de Castellón sobre las 7.40 horas. (LPC)
- 19-feb: 1 ej. acarreado material para el nido situado en lo alto de un nogal americano (MTB)

Desembocadura río Mijares:

- 15-ene: 85 ej. gran cantidad de aves entrando en el dormidero (JBC)
- 24-dic: 67 ej. gran concentración. (JBC,JLB)

Marjal de Almenara:

- 08-dic: 27 ej. en dormidero a las 18 h. (JBC)

Pyrrhonorax pyrrhonorax

Chova piquirroja - Gralla de bec roig - Red-billed Cough

ESTATUS: Residente común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A.

Barracas:

- 14-ago: 62 ej. alimentándose sobre los campos y los yermos en el llano de Barracas. (MGT)

Islas Columbretes:

- 29-oct: 1 ej. sedimentado hasta el día 31 (GRN)
- 04-nov: 1 ej. sedimentado hasta el día 6 (GRN)

Lucena del Cid:

- 11-nov: 65 ej. (AFP)

Morella:

- 10-jul: 140 ej. (RPB)

Portell de Morella:

- 19-may: 34 ej. (MAM)

Villafranca del Cid:

- 07-jul: 60 ej. junto al vertedero. (VET)

Interesantísimas citas de Columbretes, indicando individuos que se dispersan en otoño incluso cruzando el mar. Son muy escasos este tipo de registros para una especie principalmente sedentaria y que sólo suele realizar desplazamientos de pocos Km para buscar alimento (BWPi 2004). Por otro lado, buenas agrupaciones en zonas del interior, destacando la de 140 ejemplares en Morella.

Sturnus unicolor

Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling

ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; citas de interés. **Categoría:** A,E3.

Benicasim/Benicàssim:

- 07-jul: 0 ej. la colonia de cría situada en las afueras del pueblo, donde habrá unas 30 o 40 parejas ha quedado casi desierta. (MTB)

Castellón de la Plana:

29-jul: 800 ej. concentración postnupcial en el prado junto a una granja (MTB)

Desert de Les Palmes:

03-jun: 1 ej. volando barranco arriba, escasas observaciones anuales. (VET)

Forcall:

10-ago: 300 ej. (MAM)

Marjal de Almenara:

02-nov: 3000 ej. gran concentración observando ejemplares de estornino pinto. (JBC)

03-nov: 5000 ej. junto a estorninos pintos. (JBC)

Sturnus vulgaris

Estornino pinto - Estornell - Common Starling

ESTATUS: Migrante e invernante abundante. **Conservación:** EC **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; dormideros; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

05-ago: 26 ej. primera cita postnupcial. (DES)

Barracas:

26-may: 20 juv.+ ad. nidificación en un encinar del zona del llano Barracas-El Toro. Se ven ejemplares jóvenes volanderos (ELL, JAR)

27-ago: 3 juv. encima de un tejado. Mudando a plumaje adulto entre estorninos negros. Son de una complexión un poco más fina que éstos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

21-jul: 3 ej. primera cita postnupcial (MTB)

23-oct: 3500 ej. máximo otoñal de 1 bando en paso. (MTB)

Desembocadura río Mijares:

12-nov: 3500 ej. gran concentración junto a estornino negro (JBC)

Desert de Les Palmes:

30-dic: 15000 ej. volando poco después del amanecer a cierta altura hacia el N, seguramente provienen de un dormidero situado en alguna localidad costera y se dirigen a alimentarse a los llanos prelitorales. (VET)

Islas Columbretes:

17-sep: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 3 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 57 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

La Vall d'Uixó:

15-dic: 3000 ej. volando a las 8 h. hacia el NE. (JBC)

Sant Mateu:

26-dic: 1000 ej. (MAM)

Para esta especie lo más destacado de este año 2007 es el núcleo reproductor descubierto en Barracas (XK92, XK93), convirtiendo al Estornino pinto en nueva especie nidificante en la provincia.

Passer domesticus

Gorrión común - Teuladí - House Sparrow

ESTATUS: Residente abundante. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; dormideros; citas de interés.

Categoría: A.

Islas Columbretes:

18-mar: 1 h. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Marjal de Almenara:

15-sep: 5000 ej. gran concentración comiendo arroz en cultivos de la Llosa. (JBC)

Digna de mención es la captura de un ejemplar de Gorrión común en Columbretes, en este caso una hembra el 18.III. Esta especie es altamente residente, por lo que registros de ejemplares migrantes/dispersivos en un lugar tan remoto y donde no cría como Columbretes son de gran interés.

Passer montanus

Gorrión molinero - Teuladí torredà - Tree Sparrow

ESTATUS: Residente e invernante común. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Cabanes:

01-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Única cita anual (GAU)

Marjal de Almenara:

13-feb: 90 ej. (JBC)

09-nov: 80 ej. (JBC)

Petronia petronia

Gorrión chillón - Pardal roquer - Rock Sparrow

ESTATUS: Residente e invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Barracas:

27-jun: 35 ad. (JBC)

Chert/Xert:

09-jun: 6 par. ad. en zonas con roquedos cerca de Fte. Albi y Ermita de Sto. Domingo (ELL)

El Toro:

25-abr: 5 par. ad. criando entre montículos de piedras en el llano cerealista (ELL)

Pina de Montalgrao:

03-ene: 75 ej. (JBC)

16-jul: 40 ej. (JBC)

Estrilda astrild

Pico de coral común - Bec de corall senegalès - Common Waxbill

ESTATUS: Escapado origen del S del Sahara y Madagascar **Criterio:** Todas las citas de cría; censos destacados; citas de interés.. **Categoría:** C1.

Desembocadura río Mijares:

24-feb: 1 ej. única captura anual (GAU)

06-dic: 15 ej. (ALR,RPB,VOO)

Grau de Castelló:

29-ene: 7 ej. (XBC)

Marjal de Almenara:

01-ago: 1 ej. a Casablanca (DOC)

Carduelis cannabina

Pardillo común - Passerell - Linnet

ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

03-abr: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)

28-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)

2007: 60 ej. febrero. Censo máximo anual. (DES)

Barracas:

29-dic: 21 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

15-abr: 3 ej. última cita prenupcial (MTB)

09-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Cabanes:

06-jul: 3 ej. presencia estival en la cuadrícula UTM BE54, no citada en el Atlas de las Aves Reproductoras de España. (VET)

Islas Columbretes:

22-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

29-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. (GAU)

2007: 22 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 17 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

26-feb: 83 ej. suma total de 8 grupos (JBC)

Morella:

02-ago: 500 ej. bando hacia el N (MAM)

En las zonas donde no cría la especie se registran migrantes postnupciales a partir de finales de septiembre y principios de octubre (29.IX Columbretes, 9.X Benicàssim). La primera cita postnupcial de Alcossebre del 28 de agosto se adelanta un mes al patrón normal de la especie, por lo que podría hacer referencia a individuos dispersivos de las zonas reproductoras más cercanas. Los últimos migrantes vuelven a sus lugares de cría durante el mes de abril (22.IV Columbretes).

Carduelis carduelis

Jilguero - Cadenera - Goldfinch

ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

2007: 120 ej. diciembre. Censo máximo anual. (DES)

Barracas:

29-dic: 22 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

02-nov: 251 ej. bando destacado en área de censo en campo de naranjos abandonado. (MTB)

Chilches:

21-nov: 150 ej. (JBC)

El Toro:

06-dic: 30 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. Todos juntos en un chopo cerca de un bebedero. (MGT)

Islas Columbretes:

2007: 2 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

Marjal de Almenara:

09-feb: 100 ej. grandes grupos de aves (JBC)

Moncofa:

07-nov: 250 ej. (JBC)



Jilguero leucístico, partida Patos, Grau de Castelló). Autor: Javier Barreda Carbó

Carduelis chloris

Verderón común - Verderol - Greenfinch

ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

15-mar: 35 ej. bando migrante destacado (MTB)

Burriana:

28-oct: 43 ej. gran grupo comiendo en la arena. (JBC)

El Toro:

06-dic: 3 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar-sabinar. (MGT)

Islas Columbretes:

18-may: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)

05-oct: 1 ej. primera cita postnupcial. (GAU)

2007: 42 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 3 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

23-ene: 28 ej. (JBC)

Onda:

06-may: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)

Los datos de Columbretes permiten ver los movimientos que se dan en el Verderón común, una especie presente durante todo el año en la provincia. Últimos migrantes prenupciales a mediados de mayo y primeros postnupciales a principios de octubre.

Carduelis spinus

Lúgano - Lluer - Siskin

ESTATUS: Nidificante raro, Invernante moderado **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

30-nov: 4 ej. primera cita invernal. (DES)

2007: 58 ej. diciembre. Máximo anual. (DES)

Benicasim/Benicàssim:

20-mar: 0 ej. sin citas invernales (MTB)

26-oct: 5 ej. primera cita postnupcial (MTB)

23-dic: 30 ej. bando destacado. Presencia ininterrumpida durante todo el mes. (MTB)

Borriol:

30-nov: 30 indet.+ m. inm.+ ad. bando mixto de lúganos, verdecillos y algún jilguero estimado en un total de 50 individuos (LPC)

Desert de Les Palmes:

08-oct: 2 ej. migrando hacia el S en 3 horas. (VET)

15-oct: 60 ej. paso destacado en 3 horas de censo (MTB, VET)

El Toro:

06-dic: 11 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en pinares. (MGT)

Islas Columbretes:

10-oct: 1 ej. primera cita postnupcial. (GAU)

2007: 0 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)

2007: 92 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Onda:

25-feb: 1 ej. última captura invernal (GAU)

13-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)

2007: 177 ej. capturados en invierno. (GAU)

Durante el 2007 se han producido dos situaciones bien distintas para este invernante. Por un lado durante el invierno 2006-2007 la especie ha resultado extremadamente escasa en la provincia (y por lo que tenemos constancia también en otros lugares), recibiendo tan solo una sola cita (25.II Onda). En cambio, durante el invierno 2007-2008 la especie ha resultado muchísimo más abundante, ampliamente distribuida por la provincia y denotando su carácter irruptor. Las primeras llegadas se han producido, como es habitual, en la primera quincena de octubre (primera cita 8.X Desert de les Palmes).

Coccothraustes coccothraustes

Picogordo - Trencapinyols - Hawfinch

ESTATUS: Invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A.

Ares del Maestre:

25-jul: 1 juv. se encuentra un ejemplar joven recién muerto al impactar contra un vallado metálico. Por la edad del ave, el hábitat de la zona y la época en que se encontró, podría tratarse de una cita de cría de la especie. (AAC, FRB)

Aín:

30-jun: 1 par. (JCS)

Dos nuevos interesantes apuntes sobre la distribución del Picogordo como reproductor en nuestra provincia. Una de Ares del Maestre (YK48) donde se halla un juvenil y por tanto se puede considerar nidificante seguro, y otra en Aín (YK22) donde por la época se puede considerar nidificante probable. Ambos no estaban citados en el anterior Atlas de Aves Reproductoras de España 1998-2002 (Martí y del Moral 2003). Además, cualquier cita de este fringilido en la provincia es de mucho interés debido a que pasa muy desapercibido y a su habitual escasez (excepto en años de irrupción).

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch

ESTATUS: Nidificante, migrante e invernante abundante. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

25-abr: 1 ej. última cita invernada. (DES)

08-oct: 1 ej. primera cita invernada. (DES)
 2007: 225 ej. noviembre. Máximo anual. (DES)

Barracas:

10-nov: 75 ej. alimentándose en el suelo. (MGT)

Bejís:

03-mar: 200 ad. paso de numerosos bandos por los pinares de la zona Cloticos (ELL, RAF)

Benicasim/Benicàssim:

07-mar: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
 09-oct: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)

Chilches:

09-feb: 200 ej. grandes grupos (JBC)

El Toro:

06-dic: 103 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar. (MGT)

Islas Columbretes:

10-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
 2007: 2 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5 (GAU)
 2007: 68 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Reproductor abundante por el interior de la provincia. En las zonas costeras donde se comporta como invernante se ha dado una sincronía espectacular de primeras llegadas (8.X Alcossebre, 9.X Benicàssim, 10.X Columbretes).

Fringilla montifringilla

Pinzón real - Pinsà mec - Brambling

ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Barracas:

06-feb: 5 ej. (JBC)

Caudiel:

03-mar: 7 ej. posiblemente más, junto a pinzones vulgares en cultivo olivos. (JBC)

Chert/Xert:

28-ene: 35 ad. (AGC)

El Toro:

10-nov: 1 h. alimentándose en el suelo. Entre un bando de unos 40 Pinzones vulgares en el llano Barracas-El Toro. (MGT)

Islas Columbretes:

19-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
 28-oct: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
 08-nov: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
 11-nov: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

Invernante escaso en la provincia y con fluctuaciones entre años. Los últimos ejemplares invernantes se detectan por el mes de marzo, y las primeras llegadas a finales de octubre. Destaca la agrupación invernal detectada en Xert.

Loxia curvirostra

Piquituerto común - Bec-tort - Common Crossbill

ESTATUS: Nidificante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcudia de Veo:

11-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Única captura anual (GAU)

Barracas:

29-dic: 14 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar. (MGT)

Desert de Les Palmes:

14-oct: 1 ej. migrando hacia el S en 2 horas. (VET)

El Toro:

10-nov: 25 ej. grupos de 2-15 (MGT)

06-dic: 11 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en pinares. (MGT)

Morella:

02-oct: 10 ej. machos y hembras (MAM)

Serinus citrinella

Verderón serrano - Verderolet - Citril Finch

ESTATUS: Nidificante localizado en el NO, invernante escaso. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A. **Rango:** 11/57 (Abr,Jun,Jul,Nov,Dic) .

Barracas:

29-dic: 2 ej. invernando en zonas bajas de cultivos con encinas. (MGT)

El Toro:

06-dic: 24 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en pinares y sabinars. (MGT)

28-dic: 16 ej. durante la excursión del Anuario. Dos grupos alimentándose entre la nieve y un ejemplar solitario a unos 1.500 metros. (AOC)

Villafranca del Cid:

16-jul: 3 ej. cuadrícula no citada en Atlas (ALR,RPB)

Nueva localidad de posible cría, Villafranca del Cid (cuadrícula YK37). También muy destacable el uso por parte del Verderón serrano de las zonas más altas del Alto Palancia para la invernada. También ha sido detectado en otras zonas más bajas de cultivos, quizás relacionado con movimientos altitudinales debido a las inclemencias meteorológicas. Ninguna cita este año en localidades cercanas a la costa.

Serinus serinus

Verdecillo - Gafarró - European Serin

ESTATUS: Nidificante, migrante e invernante abundante. **Conservación:** ET **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

15-mar: 53 ej. máxima concentración prenupcial en 1 Km. en campos abandonados (MTB)

05-abr: 1 pollo joven volandero sale de un nido en un ciprés (MTB)

Chilches:

21-nov: 250 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

12-dic: 100 ej. (JBC)

El Toro:

06-dic: 1 ej. único contacto en los transectos del Atlas de Invernantes. En la cota más baja. (MGT)

Islas Columbretes:

11-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. Única captura prenupcial. (GAU)

24-oct: 2 ej. primera captura postnupcial. (GAU)

2007: 59 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-11 (GAU)

Marjal de Almenara:

03-oct: 300 ej. gran concentración. (JBC)

Onda:

11-mar: 1 juv. capturado para anillamiento. primer ej. juvenil (GAU)

Grandes agrupaciones postnupciales e invernales en zonas costeras gracias al aporte de individuos de zonas más frías. Los datos de Columbretes nos permiten ver que el paso postnupcial se da a partir de finales de octubre. En cambio, en las zonas altas del interior, la especie se rarifica mucho más en invierno como apunta la cita de la Sierra del Toro.

Emberiza calandra

Triguero - Cruixidell - Corn Bunting

ESTATUS: Nidificante común, migrante moderado. **Conservación:** EP **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Ares del Mestre:

15-feb: 1 ej. primera cita para la zona donde en invierno la especie està ausente (RPB)

Barracas:

10-nov: 75 ej. posados en chopos y cantando. Gran concentración. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

25-abr: 1 ej. única cita en migración prenupcial (MTB)

Morella:

21-feb: 1 ej. primera cita para la zona donde en invierno la especie està ausente (ALR)

Pina de Montalgrao:

02-feb: 34 ej. grupo numeroso posado en una almendro. Cantos característicos (ELL)

Recogemos citas de buenas agrupaciones fuera de la época de cría.

Emberiza cia

Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting

ESTATUS: Residente común, migrante e invernante moderado. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Alcossebre:

25-feb: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)

20-nov: 1 ej. primera observación postnupcial. (DES)

Alcudia de Veo:

17-jun: 1 juv. captura estival de 1 juv. (GAU)

Barracas:

10-nov: 3 ej. invernantes en el llano cerealista. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

28-feb: 1 ej. última cita invernal (MTB)

Borriol:

18-may: 2 par. ad. pareja con dos jóvenes volanderos. El macho lleva ceba en el pico.
Se mueven entre pinos carrascos y algarrobos. (LPC)

Chert/Xert:

09-jun: 1 m. ad. ejemplar cantando cerca de la pedrera (ELL)

Islas Columbretes:

03-may: 1 ej. (GRN)

Buen seguimiento fenológico en Alcossebre, localidad costera donde la especie se comporta como invernante. También la cita de Columbretes del 3.V (muy tardía) pone de manifiesto movimientos en la especie. En las zonas interiores donde cría, suele realizar movimientos altitudinales y agruparse en zonas más bajas y cultivos.

Emberiza cirlus

Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting

ESTATUS: Nidificante y residente común, migrante e invernante común. **Conservación:** IE **Criterio:** Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. **Categoría:** A.

Barracas:

29-dic: 2 ej. un macho cantando. En el encinar con cultivos. (MGT)

Benicasim/Benicàssim:

11-mar: 1 ej. asociado a un bando de 7 verderones y 8 gorriiones comunes. (MTB)

Cabanes:

28-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)

Chert/Xert:

30-jul: 1 ej. presencia durante todo el año exceptuando el mes de agosto en esta localidad. En 2006 la especie estuvo ausente desde el 20/02 al 10/10. (ALR,RPB)

Desert de Les Palmes:

17-dic: 1 m. cantando en el Bco. de les Santes. (VET)

Emberiza citrinella

Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer

ESTATUS: Invernante raro. **Conservación:** IE **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** A. **Rango:** 23/40 (Feb,Jul,Ago,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Islas Columbretes:

07-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

10-nov: 1 m. juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

13-nov: 1 ej. última cita otoñal (GRN)

Tres nuevas interesantes citas de individuos en paso para este emberícido escasamente citado en la provincia. Ninguna cita plenamente invernal para este año.

Emberiza hortulana

Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting

ESTATUS: Nidificante disperso poco abundante en el NO y SO de la provincia, migrante escaso. **Conservación:** IE

Criterio: Todas las citas estivales; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Benicasim/Benicàssim:

27-abr: 1 m. posado en un almendro (MTB)

Islas Columbretes:

25-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

30-abr: 2 m. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

02-sep: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

06-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

20-sep: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)

07-nov: 1 ej. última cita postnupcial (GRN)

Morella:

27-may: 1 ej. (MAM)

Especie estival más conspicua durante el paso primaveral, que suele darse de manera concentrada desde mediados de abril a mediados de mayo. El paso postnupcial es mucho menos detectable pero gracias a los datos de anillamiento de Columbretes podemos ver que se da principalmente desde principios de septiembre a principios de noviembre (este año del 2.IX al 7.XI). La cita de Morella del 27.V probablemente hace referencia a un individuo reproductor.

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting

ESTATUS: Posiblemente extinguido como nidificante, invernante común. **Conservación:** VUL **Criterio:** Todas las

citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. **Categoría:** A.

Alcossebre:

18-abr: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)

20-oct: 1 ej. primera observación postnupcial. (DES)

Chilches:

21-nov: 250 ej. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

03-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)

13-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)

2007: 12 ej. total capturas anual (GAU)

Islas Columbretes:

07-jul: 1 ej. sedimentado en la isla (GRN)

10-nov: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. Única captura anual. (GAU)

Marjal de Almenara:

08-mar: 5 ej. (JBC)

03-nov: 29 ej. (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 25-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)
- 27-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
- 2007: 148 ej. total capturas anual (GAU)

Vall d'Alba:

- 24-nov: 5 ej. en la vegetación palustre de una acequia. (VET,JPH)

Todas las citas recibidas se refieren a individuos de la subespecie nominal, invernantes en nuestras tierras. La única excepción es la cita de Columbretes del 7.VII, que se aleja totalmente del patrón típico de los individuos invernantes en la Península. Sin conocimiento de la edad ni subespecie de este individuo es difícil asegurar el por qué de su aparición, pero quizás se trate de un individuo dispersivo muy temprano de zonas cercanas después de la reproducción o que no se ha reproducido. Dejando a un lado esta cita, ninguna cita en período estival en nuestros humedales de la subespecie endémica whiterby, cuya población está muy amenazada en la Península y que ha dejado de reproducirse en la provincia. Las citas de invernantes están dentro del patrón habitual para la subespecie nominal, con últimos individuos en el mes de abril (18.IV en Alcossebre) y primeras llegadas en octubre (13.X en la Desembocadura del Mijares).

Anexo 0. Citas de especies exóticas (Categorías D y E)

Cygnus atratus

Cisne negro - Cigne negre - Black Swan

ESTATUS: Especie introducida. Originario de Australia y Tasmania **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** E2.

Castellón de la Plana:

- 18-jun: 1 ej. cerca de la desembocadura. Cita homologada por el Comité de Aves Exóticas de SEO-BirdLife (Noticiario de 2007). (GRM)

Primera cita publicada para la provincia aunque se sabe de observaciones fidedignas no publicadas de ejemplares observados en otros lugares de la provincia (Estany de Peñíscola en los años 80- Observador: ELL). En España ha sido introducida de forma esporádica en humedales y parques recreativos, llegando incluso a criar. Suele competir con otras especies acuáticas debido a su territorialidad. Más información: http://www.seo.org/media/docs/f_cygnus_atratus.html



Cisne negro. Desembocadura Riu Sec. Grau de Castelló. Autor: Juan Luis Bort

Parabuteo unicinctus

Gavilán mixto - Harris' Hawk

ESTATUS: Rareza nacional. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

Marjal de Almenara:

17-feb: 1 ej. escapat de falconeria (DOC)

18-mar: 1 ej. (DOC)

22-abr: 1 ej. (DOC)

13-may: 1 ej. durant la visita de AHSA, menjant ocell a l'arbre que dilluns 14 se cremà en l'incendi (EAB)

19-may: 1 ej. (AGR)

04-nov: 1 ej. escapat de falconeria (DOC)

Como se ha comentado en anuarios anteriores, este ejemplar proviene del escape de cetrería. Su observación es constante en la zona húmeda de Marjal d'Almenara - Quartells, lugar que utiliza como dormitorio y cazadero, llama la atención el poco espacio utilizado para su actividad diaria y la defensa del territorio sobretodo de los aguiluchos laguneros invernantes.

Nandayus nenday

Aratinga ñandai - Aratinga nandai - Nanday Parakeet

ESTATUS: Escapado. Origen: Brasil (zona SO), Bolivia (zona SE), Paraguay y Argentina (zona N) **Criterio:** Citas de interés.. **Categoría:** E2.

Castellón de la Plana:

06-oct: 1 ej. cita homologada por el Comité de Aves Exóticas de SEO-BirdLife
(Noticiario de 2007) (XBC)

Primera observación en la provincia de esta especie escapada de cautividad. En la Península, se citan numerosos ejemplares que crean núcleos reproductores aislados en algunas zonas, aunque sin llegar a ser estables. Más información: http://www.seo.org/media/docs/f_nandayus_nenday.html

Estrilda melpoda

Estrilda de Carita Naranja - Bec de corall de galta taronja - Orange-cheeked Waxbill

ESTATUS: **Conservación:** ET, Escapado origen del W y Centro África, **Criterio:** Todas las citas recibidas. **Categoría:** E1.

Betxí:

17-sep: 1 ej. (JBC)

Castellón de la Plana:

09-ene: 2 ej. (XBC)

29-ene: 40 ej. (XBC)

13-feb: 10 ej. (XBC)

26-jun: 2 ej. (XBC)

27-nov: 10 ej. (XBC)

04-dic: 2 ej. (XBC)

11-dic: 15 ej. (XBC)

30-dic: 3 ej. (XBC)

Desembocadura río Mijares:


07-ene: 1 ej. capturado para anillamiento. 2 ej. más a lo largo del año el 24-09 y el 5-11 (GAU)

Estríldido originario de la zona tropical y ecuatorial del centro-oeste de África (desde Senegal y Gambia hasta el norte del Congo y el Zaire). Cuenta con citas por todo el litoral castellonense y su reproducción ha sido comprobada en la desembocadura del Mijares.

Bibliografía citada en los textos de las especies

Balmorí, A. 2003. Andarríos chico (*Actitis hypoleucos*) en Martí, R. y del Moral, J.C. (Eds.): Atlas de las Aves Reproductoras de España pp. 262-263

- Bertolero, A. 2004. Gamba rotja (*Tringa totanus*) in: Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). 2004. Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d'Ornitologia (ICO/Lynx Edicions)
- BWPi (2004). The Birds of the Western Palearctic 1.00. Birdguides, Shrewsbury.
- Chacon G. 1991. Distribución y fenología de las polluelas en Cataluña. *Quercus* 61: 26-30.
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1991 Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1990. Generalitat Valenciana. Valencia.
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1995. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1993. Vol. 6. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia.
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1997. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1994. Vol. 7. Estación Ornitológica l'Albufera (SEO/BirdLife), Valencia.
- Feliu, P. 2008. Baldriga mediterrànea (*Puffinus yelkouan*) en Antón, M. (Ed.). Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2007. p. 38 Barcelona: Institut Català d'Ornitologia
- Glutz von Blotzhem U N, & Bauer, K M 1980. Handbuch der Vögel Mitteleuropas 9
- Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006. Las aves acuáticas de la Comunitat València, censos y evolución de las poblaciones (1984-2004). Conselleria de Territori i Habitatge, Generalitat Valenciana. València.
- Gómez-Serrano, M., Jiménez, M., Dies, J., Dies, B. & Monsalve, M. (eds.). 2000. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana (1995-1997). València: Estació Ornitològica l'Albufera (SEO/BirdLife).
- Gómez-Serrano, M., Jiménez, M., Dies, J., Dies, B. & Monsalve, M. (eds.). 2000. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana (1995-1997). València: Estació Ornitològica l'Albufera (SEO/BirdLife).
- Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.) 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección general de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Pereda, L.A. 2005. Selección de edificaciones en la nidificación del vencejo pálido (*Apus pallidus*) en núcleos urbanos de la provincia de Castellón. *Toll Negre* 5: 33-36
- Polo, A. & Polo, M. (eds.). 2007. Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002. Societat Valenciana d'Ornitologia. València.




Aguilucho papialbo (*Circus macrourus*). Marjal de Xilxes. Feb-2007. Autor: Juanvi Capella



Malvasía cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*). Marjal d'Almenara. Autor: David Olmos



Mosquitero de Pallas (*Phylloscopus proregulus*). Islas Columbretes. Autor: Vicente Ferris



Alcaudón dorsirrojo x Alcaudón común (*Lanius collurio* x *senador*). Alcossebre. Autor: Des Norden



Avetoro común (*Botaurus stellaris*). Marjal de Almenara. Autor: Josep Bort



Papamoscas papirrojo (*Ficedula parva*). Islas Columbretes. Autor: Jennifer Andreu



Guión de codornices (*Crex crex*). Islas Columbretes. Autor: Vicent Esteller

Anexo I. Artículos

MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE ÁGUILA-AZOR PERDICERA (*Hieraetus fasciatus*) EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (PERÍODO 1971-2006)

Josep Bort¹, Miguel Agueras², Juan Luis Bort³, Sergi Marzá⁴ y Fernando Ramia⁵

RESUMEN. Se exponen todos los datos recopilados por el GER-EA entre los años 1971 y 2006 sobre la pérdida de efectivos que afectan a la población de águila azor-perdicera en la provincia de Castellón y las causas que los motivan. Durante estos años se han recogido 229 casos, que ha supuesto la pérdida de 256 individuos de todas las edades comprendidas entre huevos y adultos. Se observa que las muertes de águilas adultas, alcanza un 60,55% del total de pérdidas. El 50,93% de los datos analizados de causas conocidas corresponde a muertes por disparo, seguidas por expolios 23,6%, que afecta, sobre todo, a pollos pequeños, y las molestias 13 %, que afecta a las pérdidas de huevos, principalmente. Si bien, la persecución directa sigue siendo la causa más importante de mortalidad para esta especie, la alteración de los territorios y las molestias aumentan en porcentaje.

SUMMARY. It outlines all the data collected by the EA-GER between the years 1971 and 2006 on the loss of troops that affect the population of Bonelli's eagle goshawk in the province of Castellon and the causes that motivate them. During these years have been 229 cases, that has meant the loss of 256 individuals of all ages ranging from eggs and adults. It is noted that the deaths of adult eagles, reaches 60.55% of total losses.

The 50.93% of the analyzed data correspond to known causes of deaths by gunshot, followed by pillaging 23.6%, which concerns above all to young chickens, and discomfort 13%, which concerns to losses of eggs, mostly.

While the direct persecution remains the biggest cause of death for this species, the alteration of the territories and in percentage increase for any inconvenience.

¹jbor@internatura.org, ²magueras@quatrecantons.com, ³juanlu@internatura.org, ⁴sergimarza@hotmail.com, ⁵fernandoramia@hotmail.com (Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires GER-EA)

INTRODUCCIÓN

El águila-azor perdicera, es una de las pocas especies de aves rapaces diurnas más amenazadas del continente europeo, siendo la Península ibérica donde el número de parejas se mantienen alcanzando el 70% de todos los efectivos europeos (Real, J. 2003; Ontiveros, D. 2007).

Aún así en nuestra península son muchas las zonas donde se ha citado como en declive, incluso en la Comunidad Valenciana, quedando de manifiesto en los resultados del II Censo Nacional de águila-azor

perdicera (SEO/Birdlife 2005), quizás las únicas zonas que se salvan son algunas áreas del sur peninsular (Andalucía y Extremadura), posiblemente porque muchas de las aves nacidas en la zona centro y norte peninsular se desplazan hacia el sur donde muchas al cabo de los años, forman parejas y no regresan a las zonas norteñas donde nacieron, quedando estas últimas cada vez con menos ejemplares para sustituir las bajas de la población adulta.

Respecto a la mortalidad se ha citado a la especie como una de las que más sufre la persecución directa especialmente

en el Levante (Bort, 1988; Bort, 1994; Arroyo, B., 1995), tendencia que ha ido disminuyendo mientras aumentaban otras causas como la electrocución y colisión con tendidos eléctricos, siendo en la actualidad la primera causa de mortalidad en las aves jóvenes e inmaduras con un 52% ; n= 337, mientras que la persecución directa (26%) afecta a los adultos (Real, J. et al. ,2001), siendo la provincia de Castellón una de las más afectadas con un 12,87% (Real, J et al., 1997).

En el presente trabajo se hace un pequeño análisis de los datos recopilado a lo largo de los últimos 30 años en la provincia de Castellón, periodo donde muchas zonas

se han visto abandonadas, debido posiblemente a la muerte sistemática de las parejas adultas, otras han visto como su hábitat ha sido transformado continuamente, mientras otras agresiones iban apareciendo como los deporte de montaña, el aumento de la instalación de tendidos eléctricos, de balsas de riego y en los últimos años la proliferación de parques eólicos, la ocupación de los nidos por el buitre común (*Gyps fulvus*), y la instalación de parejas de águila real (*Aquila chrysaetos*) muy cerca de los territorios de águila-azor perdicera, aspectos estos últimos, que aún no se conocen sus efectos en profundidad.

METODOLOGÍA

Para la recogida de datos se diseño una ficha, en la que se relacionaba una serie de puntos, siendo los más importantes: fecha de la muerte (en datos antiguos sólo el año), herida o desaparición, término municipal, lugar concreto, nº de individuos, edad y sexo, causa de la muerte (en caso que se conociera), pareja más próxima, situación o destino del ave (centro recuperación, casa particular, disecada, otros, etc.), posibles causantes e informador.

La recogida de datos ha venido por varias fuentes, desde los datos aportados por el Centro de Recuperación de Rapaces de Castellón, dependiente de la Conselleria de Territorio, agentes medioambientales, información recogida por los propios naturalistas, ornitólogos y ecologistas de la provincia. Además de por gente del campo, cazadores, agricultores, pastores, etc. y por los propios miembros del GER-EA, localizando muchas de estas aves disecadas en casas particulares.

PROBLEMÁTICA

La problemática del águila-azor perdicera en la provincia de Castellón ha variado, ligeramente, en el período comprendido entre los años 1971 y 2006. Es preciso reseñar el cambio de tendencia que se aprecia en los tres factores que agrupan las causas de mortalidad analizadas en este trabajo: persecución directa, alteración del hábitat y molestias. La persecución directa, aun siendo el factor más importante en la muerte del águila-azor perdicera,

disminuye porcentualmente entre 1971 y 2006. Sin embargo, aumentan de la misma forma las molestias y la alteración del hábitat. (Gráfico 1).

Las causas que inciden en la pérdida de efectivos de esta especie siguen siendo por orden de importancia: muerte por disparo (n=82, 50,93%), expolio de pollos (n=38, 23,6%) y molestias a nidos (n= 21, 13,04%), que conlleva la pérdida de los huevos.




Gráfico 1.- Principales factores que afectan negativamente a la población de águila azor-perdicera en Castellón en porcentajes.

Los factores que inciden negativamente en la población de esta especie se han agrupado en:

1.- Alteración o destrucción del hábitat:

- Canteras o minas a cielo abierto.
- Talas y/o incendios forestales de extensión importante.
- Transformaciones en el cambio de cultivo de secano a regadío.
- Construcción de accesos (pistas forestales, caminos, carreteras,...) cercanas a los nidos.
- Construcción de viviendas (urbanizaciones,...)
- Construcción de tendidos eléctricos.
- Parques eólicos.
- Construcción de balsas antiincendios y de riego.

2.- Persecución directa:

- Expolios de huevos y pollos en el nido.
- Disparos en zonas de cría a adultos y jóvenes.
- Quema y derribo de nidos.
- Cotos de caza menor intensiva.
- Venenos y trampas.
- Colombicultura.
- Nidos de fácil acceso.

3.- Molestias humanas:

- Molestias por agricultores y ganaderos.
- Molestias por trabajos forestales cerca de los nidos.
- Molestias por trabajos de infraestructuras.
- Campo de tiro y campo militar en las inmediaciones.
- Rutas y vías de escalada en zonas de cría.
- Excursionismo y senderismo en época de cría.
- Parapente.
- MotoCross, trial, quads, 4x4.
- Zona de recreo en las cercanías.
- Fotógrafos y observadores de la naturaleza.
- Investigación y marcaje de pollos, jóvenes y adultos.

4.- Otras problemáticas:

- Muerte natural.
- Muerte por caídas en balsas de riego y antiincendios.
- Muertes por colisión o electrocución.
- Muerte por enfermedades (triquinosis, Aspergilosis, ...)

5.- Problemática o muerte por causas desconocidas.

6.- Competencia por la zona de cría con otras rapaces rupícolas, especialmente buitre

RESULTADOS:

Respecto a la mortalidad directa, hemos identificado 11 causas las que provocan la muerte de las águilas azor-perdiceras en Castellón, se ha descartado el grupo de causas no identificadas y denominadas desconocidas, que para todo el periodo se eleva a 95, de ellas, 77

leonado (*Gyps fulvus*), águila real (*Aquila chrysaetos*) y Halcón peregrino (*Falco peregrinus*).

corresponden adultos, 1 pollo, 16 a huevos y un caso de edad sin determinar.

Del resto de casos, que sí conocemos la causa que ha provocado la muerte del águila, se elevan a 161, de los cuales 26 corresponden a expolios de huevos y el resto a muertes de águilas en las distintas edades (gráfico 2).




Gráfico 2.- Porcentaje de causas de pérdidas o desapariciones de águilas azor-perdicera en la provincia de Castellón (1971-2006).

La causa principal es la muerte por disparo, que supone la mitad de todas las muertes identificadas, y que afecta en el 80% de los casos de los individuos adultos ($n=62$), afectando poco a la población joven ($n=10$), probablemente, este hecho está relacionado por la presencia durante todo el año de los adultos en zonas concretas y sus visitas para conseguir alimento a pueblos con afición a la columbicultura o a palomares y picaderos colocados fuera de las poblaciones. Las áreas con más muertes

se centran en la zona media y sur de la provincia (Imagen1). A los disparos siguen en importancia los expolios, prácticamente, todos a pollos ($n=26$), seguido por la pérdida de huevos por molestias ($n=19$) y el expolio de huevos ($n=8$)(Cuadro 1). El resto de causas, englobadas en las alteraciones del territorio (infraestructuras, tendidos, etc.), que afectan negativamente a la población de esta especie, aunque aparecen con porcentajes bajos, mantienen una tendencia al alza, como ya se ha reseñado (Gráfico 1).

Cuadro 1. Muertes de *Hieraaetus fasciatus* por edades.

Motivos	Adultos	Jóvenes	Pollos	Huevos	Indeterminados	TOTAL
<i>Tendidos eléctricos</i>	2	2	0	0	0	4
<i>Disparos</i>	62	10	8	0	2	82
<i>Veneno</i>	2	1	0	0	0	3
<i>Cepos</i>	2	0	0	0	0	2
<i>Lazos</i>	2	0	0	0	0	2
<i>Capturas</i>	2	0	1	0	0	3
<i>Colisiones</i>	3	0	0	0	0	3
<i>Expolios</i>	3	1	26	8	0	38
<i>Atropellos</i>	0	1	0	0	1	2
<i>Desnutrición</i>	0	1	0	0	0	1
<i>Molestias</i>	0	0	2	19	0	21
TOTAL	78	16	37	27	3	161




Imagen 1. Áreas de la provincia donde se concentran las muertes y pérdidas de población.

El análisis de los datos de mortalidad se han dividido en los tres periodos siguientes:

- a) Muertes o pérdidas antes de 1985
- b) Muertes o pérdidas entre 1985 y 1995.
- c) Muertes o pérdidas entre 1996 y 2006.

Los resultados se exponen en el (gráfico 3), donde podemos observar que el

peor periodo corresponde al ocurrido entre 1986 y 1995, en el que la muerte por disparo a los adultos, junto a la pérdida de pollos y huevos por expolio, y la pérdida de la pollada por molestias continuas cerca de los nidos fue muy importante.

Este aumento de muertes y pérdidas coincide con la baja productividad observada en el mismo periodo 1985-1995, productividad que fue la más baja de los últimos 25 años y podrían estar relacionadas.

Comparación de la productividad media y las pérdidas de efectivos de <i>Hieraetus fasciatus</i> durante los tres periodos.			
	Hasta 1985	1985-1995	1996-2006
Productividad	1,02	0,72	1,06
Pérdidas	49	179	34




Gráfico 3.- Mortalidad encontrada según los periodos analizados.

Respecto a la edad de las águilas muertas o pérdidas (gráfico 4 y 5), podemos ver como la población adulta es la más afectada o de la que más datos poseemos, afectando a más de la mitad de los datos obtenidos, un 60,5% de todos los datos, siendo las otras edades afectadas en porcentajes similares.

Si hacemos el análisis de los tres periodos analizados anteriormente, encontramos que, el periodo comprendido entre 1985 y 1995, es donde mayor número de águilas adultas, jóvenes, pollos y huevos han sido afectadas en lo referente a muertes directas o pérdidas.




Grafico 4.- Mortalidad por grupos de edad durante todo el período.




Grafico 5.- Mortalidad según la edad de las águilas, en los tres periodos.

CONCLUSIONES:

Si bien, los datos que disponemos son parciales, reflejan una mortalidad muy elevada de los efectivos de águila-azor perdicera provocados por causas no naturales en la provincia de Castellón. Los disparos y los expolios son las causas principales de esta mortalidad, a la que contribuyen, cada vez con mayor incidencia las molestias y la alteración del hábitat.

Estas muertes afectan a las edades de población básicas para el sostenimiento de la población del águila-azor perdicera: adultos, pollos y huevos. En el primero de los casos, ha llevado a la desaparición de parejas en amplios territorios, ya desde los años 70. En cuanto a la pérdida de pollos y de huevos, conlleva la reducida productividad observada en la provincia de Castellón durante este periodo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

De igual forma, si la problemática es la misma en estos 35 años las medidas de protección, conservación y recuperación deben ser las mismas, si bien, el aumento de las molestias y de la alteración del hábitat requiere el planteamiento de medidas de más hondo calado que las tendentes a disminuir o eliminar la persecución directa:

1.- Conservación del hábitat mediante la declaración como zona estrictamente protegida de 3 km de radio, cuyo centro sea el nido reproductivo.

2.- Aporte alimenticio suplementario, en las zonas donde se considere oportuno, especialmente a base de conejos.

3.- Eliminación de los tendidos eléctricos que discurran por las zonas de nidificación y dispersión, incluso mediante el enterramiento de los cables donde sea necesario y la alteración de la vegetación de interés no se vea afectada.

4.- Eliminación o la no instalación de parques eólicos en las proximidades, evitando además la instalación de nuevas líneas y torres eléctricas.

5.- Eliminación de la persecución directa, especialmente en las zonas con afición a la competición de palomos deportivos y cotos de caza. Instalación de “palomares barrera” aún sabiendo que puede ser un factor de transmisión de algunas enfermedades infecto-contagiosas a las águilas. Evitando la predación sobre palomos deportivos y por tanto la muerte por el hombre

6.- Programas de investigación, educación y sensibilización a largo plazo, determinando las fluctuaciones de la población existente.

7.- Estudios de intervención y manejo de la especie solo en las parejas con problemas, especialmente en lo referentes a reproducciones nulas o muy irregulares. Evitando la intervención en parejas estables con productividades igual o mayor a 1 p/p/a.

AGRADECIMIENTOS:

Quisiéramos agradecer a todos los miembros del GER, así como a todos los componentes de otros grupos ecologistas / naturalistas provinciales (APNAL, Colla de

Castelló, GECEN, GEV) y amigos, que han colaborado, a distintos niveles, a lo largo de estos años con su esfuerzo, entusiasmo.

BIBLIOGRAFÍA:

Arroyo, B. Ferreiro, E. Garza, V. 1995. El águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*) en España. Censo, reproducción y conservación. Colección Técnica. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Bort, J. 1987: Mortalidad de rapaces en la provincia de Castellón. Inédito. Consellería de Medio Ambiente

Bort, J. 1988: Mortalidad de rapaces en Castellón: Estudio comparativo entre 1987 y

1988. Inédito. Consellería de Medio Ambiente.

Bort, J. 1994. Evolución del águila perdicera en la provincia de Castellón. VI Congrès Internacional de biologia i conservació dels Rapinyaires mediterranis. Sep. 1994 Palma de Mallorca.

Ontiveros, D. (2007). Águila perdicera – *Hieraaetus fasciatus*- En: Enciclopedia Virtual de Vertebrados Españoles. Carrascal, L. Salvador, A. (Eds.). Museo

Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

Real, J y Mañosa, S 1997: Demography and conservation of Western European Bonelli's Tagle (*Hieraaetus fasciatus*) populations. *Biological Conservation*, 79: 59-66

Real, J. Grande, J., Mañosa, S, Sanchéz.Zapata, J. (2001): Causes of death in different areas for Bonelli's (Hf), in Spain. *Bird Study*, 48 (2): 221-228.

Real J. 2003. Aguila Perdicera. *Hieraaetus fasciatus*. En R. Martí & J.C. del Moral

(Eds): Atlas de las Ave Reproductoras de España, pp. 192-193. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. SEO. Madrid

SEO/Birdlife 2005: Exposición Aguila-azor perdicera. Generalitat Valenciana Segorbe Sept-2007 (Castellón).

Enciclopedia Virtual de los vertebrados españoles:
<http://www.vertebradosibericos.org/aves/habitat/hiefasha.html>

LA GAVIOTA CABECINEGRA (*Larus melanocephalus*) EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

¹Miguel Tirado

RESUMEN. La gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*) es invernante común en Castellón, asociada a los puertos pesqueros de la provincia, siendo más abundante cuanto más al norte. La población total invernante se sitúa entre los 6.000 y los 12.500 ej. En Valencia y Alicante es mucho más escasa, con máximos de 400 ej. en Valencia y apenas unas decenas en Alicante. NE Castellón muestra dos pasos marcados, a principios de diciembre y a principios de enero. Más del 80% de las recuperaciones corresponden a aves inmaduras de 1er y 2º año. El 77% provienen de Italia, Ucrania y Grecia.

SUMMARY. The Mediterranean gull (*Larus melanocephalus*) is common in winter in Castellón associated with fishing ports of the province, being far more abundant further north. The winter population is between 6,000 and 12,500 ex. In Valencia and Alicante is much more limited, with peaks of 400 ex. Valencia and Alicante in just a few dozen. NE Castellón shows two steps marked the beginning of December and early January. Over 80% of recoveries are immature birds 1st and 2nd year. 77% from Italy, Ukraine and Greece.

¹tiradobemat@yahoo.es. (Grup Au d'Ornitologia)

DISTRIBUCIÓN EN LA CV

En la Comunidad Valenciana la gaviota cabecinegra se puede considerar básicamente como un ave invernante, aunque en la expansión de la especie hacia el oeste ha ocupado algunos hábitats costeros durante la época de cría, llegando a nidificar desde hace unos 7 años de manera ocasional en la Albufera de Valencia y en las Salinas de Santa Pola y el Fondó de Elx, pero con una población muy pequeña que apenas llega a superar las 10 parejas. La evolución de estas poblaciones nidificantes parece pues estancada.

Sin embargo como ave invernante sus poblaciones adquieren bastante importancia, aunque está repartida de manera muy desigual, es común en Castellón, y bastante escasa en Valencia y Alicante. Las diferencias son muy notables en este sentido, mientras en la provincia más norteña puede considerarse la especie de gaviota más abundante junto a la gaviota sombría, en Valencia y en Alicante, sumadas todas las citas invernales apenas superan el centenar.

HÁBITOS GENERALES

La gaviota cabecinegra es un ave claramente diurna, se alimenta durante las horas de sol en el mar y se concentra en dormideros al atardecer, para volver a dispersarse antes del amanecer. Este comportamiento la convierten en un ave muy fácil de seguir, ya que los dormideros demuestran ser los mejores sitios para cuantificar las poblaciones, una especie de formación vespertina en la que se puede pasar lista a todos los reclutas. Nada que ver con los agónicos recuentos parciales de cientos de sombrías que se mueven sin parar siguiendo a los pesqueros, descansando en las dársenas, en las playas y en el mar.

Sin embargo todas las facilidades que ofrece la especie para los recuentos, se convierten en dificultades para conocer su comportamiento durante el día.

A primera hora de la mañana se suelen concentrar junto al resto de especies de gaviota en playas tranquilas cercanas al puerto, son muy gregarias pero se mantienen separadas del resto, y normalmente en la periferia de los grupos de

gaviotas grandes y más a tierra, ocupando por su menor tamaño una posición menos dominante. De todos modos no permanecen por mucho tiempo, y poco a poco van desapareciendo en pequeños grupos mar adentro, raro es ver cabecinegras descansando a plena luz del día. Donde y cómo pescan es un pequeño misterio, tan solo disponemos de algunos indicios proporcionados por un par de salidas invernales con los grandes arrastreros de la flota pesquera de Castellón. En estas salidas lo primero que llama la atención es lo rápidamente que desaparecen las gaviotas patiamarillas y sombrías del panorama general, a las pocas millas se ven escasas y casi desaparecen a las 10 millas. La gaviota cabecinegra sin embargo sigue presente con mayor o menor abundancia en toda la plataforma, que es muy ancha en esta zona (30 millas). En estos momentos se puede disfrutar del vuelo fácil y ligero de las cabecinegras que forman pequeñas partidas que vuelan arriba y abajo, siguiendo a veces durante bastante rato a los barcos, confundiendo con la gaviota tridáctila, más grácil pero de tamaño muy similar aunque de hábitos más marinos, ya que ni siquiera los temporales de levante las llevan a la costa. En estas situaciones de temporal, precisamente, se aprecia un aumento de cabecinegras en los dormideros, lo que podría indicar que existe un contingente de aves de costumbres completamente pelágicas durante el invierno y que subestiman los censos. Este hecho ya fue observado en el entorno de la Albufera por Dies & Dies (1992).

Además de esta pesca activa diurna, la especie ha superado la tensión de volar junto a motores rugientes de 500 caballos y se alimenta frenéticamente de la inmensa cantidad de pescado que se lanzan por las bordas de los arrastreros en su vuelta al puerto, junto a todo el resto de gaviotas, págalos y pardelas. Para un observador de tierra, que puede pasar días sin ver págalos o pardelas, es un espectáculo revelador de lo difícil que es estudiar las aves marinas desde la costa.

FENOLOGÍA CV

Alicante

El buen seguimiento de la especie, básicamente por parte de A.J. Ramos, en algunas zonas húmedas de Alicante (P.N. de las Salinas de Santa Pola y Saladar de Agua Amarga) indican que la gaviota cabecinegra está presente todo el año, con máximos pre y postnupciales que no llegan a sumar los 200 ejemplares los mejores años, y presencia testimonial durante el invierno, con una cita máxima de 20-30 ej. en el norte de la provincia a finales de diciembre.

Valencia

El seguimiento por parte de los ornitólogos valencianos de esta especie indican que muestra un patrón muy similar al observado en Alicante, pero su mayor proximidad a las mejores áreas de invernada de Castellón hace que se cite en mayor número, con un máximo histórico de 400 ej. en el Puerto de Sagunto a mediados de enero de 1994 (M. Yuste, SVO, en Dies & Dies, 1994). El primer intento de cría en la Albufera de Valencia fue de 2001, con una puesta que fracasó.

Castellón

Los censos realizados durante dos inviernos seguidos (2002-2004) mostraron una fenología muy similar, y un tanto particular, aunque compartida con algunas otras especies invernantes en el levante ibérico, y caracterizada por un doble pico, uno a principios de diciembre y otro a principios de enero, con una bajada intermedia muy notable y claramente significativa, esto indica que en los poco más de tres meses con presencia importante de aves se producen dos pasos marcados, queremos suponer que de aves hacia el norte, hacia la gran población invernante tarragonina y hacia el sur, hacia el atlántico de nuevo en un paso muy temprano.


Fuera de la época invernal las citas vienen marcadas por un goteo de

ejemplares aquí y allá durante los meses de julio, agosto y septiembre, irregulares y sujetas posiblemente a los desplazamientos locales de la pequeña población nidificante en varias zonas del levante por lo que hemos sido incapaces de observar ningún patrón definido.


No es hasta mediados del mes de octubre cuando comienza a hacerse regular,

con una entrada brusca, casi irruptiva, de aves a mediados de noviembre. Pasados los meses más fríos deja de ser abundante a mediados de febrero y escasa en marzo, comenzando a hacerse irregular durante el mes de abril y dejándose ver los últimos ejemplares a principios de mayo.

Larus melanocephalus puerto de Castellón 02/03



Larus melanocephalus Puerto de CASTELLÓN 03/04



INVERNADA CV

La población invernada de la comunidad valenciana está prácticamente concentrada al 100% en Castellón, e igualmente a lo que sucede entre Castellón-Valencia-Alicante, existe un gradiente en invernada, con máximos en los puertos más septentrionales de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, y mínimos en los de Castellón y Burriana.

No disponemos de censos regulares de esta importante zona de invernada del norte, existen recuentos realizados en diferentes momentos entre diciembre y febrero que arrojan números sobre los que resulta complicado hacer generalizaciones, más teniendo en cuenta la fenología que muestra en los puertos de Castellón. Estos censos muestran unas fluctuaciones de cierta importancia para estos puertos limítrofes con Tarragona, de unos mínimos de 600 a unos máximos de 3.200 para Peñíscola y entre poco más de 1.000 y algo más de 3.000 para Benicarló y otros tantos para Vinaroz.

Para los puertos de Castellón y Burriana los máximos se sitúan entorno a los 1.000 – 1.300 ej. y marcan el límite septentrional de la población invernante del litoral levantino.

Estas estimas de entre 6.000 y 12.500 ej. invernantes es bastante grosera y no del todo fiable, ya que no sabemos hasta que punto los ejemplares que ocurren en los puertos del norte sean los mismos que abandonan los de Castellón y Burriana entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, o si están en tránsito o si se comparten con los

del sur de Tarragona, y tampoco estamos seguros de si las aves de estos tres puertos son las mismas, ya que entre los 3 puertos del norte hay solo 10 Km. Muchas incógnitas, sin duda tenemos aquí trabajo pendiente.

RECUPERACIONES


Para el gran volumen de aves que se congregan en el área del Puerto de Castellón disponemos de pocas recuperaciones, si bien hemos podido complementarlas con las de la base de datos del Centro de Migración de Aves del MMAA, para dar un total de 37 recuperaciones.

La mayor distancia recorrida corresponde a un ave de Turquía a 2.780 Km., el 80% de las aves recuperadas fueron anilladas como pollo en la colonia de cría.

Edad

Presentadas todas las recuperaciones en un diagrama de barras llama inmediatamente la atención el elevado porcentaje de aves inmaduras (1er y 2º año calendario) que componen más del 80% de las aves invernantes en la zona. Este porcentaje es radicalmente distinto del encontrado en la misma zona para la gaviota sombría y de Audouin, que muestran una distribución de edades mucho más amplia, con ejemplares de hasta 18 años, aunque no es muy diferente de la que muestra la gaviota patiamarilla, para la que el entorno del puerto funciona como un hábitat de 2ª calidad, con apenas representación de aves adultas.

Edad de las gaviotas cabecinegras recuperadas en Castellón. n=39



El motivo de esta distribución de edades puede encontrarse en alguna de estas dos causas, o bien efectivamente se trata de un ave con una corta longevidad, lo que a juzgar por las edades máximas de otras especies de gaviota parecería un poco raro, o bien por algún motivo similar al de la gaviota patiamarilla, existe una selección diferencial entre aves jóvenes e inmaduras, y las aves adultas se encontrarían segregadas de las jóvenes.

Orígen

Por orígenes, la mayoría de las recuperaciones provienen de Italia seguidas de Ucrania y a mucha distancia el resto de remites: Grecia, Holanda, Hungría, Francia y Turquía

País origen	Recs.	%
Italia	15	38,5
Ucrania	11	28,2
Grecia	5	12,8
Holanda	3	7,7
Hungría	2	5,1
Francia	2	5,1
Turquía	1	2,6

10 de las 11 recuperaciones de gaviotas de Ucrania son anteriores a los años 50 del siglo pasado y provienen de los archivos del centro de Migración de Aves del MMAA. Actualmente este remite ha perdido fuerza a favor del italiano.

Agradecimientos: A Javier Marchamalo que aportó algunas de las lecturas de gaviota cabecinegra, a Jose Bort que compartió sus datos de censos de invernada del puerto de Burriana y a Luis Aleixos que recopiló parte de las citas para las provincias de Valencia y Alicante.

BIBLIOGRAFÍA

- Bort, J.L. & Bort, J. (Coord.). 2005. Anuario Ornitológico de Castellón 2003. Vol.1.
http://www.internatura.org/aocs/anuario_2003.pdf. AOCS. Castellón
- Bort, J.L. & Bort, J. (Coord.). 2007. Anuario Ornitológico de Castellón 2004. Vol.2.
http://www.internatura.org/aocs/anuario_2004.pdf. AOCS. Castellón
- Cabo, M.J. & Polo A. (Coord.). Aves de la Comunidad Valenciana 1998. Societat Valenciana d'Ornitologia. Valencia
- Cabo, M.J., Polo, A. & Polo, M. (Ed.). Aves de la Comunidad Valenciana 1999. Societat Valenciana d'Ornitologia. Valencia
- Dies, J. I., Dies, B. & Caletrió, J. (eds.). 1989. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1988. Vol.1. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1990. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1989. Vol.2. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia
- Dies, B & Dies, J. I. 1990. El incremento de la Gaviota Cabecinegra [Larus melanocephalus] en l'Albufera de Valencia. GIAM no.8 (invierno 1989-90): 3-4.
- Dies, J. I. & Dies, B. 1991. Presencia de Gaviota Cabecinegra [Larus melanocephalus] en la costa asociada a un temporal de Levante. GIAM no.12 (primavera 1991): 4
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1991. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1990. Vol.3. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1992. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1991. Vol.4. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1994. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992. Vol.5. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1995. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1993. Vol.6. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia
- Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1997. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1994. Vol.7. Estación Ornitológica l'Albufera (SEO/BirdLife), Valencia
- Gomez-Serrano, M.A.; Giménez Ripoll, M.; Dies Jambrino, J.I.; Dies Jambrino, B. y Monsalve Dolz, M.A. 2000. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1995-1997. Estació Ornitológica de l'Albufera (SEO/BirdLife). Valencia
- Luque, E. & Ortiz, J.V. (Coord.). 2007. Anuario Ornitológico de Castellón 2005. Vol.3.
http://www.internatura.org/aocs/anuario_2005.pdf AOCS. Castellón
- Polo, A. & Polo, M. (Eds.). Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002. Societat Valenciana d'Ornitologia. Valencia
- SEO-Alicante. Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante 2000. Alicante, 2002.
- SEO-Alicante. Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante 2001-2002-2003. Alicante, 2006.

EL CHORLITEJO CHICO (*Charadrius dubius*) EN CASTELLÓN. DISTRIBUCIÓN Y POBLACIÓN NIDIFICANTE. 4º CENSO PROVINCIAL 2007.

Ramón Prades Bataller¹
Ana Llopis Raimundo²
Jose Vicente Ortiz Olmos³

RESÚMEN

Durante mayo – junio de 2007 se han realizado, con metodología de transecto lineal, una serie de controles en 53 localidades de Castellón para detectar la presencia y nidificación del Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*). Se han localizado 134 parejas nidificantes en tan sólo 25 localidades, lo que ha supuesto un aumento importante de ocupación, aunque no del número de parejas desde 1994. El hábitat más utilizado en 1994 eran las ramblas y los ríos con el 54,5%, pero con el empeoramiento de los cauces, sobre todo el tramo final del río Millars, este porcentaje a disminuido al 35,3% en 2007, siendo menos utilizado las graveras y zonas litorales.

Las características del hábitat más utilizado son ríos interiores con zonas anchas de suelos arenosos, gravosos o de cantos rodados, con vegetación escasa, incluso con caudales intermitentes pero con permanencia de charcas en época de reproducción. Las zonas húmedas litorales también son muy utilizadas (31,6%) y desde 2003 las playas litorales, zonas industrializadas y encauzamientos de ríos con cemento.

Por último se postula la hipótesis, que el número de parejas nidificantes va en función de las trompas de agua o avenidas de los ríos por fuertes lluvias, las cuales producen una limpieza de vegetación en el márgenes de los ríos, que favorece la instalación de parejas nidificantes a medida que va aumentando la vegetación en estos márgenes el número de parejas disminuye, hasta casi desaparecer (ver tablas), hasta una nueva avenida que inicia el ciclo.

SUMMARY

During May-June 2007 have been made, with the methodology of linear transect, a series of controls in 53 locations in Castellon for the presence and breeding of *Charadrius dubius*. Are located 134 nesting pairs in only 25 locations, which has led to a significant increase in employment, but not the number of partners since 1994. The habitat most used in 1994 were the watercourses and rivers with 54.5%, but with the deterioration of rivers, especially the end of the Millars river, this percentage decreased to 35.3% in 2007, being less used gravel and coastal areas. The habitat characteristics are most used rivers inland areas with wide sandy soil, or heavy boulders with sparse vegetation, even with water but with intermittent puddles remain in breeding season. Coastal wetlands are also widely used (31.6%) and coastal beaches since 2003, industrial areas and channeling rivers with cement.

Finally, the hypothesis posits that the number of nesting pairs is a function of the horns of water or flood the rivers by heavy rains, which produce a clean vegetation in the river banks, which supports the installation of couples nesting increases as vegetation in these margins reduces the number of couples to almost disappear (see table) to a new venue to start the cycle.

¹sosuelo@terra.es, ²sosuelo@terra.es, ³www.josevicenteortiz.info

INTRODUCCIÓN

EL CHORLITEJO CHICO *Charadrius dubius*, se distribuye por Europa, Asia, Norte de África y parte de las islas de Indonesia. Las poblaciones europeas ivernan en África al Sur del Sahara, mientras las asiáticas lo hacen en la India, sudeste asiático e islas indonesias (Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1996).

La población europea se ha estimado en 110.000-610.000 parejas (Thorap en Hortas et al 2003).

En España el chorlito chico está presente como nidificante en todas las regiones, archipiélagos incluidos (Hortas Rodríguez-Pascual & Figuerola J., 2003) con una población estimada para la península de

2500-3300 parejas (Hortas et al. 2000) y un centenar de parejas para las Islas Canarias (Martín & Lorenzo 2001 en Hortas et al 2003) En el Atrás De Las Aves Reproductoras de España la población mínima se estimó en 4277 parejas (faltando datos del 16% de la cuadrículas).

En la provincia de Castellón las poblaciones nidificantes se han evaluado en 3 ocasiones; 1994, 1997 y 1999 (datos propios) Prades, R. & Ortiz, JV.1997) (Prades & Ortiz 1999).

En el presente trabajo se ofrecen los datos sobre el número de parejas nidificante, localidades de cría y hábitats de la especie durante el año 2007, comparándolos con los de años anteriores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los meses de mayo y junio, se visitaron todas las localidades susceptibles de albergar chorlitos chicos incluidas las zonas donde se habían localizado en prospecciones anteriores, parejas nidificantes en la provincia de Castellón.

En total se visitaron 53 localidades, cada localidad fue visitada entre 1 y 3 veces durante el periodo citado en función de la extensión y diversos problemas a la hora del censo (visitantes, molestias etc.)

El método de censo, fue el transecto lineal (Souza & Domínguez 1989)

realizado según las zonas por 1, 2 ó 3 personas, aunque se ha tenido la colaboración de otras personas en determinadas localidades citadas en agradecimientos.

La cobertura del censo se considera muy buena, aunque cabe la posibilidad, de que se hayan pasado por alto alguna localidad, ahora bien en el caso de que así fuera, estos errores afectan a un pequeño número del total reproductor, lo que no incidiría de forma importante en el resultado final.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante 2007 el chorlito chico ha nidificado en 25 localidades con un total de 134 parejas (Ver tabla 1).

Respecto al número de localidades, estas han aumentado en relación con los censos anteriores pasando de 12 en 1994 a las 25 actuales. Ahora bien algunas localidades donde se reproducía la especie ha desaparecido como son: Sant Jordi (río Cervol) Rambla Segorbe, Río

Palancia, en otras su reproducción es esporádica en función de las condiciones del hábitat; Marjal de Oropesa, Ríos Ana, Seco (Bechí) Seco (Onda), Pantano de Alcora, Polígono Industrial de Almassora.

En la tabla nº 2 se exponen las localidades donde se ha constatado la reproducción de la especie y las poblaciones máximas y mínimas en los años en que se conoce.

LOCALIDAD / Nº parejas	1994	1997	1999	2007
DESEMBOCADURA DEL MIJARES	41	16	4	3
MAJAL DE ALMENARA	13	12	27	39
P.N. CABANES-TORREBLANCA	3	2	1	3
MARJAL OROPESA	3	0	0	0
REFINERÍA B.P.	13	15	7	1
RIO Belcaire	12	8	18	10
PANTANO M ^a CRISTINA	35	34	11	13
RIO ANA	3	11	1	0
SAN JORJE	8	0	0	0
RIO SERVOL VINARÒS	1	3	0	2
RAMBLA SEGORBE	2	0	0	0
RIO PALANCIA	12	0	0	0
RIU SEC BECHÍ	-	4	1	0
RIU SEC ONDA	-	3	2	0
RIU SEC CASTELLÓ	0	3	2	0
MARJAL DE CASTELLÓ	0	0	4	3
RAMBLA DE LA VIUDA	0	4	2	0
PANTANO SITJAR	0	15	3	3
RIBESALBES	-	2	0	0
ESPADILLA	-	3	1	0
MINAS DE SEGORBE-	-	2	0	0
PANTANO DE ALCORA	0	0	1	0
TORRENOSTRA	0	0	1	0
PUESTO DE CASTELÓ	0	3	0	6
RIO BERGANTES	-	5	5	29
AEROCLUB	-	0	0	3
BENICARLÓ	-	0	0	1
PUERTO BURRIANA	-	0	0	1
PLAYA DE BURRIANA	-	0	0	3
PLAYA SERRATELLA BURRIANA	0	0	0	1
PLAYA NULES	0	0	0	1
PLAYA ALMASSORA	0	0	0	1
PLAYA ALMASSORA MILLARS	0	0	0	1
PLAYA DE ALMENARA	0	0	0	3
PLAYA PINAR CASTELLÓ	0	0	0	1
CERVERA	0	0	0	2
CÀLIG	-	0	0	2
PANTANO DEL REGAJÓ	-	0	0	2
TOTAL	145	145	92	134

Tabla nº 1. Distribución por localidades y número de parejas reproductoras de chorlito chico en castelló.
Años 1994, 1997, 1999, 2007.

<u>LOCALIDAD</u>	<u>MÁXIMA</u>		<u>MÍNIMA</u>	
DESEMBOCADURA DEL MIJARES ₁	1993	53pp	2007	3pp
MARJAL DE ALMENARA	2007	39pp	1989	3pp
MARJAL OROPESA	1994	03pp	varios	0pp

PRAT DE CABANES	1994	03pp	varios	0pp
REFINERÍA B.P.	1997	15pp	2007	1pp
RIO BELCAIRE	2005	25pp	2004	3pp
PANTANO M ^a CRISTINA	1996	36pp	varios	2pp
RIO ANA	1997	11pp	varios	0pp
SAN JORGE	1994	08pp		
RIO SERVOL (VINARÒS)	2004	06pp	1999	0pp
RAMBLA SEGORBE ₂	1994	00pp		
RIO PALANCIA ₂	1994	12pp		
RIO SECO BECHÍ	1997	04pp	varios	0pp
RIO SECO ONDA	1997	03pp	varios	0pp
RIO SECO CASTELLÓ	1996	04pp	varios	0pp
RAMBLA LA VIUDA	1997	04pp	varios	0pp
PANTANO SITJAR	1997	15pp	1994	0pp
RIBESALVES	1997	02pp	varios	2pp
ESPADILLA	1997	03pp	varios	0pp
MINAS SEGORBE	1997	02pp	varios	0pp
PANTANO ALCORA	1994	01pp	varios	0pp
MARJAL CASTELLÓ	1996	04pp	varios	0pp
TORRENOSTRA NORTE	2006	01pp	varios	0pp
PUERTO CASTELLÓ	2007	06pp	varios	0pp
RIO BERGANTES ₃	2004	30pp	1997	5pp
AEROCUB CASTELLÓ	2007	05pp	2005	2pp
PLAYA ALMASSORA	2003	05pp	2004	1pp
PLAYA NULES	2005	03pp	2007	1pp
ARENAL BURRIANA	2007	04pp	2005	1pp
PLAYA BURRIANA	2007	03pp	2005	1pp
PLAYA SERRATELLA BURRIANA	2005	01pp	2007	1pp
PLAYA MONCOFAR	2005	03pp	2007	1pp
PLAYA ALMENARA	2007	03pp	2004	1pp
PLAYA XILXES	2004	01pp	varios	0pp
MARJAL NULES	2004	02pp	varios	0pp
BARBECHOS NULES	2004	02pp	varios	0pp
CÀLIG	2004	04pp	2007	2pp
CERVERA	2004	03pp	2007	2pp
PUERTO BURRIANA	2007	01pp	varios	0pp
PLAYA AMPLARIES OROPESA	2005	01pp	varios	0pp
BENICARLÓ	2005	01pp	2007	1pp
POLÍGONO ALMASSORA ₂	2004	01pp		
PLAYA SERRADAL CASTELLÓ	2004		varios	0pp
PLAYA PINAR CASTELLÓ	2007	01pp	varios	0pp
EMBALSE REGAJO	2007	02pp	varios	0pp

NOTAS

¹ Tramo comprendido entre puente N-340 al mar.

² Solamente se ha constatado la reproducción el año anotado en la columna de máximos.

³ Comprende tramos de los ríos Caldés y Cantavieja, el total de esta localidad está comprendida en los T.M. de Morella, Forcall, Villoses, Ortells (Morella) Palanques y Sorita.

Para algunas localidades los datos, abarcan desde 1998 hasta 2007.

Tabla nº 2. Localidades con presencia reproductora del Chorlitejo chico (*Charadrius alexandrinus*) y poblaciones máximas y mínimas (años).

Como se puede observar en la tabla n° 2 son 45 las localidades en las que hemos observado reproducirse el chorlito chico en la provincia de Castelló. Esto puede indicar el oportunismo de la especie en la hora de elegir una zona para la cría,

seleccionando zonas en función de las condiciones anuales de esta.

En la tabla n° 3, se ofrecen datos sobre el porcentaje de la población presente en los diferentes tipos de hábitat o biotopos, durante los 4 censos provinciales efectuados.

BIOTOPO	1994	1997	1999	2007
ZONAS HÚMEDAS + DESEMBOCADURAS	20,0%	09,7%	38,0%	31,6%
PANTANOS	16,6	33,8%	16,3%	13,2%
RIOS +RAMBLAS	54,5%	43,4%	38,0%	35,3%
ZONAS INDUSTRIALES	09,0%	12,4%	07,6%	08,1%
GRAVERAS, MINAS	—	07,4%	—	—
PLAYAS LITORALES	—	—	—	11,8%

Tabla n° 3. Distribución población por biotopos

En principio el análisis de la ocupación por biotopos muestra una preferencia clara de la especie por aprovechar las localidades en función de su situación ambiental. Años en que el volumen de lluvia permite ocupar áreas o no, por ejemplo pantanos según el volumen de agua embalsada, habrá mayor o menor presencia de chorlitos chicos, ya que la especie rehuye orillas escarpadas o con vegetación densa.

La distribución por biotopos en Castelló, muestra una preferencia de la especie por ríos y ramblas al igual que lo observado en Catalunya (Montras, T. et al in., Estrada, J. Pedrochi, V. Brotons, L. Herrando, S. 2004). Sin embargo el porcentaje del total reproductor, ha descendido del 54.5% en 1994 al 35,3% del último censo. Esta disminución, está relacionada con el empeoramiento del hábitat en el último tramo del río Mijares, que ha ocasionado el que se haya pasado de las 41pp de 1994 a las 3 actuales.

Otros tramos fluviales han perdido al chorlito chico en estos años como puedan ser los ríos Ana, Seco de Bechí y Onda, el Servol en San Jorge, La Rambla de Segorbe o el río Palancia.

Posiblemente las condiciones que rigen en nuestros cauces principales (Mijares, Palancia y Rambla de la Viuda), y concretamente los pantanos hacen que las condiciones de los cauces no sean las adecuadas para la especie en los cauces permaneciendo aguas abajo de las presas secos (algunos) y otros con las orillas totalmente cubiertas de vegetación.

La orografía montañosa de gran parte de nuestra provincia (Cauces encajonados) tampoco favorece a la especie al preferir ambientes abiertos.

El río Bergantes, junto a los últimos tramos del Caldés y Cantavieja, es un buen ejemplo del hábitat preferente de la especie en un río del interior (29 pp en 2007). El chorlito chico ocupa los tramos, con una cierta anchura del cauce (incluida la zona seca) con una corriente de agua lenta, y poca profundidad ó incluso zonas del río sin corriente continua, pero donde se mantengan charcas durante la época de reproducción. Suelos arenosos, gravosos o de cantos rodados, con vegetación escasa. Faltando como nidificante al desaparecer estas condiciones.

Tras periodos de lluvias torrenciales que pueden llegar a ocasionar

desembalses controlados, que modifican los cauces (eliminación de vegetación) o mantener cursos de agua en algunos cauces habitualmente secos, se pueden establecer chorlitejos chicos en estos ríos o ramblas (Rambla La Viuda, Río Seco en Bechí, Onda, Castelló etc.)

Durante 2007, se han localizado en estos hábitat 6 localidades de cría; Ríos Mijares, Belcaire, Servol, Bergantes (incluye Caldés y Cantavieja) y Rambla Cervera (en Càlig, Cervera).

El segundo hábitat en volumen de parejas reproductoras son la zonas húmedas, marjales y cultivos asociados, con un 31.6% del total. Sin embargo solamente un humedal, las marjales de Almenara, La Llosa, Xilxes y Moncofar, contiene el 90,7% de las parejas nidificantes en estos ambientes y esta población está asociada claramente al cultivo del arroz. En los humedales, el chorlitejo chico se establece cerca de corrientes (acequias) o masas de agua dulce en suelos limosos principalmente.

Desde el censo de 1994 se han localizado nidificando en 8 de estas zonas. Durante 2007 solo lo ha hecho en 4 marjales; Almenara, Castelló Prat de Cabanes Torreblanca y Benicarló.

Los pantanos pueden llegar a albergar importantes poblaciones en algunos años, como en 1997 con el 35,2% de la población total. Sin embargo como ya exponíamos anteriormente, estos ambientes pueden tener unas condiciones muy variables de un año para otro, según el volumen de agua embalsada, la abruptuosidad de las orillas y la vegetación de estas orillas.

Como ejemplos se pueden citar los censos del Pantano de María Cristina, con 2 Parejas en los años 1988 y 89. Durante los años 1994 a 1997 la población se mantuvo entre las 32 y 36pp bajando a las 11 pp en 1999 en 2007 han sido 13 las parejas presentes.

En el pantano del Sitjar en 1994 no nidificó ninguna pareja en 1997 fueron 15 pp, bajando 3 en 1999 y 2007.

Durante los censos realizados se ha constatado la reproducción en los

pantanos de: María Cristina, Sitjar, Regajo y Alcora.

En 2007 solo se localizaron en los tres primeros.

Las zonas industriales que ocupa el chorlitejo durante la reproducción, están todas ubicadas en el litoral o cercanías (exceptuando el polígono industrial de Almassora cercano al río Mijares) y en la mayoría de los casos emplazados sobre antiguos humedales o en cercanías de corrientes de agua dulce (ríos o acequias). Se han localizado en zonas como la Refinería de B.P. (en 1997 15 pp, habiendo disminuido estas a medida que se ocupaba el territorio por las actividades industriales, hasta llegar al 2007 con una sola pareja reproductora). Puertos de Castelló y Burriana, polígono Industrial de Almassora y Aeroclub de Castelló.

En ocasiones en estos ambientes llega a nidificar sobre asfalto u hormigón, algo también observable en la desembocadura del Belcaire.

La población en estas zonas se mantiene relativamente estable durante los años en que se ha controlado, oscilando entre el 7,6% y el 12,4% del total.

Graveras ó minas, dentro de este apartado, solo se han considerado como tales, (respecto a donde se ha observado reproducción) las minas de yeso de Segorbe con datos de cría solamente en 1997. En gravera asociadas a ríos, Bergantes, Millars, las poblaciones se incluyen dentro del apartado ríos y ramblas.

En estos ambientes, la problemática es similar a lo observada en pantanos, sumándose en algunos casos molestias derivadas de las actividades extractivas.

La nidificación del chorlitejo chico en playas litorales es algo reciente en nuestras comarcas, al menos según nuestros datos. Esta ocupación se constató en el año 2003 en las playas de Almassora, Nules, Burriana, Moncofar.

Desde entonces existen datos de reproducción también en Almenara, Xilxes, Serradal y Pinar en Castelló, Serratella de Burriana, Torreblanca y Oropesa. En todas estas playas los chorlitejos chicos se ubican

en las cercanías de corrientes de agua dulce, normalmente desembocaduras de ríos o acequias o zonas encharcadas. En alguna de estas áreas la especie viene manteniendo la presencia en los últimos años.

En otras sin embargo su presencia no es continua (según datos de censos parciales), desconociéndose el porqué de esta situación.

Respecto al número de reproductores es claramente superior al censo anterior (1999) y ligeramente inferior a los de los años 1999 y 1997. Sin embargo, en nuestra opinión, la especie está mejor representada que en los años anteriores en que se poseen datos totales. Una prueba de esto sería el mayor número de localidades de nidificación y la ocupación de nuevos hábitats (playas litorales).

Según nuestras observaciones, la población nidificante de chorlito chico, aumentaría después de episodios de fuertes lluvias, las avenidas producidas por estas lluvias "limpiarían" cauces de vegetación y aportarían agua a cauces habitualmente secos. Tras estos episodios, a medida que se vuelve a regenerar la vegetación la población iría en descenso. Esto se ha

observado por nosotros en el norte de Castelló mediante el seguimiento de estas poblaciones antes y después de las aguas del 2000 comparando la población de cada año. Algo también observado en Catalunya (Borràs & Junyent 1993).

La población del norte de Castellón en 1997 estaba estimada en 8 pp. en 2 localidades, En 1999 5pp en una sola localidad, tras las lluvias del año 2000, las poblaciones aumentaron, hasta llegar a las 43 pp (4 localidades) en 2004. A partir del año siguiente empezaron a reducirse hasta las 36 pp del 2007.

Según nuestros cálculos, las poblaciones de esta zona, continuarán descendiendo paulatinamente, a medida que aumente la ocupación por la vegetación de los cauces hasta que se produzca un nuevo episodio de abundantes lluvias con suficiente fuerza de arrastre para arrancar la vegetación.

Faltaría dilucidar (en estudio en la actualidad) que es lo que ocurre entre estos años de avenidas, si los índices de pluviosidad, inciden en el mayor o menor número de parejas reproductoras.

CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos, el chorlito chico está en aumento como reproductor en Castelló, algo también observado en Catalunya (Montras et al 2004) aunque sus poblaciones sufren fluctuaciones, en función de la pluviosidad, ahora bien, la especie se ha adaptado a

diversos ambientes antropizados como: Puertos, depuradoras, graveras, playas, lo que ha hecho aumentar el número de localidades y parejas.

No se ha observado ninguna problemática especial que pueda poner en riesgo sus poblaciones.

AGRADECIMIENTOS

Han colaborado en los censos; Carles Sales, Elvira Mondragón, Neus Avilés, Marcos Mata, Angel de Paz, Alfred

Mechó, Manolo Marco, Jorge Martinez Zarzoso, Vicent Agustí, Valentí Lesmes y Xavi Del Señor.

BIBLIOGRAFÍA

Birdlife internacional. european bird census count ch 2000. European bird populations estimates and trends Cambridge U.K.

Birdlife International (BirdLife Conservation Series N° 10).

Borras, A.& Junyent, E. 1993 Vertebrats de la Catalunya central. De la conca alta del Segre i de les Valls-alta i mitjana. Del Llobregat i Cardener Manresa Edicions intercomarcals.

Del Hoyo j, Elliott, A. & Sargant, J. (Eds) 1996 hand book of the Birds of the world. Vol 3 Hoatrin to Auks Lynx Edicions Barcelona.

Cramp & Simons. K.E.L.(Eds) 1983 The Birds of the Western Palearctic Vol II Oxford University Press.

Llopis, Ana. Sendra, Nacho & Prades, Ramón 2004. El chorlitejo chico (*Charadrius dubius*) en el Norte de Castelló. Efectivos Reproductores y distribución.

Anuario Ornitológico de Castelló 2004 Vol.2 pp 204 208.

Montras, T. Montalvo, T.& Figuerola Jordi Corriol petit *Charadrius dubius* in. Estrada, J. Pedrochi, V. Brotons, L & Herrando, S. (Eds) *Atles del ocells nidificants de Catalunya* 1999. 2002pp 216 217 Institut Català d'Ornitologia (ICO) Lynx Edicions. Barcelona.

Prades, T. & Ortíz, J. V. Efectivos y distribución de las aves limícolas nidificantes en la provincia de Castellón. 2º Censo (1997) Informe inédito.

Prades, R & Ortíz, J. V. Efectivos y distribución de las aves limícolas nidificantes en la provincia de Castellón 3º Censo (1999) Informe inédito.

Anexo II. Notas ornitológicas

EL LLUERET (*Carduelis spinus*) (Cas: Lugano)

José Antonio Martínez Pérez
Joan Castany i Álvaro
Associació Grup Au d'ornitologia

Desde fa 10 anys, temporada 1999, l'Associació Grup AU d'Ornitologia d'Onda, duu a terme en la partida "La Murtera" de la nostra localitat una **Estació d'Esforç Constant**, nom com es coneix en metodologia científica al fet d'anellar una vegada a la setmana en el mateix lloc, respectant rigurosament sempre les mateixes condicions. Aquesta s'hi ubica en un espai de regadiu on s'han substituït els tarongers per espècies autòctones (llentiscles, aladerns, oliveres, carrasques, sureres, lledoners, pins, arborcers, margallons, ...) i de jardí i on s'han instal·lat abeuradors i menjadores que concentren un important volum d'aus, permetent captures per tal d'assolir objectius com ara, les tendències poblacionals, l'anàlisi de supervivència, fenologia, distribució geogràfica, biometria ... de les poblacions que s'hi concentren. D'aquestes, hem triat la que ha produït més rendabilitat durant la hivernada 2007-08, el Llueret (*Carduelis spinus*).

Sistemàticament pertany a l'ordre dels Passeriformes i a la família dels Fringílids. Mesura 12 cm de llargada i 20 cm d'envergadura.

Trets significatius. En llatí el terme "*Lluer*" significa "cantor de l'alba" essent un dels ocells més matiners. Ve a ser del tamany del Gafarró i gosa de protecció administrativa a tots els nivells. No és un ocell considerat com de cant, a pesar dels silvestristes que intenten incloure'l en les seues llistes de caçables. De fet pateix les captures indiscriminades dels falsos silvestristes que els capturen de manera fàcil amb ocells de reclam ja que es tracta d'un ocell molt

confiat que ni tem ni estranya l'home. És molt fàcil de mantindre en captivitat i a les nostres comarques rep diferents noms: Tirori a Betxí, Llueret a Vila-real i Gabatxet a Onda. La seua presència fluctua d'any a any en funció de l'èxit reproductor i de l'abundància d'aliment a les àrees de cria que s'ubiquen en el centre i N d'Europa. Hi ha escampat, però, un preconcepte erroni sobre aquest ocell que pressuposa que migra una vegada cada tres o quatre anys; es tracta d'una creença popular errònia.

Alimentació. Fonamentalment granívora, menja llavors de Vern (*Alnus glutinosa*) (Castellà: Aliso), d'Oms (*Ulmus sp.*) de coníferes i d'eucaliptus; a casa nostra mostra especial preferència per les llavors d'Olivarda (*Inula viscosa*).

Conservació. La seua adaptabilitat i refiament el converteix en un animal indefens en mans de l'home. Tothom relacionat amb el món de l'ornitologia --ecòlegs, biòlegs, ornitòlegs, caçadors-- coneix les conseqüències de certes pràctiques relacionades amb la llaurança que acaben amb gran quantitat d'individus alats. Herbicides i pesticides els afecten de manera especial, trobant-se totalment "venuts" quan van a picotejar les llavors que hi ha als horts de tarongers. A aquest factor de selecció "artificial" cal sumar-li'n la derivada dels efectes de les pràctiques dels falsos silvestristes que els capturen i maten injustificadament.

Resultats hivernada 2007-08. Les captures s'han fet a l'atzar sense usar mètodes d'atracció sonora i usant quatre xarxes

japoneses. S'han capturat 286 exemplars: 192 joves (127 mascles, 31 femelles i 54 indeterminats –molts d'ells seran femelles) i 96 adults (48 mascles, 26 femelles). La presència de lluers durant la hivernada a casa nostra s'ha estès des de principis d'octubre a finals de març. La presència major de joves que d'adults és la que li pertoca a totes les espècies. El 60% de les

captures han segut de mascles i el 20% de femelles (20% de sexe indeterminat). Aquesta discriminació sexual pel que fa a la migració és comuna en moltes espècies tot i que el què és més habitual és que siguin les femelles les que migren i els mascles els que s'hi queden a les àrees de cria. Cal recordar el cas del Pinsà (*Fringilla coelebs*) i del Rossinyol bord (*Cettia cetti*).




Fig. 1. Fenologia (distribució temporal) del número de captures.




Fig. 2. Fenologia (distribució temporal) del número de captures distribuïdes per edats.




Fig. 3. Fenologia (distribució temporal) del número de captures adults.




Fig. 4. Fenologia (distribució temporal) del número de captures joves.

AGUILUCHO PAPIALBO (*Circus macrourus*). EL CASO DE CASTELLÓN

Josep Bort¹, Juan Capella², Juan Luis Bort³
¹jbor@internatura.org, ²juanvicapella@telefonica.net, ³juanlu@internatura.org


El aguilucho papialbo (*Circus macrourus*) es una especie migradora cuya población reproductora se ubica en el Paleártico, (Rusia, Kazajistán y noroeste de China), mientras que durante el invierno prácticamente toda la población se desplaza hacia los cuarteles de invernada situados principalmente por una parte en el África subsahariana y por otra en el sur de Asia (mapa 1).

La migración postnupcial se realiza mayoritariamente durante los meses de septiembre – octubre, aunque existen citas a mediados de agosto y principio de noviembre. La migración prenupcial se produce desde mediados de marzo a

mediados de abril, desplazándose a los lugares de nidificación en el paleártico. La población mundial se ha estimado entre 9 y 15 mil parejas mientras que la población europea se sitúa entre las 310-1200 parejas distribuidas por Azerbaiyán, Rumania, Turquía, Ucrania y Rusia occidental (BirdLife, 2008).

La ruta mayormente utilizada para desplazarse al sur es en diagonal a través del Sahara, citándose como divagante al N de Gran Bretaña, Países Bajos, España y Marruecos.

El hábitat utilizado son las estepas, herbazales secos, terrenos abiertos y ondulados (Ferguson-Lees, J. et al. 2004).




Ref.: del Hoyo et al. 1991-1999. www.hbw.com

Mapa 1.- Distribución de las áreas de cría e invernada del *Circus macrourus*.

EL CASO DE CASTELLÓN

Posiblemente sea un caso único el aparecido en Castellón, concretamente en la zona comprendida y conocida como la marjal de Xilxes y Almenara (mapa 1). El caso es que durante tres inviernos consecutivos, 2005 – 2006 – 2007, un ejemplar de esta especie ha sido observado, fotografiado y filmado en múltiples ocasiones. Consideramos que durante estos tres inviernos ha sido el mismo ejemplar el

que nos ha visitado, ya que desde el primer contacto realizado por Juanvi Capella a principio de febrero del 2005 y los sucesivos por Juan Luis Bort hasta el último por José Bort, se ha podido identificar a la especie por medio de fotografías y videos, donde se ven las características del plumaje y la evolución del mismo a lo largo de tres los años.



Mapa 1.- Áreas utilizadas en los distintos años por *Circus macrourus*. Marjal d'Almenara - Xilxes

- Área utilizada en el primer invierno (2004 – 2005)	Zona A 44,60 ha
- Área utilizada en el segundo invierno (2005 – 2006)	Zona B 40,17 ha
- Área utilizada en el tercer invierno (2006 – 2007)	Zona C 283,89 ha

PRIMEROS CONTACTOS: INVIERNO 2004 - 2005

La realización del primer contacto se tiene el 2 de febrero del 2005, sobre la zona de la marjal d'Almenara (zona A). Posteriormente y durante el mes de marzo fue observado en diversas ocasiones por distintos ornitólogos regionales.

En la observación del ave destaca la parte ventral con un plumaje de color rojizo uniforme (sin rayas), con infracobertoras también del mismo color y secundarias de color oscuro que contrastan

Pero lo que más nos llamo la atención fue el dibujo facial que presenta en forma de máscara, con una mancha negra alrededor del ojo que contrasta con la mancha blanca de debajo del mismo, destacando a distancia. Seguidamente se observa un collar blanco que rodea prácticamente todo el cuello separando las partes oscuras de la cara con la del cuello. Por la parte superior destaca el obispillo de color blanco que sin ser muy grande se observa a gran distancia contrastando con un plumaje de color marrón oscuro. Durante este invierno la última cita se produjo el día 22 de marzo 2005 (cita de David Olmos).

La superficie utilizada fue alrededor de 45 ha, en la Marjal d'Almenara, caracterizada por campos de arroz cortados e inundados, junto a zonas de vegetación palustre, carrizales y cultivos de

hortalizas y verduras (tomates, pimientos,...), lugares donde potencialmente alberga gran cantidad de micromamíferos y gran diversidad de aves de pequeño tamaño



Foto 1. *Circus macrourus*. 2-febrero-2005. Autor: Juanvi Capella



INVIERNO 2005 – 2006

Durante el segundo invierno, se observa el 5 de diciembre 2005 a la rapaz más hacia el norte que en el invierno anterior, concretamente en la marjal de Xilxes situada al norte de la marjal d'Almenara. Esta zona se caracteriza por ser una pequeña extensión de cultivo de regadío principalmente de cultivo de tomates, hortaliza y melones con una extensión muy reducida, 40 ha. (zona B).

En este punto son múltiples los contactos que se tienen con el ave fotografiándola y filmándola casi a diario. Nos llama la atención el vuelo rápido a baja altura que realizaba comparado con el aguilucho pálido (*Circus cyaneus*) y el aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*) que también están presentes en esta pequeña marjal durante todo el invierno.



Mapa 2.- Zona B (marjal de Xilxes), 40,17 ha, invernada 2005-2006.

Lo seguimos distinguiendo por la parte ventral de color rojizo, pero en esta ocasión presenta pequeñas estrías blanquecinas dando un aspecto emborronado, ya no es el tono rojizo uniforme del primer invierno. En la parte inferior de las alas sigue distinguiéndose las secundarias más oscuras que contrastan con las primarias mucho más blancas y barreadas (foto 2). Por la parte superior, el

obispillo blanco sigue detectándose desde lejos, con una tonalidad marrón oscura en toda la parte dorsal y superior de las alas que sólo es rota por una pequeñas manchas longitudinales ocre en la parte de las escápulas, que también son visibles desde lejos, junto a unas alas largas y estrechas que nos lo hacen distinguir de la hembra de *C. cyaneus*. En la cabeza y cara se distinguen las marcas faciales en forma de máscara, destacando la mancha blanca entre el ojo y la mancha negra de la mejilla, que junto al collar de color blanco lo hacía inconfundible.



Foto 2: 12/12/2005. Autor: Juan L. Bort

Básicamente todos los días que nos desplazábamos a la marjal de Xilxes observábamos al *C. macrourus*, debido a que el espacio utilizado para conseguir alimento era muy reducido (unas 40 ha.) y con gran visibilidad, siendo muy raro el que hiciera desplazamientos lejos de este enclave, de hecho nosotros no observamos ninguno en los días de control.

La técnica de caza observada es similar a las de los otros tipos de aguiluchos, consistiendo en desplazamientos rectilíneos a baja altura sobre la vegetación y campos de cultivos abandonados, observando detenidamente el suelo, cuando detecta una posible presa, da un giro sobre sí mismo abriendo totalmente las alas y la cola (postura típica de los

aguiluchos), dejándose caer entre el matorral, o manteniéndose a escasa distancia del suelo batiendo las alas y con las patas colgando hasta que se dejaba caer al suelo, muy similar a lo observado con *C. aeruginosus*. En alguna ocasión muy aislada se han observado pequeñas persecuciones sobre passeriformes que han terminado todas en fracaso.

Entre *C. macrourus* y *C. cyaneus* no hemos observado escaramuzas de picados ni peleas, estando por regla general volando juntos por las mismas zonas, sin embargo si que hemos observado persecuciones y picados incluso a grandes alturas entre el *C. macrourus* y los *C. aeruginosus*.

TERCER INVIERNO 2006 – 2007

Por tercer invierno consecutivo hemos podido disfrutar de la presencia de *C. macrourus* en la marjal de Xilxes, el primer contacto fue el 27 de noviembre 2006. El individuo detectado presenta su plumaje similar a una hembra adulta. Se observa que la parte ventral ha dejado de tener esa tonalidad rojiza que destacaba junto con el obispillo blanco, para pasar a un abdomen blanco listado densamente de marrón. La máscara facial no es tan marcada y aunque se ve la separación entre la cabeza con el resto del cuerpo por una ligera línea blanca a modo de collar (foto 3), sólo se ha podido



Foto 3: El 27/11/2006. Autor Josep Bort

Otra forma de caza, que pensamos utilizan aunque no la hemos podido ver en desarrollo, es similar a la utilizada por los Busardos ratoneros (*Buteo buteo*) y Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*), también presentes en la zona. En varias ocasiones se ha visto y fotografiado a este tipo de aguilucho posado en las ramas de árboles de mediano y gran porte oteando los alrededores, desconocemos si desde estas posaderos se lanzan a la captura de presas o simplemente son puntos de descanso, aspecto no observado en *C. cyaneus*.

La última cita de este periodo fue el 3 de marzo 2006 (cita de Josep Bort)

detectar en las fotos realizadas y no en vuelo por lo que en este tercer invierno nos ha hecho dudar a la hora de identificarla y distinguirla de *C. cyaneus* hembra presente en la zona. Por la parte dorsal el obispillo blanco sigue llamando la atención pero de una forma más discreta, destacando sobre las partes marrones del dorso y partes superiores de las alas (foto 4)



Foto 4: El 27/11/2006. Autor Josep Bort

Para identificarlo lo hacíamos más por el aspecto general del ave y por la conducta que por las características del plumaje. Nos llamaba mucho la atención los vuelos rápidos y rasos sobre la vegetación con una


silueta estilizada (alas largas y estrechas y cola bastante larga), yendo de un sitio a otro, con giros rápidos y aleteo también rápido, dejándose caer entre el matorral y saltando rápidamente, que contrastaba con la hembra de *C. cyaneus* con un vuelo mucho más pausado y pesado, con alas más anchas dando un aspecto más robusta, características que se pueden apreciar en las fotos. Además nos basábamos para su identificación en signos indirectos como las trayectorias utilizadas. Durante este tercer invierno, el *C. macrourus* realizaba desplazamientos muchos más largos tanto hacia el norte (desembocadura del río Belcaire) como hacia el sur (marjal d'Almenara), ampliando en gran medida el nº de hectáreas, respecto a los inviernos anteriores (zona C), utilizando alrededor de 280 ha., y tardando cada vez más en volver a la zona de la marjal de Xilxes (mapa 3).

En este periodo una de las claves para la identificación de la especie y separarla de *C. cyaneus* fue contabilizar el número de plumas primarias que presentan


cada tipo de aguilucho en concreto el *C. macrourus*, presenta 4 primarias claramente distinguibles, mientras que *C. cyaneus* presenta 5 plumas primarias (Porter, R. et al. 1994), diferencia que en el campo no pudimos comprobar en ningún momento, y solo se pudo hacer a través del material fotográfico (dibujos 1).



Mapa 3.- Zona C (marjal de Xilxes), con 283,89 ha, invernada 2006 -2007.



CIRCUS MACROURUS



CIRCUS CYANEUS

CONCLUSIONES:

Podemos estar ante un caso de aves erráticas desviadas de la ruta normal de migración postnupcial, posiblemente por fenómenos atmosféricos (fuertes vientos, tormentas importantes, etc.), que harían que unos pocos ejemplares se unieran a otras especies similares y más occidentales, para desplazarse hacia el sur, llegando al continente africano a través de la Península ibérica.

Lo curioso de este caso es la observación de probablemente el mismo ejemplar en tres inviernos consecutivos 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007 y en la misma zona, marjal d'Almenara - marjal de Xilxes, con apenas 40 ha, y que se caracterizada por presentar cultivos de hortalizas, frutas y verduras terrestres (melones, tomates, pimientos, etc.), muchos de los cuales no son cosechados durante el verano - otoño y quedan a merced de las aves y roedores de la zona, que aumentan tanto en el número como en especies durante el invierno. Además se unen a estos

cultivos abandonados, las zonas de carrizos y canales de agua que producen gran cantidad de recursos tróficos para una gran mayoría de la fauna invernante y local, por eso en esta pequeña marjal encontramos otras aves rapaces como aguilucho lagunero (*C. aeruginosus*), aguilucho pálido (*C. cyaneus*), busardo ratonero (*Buteo buteo*), gavián (*Accipiter nisus*), cernicalo vulgar (*Falco tinnunculus*), aguililla calzada (*Hieraetus pennatus*), incluso jóvenes de águila azor perdicera (*Hieraetus fasciatus*), lechuza campestre (*Asio flammeus*) que conviven todos en esta pequeña extensión.

La última observación la realizamos el 9 de febrero del 2007 (cita de Josep Bort), esperando que este invierno 2008 - 2009, tengamos la oportunidad de seguir disfrutando de esta extraordinaria ave rusa (foto 5).

Nuestra pregunta sigue en el aire, ¿donde ha permanecido durante los meses de ausencia en Castellón?



Foto 5: El 13 de enero del 2007. Autor: Juanvi Capella

BIBLIOGRAFÍA:

BirdLife Internacional (2008). Especies

ficha: *Circus macrourus*.

<http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3409&m=0>.

Detailed species account from *Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status* (BirdLife International 2004):

<http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp3409.pdf>

del Hoyo, J., Elliott, A. and Sargatal, J.

(1994) *Handbook of the Birds of the World*.

Lynx Edicions, Barcelona.

Ferguson-Lees, J., Christie, D.A. (2004): *Rapaces del Mundo, Guía de identificación*. Ed. Omega, pag. 144 y 518-521

Porter, R. Willis, I., Christensen, S. Pors, B. (1994): *Rapaces europeas, Guía para identificarlas en vuelo*. Eds. Perfils, pag. 99-101.

Status of Migratory Raptors in Africa and Eurasia. September 2005


http://www.cms.int/bodies/meetings/regional/raptors/pdf_docs/Inf_08_Status_Report_Raptors_AERegion.pdf

INFORME DE RAREZAS NACIONALES Y PROVINCIALES 2007

Manolo García Tarrasón (manologt84@hotmail.com)

Este año ha sido realmente fructífero en cuanto a rarezas ornitológicas citadas, lo que demuestra que cada vez es mayor la cobertura del territorio y el nivel general de los observadores va en aumento. El presente informe pretende ser un recuento de las rarezas citadas en la provincia durante el 2007, dando pinceladas de información sobre su biología, ecología y patrón de aparición en la provincia. Se tratan todas las rarezas nacionales (aguilucho papialbo,

guión de codornices, mosquitero de Pallas, papamoscas papirrojo), así como las rarezas locales más escasamente citadas en la provincia (malvasia cabeciblanca, gaviota de Delaware, alcaudón dorsirrojo, mosquitero ibérico). También destaca una sorprendente citación de un probable híbrido de alcaudón dorsirrojo x alcaudón común, muy escasamente registrados en Europa.



Mapa con la localización provincial de las rarezas citadas en este informe.
(Los números indican la especie descrita a continuación)



1. Malvasía cabeciblanca – Ànec capblanc WHITE-HEADED DUCK

Oxyura leucocephala Scopoli 1769

Foto © David Olmos – Marjal de Almenara – 26/08/2007

Anátida catalogada como en Peligro (EN) con una distribución muy fragmentada en el Paleártico, debido a sus específicos requerimientos de hábitat. Presenta dos subpoblaciones bien diferenciadas. Una migradora que cría en una extensa área de Asia central (Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, China, Mongolia...) y que inverna desde Rumanía, Bulgaria y Grecia por el este hasta Pakistán. La otra, mucho más sedentaria y reducida, ocupa zonas muy localizadas de la cuenca mediterránea como España, Marruecos, Túnez, Israel y Turquía.

La malvasía es muy buena buceadora, pero prefiere charcas y lagunas poco profundas, normalmente de menos de 1 metro de profundidad. Necesita amplias zonas abiertas flanqueadas por densa vegetación emergente para darle cobertura durante la nidificación (BWPI 2004). La población española se calcula en torno a 2.300 ejemplares (Martí & del Moral 2003) con su mejor enclave en El Hondo de Alicante.

Sin duda, actualmente la principal amenaza sobre la especie es la hibridación con la malvasía canela (*Oxyura jamaicensis*), especie americana que se introdujo en Inglaterra sobre 1940 y que rápidamente se ha expandido por muchos

países europeos. Esto supone un grave problema de conservación puesto que la descendencia híbrida es fértil. En poblaciones muy pequeñas como es el caso de nuestra malvasía, esta hibridación puede empobrecer de forma notoria el acervo genético original. El problema se agrava puesto que el macho de malvasía canela desarrolla una parada nupcial más elaborada y que atrae más a las hembras de cabeciblanca, unido a su carácter poligínico capaz de fecundar a muchas hembras de una laguna. Todos los ejemplares de malvasía canela observados deben ser comunicados a las autoridades para ser eliminados lo antes posible (U.T.E./Sylvática 2002).

En nuestra provincia está considerada una rareza local, con muy pocos registros a lo largo de la historia. Hasta este año únicamente fue citada en el año 2000, en la Desembocadura del río Mijares. El 26-09-2000 aparecieron 4 ej. (2 adultos y 2 juveniles). Del 14 al 18-10-2000 aparecieron en la misma localidad 3 ej. (2 machos y una hembra), quedando 2 ej el 25-10-2000 (Polo & Polo 2005). Este año 2007 hemos recibido otra cita más, una hembra de fase oscura el 26 de agosto en la Marjal de Almenara. Esperemos que se sigan acumulando los registros de esta escasa anátida.



2. Aguilucho papialbo – Arpella pàl·lida russa

PALLID HARRIER

Circus macrourus Gmelin 1771

Foto © Juanvi Capella – Marjal de Xilxes – 13/01/2007

Aguilucho con similares requerimientos ecológicos que nuestro aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), con el que se superpone en los hábitats estépico y semidesiertos del sur de Rusia. Ha sufrido un fuerte declive poblacional, probablemente debido a la intensificación de la agricultura en la estepa rusa.

Migrador de larga distancia, sus cuarteles de invernada se sitúan principalmente en el subcontinente indio y el África subsahariana. Sin embargo, se dan escasos casos de invernada en localidades del norte de África, los Balcanes, Turquía y Oriente Medio, dentro de los cuales se encuadraría la cita de este año de Castellón. Normalmente abandona las zonas de cría entre finales de agosto y principios de octubre, para regresar a ellas principalmente

durante el mes de abril. La ruta de migración postnupcial está descrita como más oriental que la prenupcial (es en primavera cuando se detecta un abundante paso por Libia, Túnez y Argelia) (BWP 2004) sin embargo en nuestra provincia ha sido detectado únicamente en época postnupcial.

Durante los meses de enero y febrero de 2007 ha sido detectada una hembra invernando en la Marjal de Xilxes. Con toda probabilidad es el mismo ejemplar que invernó en la misma localidad los inviernos de 2005 y 2006. Es la única cita homologada para la provincia, aunque no es la única (otra cita de un joven en el Desert de les Palmes el 29-09-2002 fue revocada posteriormente por los autores):

Fecha	Individuos	Lugar	Referencia
10-09-1988	1 macho	Torremiró	Dies & Dies AOCV 1988 - 1994
Desde el 15-02-2005 inviernos 05-06-07	1 hembra	Marjal de Xilxes y Almenara	Luque & Ortiz 2007 Tirado & Esteller 2008 Este anuario



3. Guión de codornices – Guatlla maresa CORNCRAKE

Crex crex Linnaeus 1758

Foto © Vicent Esteller – Islas Columbretes – 21/09/2007

Enigmática especie que pasa muy desapercibida debido a sus hábitos retraídos. Migradora de larga distancia. Cria por Europa de manera fragmentada, desde Irlanda, G. Bretaña y Francia por el norte hasta el sur de Escandinavia, y por el este hasta Rusia y Siberia occidental. Ha sufrido un declive espectacular en Europa occidental, principalmente debido a la mecanización de la agricultura que ha hecho adelantar la siega de los cultivos, destruyendo muchos nidos para una especie tardía en criar como es el guión de codornices.

Inverna presumiblemente en la mitad este del África subsahariana, como hacen otras gruiformes migradoras – como las del genero *Porzana*- (BWP 2004). El paso prenupcial se da principalmente desde

marzo a mayo, y el postnupcial comienza en agosto y principalmente septiembre (cuando algunos ejemplares son cazados en nuestro país confundidos con codornices).

Su nombre se debe a que antaño era mucho más numerosa y era una pieza bien conocida por los cazadores. Normalmente llegaba antes o a veces integrada en los bandos de codornices, lo que le valió este apodo por creer que guiaba los bandos de codornices.

El 21 de septiembre fueron encontrados restos de 2 ej. en nidos de halcón de Eleonor, una rapaz especializada en cazar migrantes. Esto nos dice que, aunque de manera muy escasa, esta ave pasa por nuestras tierras. No es la única cita conocida para la provincia:

Fecha	Individuos	Lugar	Referencia
25-09-1990	1 anillado	Islas Columbretes	Clavell 2002
02-10-2002	1	Islas Columbretes	Polo & Polo 2005
21-09-2007	2	Islas Columbretes	Este anuario



4. Gaviota de Delaware – Gavina de Delaware
RING-BILLED GULL
Larus delawarensis Ord 1815

Foto © Josep Bort – Playa de Borriana – 25/02/2007

Gaviota americana que se reproduce en Norteamérica (oeste y centro de Canadá, zonas próximas de Estados Unidos y los Grandes Lagos). Inverna en las costas del Pacífico y Atlántico del Caribe y Centroamérica, y ocasionalmente el interior de EEUU. Es el accidental americano más común en Europa, con un aumento espectacular de citas en el último medio siglo (no se citó en las Islas Británicas hasta 1973, en 1985 había 449 registros) (De Juana 2006). En España ha sido retirado de la lista de rarezas nacionales desde el 1-1-2006 debido a que se cita cada invierno y es considerado invernante regular en la costa

atlántica. En el Mediterráneo es mucho más escaso.

Para este año 2007 recogemos citas referentes a un individuo adulto, con toda probabilidad el mismo que se viene observando durante todos los inviernos en la misma localidad desde marzo de 2005, cuando era un 1er invierno. Este año ha abandonado nuestra provincia en el mes de marzo para volver a invernar a partir de noviembre, lo que encaja perfectamente con su patrón de migración y aparición en la Península.

Con éste son dos los individuos citados en la provincia.

Fecha	Individuos	Lugar	Referencia
7 al 15-11-2002	1	Playa del Serradal (Castellón)	Polo & Polo 2005
Desde el 15-03-2005 inviernos 05-06-07	1	Playa de Borriana	Luque & Ortiz 2007 Tirado & Esteller 2008 Este anuario



5. Mosquitero de Pallas – Mosquiter reiet

PALLAS'S LEAF WARBLER

Phylloscopus proregulus Pallas 1827

Foto © Vicente Ferris – Columbretes – 29/04/2007

Divagante raro a nuestra región que cría en bosques de coníferas de latitudes medias y bajas del este del Paleártico, desde el Macizo de Altai por el sur hasta el centro de China, Himalayas y la frontera de Afganistán. Las poblaciones meridionales se mueven poco, principalmente en altitud, pero las norteñas son muy migradoras y tienen sus cuarteles de invierno en el sur de China, India y norte de Tailandia (BWPI 2004). Estas aves emprenden su migración postnupcial entre finales de agosto y septiembre, regresando a las áreas de reproducción en mayo.

En algunos países como Gran Bretaña acumulaban en 2002 casi 1.500 registros la inmensa mayoría otoñales, mientras que en España hasta 2007 sólo había 6 registros de los cuales 4 eran primaverales. El hecho de que haya muchísimos más registros en el norte de Europa y Gran Bretaña, y en cambio sean bastante escasos en Irlanda y el sur de Europa, ha hecho pensar que quizás esto no se debe a pura divagancia. Esta diferencia

de número de citas y el hecho que haya desfase en los máximos de abundancia (en el N de Europa y GB a principios de octubre, en Francia y las otoñales de España a finales de octubre) ha hecho pensar que quizás se debe a una gran dispersión postnupcial por el norte de Europa hasta llegar a GB, para luego volver a sus lugares de invernada naturales en un proceso de migración revertida ya conocido para algunas especies (De Juana 2006).

La abundancia de registros primaverales en España puede hacer sospechar de que una pequeña parte de la población inverna en África y que las aves son detectadas en su migración prenupcial. En 2007 han sido anillados dos ejemplares en las Islas Columbretes (el 29 de abril y el 13 de Noviembre). La Comunidad Valenciana no contaba con ningún registro, por lo tanto estas dos citas suponen las primeras para la comunidad y la 7ª y 8ª cita para España. Así, las citas nacionales se distribuyen de esta forma:

Fecha	Individuos	Lugar	Referencia
17-04-1987	1	Cazorla (Jaén)	De Juana 2006
12 al 15-4-1995	1	Pollença (Mallorca)	De Juana 2006
26-10-1997	1	Artà (Mallorca)	De Juana 2006
19-03 al 8-04-2000	1	Barcelona	De Juana 2006
29-04-2001	1	Chafarinas (Melilla)	De Juana 2006
18-10-2005	1	Delta del Ebro (Tarragona)	De Juana 2006
29-04-2007	1	Islas Columbretes (Castellón)	Este anuario
13-11-2007	1	Islas Columbretes (Castellón)	Este anuario



6. Papamoscas papirrojo – Papamosques menut

RED-BREASTED FLYCATCHER

Ficedula parva Bechstein 1794

Foto © Jennifer Andreu – Columbretes – 11/10/2007

Papamoscas con una vasta distribución geográfica como reproductor, desde el sur de Suecia, este de Alemania y norte de los Balcanes hasta el Pacífico. Puede que se halle en expansión hacia el oeste, lo que explicaría un aumento de citas en Europa occidental. Se trata de una especie altamente forestal, las poblaciones europeas crían principalmente en bosques mixtos y caducifolios de *Fagus*. Muy migradora, tiene los cuarteles de invierno en el sur de Asia, principalmente India y Pakistán. Suele abandonar las áreas de cría

en agosto-septiembre, volviendo a ellas en mayo (BWPI 2004).

El 11 de octubre de 2007 fue anillado un ejemplar en Columbretes. Con éste ya son 19 los ejemplares citados en la provincia de Castellón de esta rareza nacional, muchos de ellos no sometidos a homologación. Todas las citas provinciales son de las Islas Columbretes en otoño. Las citas que tenemos constancia desde 1985 hacen referencia a Septiembre (12 ej.), Octubre (6 ej.) y Noviembre (1 ej.).

Fecha	Individuos	Lugar	Referencia
22-09-1985	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
01-10-1985	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
08-10-1985	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
16-10-1985	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
28-09-1987	2	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
14-09-1991	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
27-09-1991	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
18-09-1992	2	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
19-11-1992	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
09-10-1993	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
26-09-1995	3	Islas Columbretes	Gómez-Serrano <i>et al.</i> 2000
27-09-1996	2	Islas Columbretes	Gómez-Serrano <i>et al.</i> 2000
07-10-2002	1	Islas Columbretes	Polo & Polo 2005
11-10-2007	1	Islas Columbretes	Este anuario

7. Alcaudón dorsirrojo - Capsot d'esquena roja

RED-BACKED SHRIKE


Lanius collurio Linnaeus 1758

Especie migradora de larga distancia, bien distribuida por prácticamente toda Europa y Asia occidental durante la cría. En la Península Ibérica sólo ocupa el tercio norte, a nivel del mar en Galicia pero ocupando las zonas montañosas en las zonas más meridionales (norte de los sistemas Central e Ibérico) (Martí & del Moral 2003). Principalmente habita zonas abiertas, estepas y ambientes continentales. Inverna en el este y sur de África. Según la bibliografía, la migración prenupcial en primavera es más oriental que la postnupcial, ascendiendo por el este de África e Israel y ocupando toda Europa de este a oeste. El alcaudón dorsirrojo abandona sus zonas de cría mayoritariamente entre mediados de agosto y principios septiembre, volviendo a

ocuparlas en mayo (incluso bien entrado este mes) en Europa occidental (BWPi 2004).

En nuestra provincia está considerada una rareza local ya que queda fuera de su área de distribución. Sin embargo se acumulan unos cuantos registros de esta especie, para este año recibiendo una nueva cita (5 de junio en el embalse de María Cristina, L'Alcora) que probablemente hace referencia a una llegada prenupcial. Curiosamente, un alcaudón dorsirrojo también fue citada hace justo 10 años en el mismo embalse en fechas parecidas, un 26 de junio de 1997. El total de las citas hace referencia a 13 individuos que se reparten entre marzo (1 ej.), mayo (2 ej.), junio (5 ej.), agosto (3 ej.), septiembre (1 ej.) y octubre (1 ej.).

Fecha	Individuos	Lugar	Referencia
15 y 16-06-1987	1 macho	Ptos Tort-Bec. (Tinensa de Benifasar)	Ardeola 35 (2), 1988: 297-316
29 y 31-08-1987	2 (1 pareja)	Ptos Tort-Bec. (Tinensa de Benifasar)	Ardeola 35 (2), 1988: 297-317
25-05-1989	2	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
06-06-1989	1 macho	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
29-08-1992	1 hembra	La Vall d'Uixó	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
31-03-1994	1	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
07-06-1994	1 hembra	Islas Columbretes	Dies & Dies AOCV 1.988 - 1.994
26-06-1997	1	Embalse M ^a Cristina (L'Alcora)	Gómez-Serrano <i>et al.</i> 2000
13 y 14-09-2002	1	Ares del Maestre	Polo & Polo 2005
8 al 10-10-2006	1 joven	Alcossebre	Tirado & Esteller 2008
05-06-2007	1 macho	Embalse M ^a Cristina (L'Alcora)	Este anuario



8. Alcaudón dorsirrojo x Alcaudón común RED-BACKED SHRIKE X WOODCHAT SHRIKE

Lanius collurio x senador

Foto © Des Norden – Alcossebre – 29/04/2007

Ejemplar citado inicialmente como alcaudón dorsirrojo el 29 de abril de 2007 en Alcossebre. Un análisis posterior cuando fueron recibidas las imágenes demostró que este *Lanius* no se ajustaba estrictamente a ninguna especie del Paleártico occidental, pero que presentaba caracteres intermedios que hacían pensar en un híbrido. De hecho, este alcaudón es extremadamente similar a un probable híbrido de alcaudón dorsirrojo x alcaudón común anillado en Malta. Son muy escasos los híbridos con estas características, y desconocemos si se han citado alguna vez en España.

Presenta características de alcaudón dorsirrojo, como es la cabeza grisácea, el pecho rosado y el pico aparentemente fino. Sin embargo, se puede ver que el antifaz muy ancho en la frente no

es típico de alcaudón dorsirrojo, pero sí que lo es de alcaudón común y de alcaudón chico. Aunque la foto está quemada, lo que hace decantarse por alcaudón común en lugar de chico es que parece que presenta muy poco blanco en el ala, blanco en las escapulares, y el antifaz es muy ancho por detrás del ojo (en alcaudón chico es más fino).

Por lo tanto, sin medidas, fórmula alar y conocimiento de la extensión total del panel alar es muy difícil asegurar de que tipo de híbrido se trata. Sin embargo, debido a las características comentadas anteriormente, lo más prudente es hablar de un probable híbrido de alcaudón dorsirrojo x común (*Lanius collurio x senador*). Esto es lo que han hecho malteses, alemanes y belgas con aves similares (David Bigas, com. pers.).




Foto © Des Norden – Alcossebre – 29/04/2007

9. Mosquitero ibérico – Mosquiter ibèric IBERIAN CHIFFCHAFF

Phylloscopus ibericus Ticehurst 1937

Especie estival todavía bastante desconocida, ya que se ha escindido recientemente del mosquitero común (*Phylloscopus collybita*), del que antes era una subespecie. No todos los individuos se pueden identificar con seguridad. Muy similar en el campo al mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*) por su coloración y estructura, la mejor forma de identificarlo suele ser su reclamo y canto característico. En mano, con un poco de experiencia y la ayuda de la fórmula discriminante de Svenson (Svenson 2001), se puede llegar a separar a una gran parte de los individuos del mosquitero común (*P. collybita*). Más información en Identificació de *Phylloscopus ibericus* www.ornitologia.org/utilitats/utills2.htm

BIBLIOGRAFÍA

Ardeola 35 (2), 1988: 297-316. Sociedad Española de Ornitología.

BWPi (2004). *The Birds of the Western Palearctic 1.00*. Birdguides, Shrewsbury.

Clavell, J. (2002). *Catàleg dels ocells dels Països Catalans*. Lynx Edicions, Barcelona.

De Juana, E. (2006). *Aves raras de España: un catálogo de las especies de presentación ocasional*. Lynx Edicions, Bellaterra.

Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana*. 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994. Generalitat Valenciana. Valencia.

Gómez-Serrano, M. A., Giménez, M., Dies, J.I., Dies, B. & Monsalve, M.A. (2000). *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1995-1997*. Estación Ornitológica de l'Albufera (SEO/Birdlife). Valencia.

Se distribuye principalmente por la mitad occidental de la Península, pero sus límites no están claros. En la zona mediterránea se comporta como migrante raro en época primaveral principalmente, no citado todos los años.

Esta cita del 15 de junio en Gaibiel supondría la 3ª conocida para la provincia. Hay que tomarla con cautela puesto que puede hacer referencia a un macho reproductor, y hasta ahora todos los registros de reproducción de mosquiteros en Castellón hacen referencia al mosquitero común (*P. collybita*) como el anillamiento de un juvenil en junio de 2002 en una zona cercana a la cita de este año (Sierra de Espadán). Prospecciones específicas serían necesarias para conocer el estatus de estos mosquiteros en Castellón.

Luque, E. & Ortiz, J.V. (Coord.) 2007. *Anuario Ornitológico de Castellón 2005*, Vol. 3. www.internatura.org/aocs

Martí, R., Del Moral, J.C. (Eds.) (2003). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Sociedad Española de Ornitología, Madrid.

Polo, A. & Polo, M. (eds.) (2005). *Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002*. Societat Valenciana d'Ornitologia. València

Svenson, L. (2001). *The correct name of the Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus Ticehurst 1937, its identification and new evidence of its winter grounds*. Bull. B.O.C. 121(4): 281-296.

Tirado, M. & Esteller, V. (Coord.) 2008. *Anuario Ornitológico de Castellón 2006*, Vol. 4. www.internatura.org/aocs

U.T.E./Sylvática (2002). *La Malvasía en el Mediterráneo Occidental*. U.T.E. Consultoria de Recursos Naturales S.L. y Sylvática, Estudio y Gestión del Medio Natural, S.L.

SEGUIMIENTO DE AVES RAPACES EN EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓ 2007

Ángel de Paz, Sergi Marzá, Ana Llopis, Martí Surroca y Ramón Prades.

Colaboran: Alberto Seco, Juanjo Palomo, Isidro Casanova y Cesar Colomer

INTRODUCCIÓN

Continúa el seguimiento de este grupo de aves en el NO de la provincia de Castellón, aportándose tanto datos sobre especies nidificantes, como migrantes, invernantes o dispersivas. En este artículo se ofrece la información de reproducción obtenida durante el año 2007.

Municipios del NorOeste: Morella, Ares, Vilafranca, Castellfort, Portell de Morella, Cincorres, La Mata, Olocau, Todolella, Forcall, Villorres, Ortells, Palanques, Sorita y también a alguna zona aledaña con las cuadrículas UTM 10x10 siguientes; YL 31, YL 30, YL41, YL40, YL50, YL20, YL29, YL39, YK49, YK59, YK28, YK38, YK27, YK37, YK48, YK58, YK47, YK57).

METODOLOGÍA

Solamente sobre algunas especies se realiza un seguimiento todo lo exhaustivo que se puede tanto sobre reproducción como número de parejas reproductoras y localización de estas especies, serían; buitre leonado, alimoche, aguilucho cenizo, águila real y águila azor perdicera.

En el resto de especies, depende del tiempo que se pueda o quiera emplear en su seguimiento. Algo que especialmente se nota en lo que a nocturnas concierne, con pocos datos sobre ellas comparado con las diurnas.

MILANO NEGRO

13 son las pp en que se estima la población reproductora (1 más que en 2006)

En 5 pp se constata la reproducción aunque no se obtiene éxito reproductor.

ALIMOCHE

6 son las parejas presentes en la comarca, se han obtenido información sobre 5 (la última en instalarse no ha ocupado el nido conocido). Sospechándose que haya desaparecido del territorio.

De las otras 5, han volado 5 pollos, uno por nido. Como curiosidad comentar que estas 5 parejas han repetido todas la nidificación en el mismo nido del año anterior.

BUITRE LEONADO

Continúa el descenso, tanto en el nº de parejas reproductoras como en el éxito reproductor pasando de las 70 parejas del año 2006 a las 56 este año y descendiendo el éxito reproductor a un 0,46 el más bajo desde que iniciamos este seguimiento. Sin lugar a dudas los 127 ej. de la especie muertas en 2007 por los aerogeneradores tienen algo que ver. La especie se ha reproducido o lo ha intentado hacer en 12 colonias en la zona. Con una nueva localidad en Ares.

ÁGUILA CULEBRERA

De las 20 pp. en que cifrábamos la población hemos eliminado 1 por dudas de que se trate de la misma por lo que el nº actual es de 20 por localizarse una nueva pareja no conocida en Portell. De estas pp en 3 casos se ha seguido la reproducción volando el pollo en las 3. En otras 4pp se ha constatado la reproducción. Del resto solo se tienen avistamientos.

AGUILUCHO CENIZO

Respecto a la presencia como nidificante de la especie en Morella, no hay datos concluyentes habiéndose observado 1 joven el 10/07, 2 jóvenes + 1♀ el 18/07 y 1♂ el 19/07, aunque estos datos parecen concluyentes, también se puede tratar de ejemplares en dispersión procedentes de otras zonas.

En Catí, población no contemplada en este seguimiento, las parejas de cenizos han pasado de 3 a 11 repartidas en 3 núcleos.

AZOR

En 2006 hablábamos de 28 pp reproductoras, este año se ha eliminado una ya que existen dudas dada la proximidad a otra pareja y se incluyen 2 nuevas parejas (Ares y Cincorres) lo que la población actual conocida se estima en 29 pp.

De estas 29 se ha obtenido información de 18 siguiendo la reproducción en 4 nidos con una media de 2 pollos/nido. Destacar que uno de los nidos controlados fue expoliado, primer caso que conocemos en esta zona, desde que iniciamos el seguimiento.

GAVILÁN

Pocos datos este año en que solo se ha obtenido información de reproducción segura en 2 casos, curiosamente en 2 pp nuevas para este año ubicadas en Morella y Vilafranca.

BUSARDO RATONERO

De estas pp se ha obtenido información sobre 19 aunque tampoco este año se ha podido seguir la reproducción completa en ningún caso. Ahora bien en 5pp se ha observado los pollos ya volantones dando una media de 1,8 pollos/pareja.

ÁGUILA REAL

10 son las pp controladas este año en la zona en estudio (las mismas que el año anterior.) De estas 10 pp se ha obtenido

información sobre la reproducción en 9 casos con los resultados siguientes:

- 4 pp sacan 1 pollo
- 1 pp sacan 2 pollos
- 4 pp fracasan en la reproducción (1 durante incubación, 1 con pollos pequeños).

El fracaso de la pareja durante la incubación posiblemente se deba a la desaparición del macho, ya que se vió a la hembra abandonar el nido durante 40' el 08/04 (periodo de incubación). El 09/04 se observa la hembra a las 20h 15' (anocheciendo) con actividad de caza a 6,5 Km del nido. La última observación de los 2 ej. de la pareja se realizó el 12/03. Cabe decir que en dos cazaderos de esta pareja se han instalado aerogeneradores y una línea de evacuación eléctrica a 150-200 m del nido.

Respecto de la pareja de la que no se han obtenido datos, estos solo faltan sobre el resultado de la nidificación observándose el resto del proceso. Sobre esta pareja existían dudas sobre si se reproducía en Morella ó Catí (fuera de zona de estudio) confirmándose este año al menos el intento reproductor en Morella.

Los resultados totales de este año son los siguientes:

Éxito reproductor 1,20
Productividad 0,66

AGUILILLA CALZADA

3 parejas más conocidas para este año, lo que hace un total de 38 pp. De estas se ha obtenido información de 34pp. Se han seguido en 10 casos la reproducción, volando 13 pollos (1,3 pollos/nido) similar al año anterior que fue 1,37 pollos/nido.

En 9 parejas más se constata que han tenido éxito en la reproducción al observar jóvenes del año.

ÁGUILA AZOR PERDICERA

Presencia de 1 pp, pero no se localiza nido.

CERNÍCALO VULGAR

139 pp son las conocidas por el momento en la zona (faltando áreas por prospectar). De estas se ha obtenido información de 65, localizándose 6 nidos, todos en roquedos. En tres casos en que se ha seguido la reproducción la tasa de vuelo fue de 2,3 pollos/nido.

ALCOTÀN

Sobre la población nidificante, continúa la escasez de datos aunque se ha localizado 1 pp nueva en Sorita siendo 22 las pp hasta ahora conocidas.

De estas 22 pp sólo se ha obtenido información, de 9 de ellas y solamente en 2 casos de nidificación segura, no localizándose ningún nido.

HALCÓN PEREGRINO

Aunque se localiza 1 pp nueva en Forcall, este año se eliminan 3 pp (Sorita, Forcall y Morella) por faltar datos en los últimos años, habiéndose prospectado las zonas con resultados negativos por lo que la población queda establecida en 19 pp.

En 9 pp se ha constatado la reproducción, siguiéndose 5 nidos obteniéndose un éxito reproductor de 2,2 pollos/nido.

BÚHO CHICO

Aumenta en 21 las pp conocidas aunque solamente se obtiene información sobre 6 (2 casos de reproducción segura). Los 3 nuevos territorios se localizan en Cinctores, Morella y Forcall.

LECHUZA COMÚN

Se localizan 2 nuevos territorios en Ares y Vilafranca, pero solamente se obtienen datos de 2 pp más del total conocido (las dos de reproducción segura). Al igual que en el halcón, eliminamos parejas por falta de datos en los últimos años (las 2 en Ares).

Por los que el nº de parejas continúa igual, 15.

Este año se han efectuado escuchas en territorios conocidos, concretamente en Castellfort, Forcall, Ares, Morella Todolella, La Mata y Vilafranca (de 2 a 3 prospecciones) con resultados negativos. Aunque estos datos no son concluyentes ya que en una localidad, Cinctores se hicieron 5 escuchas sólo dándose resultados positivos en 2 de ellas.

AUTILLO

105 son los territorios conocidos hasta la fecha, obteniéndose datos de 28pp.

BÚHO REAL

Se localiza una nueva pp en Portell con 1 pollo el 10/05. Aunque se elimina 1 pareja anterior en Morella por no conseguirse datos en los últimos años y observar que el territorio anteriormente conocido está ocupado por 1 pareja de cárabos.

De la 12 pp seguras y las 8 posibles sólo se obtiene información de 6 de ellas, con sólo un dato de reproducción segura.

CÁRABO

Aumenta el nº de parejas conocidas a 107, con datos de 34 parejas.

Sobre 2 nidificaciones observadas vuelan 2,5 pollos /nido.

MOCHUELO

Para el anuario del 2006, no se aportó información sobre esta especie, al no tener clara una metodología para evaluar sus poblaciones. Desde 2007, se ha decidido asignar un territorio de 1 Km2/pp conocida, con lo que siempre obtendremos unas cifras donde el error será por defecto y no por exceso (según bibliografía consultada y observaciones propias).

Pues bien, en función de este método el nº de parejas estimadas por el momento es de 110.

Anexo III. Reseñas bibliográficas

ARE IMPORTANT BIRD AREAS AND SPECIAL PROTECTED AREAS ENOUGH FOR CONSERVATION? THE CASE OF BONELLI'S EAGLE IN A MEDITERRANEAN AREA.

Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P., GARCÍA-RIPOLLÉS, C., SOUTULLO, Á., CADAHÍA, L. & URIOS, V.

Datos de contacto: lopez.pascual@gmail.com

Tipo de comunicación: Artículo científico

Referencia: Biodiversity and Conservation 16: 3755–3780

Fecha publicación: 2007

Abstract: The Bonelli's eagle (BE) is considered by the European Union as a high-priority species for conservation in the Valencian Community (East of Spain). However, in 2006 the European Union opened a legal procedure against the Spanish Kingdom, accused of lacking of an adequate network of special protected areas (SPAs) to preserve the BE in the region. Here we evaluate whether important bird areas (IBAs) and SPAs network is enough to preserve this species, on the basis of a thorough analysis of habitat preferences. A GAP analysis is performed to conduct a revision of current SPAs and BirdLife proposed IBAs. Our results suggest that the current network of SPAs becomes insufficient to protect the BE. The IBAs network, although improves the current network of SPAs, increasing the percentage of BE potential habitat included, also results inadequate. We propose a new SPAs network according to the potential suitable habitat for the species. Given the trade-off between financial investment and the conservation of biodiversity, we propose to maximize the surface of potential habitat included in the protected network minimizing the surface of the region that would be necessary to protect, thus avoiding an unnecessary expense and otherwise unrealistic results.

EL ALIMOCHES SE RECUPERA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. CENSO, TENDENCIA Y PARÁMETROS REPRODUCTORES DE UNA POBLACIÓN EN EXPANSIÓN.

Autor: GARCÍA-RIPOLLÉS, C., SURROCA, M., LÓPEZ-LÓPEZ, P. & J. JIMÉNEZ.

Datos de contacto: lopez.pascual@gmail.com

Tipo de comunicación: Artículo divulgativo

Referencia: Quercus 255: 26-29

Fecha publicación: 2007

Resumen: Desde finales de los años ochenta se ha observado un lento y progresivo aumento de la población de alimoches en la Comunidad Valenciana, cifrada actualmente en once parejas reproductoras. Algunas de ellas han ocupado antiguas zonas de cría y otras han logrado colonizar nuevas áreas. Esta positiva evolución hay que achacarla tanto a la ausencia de amenazas -veneno y persecución directa- como a la disponibilidad estable de alimento y al aumento de las poblaciones limítrofes de Cataluña y Aragón.

IDENTIFYING POTENTIALLY NESTING HABITAT FOR GOLDEN EAGLES (*AQUILA CHRYSAETOS*) APPLIED TO IMPORTANT BIRD AREAS DESIGN.

Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P., GARCÍA-RIPOLLÉS, C., SOUTULLO, A., CADAHÍA, L. & URIOS, V.

Datos de contacto: Pascual.Lopez@uv.es

Tipo de comunicación: Artículo científico

Referencia: Animal Conservation 10(2): 208-218

Fecha publicación: 2007

Abstract: Geographic Information Systems (GIS) based habitat-suitability modelling is becoming an essential tool in conservation biology. A multi-scale approach has been proposed as a particularly useful way to identify different factors affecting habitat preferences. In this paper we developed predictive models of potentially suitable habitat for Golden eagles *Aquila chrysaetos* at three spatial scales in a representative Mediterranean area on the Iberian Peninsula. We used logistic regression through a Generalized Linear Model (GLM) to model Golden eagle breeding habitat preferences. The best occurrence GLM models were those that involved topographic factors as independent predictors. Golden eagles seemed to prefer rugged and higher places of the study area for nesting. Climatic factors identified cold temperatures in January and temperate ones in July as best predictors of eagles' occurrence. This was also higher in places with less agricultural areas and higher surface of pine forests. The distribution of potentially suitable area matches the distribution of mountain ranges, mainly in inner sectors of the study area. In contrast, potentially suitable nest sites in coastland areas remain unoccupied by Golden eagles. Avoidance of coastland places for nesting may be due to the synergistic effects of human avoidance and the occurrence of potential competitors, like the endangered Bonelli's eagle *Hieraetus fasciatus*. When mapped at fine spatial resolution, the best GLM model identified large areas that fall outside the current network of protected areas. We therefore propose three new Important Bird Areas (IBAs) for the region.

POPULATION SIZE, BREEDING PERFORMANCE AND TERRITORY QUALITY OF BONELLI'S EAGLE (*HIERAAETUS FASCIATUS*) IN EASTERN IBERIAN PENINSULA.

Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P., GARCÍA-RIPOLLÉS, C. & URIOS, V.

Datos de contacto: Pascual.Lopez@uv.es

Tipo de comunicación: Artículo científico

Referencia: Bird Study 54: 335-342

Fecha publicación: 2007

Abstract: Capsule A five-year monitoring study is described of overall population stability and differential reproductive success in relation to habitat heterogeneity. Aims To assess the effect of the altitude and orientation on laying date and breeding performance, and analyse the effect of territory quality as a likely factor that could be regulating the population. Methods We monitored a population of 28-33 pairs, from 2002 to 2006, counting a total of 131 breeding attempts. Results Territories located at lower altitude showed higher mean fecundity than those located at higher

altitude. The mean laying date was February 18 ± 16 days. Laying date was positively correlated with nest altitude, the coastal pairs laying earlier than those in mountainous regions. Pairs located at lower altitudes showed higher mean fecundity than those located at higher altitudes. There was no preference in mean orientation either in breeding performance or in relationship to nest altitude. We did not find a difference in breeding performance between territories classed as being at high density and those classed as being at low density. Conclusion The population has remained stable since the first national census was conducted 17 years ago. Our results could be explained in the light of the Habitat Heterogeneity Hypothesis. We suggest a differential reproductive success in relation to habitat heterogeneity.

TAMAÑO POBLACIONAL Y PARÁMETROS REPRODUCTORES DEL ALIMOCHÉ COMÚN (NEOPHRON PERCNOPTERUS) EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, ESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P. & C. GARCÍA-RIPOLLÉS.

Datos de contacto: lopez.pascual@gmail.com

Tipo de comunicación: Artículo científico

Referencia: Dugastella 4:49-52

Fecha publicación: 2007

Resumen: La población de Alimoche común en la Península Ibérica ha decaído en las últimas décadas hasta alcanzar valores de 1.320-1.480 parejas reproductoras según los últimos censos. En este trabajo se muestran algunos datos sobre el tamaño poblacional y los parámetros reproductores durante los años 2003 y 2004 así como una pequeña descripción de las principales características del emplazamiento de los lugares de cría de la especie. Un total de siete parejas reproductoras fueron localizadas en 2003 y nueve en 2004. Los parámetros reproductores fueron similares a los encontrados en otras áreas geográficas. La mayoría de nidos se emplazaron en orientaciones térmicamente favorables, y es destacable que la mayoría de las parejas estudiadas utilizaron cuevas para la instalación del nido. Dado el escaso número de parejas encontradas, se debe tener en cuenta la limitación de los resultados obtenidos y sus posibles inferencias. Si tenemos en cuenta el declive generalizado de la población de Alimoche en la Península Ibérica y el aumento detectado en nuestra provincia, estimamos necesario llevar a cabo estudios más detallados, así como la toma de medidas de conservación concretas para favorecer el mantenimiento de la especie en nuestro área de estudio.

Abstract: The Iberian Egyptian Vulture's population has decreased in the last decades reaching 1.320-1.480 reproductive pairs according to last censuses. In this paper, population size and reproductive performance are shown for 2003 and 2004. A brief description of main nest characteristics of the species is also exposed. Seven reproductive pairs were located in 2003 and nine in 2004. Breeding parameters were similar to those found in other geographic areas. Most nests were placed on thermic favourable orientations and inside caves. Due to breeding pair's scarce number, results obtained and possible inferences should be limited. If we consider the generalized Egyptian Vulture's population decay and the increase detected in our province, more detailed studies are necessary. Furthermore, specific conservation measures are needed in order to keep the species in our study area.

INFORMACIÓN

Las citas publicadas en este Anuario se refieren a aves observadas en la provincia de Castellón. Su ordenación sigue la lista sistemática propuesta por la “Lista de las Aves de España” (CLAVELL et al., 2005).

De cada especie se proporciona la siguiente información:

- Nombre
- Estatus
- Abundancia
- Localización
- Conservación
- Localidad
- Datos mínimos para el anuario
- Otros parámetros adicionales en la presentación de la cita
- Rango
- Criterios de selección de citas
- Lista Sistemática
- Rarezas / Accidentales
- Rarezas locales para la provincia de Castellón
- Listado de aves exóticas
- Abreviaturas utilizadas en el anuario
- Bibliografía

Nombre

- Los nombres comunes en castellano y en inglés están basados en los “Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología” (BERNIS, et al., 1994-2003 y DE JUANA et al., 2004-2005) y en la monumental obra titulada “*Handbook of the Birds of the World*” (DEL HOYO, et al. 1992-2008). También se han usado las publicaciones: “Lista de las Aves de España”. Edición 2005. Versión plurilingüe online 2.0 (Sociedad Española de Ornitología) y “Aves Invasoras en España: Lista de especies en las categorías C y E”. Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife). Versión 2.4 (marzo 2006).
- Para los nombres en valenciano se ha utilizado la nomenclatura propuesta en “El nom valencià dels ocells d'Europa” (MIGUEL & FONT, 1990), el programa Ornitocites (Institut Català d'Ornitologia) y la “Llista patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya” de l'Institut Català d'Ornitologia. Versió 1.0
- Respecto al nombre científico (incluidas subespecies), seguimos lo publicado por CLAVELL (2002) y “La Lista de las Aves de España” (CLAVELL et al., 2005) editada por la Sociedad española de Ornitología (SEO/BirdLife), siendo adaptado periódicamente con las recomendaciones taxonómicas publicadas hasta la fecha por la Association of European Records and Rarities Committees-AERC y KNOX et al. (2002)

Estatus

Se basa en el estatus propuesto en las publicaciones de los Anuarios de la Comunidad Valenciana (DIES et al. 1.988–1.994), siendo éste revisado y adaptado por el Comité Editor de AOCS, estableciendo un estatus propio para las aves de la provincia de Castellón. De esta forma todas las especies quedan clasificadas bajo el siguiente criterio:

- **Residente:** especie nidificante (salvo indicado como “no reproductor”) y presente todo el año.
- **Nidificante:** especie nidificante no presente todo el año pero sí al menos entre el 21 de mayo y el 20 de julio.
- **Migrante:** especie presente al menos durante sus desplazamientos prenupciales (del 15 febrero al 30 mayo) y/o postnupciales (del 15 de julio al 30 octubre).
- **Invernante:** especie presente durante la invernada, al menos entre el 1 diciembre y 15 febrero.
- **Visitante:** especie no migrante dispersada, sin patrón fenológico concreto, desde poblaciones próximas, sin discriminar época de presencia.
- **Divagante:** especie fuera de su ámbito geográfico habitual.
- **Escapada de cautividad:** presencia debida al hombre asociada a escapes o sueltas.

Abundancia

Además del estatus se indica, en las especies cuya magnitud de población ha podido ser estimada (censos), la abundancia de acuerdo con el siguiente patrón:

- **Ocasional:** especie que nidifica o se cita muy irregularmente, pudiendo no verificarse su reproducción o presencia durante años.
- **Raro:** de 0 a 5 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Escaso:** de 6 a 100 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Moderado:** de 101 a 1.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Común:** de 1.001 a 2.500 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Abundante:** más de 2.500 parejas nidificantes o individuos censados anualmente, aplicado también a especies paseriformes cuyas poblaciones no se han calculado pero se estiman como abundantes.

Localización

Respecto al número de lugares donde se observa una especie se divide en:

- **Muy localizado:** observado sólo entre 1 – 3 lugares.
- **Localizado:** observado entre 3 – 10 lugares.
- **Sin especificar** en más de 10 lugares.

Conservación

El estado de conservación de cada especie hace referencia a la clasificación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en su revisión de abril de 2006. Sobre esta primera clasificación se aplica la normativa autonómica valenciana vigente en la actualidad requerida.

También es de aplicación, por tanto, el "*Decreto 32/2004 , de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. [2004/X2170]*".

Clasificación de las especies:

- **En peligro de extinción (PE):** Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando.
- **Sensibles a la Alteración del Hábitat (SAH):** Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando. Aquellas especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, fraccionado o muy limitado y en grave regresión
- **Vulnerables (VUL):** Aquellas especies que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
- **De Interés Especial (IE):** Son las que son merecedoras de una atención especial de acuerdo con el valor científico, ecológico o cultural que tienen, o por su singularidad.
- **Especies Protegidas (EP):** Son las especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprovechamiento cinegético, consideradas beneficiosas o que no necesitan control habitual para evitar daños importantes a otras especies protegidas, a la ganadería, agricultura o a la salud y seguridad de las personas, la protección de las cuales exigen la puesta en marcha de medidas generales de conservación.
- **Especies Tuteladas (ET):** Son las no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos que puedan necesitar controles para evitar daños . Se incluyen las especies silvestres capturadas con métodos tradicionales, que no comporten la muerte de los ejemplares.
- **Especies cinegéticas (EC):** Tomando como base el artículo 33.1 de la Ley 4/ 1.989, de 27 de marzo (especies sujetas a aprovechamientos cinegéticos). El régimen de protección y aprovechamiento de estas especies será el establecido por la legislación propia de caza y pesca, y las ordenes de la Consellería que fijan anualmente los periodos hábiles de caza y establece las vedas especiales en la Comunidad Valenciana.

Localidad

Si tomamos como referencia otros anuarios en los que sólo aparece el nombre del lugar de observación, o sólo el del paraje (en caso de estar declarado como espacio protegido) o sólo el nombre de la sierra, río, albufera o ciudad, en muchas ocasiones nos encontraremos con problemas de localización de la cita (DIES *et al.*, 1997; CABO *et al.*, 2000).

En el Anuario Ornitológico de Castellón se expone el nombre del municipio o el nombre del lugar donde se ha realizado la observación para que la cita sea localizada por otros ornitólogos con mayor facilidad. Al mismo tiempo se facilita un listado de todos los municipios de la provincia identificados por su UTM.

Datos mínimos para el anuario

Se han propuesto unos datos mínimos que deben estar presentes siempre en la descripción de la cita, nombre/s del observador/es, fecha de la observación, nombre de la especie, número de individuos, lugar de observación especificando el municipio, UTM (Universal Transverse Mercator) en un principio 10 km x 10 km.

Otros parámetros considerados de forma aleatoria en la presentación de la cita

El sistema permite ampliar notablemente la cantidad de información que se introduce en el sistema, pudiéndose especificar la subespecie (en caso de ser conocida) la edad (adulto, subadulto, inmaduro, joven, pollo o huevo) y sexo (macho, hembra) de la/s ave/s, y una breve descripción de la observación (conducta, dirección predominante de vuelo, anillas, curiosidades del plumaje, estado del ave, etc.).

Para facilitar la labor de redacción y análisis de los datos al Comité Editor, se han propuestos una serie de datos referidos al interés y periodos de la cita. En este caso nos hemos basado en lo expuesto por L'Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2000 (AYMÍ *et al.*, 2003) y el "Atlas dels Ocells Nidificants de Catalunya" (ESTRADA *et al.*, 2004):

- **Interés de la cita**, motivado por:
 - **Geográfico**: Se trata de una observación cuyo interés principal se refiere al lugar en el que se ha observado. Referido a cualquier variación del área de distribución actual de la especie, basándonos principalmente en el Atlas de aves nidificantes de la Comunidad Valenciana (URIOS *et al.* 1991), Atlas de las Aves Reproductoras de España (2003) y los Anuarios Ornitológicos de la Comunidad Valenciana (DIES *et al.* 1997), (CABO *et al.* 2003)
 - **Fenológico**: Observaciones de especies fuera de las fechas que se consideran o últimas o primeras citas anuales.
 - **Nidificación**: Observaciones cuyo interés se derive del hecho de la nidificación (nidos ocupados, pollos no volanderos, ...) o indirecta (vuelos nupciales, comportamientos territoriales, ...).
 - **Numérico**: Observaciones de especies que su número es inusual (concentraciones,...).
 - **Comportamiento**: Avistamientos de comportamientos inusuales.
- **Periodo**: Fechas de observación.
 - **Reproductor**: Al menos entre el 21 de mayo y el 20 de julio.
 - **Migratorio**:
 - **Prenupcial** del 15 de febrero al 30 de mayo.
 - **Postnupcial** del 15 de julio al 30 de octubre.
 - **Invernada**: Presente al menos del 1 de diciembre al 15 de febrero.
 - **Estival**: Presente en época estival, al menos entre el 1 de mayo y 30 de junio.
- **Otros**:
 - **Cita temprana**: corresponde a observaciones de aves en fechas anteriores a lo que se considera normal para la especie.
 - **Cita tardía**: corresponde a observaciones de aves en fechas posteriores a lo que se considera normal para la especie.
 - **Concentración**: corresponde a concentraciones o agrupaciones inusuales de aves de la misma especie.
 - **Censo**: corresponden a citas realizadas bajo una metodología de censo, en este caso no se deben confundir con las observaciones ocasionales o esporádicas.

- **Atlas:** (Ver punto 11: Atlas / Mapas de distribución y abundancia)

Rango

Es utilizado para especies ocasionales, raras, escasas o divagantes, sobre las que mantenemos un recuento acumulado de las veces que ha sido citada y de cuantos ejemplares se han visto, siendo esta circunstancia indicada mediante dos cifras (p ej. 2/3). El primer número indica las citas que se han recogido en los distintos Anuarios publicados, primero los de la Comunidad Valenciana hasta 1997 y posteriormente en AOCS. El segundo número indica el total de aves implicadas en las citas. Pretende ser una lista dinámica en la que los observadores de campo tienen mucho que aportar y donde algunas de las especies están incluidas a la espera de nuevos datos.

Núm. de Citas / Ejemplares observados (Meses de las observaciones)

Criterios de selección de citas

Es el Comité Editor quien dictamina los criterios de selección de las citas que se incluirán en los respectivos anuarios finales. Como ejemplo podemos tener:

- Especies inusuales para cada localidad.
- Citas de subespecies.
- Observaciones de dismorfismos (albinismo, melanismos o híbridos)
- Comportamientos inusuales.
- Aves con marcas o instrumentos de identificación (marcas alares, decoloración de plumas, anillas, etc). En este caso sería adecuado al mismo tiempo informar a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, o accediendo a la página web de SEO: <http://www.seo.org>.

A continuación se detallan una serie de “Criterios de interés” utilizados para cada especie. Los criterios siguientes pueden ser únicos para una especie o por el contrario puede ser la combinación de varios de ellos en el caso que así lo requiera la especie analizada:

Criterios de interés:

1. Todas las observaciones.
2. Concentraciones y concentraciones inusuales.
3. Citas de interés.
4. Reproducción.
5. Reproducciones en colonias.
6. Dormideros.
7. Fechas extremas.
8. Registros invernales. Máximos invernales.
9. Formas melánicas.
10. Registros estivales.
11. Censos mensuales destacados por localidad.
12. Cifras máximas en migración y fechas extremas.

Lista Sistemática

La ordenación taxonómica y nombres científicos están basados en la “Lista de las Aves de España” (CLAVELL *et al.*, 2005), lo que supone asumir las recomendaciones de la Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2003) y actualiza la lista de VOOUS (1977). Las subespecies se basan en CRAMP *et al.* (1977–1994) y SNOW *et al.* (1998).

Las aves incluidas en la lista sistemática están formadas por las especies pertenecientes a las categorías A, B y C. Estas categorías fueron desarrolladas por la British Ornithologists' Union (BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de la SEO/BirdLife en España. Su significado es el siguiente:

Categoría A: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez desde el 1 enero de 1950. A esta categoría corresponden las especies de aves de la Lista Sistemática.

Categoría B: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez hasta el 31 de diciembre de 1949, pero no han sido citadas posteriormente.

Categoría C: Especies que, habiendo sido introducidas por el hombre, de manera deliberada o accidental, han establecido poblaciones reproductoras del grupo introducido, que se mantienen por ellas mismas sin tener que realizar posteriores introducciones. Dentro de esta categoría hay cinco subcategorías:

- **C1 Especies exóticas.** Especies que están presentes como resultado de una introducción.
- **C2 Especies nativas introducidas.** Especies con poblaciones establecidas como resultado de la introducción por el hombre, pero que también se citan en estado aparentemente natural.
- **C3 Especies reintroducidas.** Especies con poblaciones reintroducidas con éxito por el hombre en áreas donde se encontraban anteriormente.
- **C4 Especies asilvestradas.** Especies domésticas (i.e. seleccionadas artificialmente) con poblaciones establecidas en libertad.
- **C5 Especies naturalizadas en áreas vecinas.** Especies con poblaciones naturalizadas establecidas en otros países dentro de la misma región.

Rarezas / Accidentales

Todas las citas de especies consideradas rarezas en Iberia, están sometidas a homologación por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Se deben remitir todas las citas con la máxima información posible y todos aquellas características de la especie que puedan identificarla, así como aportación gráfica en el caso que se disponga. Para mayor información se ruega dirigirse al Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología en c/ Melquiades Biencinto nº 34 E-28053 Madrid. Al mismo tiempo en la página web de SEO se encuentra la ficha del comité de rarezas

De forma orientativa y consultiva se expone a continuación la lista de rarezas propuestas por SEO/BirdLife (www.seo.org) que utilizamos en este anuario:

ESPECIES QUE NECESITAN HOMOLOGACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE RAREZAS DE SEO

Nombre científico	castellano	inglés
<i>Aix sponsa</i>	Pato joyuyo	American Wood Duck
<i>Anas americana</i>	Silbón americano	American Wigeon
<i>Anas carolinensis</i>	Cerceta de Carolina	Green-winged Teal
<i>Anas carolinensis x crecca</i>	Cerceta americana x cerceta común	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta colorada	Cinnamon Teal
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	Blue-winged Teal
<i>Anas falcata</i>	Cerceta de Alfanjes	Falcated Duck
<i>Anas formosa</i>	Cerceta del Baikal	Baikal Teal
<i>Anas rubripes</i>	Ánade sombrío	Black Duck
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Ánsar piquicorto	Pink-footed Goose
<i>Anser caerulescens</i>	Ánsar nival	Snow Goose
<i>Anser fabalis</i>	Ánsar campestre	Bean Goose
<i>Aythya affinis</i>	Porrón bola	Lesser Scaup
<i>Aythya collaris</i>	Porrón acollarado	Ring-necked Duck
<i>Branta ruficollis</i>	Barnacla cuellirroja	Red-breasted Goose
<i>Bucephala albeola</i>	Porrón albeola	Bufflehead
<i>Bucephala islandica</i>	Porrón islándico	Barrow's Goldeneye
<i>Cygnus columbianus</i>	Cisne chico	Tundra Swan
<i>Cygnus cygnus</i>	Cisne cantor	Whooper Swan
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Suirirí bicolor	Fulvous Whistling Duck
<i>Dendrocygna viduata</i>	Suirirí cariblanco	White-faced Whistling Duck
<i>Melanitta perspicillata</i>	Negrón careto	Surf Scoter
<i>Mergus albellus</i>	Serreta chica	Smew
<i>Mergus cucullatus</i>	Serreta capuchona	Hooded merganser
<i>Mergus merganser</i>	Serreta grande	Goosander
<i>Somateria spectabilis</i>	Eider Real	King Eider
<i>Podilymbus podiceps</i>	Zampullín picogruoso	Pied-billed Grebe
<i>Thalassarche melanophris</i>	Albatros ojeroso	Black-browed Albatross
<i>Bulweria bulwerii</i>	Petrel de Bulwer	Bulwer's Petrel
<i>Pterodroma hasitata</i>	Petrel antillano	Capped petrel
<i>Puffinus assimilis</i>	Pardela chica	Little Shearwater
<i>Oceanites oceanicus</i>	Paíño de Wilson	Wilson's Storm-petrel
<i>Oceanodroma castro</i>	Paíño de Madeira	Madeiran Storm-petrel
<i>Oceanodroma monorhis</i>	Paíño de Swinhoe	Swinhoe's Storm-petrel
<i>Phaethon aethereus</i>	Rabijunco etéreo	Red-billed Tropicbird
<i>Sula dactylatra</i>	Piquero enmascarado	Masked Booby
<i>Sula leucogaster</i>	Piquero pardo	Brown Booby
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Cormorán pigmeo	Pygmy Cormorant
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pelicano común	Great White Pelican
<i>Pelecanus rufescens</i>	Pelicano rosado	Pink-backed Pelican

<i>Fregata magnificens</i>	Rabihorcado magnífico	Magnificent Frigatebird
<i>Ardea herodias</i>	Garza azulada	Great Blue Heron
<i>Botaurus lentiginosus</i>	Avetoro lentiginoso	North American Bittern
<i>Egretta gularis</i>	Garceta dimorfa	Western Reef Egret
<i>Egretta gularis x Egretta garzetta</i>	Garceta dimorfa x garceta comun	
<i>Ixobrychus sturmii</i>	Avetorillo plumizo	Dwarf Bittern
<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Marabú africano	Marabou
<i>Mycteria ibis</i>	Tántalo africano	Yellow-billed Stork
<i>Geronticus eremita</i>	Ibis eremita	Northern Bald Ibis
<i>Platalea alba</i>	Espátula africana	African Spoonbill
<i>Phoenicopterus minor</i>	Flamenco enano	Lesser Flamingo
<i>Aquila clanga</i>	Águila moteada	Greater Spotted Eagle
<i>Aquila clanga x pomarina</i>	Águila moteada x águila pomerana	
<i>Aquila pomarina</i>	Águila pomerana	Lesser Spotted Eagle
<i>Buteo lagopus</i>	Busardo calzado	Rough-legged Buzzard
<i>Buteo rufinus</i>	Busardo moro	Long-legged Buzzard
<i>Circus macrourus</i>	Aguilucho papialbo	Pallid Harrier
<i>Elanoides forficatus</i>	Elanio tijereta	American Swallow-tailed Kite
<i>Gyps rueppellii</i>	Buitre moteado	Rüppell's Griffon
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pigargo europeo	White-tailed Sea-eagle
<i>Falco biarmicus</i>	Halcón borní	Lanner Falcon
<i>Falco cherrug</i>	Halcón sacre	Saker Falcon
<i>Turnix sylvaticus</i>	Torillo andaluz	Small Button-quail
<i>Grus virgo</i>	Grulla damisela	Demoiselle Crane
<i>Crecopsis egregia</i>	Guión africano	African Crake
<i>Crex crex</i>	Guión de codornices	Corn Crake
<i>Fulica americana</i>	Focha americana	American Coot
<i>Gallinula angulata</i>	Gallineta chica	Lesser Moorhen
<i>Porphyrio alleni</i>	Calamoncillo africano	Allen's Gallinule
<i>Porphyrio martinica</i>	Calamoncillo americano	American Purple Gallinule
<i>Porzana carolina</i>	Polluela sora	Sora Crane
<i>Cursorius cursor</i>	Corredor sahariano	Cream-coloured Courser
<i>Glareola nordmanni</i>	Canastera alinegra	Black-winged Pratincole
<i>Charadrius leschenaultii</i>	Chorlito mongol grande	Greater Sandplover
<i>Charadrius mongolus</i>	Chorlito mongol chico	Lesser Sandplover
<i>Charadrius pecuarius</i>	Chorlito pecuario	Kittlitz's Plover
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Chorlito semipalmado	Semipalmated Plover
<i>Charadrius vociferus</i>	Chorlito culirrojo	Killdeer
<i>Pluvialis dominica</i>	Chorlito dorado americano	American Golden Plover
<i>Pluvialis fulva</i>	Chorlito dorado siberiano	Pacific Golden Plover
<i>Vanellus gregarius</i>	Avefría sociable	Sociable Lapwing
<i>Vanellus leucurus</i>	Avefría coliblanca	White-tailed Lapwing
<i>Actitis macularius</i>	Andarríos maculado	Spotted Sandpiper

<i>Bartramia longicauda</i>	Correlimos batitú	Upland Sandpiper
<i>Calidris acuminata</i>	Correlimos acuminado	Sharp-tailed Sandpiper
<i>Calidris bairdii</i>	Correlimos de Baird	Baird's Sandpiper
<i>Calidris fuscicollis</i>	Correlimos culiblanco	White-rumped Sandpiper
<i>Calidris himantopus</i>	Correlimos zancolín	Stilt Sandpiper
<i>Calidris mauri</i>	Correlimos de Alaska	Western Sandpiper
<i>Calidris melanotos</i>	Correlimos pectoral	Pectoral Sandpiper
<i>Calidris minutilla</i>	Correlimos menudillo	Least Sandpiper
<i>Calidris pusilla</i>	Correlimos semipalmeado	Semipalmated Sandpiper
<i>Calidris tenuirostris</i>	Correlimos grande	Great Knot
<i>Gallinago media</i>	Agachadiza real	Great Snipe
<i>Limicola falcinellus</i>	Correlimos falcinelo	Broad-billed Sandpiper
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Agujeta escolopácea	Long-billed Dowitcher
<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo picofino	Red-necked Phalarope
<i>Phalaropus tricolor</i>	Falaropo tricolor	Wilson's Phalarope
<i>Tringa flavipes</i>	Archibebe patigualdo chico	Lesser Yellowlegs
<i>Tringa melanoleuca</i>	Archibebe patigualdo grande	Greater Yellowlegs
<i>Tringa solitaria</i>	Andarrios solitario	Solitary Sandpiper
<i>Tryngites subruficollis</i>	Correlimos canelo	Buff-breasted Sandpiper
<i>Xenus cinereus</i>	Andarrios del Terek	Terek Sandpiper
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Págalo rabero	Long-tailed Skua
<i>Larus atricilla</i>	Gaviota guanaguanare	Laughing Gull
<i>Larus cirrocephalus</i>	Gaviota cabecigrís	Grey-headed Gull
<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota cocinera	Kelp Gull
<i>Larus glaucescens</i>	Gaviota de Bering	Glaucous-winged Gull
<i>Larus glaucoides</i>	Gaviota groenlandesa	Iceland Gull
<i>Larus hyperboreus</i>	Gavión hiperbóreo	Glaucous Gull
<i>Larus hyperboreus x argentatus</i>	Gavión hiperbóreo x Gaviota argétea	
<i>Larus philadelphia</i>	Gaviota de Bonaparte	Bonaparte's Gull
<i>Larus pipixcan</i>	Gaviota pipizcan	Franklin's Gull
<i>Larus smithsonianus</i>	Gaviota argétea americana	American Herring Gull
<i>Rhodostethia rosea</i>	Gaviota rosada	Ross's Gull
<i>Sterna bengalensis</i>	Charrán bengalí	Lesser Crested Tern
<i>Sterna dougallii</i>	Charrán rosado	Roseate Tern
<i>Sterna elegans</i>	Charrán elegante	Elegant Tern
<i>Sterna forsteri</i>	Charrán de Forster	Forster's Tern
<i>Sterna fuscata</i>	Charrán Sombrió	Sooty Tern
<i>Sterna maxima</i>	Charrán real	Royal Tern
<i>Cephus grylle</i>	Arao aliblanco	Black Guillemot
<i>Streptopelia orientalis</i>	Tórtola oriental	Oriental Turtle-dove
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tórtola senegalesa	Laughing Dove
<i>Coccyzus americanus</i>	Cuclillo piquigualdo	Yellow-billed Cuckoo
<i>Asio capensis</i>	Búho moro	Marsh Owl
<i>Chordeiles minor</i>	Añapero yanqui	Common Nighthawk

<i>Apus affinis</i>	Vencejo moro	Little Swift
<i>Chaetura pelagica</i>	Vencejo de chimenea	Chimney Swift
<i>Hirundapus caudacutus</i>	Rabitojo mongol	White-throated Needletail
<i>Merops persicus</i>	Abejaruco persa	Blue-cheeked Bee-eater
<i>Tyrannus savana</i>	Tijereta sabanera	Fork-tailed Flycatcher
<i>Alaemon alaudipes</i>	Alondra ibis	Greater Hoopoe-lark
<i>Ammomanes cinctura</i>	Terrera colinegra	Bar-tailed Lark
<i>Eremophila alpestris</i>	Alondra cornuda	Horned Lark
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Golondrina risquera	Cliff Swallow
<i>Anthus godlewskii</i>	Bisbita estepario	Blyth's Pipit
<i>Anthus hodgsoni</i>	Bisbita de Hodgson	Olive-backed Pipit
<i>Motacilla citreola</i>	Lavandera cetrina	Citrine Wagtail
<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul naranjero	Common Bulbul
<i>Bombycilla garrulus</i>	Ampelis europeo	Bohemian Waxwing
<i>Dumetella carolinensis</i>	Pájaro gato gris	Grey Catbird
<i>Mimus polyglottos</i>	Sisonte norteño	Northern Mockingbird
<i>Luscinia cyane</i>	Ruiseñor azul	Siberian Blue Robin
<i>Oenanthe deserti</i>	Collalba desértica	Desert Wheatear
<i>Oenanthe leucopyga</i>	Collalba yebélica	White-crowned Wheatear
<i>Phoenicurus moussieri</i>	Colirrojo diademado	Moussier's Redstart
<i>Tarsiger cyanurus</i>	Ruiseñor coliazul	Orange-flanked Bush-robin
<i>Turdus migratorius</i>	Zorzal robín	American Robin
<i>Turdus ruficollis</i>	Zorzal papinegro	Black-throated Thrush
<i>Zootera dauma</i>	Zorzal dorado del Himalaya	Common Scaly Thrush
<i>Acrocephalus agricola</i>	Carricero agrícola	Paddyfield Warbler
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Carricero de Blyth	Blyth's Reed Warbler
<i>Acrocephalus palustris</i>	Carricero poliglota	Marsh Warbler
<i>Hippolais caligata</i>	Zarcero escita	Booted Warbler
<i>Locustella fluviatilis</i>	Buscarla fluvial	River Warbler
<i>Phylloscopus borealis</i>	Mosquitero boreal	Arctic Warbler
<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Mosquitero sombrío	Dusky Warbler
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Mosquitero bilistado	Yellow-browed Warbler
<i>Phylloscopus proregulus</i>	Mosquitero de Pallas	Pallas's Leaf Warbler
<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Mosquitero de Schwarz	Radde's Warbler
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Mosquitero verdoso	Greenish Warbler
<i>Sylvia balearica</i>	Curruca balear	Balearic Warbler
<i>Sylvia curruca</i>	Curruca zarcerilla	Lesser Whitethroat
<i>Sylvia deserti</i>	Curruca sahariana	African Desert Warbler
<i>Sylvia deserticola</i>	Curruca del Atlas	Tristram's Warbler
<i>Sylvia nisoria</i>	Curruca gabilana	Barred Warbler
<i>Sylvia sarda</i>	Curruca sarda	Marmora's Warbler
<i>Ficedula albicollis</i>	Papamoscas acollarado	Collared Flycatcher
<i>Ficedula albicollis x hypoleuca</i>	Papamoscas collarino x papamoscas cerrojillo	

<i>Ficedula parva</i>	Papamoscas papirrojo	Red-breasted Flycatcher
<i>Lanius excubitor</i>	Alcaudón norteño	Great Grey Shrike
<i>Lanius isabellinus</i>	Alcaudón isabel	Isabelline Shrike
<i>Lanius nubicus</i>	Alcaudón núbico	Masked Shrike
<i>Tchagra senegalus</i>	Chagra del Senegal	Black-crowned Tchagra
<i>Corvus cornix</i>	Corneja cenicienta	Hooded Crow
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cascanueces	Nutcracker
<i>Sturnus roseus</i>	Estornino rosado	Rosy Starling
<i>Vireo olivaceus</i>	Vireo ojirrojo	Red-eyed Vireo
<i>Carduelis flammea</i>	Pardillo sizerín	Common Redpoll
<i>Carduelis flavirostris</i>	Pardillo piquigualdo	Twite
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Camachuelo carminoso	Common Rosefinch
<i>Dendroica coronata</i>	Picafollas coronado	Yellow-rumped Warbler
<i>Seiurus motacilla</i>	Reinita de Louisiana	Louisiana Waterthrush
<i>Calcarius lapponicus</i>	Escribano lapón	Lapland Longspur
<i>Emberiza aureola</i>	Escribano aureolado	Yellow-breasted Bunting
<i>Emberiza bruniceps</i>	Escribano carirrojo	Red-headed Bunting
<i>Emberiza cioides</i>	Escribano de Brandt	Meadow Bunting
<i>Emberiza leucocephalos</i>	Escribano de Gmelin	Pine Bunting
<i>Emberiza melanocephala</i>	Escribano cabecinegro	Black-headed Bunting
<i>Emberiza pusilla</i>	Escribano pigmeo	Little Bunting
<i>Emberiza rustica</i>	Escribano rústico	Rustic Bunting
<i>Emberiza sahari</i>	Escribano sahariano	House Bunting

-- Subespecies consideradas rarezas nacionales --

<i>Fringilla coelebs africana</i>	Pinzón vulgar	Common Chaffinch
<i>Sylvia cantillans albistriata</i>	Curruca carrasqueña	Subalpine Warbler
<i>Melanitta nigra americana</i>	Negrón común	Black Scoter
<i>Motacilla flava feldegg</i>	Lavandera boyera	Yellow Wagtail
<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Ánsar careto	Greater White-fronted Goose
<i>Larus fuscus fuscus</i>	Gaviota sombría	Black-backed Gull
<i>Podiceps auritus hoiboellii</i>	Zampullín cuellirrojo	Slavonian Grebe
<i>Branta bernicla hrota</i>	Barnacla carinegra	Brent Goose
<i>Saxicola torquatus maurus</i>	Tarabilla común	Common Stonechat
<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>	Collalba rubia	Black-eared Wheatear
<i>Lanius senator niloticus</i>	Alcaudón común	Woodchat Shrike
<i>Luscinia svecica svecica</i>	Ruiseñor pechiazul	Bluethroat
<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Mosquitero común	Common Chiffchaff
<i>Buteo buteo vulpinus</i>	Busardo ratonero	Eurasian Buzzard

Rarezas locales para la provincia de Castellón

Se presenta una lista de aves consideradas raras a nivel local, basada en DIES *et al.* (1997) y en la experiencia del Comité Editor. Se trata, por tanto, de taxones de aves ibéricas observadas en

Castellón, consideradas comunes en distintas áreas de la Península Ibérica, pero que su observación es escasa o incluso rara en nuestra zona geográfica. No son consideradas las rarezas nacionales (que deben ser homologadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, ni las cada vez más habituales especies escapadas de cautividad.

De éstas especies, que a continuación os relatamos, se necesitaría de una información lo más detallada posible (descripciones, dibujos, fotos, etc.) para publicar con ciertas garantías todas las citas recibidas.

LISTADO DE ESPECIES CONSIDERADAS RAREZAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

Nombre científico

Anser albifrons

Aythya marila

Bucephala clangula

Clangula hyemalis

Marmaronetta angustirostris

Melanitta fusca

Oxyura leucocephala

Somateria mollissima

Tadorna ferruginea

Gavia arctica

Gavia immer

Gavia stellata

Podiceps auritus

Podiceps grisegena

Puffinus gravis

Puffinus griseus

Botaurus stellaris

Aegypius monachus

Elanus caeruleus

Gypaetus barbatus

Falco naumanni

Falco vespertinus

Porzana parva

Porzana pusilla

Tetrax tetrax

Charadrius morinellus

Calidris canutus

Calidris maritima

Tringa stagnatilis

Stercorarius pomarinus

Larus argentatus

Larus delawarensis

Larus marinus

castellano

Ánsar careto

Porrón bastardo

Porrón osculado

Pato havelda

Cerceta pardilla

Negrón especulado

Malvasía cabeciblanca

Eider común

Tarro canelo

Colimbo ártico

Colimbo grande

Colimbo chico

Zampullín cuellirrojo

Somormujo cuellirrojo

Pardela capirota

Pardela sombría

Avetoro común

Buitre negro

Elanio común

Quebrantahuesos

Cernícalo primilla

Cernícalo patirrojo

Polluela bastarda

Polluela chica

Sisón común

Chorlito carambolo

Correlimos gordo

Correlimos oscuro

Archibebe fino

Págalo pomarino

Gaviota argétea europea

Gaviota de Delaware

Gavión atlántico

inglés

Greater White-fronted Goose

Greater Scaup

Common Goldeneye

Long-tailed Duck

Marbled Teal

White-winged Scoter

White-headed Duck

Common Eider

Ruddy Shelduck

Black-throated Diver

Great Northern Diver

Red-throated Diver

Slavonian Grebe

Red-necked Grebe

Great Shearwater

Sooty Shearwater

Eurasian Bittern

Eurasian Black Vulture

Common Black-shouldered Kite

Bearded Vulture

Lesser Kestrel

Red-footed Falcon

Little Crake

Baillon's Crake

Little Bustard

Eurasian Dotterel

Red Knot

Purple Sandpiper

Marsh Sandpiper

Pomarine Skua

Herring Gull

Ring-billed Gull

Greater Black-backed Gull

<i>Chlidonias leucopterus</i>	Fumarel aliblanco	White-winged Black Tern
<i>Alle alle</i>	Mérgulo atlántico	Dovekie
<i>Fratercula arctica</i>	Frailecillo atlántico	Atlantic Puffin
<i>Uria aalge</i>	Arao común	Common Murre
<i>Pterocles alchata</i>	Ganga ibérica	Pin-tailed Sandgrouse
<i>Dendrocopos minor</i>	Pico menor	Lesser Spotted Woodpecker
<i>Chersophilus duponti</i>	Alondra ricotí	Dupont's Lark
<i>Anthus cervinus</i>	Bisbita gorgirrojo	Red-throated Pipit
<i>Anthus richardi</i>	Bisbita de Richard	Richard's Pipit
<i>Cercotrichas galactotes</i>	Alzacola rojizo	Rufous Scrub-robin
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Carricerín cejudo	Aquatic Warbler
<i>Hippolais icterina</i>	Zarcero icterino	Icterine Warbler
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Mosquitero ibérico	Iberian Chiffchaff
<i>Panurus biarmicus</i>	Bigotudo	Bearded Parrotbill
<i>Lanius collurio</i>	Alcaudón dorsirrojo	Red-backed Shrike
<i>Lanius minor</i>	Alcaudón chico	Lesser Grey Shrike
<i>Corvus frugilegus</i>	Graja	Rook
<i>Montifringilla nivalis</i>	Gorrión alpino	Snowfinch
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Camachuelo común	Common Bullfinch
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Escribano nival	Snow Bunting

-- Subespecies consideradas rarezas locales --

<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	Mosquitero común	Common Chiffchaff
<i>Calonectris diomedea borealis</i>	Pardela cenicienta	Cory's Shearwater
<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Lavandera blanca	White Wagtail

Listado de aves exóticas

Se incluyen en el anuario como un anexo, a continuación de la lista sistemática de aves, y se corresponde con especies pertenecientes a las categorías D y E. Su significado, de acuerdo la British Ornithologists' Union (BOU), el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de la SEO/BirdLife, es el siguiente:

Categoría D:

Especies que deberían aparecer en las categorías A o B, pero existen dudas razonables del origen natural de sus citas. No forman parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de la lista.

Categoría E:

Especies que han sido citadas como introducciones, transportadas o escapadas de cautividad, las poblaciones reproductoras de las cuales se cree que no se mantienen por ellas mismas. No forman parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de la lista.

- **E1** Especies de las que se ha comprobado la reproducción de forma regular, y de las que existen sospechas que pueden llegar a establecerse. Las especies en esta subcategoría

deben ser objeto de un especial seguimiento para eventualmente considerar su inclusión en la categoría C.

- **E2** Especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular u ocasional, sin ningún indicio de que se encuentren en proceso de establecimiento.
- **E3** Especies observadas solamente de forma ocasional, sin haberse constatado su reproducción.

****Más información sobre aves invasoras en España**

Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife Versión 2.4 -19 de marzo de 2006-

Abreviaturas utilizadas en el anuario

Basadas en diversos anuarios ornitológicos, se exponen a continuación las abreviaturas utilizadas en este Anuario Ornitológico de Castellón:

CV	Comunitat Valenciana	S.	sur	Ssp.	subespecie
I.	Iberia	NE	noreste	Máx.	máximo
PN	Parque Natural	Repro	reproducción	Mín.	mínimo
S^a	sierra	P. / pp.	pareja / parejas	i.e.	esto es, en otras palabras
Emb.	embalse	Pull	pollo	Observ.	observación
Bco.	barranco	Ad.	adulto	Sd.	sin datos
Urb.	urbanización	Subad.	subadulto	1^a pre.	primera cita prenupcial
P^o	puerto	Inm.	inmaturo	1^a post.	primera cita postnupcial
Ctra	carretera	Juv	juvenil / joven	1^a inv.	primera cita invernal
Desemb.	desembocadura	M.	macho	1^a est.	primera cita estival
Lag/lags	laguna/ lagunas	h.	hembra	Últ. pre.	última cita prenupcial
E.	este	Esp.	especie	Últ. post .	última cita postnupcial
O.	oeste	Subesp.	subespecie	Últ. inv.	última cita invernal
N.	norte	Sp.	especie	Últ. est.	última cita estival
In prep.	en preparación, en bibliografía cuando el artículo aludido se encuentra en fase de elaboración en el momento que es citado				
Op. Cit.	obra citada, en bibliografía cuando ya an sido citadas con anterioridad en el mismo contexto				
In verbis	información obtenida verbalmente				
En prensa	cuando el artículo aún no ha sido publicado, pero sí enviado, en el momento que es citado				
Et al.	en bibliografía, para citar a los autores de un artículo, cuando son tres o más				

Bibliografía

AERC TAC. 2003. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Online version: www.aerc.eu

Aymí, R. & Herrando, S. 2003. *Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2000*. Institut Català d'Ornitologia-ICO. Barcelona.

Bernis, F., de Juana, E., del Hoyo, J., Fernández-Cruz, M., Ferrer, X., Sáez-Royuela, R. & Sargatal, J. 1994-2003. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125 y 50(1): 103-110.

Cabo, M^a. J., Polo Aparici, A., Polo Aparici, M. (2000). *Aves de la Comunidad Valenciana 1999*. Societat Valenciana d'Ornitologia-SVO. Valencia.

Clavell, J. 2002. *Catàleg dels ocells dels Països Catalans*. Lynx Edicions, Barcelona.

Clavell, J., Copete, J. L., Gutiérrez, R., de Juana, E. & Lorenzo, J.A. 2005. *Lista de las aves de España*. SEO/BirdLife. Madrid.

CODA-SEO 1985. *Situación de la avifauna de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia*. Madrid.

Cramp, S., Simmons, K. & Perrins, C. 1977-1994. *The Birds of the Palearctic*. Vol. 1-9. Oxford University Press. Oxford.

de Juana, E., del Hoyo, J., Fernández-Cruz, M., Ferrer, X., Sáez-Royuela, R. & Sargatal, J. 2004. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola*, 51(2): 491-499; 52(2): 389-398; 54(1): 145-153.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. 1992-2002. *Handbook of the Birds of the World*. Vols 1 a 7. Lynx Edicions, Barcelona.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. 2003-2008. *Handbook of the Birds of the World*. Vols 8 a 13. Lynx Edicions, Barcelona.

Dies, J., Dies, B. & Caletrio, J. (eds.). 1989. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, 1988*. Vol. 1. València: Estació Ornitològica l'Albufera (SEO/BirdLife)

Dies, J. & Dies, B. 1995. Lista de las aves de la Comunidad Valenciana. Estatus y criterios de selección para colaboradores en el Anuario Ornitológico. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana*. Valencia.

Dies, J. & Dies, B. 1997. *Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana 1994*. València: Estació Ornitològica l'Albufera (SEO/BirdLife)

Dies, B., Dies, J., Oltra, C., García, F.J. & Catalá, F. J. 1999. *Las aves de l'Albufera de Valencia*. Ed. VAERSA. Valencia

Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. 2004. *Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2000*. Institut Català d'Ornitologia-ICO/Lynx Edicions. Barcelona

Gómez-Serrano, M. A., Jiménez Ripoll, M. , Dies, J., Dies, B. & Monsalve, M. A. 2000. *Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana 1995-1997*. València: Estació Ornitològica l'Albufera (SEO/BirdLife).

Knox, A. G., Collinson, M., Helbig, A. J., Parkin, D. T. & Sangster, G. 2002. Taxonomic recommendations for British birds. *Ibis* 144: 707-710

Miguel, B. & Font, J. V. 1990. El nom valencià dels ocells d'Europa. *Medi Natural* 1: 103-112.

Roncadell 1998. Boletín informativo de Roncadell, Grupo de Estudio y Defensa del Entorno. Valencia.

Snow, D., & Perrins, C. 1998. *The birds of the western Palearctic. Concise edition. Vol. 2.* Oxford: Oxford University Press.

Societat Valenciana d'Ornitologia-SVO 1995. *El Serenet*, 0, nº 1. Valencia.


Urios, V., Escobar, J., Pardo, R. & Gómez, J. (eds.). 1991. *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad Valenciana.* València: Conselleria d'Agricultura i Pesca. Generalitat Valenciana.

Voous, K. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species.* London: Revised edition. BOU.

Relación de municipios (UTM)

Provincia de Castellón			
Aín	YK22	Campos de Arenoso	YK04
Albocácer	BE47	Canales	XK91
Alcalá de Chivert	BE66	(<i>Pedania de Toga</i>)	
Alcora/L'Alcora	YK34	Canet lo Roig	BE69
Alcossebre		Castell de Cabres	BF50
(<i>Pedania de Alcalá de Chivert</i>)	BE65	Castellfort	YK38
Alcudia de Veo	YK22	Castellnovo	YK11
Alfondeguiella	YK31	Castellón de la Plana	YK53
Algimia de Almonacid	YK12	Castillo de Villamalefa	YK24
Almazora/Almassora	YK52	Catí	BE48
Almedijar	YK21	Caudiel	YK02
Almenara	YK30	Cedraman	
Alquerías del Niño Perdido	YK42	(<i>Pedania de Castillo de Villamalefa</i>)	YK24
Alquerias Santa Barbara	YK52	Cervera del Maestre	BE68
(<i>Pedania de Burriana</i>)		Chert/Xert	BE58
Altura	YK11	Chilches	YK40
Arañuel	YK13	Chodos/Xodos	YK35
Araya	YK33	Chóvar	YK21
(<i>Pedania de Alcora/L'Alcora</i>)		Cinctorres	YK39
Ares del Maestre	YK48	Cirat	YK13
Argelita	YK23	Coraxa	BF50
Artana	YK31	Cortes de Arenoso	YK05
Arteas de Abajo	XK91	Costur	YK44
(<i>Pedania de Bejís</i>)		Culla	YK46
Artesa	YK32	El Jinquer	YK22
(<i>Pedania de Onda</i>)		(<i>Pedania de Alcudia de Veo</i>)	
Atzeneta del Maestrat	YK45	El Tormo	YK13
Ayódar	YK23	(<i>Pedania de Cirat</i>)	
Azuébar	YK21	El Toro	XK92
Ballestar	BF60	Els Ibarsos	YK45
Barracas	XK93	(<i>Pedania de Sierra Engarcerán</i>)	
Bejís	XK92	Els Rosildos	YK56
Bel	BF50	(<i>Pedania de Sierra Engarcerán</i>)	
(<i>Pedania de Rossell</i>)		Eslida	YK31
Benafer	YK02	Espadilla	YK23
Benafigos	YK36	Fanzara	YK23
Benasal	YK47	Figueroles	YK34
Benicarló	BE87	Forcall	YL30
Benicasim/Benicàssim	BE43	Fredes	BF61
Benitandus	YK22	Fuente la Reina	YK03
(<i>Pedania de Alcudia de Veo</i>)		Fuentes de Ayódar	YK23
Benlloch	BE45	Gaibiel	YK12
Betxi	YK32	Gátova	YK10
Boixar	BF50	Geldo	YK11
Borriol	YK43	Giraba de Abajo	YK24
Burriana	YK41	(<i>Pedania de Ludiente</i>)	
Cabanes	BE44	Giraba de Arriba	YK24
Cálig	BE78	(<i>Pedania de Ludiente</i>)	

Grau de Castelló	BE42	Nules	YK41
(<i>Pedania de Castellón de la Plana</i>)		Olocau del Rey	YL20
Grau de Moncofà	YK40	Onda	YK32
(<i>Pedania de Moncofa</i>)		Oropesa del Mar/Orpesa	BE54
Herbés	YL51	Ortells	YL30
Herbeset	YL50	(<i>Pedania de Morella</i>)	
(<i>Pedania de Morella</i>)		Palanques	YL31
Higueras	YK12	Pavias	YK12
Jérica	YK02	Peñalva	YK11
La Alqueria	YK13	(<i>Pedania de Castellnovo</i>)	
(<i>Pedania de Montanejos</i>)		Peñíscola	BE87
La Barona	YK55	Pina de Montalgrao	YK03
(<i>Pedania de Vall d'Alba</i>)		Portell de Morella	YK39
La Foya	YK34	Puebla de Arenoso	YK04
(<i>Pedania de Alcora/L'Alcora</i>)		Ribesalbes	YK33
La Jana	BE68	Rios de Abajo	XK91
La Llosa	YK30	(<i>Pedania de Bejís</i>)	
La Mata de Morella	YK39	Rios de Arriba	XK92
La Monzona	YK04	(<i>Pedania de Bejís</i>)	
(<i>Pedania de Puebla de Arenoso</i>)		Rossell	BF60
La Pelechana	YK45	Sacañet	XK91
(<i>Pedania de Vall d'Alba</i>)		San Rafael del Río	BE79
La Poble de Alcolea	YL41	San Vicente de Piedrahita	YK14
(<i>Pedania de Morella</i>)		(<i>Pedania de Cortes de Arenoso</i>)	
La Poble de Benifassà	BF50	Sant Joan de Moró	YK43
La Poble Tornesa	YK54	Sant Jordi	BE78
La Ribera de Cabanes	BE54	Sant Mateu	BE68
(<i>Pedania de Cabanes</i>)		Santa Magdalena de Pulpis	BE77
La Salzadella	BE67	Sarratella	BE46
La Torre d'En Besora	YK46	Segorbe	YK11
La Vall d'Uixó	YK31	Sierra Engarcerán	YK56
Las Casas del Río	BF60	Soneja	YK11
(<i>Pedania de Rossell</i>)		Sot de Ferrer	YK20
Les Coves de Vinromà	BE56	Sueras/Suera	YK22
Los Calpes	YK03	Tales	YK32
(<i>Pedania de Puebla de Arenoso</i>)		Teresa	YK01
Los Cantos	YK04	Tirig	BE57
(<i>Pedania de Puebla de Arenoso</i>)		Todoella	YL30
Lucena del Cid	YK34	Toga	YK23
Ludiente	YK24	Torás	XK92
Mascarell	YK41	Torralba del Pinar	YK12
(<i>Pedania de Nules</i>)		Torre Endoménech	BE56
Matet	YK12	Torreblanca	BE65
Moncofa	YK41	Torrechiva	YK23
Montán	YK03	Traiguera	BE79
Montanejos	YK13	Useras/Les Useres	YK44
Morella	YL40	Vall d'Alba	YK55
Morella la Vella	YL40	Vall de Almonacid	YK12
(<i>Pedania de Morella</i>)		Vallat	YK23
Navajas	YK11	Vallibona	BE59
Novaliches	YK02	Veó	YK22
(<i>Pedania de Jérica</i>)		(<i>Pedania de Alcudia de Veó</i>)	



- 236 -

Para consultar todos los datos, fotos y gráficos a color de los diferentes anuarios que se van desarrollando en la provincia de Castellón, pueden acceder a la web:

<http://www.internatura.org/aocs>

Anuario Ornitológico de Castellón
Apdo. de correos 237
12500 Vinaròs

E-mail: info_aocs@internatura.org

Este anuario ha sido generado automáticamente desde la aplicación de gestión de anuarios on-line que forma la web del anuario de la provincia de Castellón, a excepción de la portada y de los trabajos publicados en los anexos.

Desde estas últimas líneas, mandamos un agradecimiento a todas las personas-colaboradores que han hecho posible que exista esta publicación y su versión on-line.

Contraportada: "Aves del bosque".

Autor: Vicent Esteller Turlo

(de izq. a dcha. y de arriba abajo)

Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*)

Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Papamoscas gris (*Muscicapa striata*)

Carbonero garrapinos (*Parus ater*)

Agateador común (*Certhya brachydactyla*)

Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Mito (*Aegithalos caudatus*)

Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Reyezuelo listado (*Regulus ignicapilla*)

Reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*)

Herrerillo común (*Parus caeruleus*)

