



**Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana
Volumen XV
Años 2012-2013**

**ANUARIO ORNITOLÓGICO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA 2012 - 2013
VOL. XV**

Comité Editor:

Antonio Alcocer, José Bort, Vicente Esteller, Manuel García, José Greño, Enrique Luque, Jana Marco, Miguel Tirado & Pablo Vera

Dirección técnica y coordinación:

Juan Luis Bort & Jose Bort

Diseño gráfico y maquetación:

Miguel Tirado

Portada:

Paño europeo (*Hydrobates pelagicus*). Foto Victor París.

Cita recomendada: Tirado, M., Vera, P., Marco, J., Alcocer, A., Bort, J., García, M., Esteller, V., Greño, J. & Luque, E. 2017. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. Vol. XV. 2012 - 2013. Internatura. Castellón.

Para los artículos: Viedma, C. 2017. La focha moruna en la Comunidad Valenciana (1999-2014): logros y dificultades del proyecto de reintroducción. En Tirado, M., Vera, P., Marco, J., Alcocer, A., Bort, J., García, M., Esteller, V., Greño, J. & Luque, E. 2017. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. Vol. XV. 2012 - 2013. Pág. 207-211. Internatura. Castellón.

La publicación del presente libro ha sido posible gracias al soporte económico de las siguientes asociaciones sin ánimo de lucro:

Societat Valenciana d'Ornitologia. SVO.

Sociedad Española de Ornitología / Birdlife Internacional- Delegación SEO/BirdLife-Valencia.

Grup Au d'Ornitologia.

Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina. APNAL - Ecologistes en Acció Vinaròs.

Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires. GER - Ecologistes en Acció Vila-real.

Sociedad Española de Ornitología / BirdLife Internacional- Grupo Local SEO/BirdLife-Alicante.



© 2017 Internatura

ISSN 1885-6624

Dipòsit legal: CS-407-2005

Dirección de contacto:

Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana

Apdo. de correos 237

12500 Vinaròs

info_aocv@internatura.org

La coordinación de la edición de este Anuario y la selección y edición de las citas se han gestionado y tratado desde Internatura mediante una aplicación web diseñada y desarrollada por Juan Luis Bort y Jose Bort (internatura.org/aocv).

Internatura autoriza la reproducción y difusión de los datos contenidos en esta publicación con fines didácticos y científicos siempre que se cite correctamente el origen de los mismos. Las fotografías son propiedad de los autores y no pueden ser utilizadas, copiadas, transmitidas o cedidas sin su expresa autorización.

Editorial

Vivimos en una época de gran incertidumbre para la conservación de la naturaleza. Hoy en día, lejos de desaparecer, las presiones por parte de determinados sectores sociales hacia los espacios naturales y su fauna, son evidentes y están aumentando en varios frentes. La urbanización de las zonas litorales y prelitorales, la contaminación, la presión cinegética o las dudas y la falta de convicción política en la aplicación de las leyes en defensa de la naturaleza, están deteriorando nuestros ecosistemas y arrinconando las poblaciones de muchas especies de aves. Desde aquí, en estas páginas, observamos, a lo largo de los años, cómo algunas se van haciendo cada vez más escasas, hasta el punto de la extinción a escala local, mientras que otras (las comensales del hombre y las aves oportunistas) están en claro aumento. Esto son sin duda malas noticias para la vida salvaje y no debería de dejar indiferente a la sociedad.

Con este volumen doble, los anuarios de la Comunidad Valenciana cumplen 15 ediciones. El primer número, un pequeño anuario editado en 1988, recogió citas de 260 especies, en el que participaron 57 ornitólogos de campo. Este número que ahora editamos ha superado en ambos años las 310 especies (categorías A y C) y el número de colaboradores está por encima de los 360. Este crecimiento es una buena noticia para el medio natural, refleja el aumento de la sensibilidad hacia las aves salvajes, hacia sus poblaciones y hacia la conservación de la naturaleza. Cada observador, con sus citas, por escasas que sean, es importante, ya que este trabajo colaborativo hace crecer la cultura ornitológica y la ciencia. Desde esta publicación queremos contribuir de forma positiva y decidida a la conservación de las aves y sus hábitats a través de la divulgación de la riqueza ornitológica en nuestros espacios naturales.

Durante 2012 y 2013 se han citado 2 especies nuevas para la lista de aves de la Comunidad Valenciana: la gaviota cabecigrís, un adulto observado en la Albufera de Valencia en junio de 2013; y el pardillo sizerín, un bandito de 6 ej. observados en Altea, uno de los cuales se captura para anillamiento. Además se produce una nueva adición como consecuencia de un cambio taxonómico, al elevarse a la categoría de especie a la subespecie *molotnii* de la curruca carrasqueña, con el nombre de curruca subalpina (*Sylvia subalpina*). Con estas adiciones, y la reciente homologación de un correlimos cuellirrojo observado en la Albufera en 2008 (primera cita para España) esta lista alcanza las 418 especies.

Además de estas especies excepcionales, recogemos segunda cita para la Comunidad Valenciana de paíño de Swinhoe (un ej. capturado en la isla de Benidorm), de curruca

sarda (un ejemplar que se captura en el mes de mayo en la campaña Piccole Isole en isla Grosa), de carricero agrícola (un ave capturada en la Albufera de Valencia), y la tercera y cuarta citas de barnacla carinegra (puerto de Castellón y salinas de Santa Pola); la tercera cita de águila imperial ibérica en Villena o la cuarta y quinta citas de cerceta aliazul en la Albufera.

Entre las poblaciones nidificantes hay que destacar el aumento exponencial de la población de gaviota de Audouin, apoyada básicamente en las colonias de las instalaciones portuarias, y del morito, especie muy escasa a finales del s. XX y que en 2013 cuenta con una población de más de 180 parejas nidificantes. También se constata por primera vez la nidificación de la garceta grande, una especie que venía haciéndose más y más común en nuestros humedales en los últimos años.

En la parte negativa, hay que destacar que estos años tampoco se ha detectado la nidificación del escribano palustre iberooriental, que va camino de la extinción, y la progresiva rarefacción del bigotudo, en otras épocas ave representativa de nuestras marjales. Por último, en este número podemos observar cómo aumentan cada vez más las especies transaharianas con citas invernales: avetorillos, águilas calzadas, golondrinas, aviones o lavanderas boyeras, y cómo los rangos de presencia de otras muchas especies se desplazan hacia valores extremos, evidenciando los efectos del cambio climático.

Organización del anuario

Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las aves observadas en el territorio de la Comunidad Valenciana durante los años 2012 y 2013. La información se presenta siguiendo la lista de aves propuesta por la Asociación de Registros Europeos y Comités de Rarezas (AERC TAC por sus siglas en inglés) *AERC List of Western Palearctic birds 2015* (Crochet & Joynt, 2015). Ésta es una asociación formada por miembros de los Comités de Rarezas de muchos países europeos que opera desde 1993 con sede en la isla alemana de Helgoland, que entre otros cometidos, se encarga de mantener una lista europea de aves. Esta asociación se reúne aproximadamente cada dos años, y sus decisiones taxonómicas son adoptadas por la mayoría de los comités de rarezas, y en consecuencia, se reflejan en las listas nacionales. Los nombres comunes en inglés se basan igualmente en esta lista; para los nombres castellanos se utiliza la *Lista de las Aves de España* (Gutiérrez et al. 2012) y las más recientes actualizaciones publicadas en el *Handbook of the Birds of the World* (del Hoyo et al., 1992-2013). Los nombres en valenciano provienen de la obra *El nom valencià dels ocells d'Europa* (Miguel & Font, 1990).

Las citas se presentan en dos grupos. En la lista sistemática (I) aparecen todas las aves comunes de las categorías A y C y las aves con rango de rareza local o estatal con citas recibidas. En la lista sistemática (II) recogemos las citas recibidas de las aves con categoría D y E.

Para la denominación de las localidades y lugares en los que se producen las citas, hemos seguido el nombre oficial actualizado de la Academia Valenciana de la Lengua (2014). En aquellos casos en los que se utiliza la denominación bilingüe se ha optado por utilizar la forma valenciana. En las citas de cada especie, las localidades aparecen ordenadas de norte a sur, y dentro de cada localidad, las citas se ordenan por fecha.

CENSOS

A medida que la ornitología de campo va creciendo, cada vez son más los censos coordinados que se llevan a cabo en nuestro territorio y los trabajos de seguimiento organizados con metodología estandarizadas. Estos trabajos son liderados, bien por la propia Administración, o bien por organizaciones de ornitólogos y naturalistas. Este tipo de trabajos aportan una información de primer orden al cuerpo de este trabajo, y en general, al conocimiento de nuestra ornitofauna, ya que normalmente, a través de una depurada metodología y de un seguimiento geográficamente bien planteado, en muchas ocasiones adquieren el carácter de censo (en sentido estricto). El seguimiento a largo plazo de estos trabajos aporta un valor adicional a estos seguimientos.

Los principales proyectos de seguimiento con los que contamos actualmente en la Comunidad Valenciana son los siguientes:

Censo de aves acuáticas nidificantes. Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. Este censo viene realizándose de forma ininterrumpida desde 1984 y es una de las fuentes de datos de mayor calidad sobre la ornitofauna en la Comunidad Valenciana. En este censo se prospectan en época de cría exhaustivamente todas las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, tanto las catalogadas como otras sin catalogar.

En el censo de este año han participado más de 40 ornitólogos y más de 10 asociaciones privadas y organismos públicos. Los datos que publicamos de estos censos no están referenciados con los censadores, como es habitual en el Anuario, ya que en muchas ocasiones resultaría excesivo, la autoría de las citas se referencia exclusivamente a la Consellería de Infraestructures, Territori i Medio Ambient (CMA). Se

pueden consultar los datos de los observadores junto a los resultados originales en: <http://www.citma.gva.es/web/biodiversidad/fauna>.

Censo de aves acuáticas invernantes. Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. El censo es el equivalente al de aves acuáticas nidificantes para la invernada y se lleva a cabo de un modo muy similar. Sirvan los comentarios introducidos en el párrafo anterior para este censo.

Censo de aves marinas invernantes del litoral de la Comunidad Valenciana. Este censo se lleva a cabo una vez al año durante el mes de enero. Tiene por objetivo hacer un conteo de las aves marinas desde un número de puntos de control a lo largo de toda la costa valenciana. Este censo se viene realizando desde el año 2002 de forma casi ininterrumpida. La coordinación es rotativa entre la Societat Valenciana de Ornitología y distintos ornitólogos de Alicante.

Además de estos censos coordinados, en la Comunidad Valenciana hay un total de 45 anilladores adscritos al Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife. La labor de seguimiento de estos anilladores se lleva a cabo fundamentalmente en zonas húmedas, aunque también en otros ambientes. La labor de anillamiento se enmarcan en programas organizados coordinados por el CMA (Programa PASER de anillamiento en primavera) o bien en proyectos gestionados por las Universidades valencianas o por asociaciones ornitológicas, en forma de Estaciones de Esfuerzo Constante (algunas de las cuales llevan casi 30 años de funcionamiento) o en forma de proyectos de seguimiento específicos de ciertas especies prioritarias. Toda esta información aporta igualmente citas de relevancia al cuerpo del Anuario.

CONSERVACIÓN Y CATALOGACIÓN

Se indica para cada especie el estado de conservación según la clasificación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en su revisión de abril de 2006. Sobre esta primera clasificación se aplica la normativa autonómica valenciana vigente. También es de aplicación, por tanto, el Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, que establece categorías y normas para su protección. Las distintas tipologías y sus abreviaturas, utilizadas para describir el estado de conservación de las especies es el siguiente:

PE: En peligro de extinción: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando.

SAH: Sensibles a la Alteración del Hábitat: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando. Aquellas especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, fraccionado o muy limitado y en grave regresión.

VUL: Vulnerables: Aquellas especies que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

IE: De Interés Especial: Son las que son merecedoras de una atención especial de acuerdo con el valor científico, ecológico o cultural que tienen, o por su singularidad.

EP: Especies Protegidas: Son las especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprovechamiento cinegético, consideradas beneficiosas o que no necesitan control habitual para evitar daños importantes a otras especies protegidas, a la ganadería, agricultura o a la salud y seguridad de las personas, la protección de las cuales exigen la puesta en marcha de medidas generales de conservación.

ET: Especies Tuteladas: Son especies no amenazadas ni sujetas a aprovechamiento cinegéticos que puedan necesitar controles para evitar daños. Se incluyen las especies silvestres capturadas con métodos tradicionales, que no comporten la muerte de los ej.

EC: Especies cinegéticas: Tomando como base el artículo 33.1 de la Ley 4/ 1.989, de 27 de marzo (especies sujetas a aprovechamiento cinegéticos). El régimen de protección y aprovechamiento de estas especies es el establecido por la legislación propia de caza y pesca, y las ordenes de la Consellería que fijan anualmente los periodos hábiles de caza y establece las vedas especiales en la Comunidad Valenciana.

CATEGORÍA

Las aves incluidas en la "Lista de las Aves de España" se clasifican en distintas categorías atendiendo al origen de sus poblaciones. Actualmente se utilizan las categorías A, B, C, D y E. Estas categorías fueron desarrolladas por la British Ornithologists' Union (BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife en España. La mayoría de las aves de un área corresponden a la Categoría A, por lo que tan solo indicamos la categoría de aquellas especies que no pertenecen a la Categoría A.

Categoría A: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez desde el 1 enero de 1950.

Categoría B: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez hasta el 31 de diciembre de 1949, pero no han sido citadas posteriormente.

Categoría C: Especies que, habiendo sido introducidas por el hombre, de manera deliberada o accidental, han establecido poblaciones reproductoras del grupo introducido, que se mantienen por ellas mismas sin tener que realizar posteriores introducciones. Esta categoría se subdivide en cinco grupos:

C1: Especies exóticas. Especies que están presentes como resultado de una introducción.

C2: Especies nativas introducidas. Especies con poblaciones establecidas como resultado de la introducción por el hombre, pero que también se citan en estado aparentemente natural.

C3: Especies reintroducidas. Especies con poblaciones reintroducidas con éxito por el hombre en áreas donde se encontraban anteriormente.

C4: Especies asilvestradas. Especies domésticas (i.e. seleccionadas artificialmente) con poblaciones establecidas en libertad.

C5: Especies naturalizadas en áreas vecinas. Especies con poblaciones naturalizadas establecidas en otros países (*áreas*) dentro de la misma región.

Categoría D: Especies que deberían aparecer con categorías A o B pero hay dudas razonables de que jamás se hayan observado en estado natural.

Categoría E: Especies que, habiendo sido introducidas o reintroducidas por el hombre deliberada o accidentalmente en la región, no han establecido poblaciones reproductoras que se mantengan por ellas mismas. Con las siguientes subcategorías:

E1: Especies de las que se ha comprobado la reproducción de forma regular, y de las que existen sospechas de que puedan llegar a establecerse. Las especies en esta subcategoría deben ser objeto de un especial seguimiento para eventualmente considerar su inclusión en la categoría C.

E2: Especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular u ocasional, sin ningún indicio de que se encuentren en proceso de establecimiento.

E3: Especies observadas solamente de forma ocasional, sin haberse constatado su reproducción.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

ad.: adulto

bco.: barranco

bnc.: barranc

CR-SEO: Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife

CRF: centro de recuperación de fauna

CV: Comunitat Valenciana

desem.: desembocadura

EDAR: estación depuradora de aguas residuales

Emb.: Embassament / Embalse

FC: fase clara

FO: fase oscura

h.: hembra

indet.: indeterminado (sexo o edad)

inm.: inmaduro

juv.: juvenil

m.: macho

m s.n.m.: metros sobre el nivel del mar

par.: pareja

RAM: red de observación de aves y mamíferos marinos

sp.: especie

ssp.: subespecie

subad.: subadulto

Listado de colaboradores

AAC	Antonio Alcocer Cordellat	CMT	C. Martínez
AAR	Alex Alamán Requena	CMU	Cristina Molina Uribe
ABC	Ángel Bel del Castillo	COA	Conchi Ovín Ania
ACB	Arturo Cabos Blanquer	COM	Carlos Oltra Martínez
ADP	Angel de Paz Collantes	CPF	Carlos Perles Fernández
ADQ	Adolfo Quiles	CPG	Cristian
ADV	albuferadevalencia.com	CRF	Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz
AGC	Agustín Gasulla Carbó		
AGI	A. García	CSK	C. Suikkannen
AGU	A. Guillém	CSL	C. Soler
AJR	Antonio Jacobo Ramos	CVA	C. Vadillo
ALL	Alfonso Lario Doylataguerra	CVV	Carlos Varea Valero
ALO	A. López	DBE	D. Beneyto
ALR	Ana Llopis Raimundo	DBS	Daniel Blasco Salvador
AMA	A. Martín	DCM	David Cañizares Mata
AMG	Alberto Martín Gil	DDO	D. Domingo
AMS	Antonio A. Martínez Serrano	DES	Des Norden
APA	A. Peña	DFR	David Fontcuberta Rubio
APL	A. Peral	DGS	Daniel Guijarro Sendra
APLA	A. Plà	DJA	D. Jareño
APO	Alberto Plata Ortiz	DMF	Daniel Musitu Ferrer
ARO	A. Royo	DMM	David Molina Molina
ASI	A. Signoli	DMO	D. Mons
ASL	Agustin Salazar	DNA	D. Navalón
ASM	Antonio Sáez Moñino	DOC	David Olmos Corral
ASN	Ángel Sánchez	EBA	Eduardo Barrachina Albert
ASZ	Ana Sanz Aguilar	EGM	Elías Gomis
ATE	A. Terrasa	EGN	E. González
AUR	A. Urcelay	EGO	Evarist Gómez
AVDH	Ana van der Hofstadt	EJA	E. Jareño
AVS	Alejandra Varó	ELL	Enrique Luque López
BCH	Barry Chambers	EPA	Emilio Pons Alberola
BDJ	Bosco Dies Jambrino	EPL	Ezequiel Prieto Lillo
BFM	Belén Fortea	ERO	Emilio Rosillo
BMA	B. Martínez	ESE	Eva Serrano
BMI	B. Millican	EVB	E. van der Brugge
BOR	Jorge Boronat Cortés	EVP	Eva Pérez
BSS	Bruno Sanchís Sánchez	FAN	Francisco Atienzar
CAG	Carolina García Ruiz	FBE	François Berthet
CAP	C. A. Prieto	FBM	Fernando Ballester Martínez
CAV	Carlos Varea	FCE	F. Ceresa
CAZ	Carmen Azahara	FEC	Fernando Camuñas
CCT	Cesar Colomer Tena	FFA	F. Farratell
CDR	Centro de Recuperación de Fauna "La Granja" de El Saler	FGN	Fundación Global Nature
CFA	Carlos Fabregat Llueca	FJC	F. J. Collado
CGM	C. Gómez	FJG	F. J. García
CMA	Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (incl. el Srv. de Biodiversidad)	FJS	Francisco Javier Sánchez
CMI	C. Micó	FLL	Fran Lloris
CMO	Carlos Mompó Zornoza	FPA	F. Pardavila
		FPV	Ferran Pujol Vila
		FRJ	Felip Redó Jornaler
		GALA	Grupo de Anillamiento del Limonero

	Alicantino	JID	José Ignacio Dies Jambrino
GAU	Grup Au d'Ornitologia	JJI	Juan Jiménez
GBA	Gonzalo Barcelón	JJU	J. J. Such
GCA	G. Castillo	JLA	Jose Luis Año Chavarría
GCH	Gregorio Chaguaceda Tomás	JLB	Juan Luis Bort Cubero
GGA	G. García	JLEC	Jose Luis Echeverría
GLI	Germán López Iborra	JLO	Julio Llorens Bejarano
GLL	Gabriel Llorens Folgado	JLR	J. L. Ribera
GMA	G. Marín	JMA	Jose Miguel Aguilar Serrano
GMG	Guille Mayor Guijarro	JMAB	J. M. Abril
GPR	Gloria Priego Martínez	JMAG	J. M. Aguilar
GTR	Grupo GOTUR/Fundación Global Nature	JMB	Javier Marchamalo Blas
GUM	Guardas Riu Millars	JMD	Jesus Moro Deordal
HAH	Havar Hveding	JME	J. M. Benavent
HFO	H. Forss	JMF	Juanma Ferreira
IBR	Isabel Bischooping Rosagaray	JMG	Julio Merayo García
IMR	Isabel Martín Rubusch	JMI	Jordi Miralles Garcia
IOL	I. Oltra	JML	Juan Carlos Monzó López
IRU	I. Ruíz	JMÑ	J. Máñez
JAA	J. A. García	JMR	J. Martínez
JAG	José Manuel Aragoneses García	JMS	J. M. Terrasa
JAGP	Juan Antonio García Pertegaz	JMT	Jana Marco Tresserras
JAI	Javier Armero Iranzo	JOB	Joan Balfagón
JAM	Juan Antonio Muyas Bercet	JPE	J. Pérez
JAR	Juan Manuel Aparicio Rojo	JPG	Juan Manuel Pérez-García
JAT	Juan Antonio Tornero Collados	JPH	Josep Puentes Higuera
JAU	J. Aguado	JPR	J. Peris
JBA	J. Badillo	JRA	J. R. Cancer
JBC	Josep Bort Cubero	JRH	J. Roth
JBE	J. Belenguer	JRN	J. R. Andreu
JBF	Javier Barona Fernández	JRS	Juan Rueda Sevilla
JBL	J. Blasco	JRU	José Ruiz Sanchis
JBO	Jorge Bonet	JSMG	Juan S. Monrós González
JBS	Juan Bautista Sorlí Guerola	JSN	J. Sánchez
JCA	Joan Castany Àlvaro	JSR	Jose Santamaria Reos
JCL	Juan Carlos Lino	JSU	J. Suay
JCM	Juan Carlos Monzó	JTN	J. Luís Terrasa Nebot
JCN	Juan Carlos Navarro Tárrega	JUL	Juan Lorite Martínez
JCS	Juan V. Capella Sancho	JVE	J. Ventura
JCU	Josep Casda Usó	JVI	Jesús Villaplana
JDL	Jose Domingo López Manchón	JVM	J. V. Muñoz
JDO	J. Domingo	JWE	J. Wenzel
JES	J. Escamilla	LAA	Luis Aleixos Alapont
JFE	J. Ferrer	LBA	L. Bavi
JFL	Francisco Jose Llacer	LFS	Luis Fidel Sarmiento
JFM	Joan Ferré Manzanero	LGB	Lucía Gimeno Berga
JGG	Francisco Javier García-Gans	LHE	Laura Hernández
JGL	Josefa Galindo López	LMA	L. Marco
JGM	Jose Gimenez Segarra	LMR	L. Moreno
JGN	J. Gans	LPC	Luis Pereda Cruz
JGOM	J. Gómez	LPP	Leopoldo Pérez Pérez
JGR	J. G. Recuero	LSO	L. Soler
JGS	José Antonio Gómez Sanchez	LUB	Luis Blanes
JHE	J. Hernández	LUR	Lourdes Urios
JHZ	J. Herzer	MAA	Miguel Angel Andrés
		MAB	M. A. Bartolomé

MAL	Mateo Aleixos Grau	PFV	Patricia Fernández
MAM	Miguel Agueras Moreno	PGR	Pepe Greño
MAN	M. Andrés	PIC	Piccole Issole
MAP	M. A. Pérez	PLA	P. Laborda
MBM	Miquel Barberá Manrique	PLP	Pau Lucio
MCC	María Jesús Cabo Calatayud	PMI	P. Millican
MCH	Miguel Chardí	PMP	Pedro Marín Prado
MCR	Manuel Carrascosa Pérez	PPA	Pep Portolés Alamà
MFN	M. Finn	PPL	P. Palau
MFS	Marcos Ferrández Sempere	PPP	Pablo Perales Pacheco
MGAR	M. Garetá	PRP	Pablo Ruiz Pallardó
MGE	Mariano Gañán Esteve	PSC	Pablo Sentís Castaño
MGI	M. Gimeno	PSJ	Paula San Julián Garcés
MGO	M. González	PVG	Pablo Vera García
MGP	Marcos González Pousa	PVP	Paula Villar Pastor
MGR	Mario Giménez Ripoll	RAA	Rafa Arroyo Argudo
MGT	Manolo García Tarrasón	RAG	Raúl González
MHS	Manuel Herrera Salazar	RAR	Raúl Ramos
MIA	Michelangelo Morganti	RBB	Roque Belenguer Barrionuevo
MJC	M. J. Cancer	RBE	Roberto Sánchez
MJS	M ^a Jesús Sanchis Carles	RBR	Raúl Bastida Ribes
MLA	Matthieu Lassalle	RCM	Rafa Casaña Martínez
MLP	Malcolm Palmer	RGG	Raúl García Gregorio
MMG	Miguel Mondria Garcia	RGR	R. Gracia
MMN	M. Martín	RLM	Rubén Limiñana Morcillo
MMO	Miguel Angel Monsalve	RLO	Rafael López Ochando
MMR	M. Martínez	RMB	Rafa Muñoz
MMV	Marcial Marín	RMQ	R. Marquina
MNY	M. Nylund	RMT	R. Martí
MOT	M. Otero	ROL	Rubén Oliver Tomàs
MPA	M ^a Carmen Pla Almenar	RPB	Ramón Prades i Bataller
MPB	Miguel Piera Bisbal	RSH	Raúl Sánchez-Serrano Heras
MPN	Manuel del Pino	SAO	Sdad. Albacetense de Ornitología
MPO	Manuel Polo	SAR	Sergio Arroyo
MPR	Manete Pérez Ramón	SBA	Sergio BARGUES PONCE
MQB	Manuel Quintana Becerra	SBE	S. Bevan
MRC	M ^a Carmen Casas	SBNT	SpainBirds Nature Tours
MRG	Marta Romero Gil	SCR	Stephan Cramer
MSA	Manolo Santonja	SDA	Servei Devesa Albufera-Ayto.Valencia
MSC	Máximo Sánchez Cobo	SEL	Saul Vara López
MSM	Mayra Sucías Mollá	SEO	SEO/BirdLife
MTB	Miguel Tirado Bernat	SEOA	SEO/BirdLife-Albufera pajarera
MYB	Marcial Yuste Blasco	SEOL	Grupo local SEO-Levante
NAG	Neus Avilés García	SEOV	SEO/BirdLife - Voluntariado Alas sobre agua
NMA	Natxo Mallea	SEV	Grupo Local SEO-Vanellus
NRA	N. Ramón	SLB	Salvador Llavata Berga
OAL	Oscar Aleixos Grau	SMS	Sergi Marzà Sebastia
OAP	Óscar Aldeguer Peral	SMY	S. Mayordomo
OGT	Oficina Gestión Técnica P. N. de l'Albufera	SOR	Salvador Ortiz
PAB	Pedro A. del Baño Moreno	SSI	S. Simeón
PAS	Pablo Santonja	SSM	Sandra Martínez Sanz
PCA	P. Carreño	SVI	S. Villa
PCC	Pep Cantó Corchado	SVO	Societat Valenciana d'Ornitologia
PCR	Paco Carratalà	TAL	Toni Almonacid
PPF	Pau Ferrer Poblete	TGS	Toni Garcia Sanz

TMF Toni Mulet Ferrer
TPA Toni Polo Aparisi
TPE Toni Pérez
TPR T. Pradillo
TRE T. Revert
TZL Toni Zaragozi Llenes
UFU U. Fuente
UME Ugo Mellone
VAT Valentín Tena
VBJ Virgilio Beltrán Jordá
VCS Vero Cortés
VDA Vicente de Alba Mora
VES V. Estevens
VET Vicent Esteller Turlo
VGA Víctor Gallego Albiach

VGC Venancio Gran Corbi
VGS Vicente Gozávez
VLG Vicente Llorens
VLO V. López
VMV Valentín Moreno Villodre
VOO José Vte. Ortiz Olmos
VPA Victor París Huerta
VSA Vicent Selles Alamo
VUR Vicente Urios
VVA V. Valle
WMY Willy Mylemans
XAH Ximo Arévalo Hurtado
XBC Xavier Barreda Carbó
XGP Ximo Galarza i Planes

Agradecimientos

A Bosco Díes por la cesión de las citas de la web Birding Albufera, de la que provienen la práctica totalidad de las observaciones de la Albufera de Valencia.

A la Consellería de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, y especialmente a Juan Jiménez, Director del servicio de Biodiversidad, por la cesión los datos de los censos de aves nidificantes e invernantes en las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.

A Toni Polo por la cesión de los datos del programa del Atlas de Aves Migrantes de Valencia.

LISTA SISTEMÁTICA

(I)

CATEGORÍAS A Y C

ANSERIFORMES

ANATIDAE

Anser anser**Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose**

Estatus: Migrante e invernante escaso

2012

Desem. riu Millars: 21.X: 2 ej. observados en varias ocasiones hasta el 23.XII (MBM)

Les Alqueries: 30.X: 13 ej. migrando al S (JCS)

Albufera de València: 15.IV: 1 ej. en el tancat de l'Illa, observado también el 20.IV (BDJ, EGO,MCH); 29.X: 3 ej. sobrevolando el tancat de Milia en dirección al lago (AAC); 20.XI: 7 ej. (EGO,BDJ); 29.XI: 6 ej. en vuelo hacia el N (MCH,JID); 01.XII: 6 ej. (JHZ,BDJ); 05.XII: 2 ej. en el Racó de l'Olla (JHZ) observados de nuevo el 06.XII (BDJ); 09.XII: 1 ej. al amanecer en arrozales adyacentes al tancat de Milia (MPB); 13.XII: 3 ej. (BDJ)

Salines de Santa Pola: 23.I: 1 ej. (MLP); 21.XII: 6 ej. observados también el 26.XII (AJR)

El Fondo d'Elx: 19 ej. el 10.II, observados también el 15.II (OAP, SAR,AJR); 19.II: 6 ej.; 23.XI: 2 ej. (SAR); 19.XII: 2 ej. (OAP)

2013

Desem. riu Millars: 06.I: 2 ej. (GUM)

Albufera de València: 01.II: 6 ej. entrando desde la devesa al amanecer (MCH,JID) 15.XI: 2 ej. volando sobre el Racó de l'Olla (JID,MCH,GGA); 27.XI: 18 ej. en zonas inundadas del Malvinar (EGO,BDJ); 07.XII: 2 ej. volando sobre el Recatí hacia el N en día de tirada (MCH); 13.XII: 4 ej. en el Cavall (BDJ)

El Fondo d'Elx: 14.II: 2 ej. (CMA)

Hondo de Amorós: 28.XI: 5 ej. (AJR)

Citas invernales, exceptuando la de un ejemplar en abril de 2012 en arrozales de Sueca. Salvo el caso del grupo de aves en la desembocadura del río Mijares en 2012, no se observa una permanencia continuada durante el periodo invernal, probablemente como respuesta a las molestias ocasionadas por las prácticas cinegéticas.

Branta leucopsis**Barnacla cariblanca - Oca de galta blanca - Barnacle Goose**

Estatus: Divagante. Del E de Groenlandia a Nueva Zembla.

2012

Albufera de València: 1 ej. en el Racó de l'Olla observado de manera regular del 08.II al 11.V (VPA,FLL,JGR)

Cuarta cita de barnacla cariblanca en la Comunidad Valenciana en los últimos tres años, tras las citas del Prat de Cabanes-Torrellanca y de Elche de 2010 y l'Albufera de 2011. A pesar de la rareza histórica de esta especie en nuestra región (solo tres registros en l'Albufera anteriores a 1970) el importante número de observaciones en el invierno en España en 2010/2011, donde se citaron un total de 135 ej., hace pensar en un ejemplar salvaje, ya que la especie ha experimentado un importante aumento en las últimas décadas (de Juana & García, 2015).

Branta bernicla**Barnacla carinegra - Oca de collar - Brent Goose**

Estatus: Invernante raro del ártico.

2012

Puerto de Castellón: 22.I: 5 ej. descansando y alimentándose en una laguna (MBM), desaparecen a las pocas horas (MTB). Cita pendiente de homologación por el CR-SEO.

2013

Salines de Santa Pola: 27.XI: 1 ej. en la charca Canalets, presente hasta el 05.XII (JMT,AJR)

En la Comunidad Valenciana tan solo existen dos citas previas del año 2001 en Alicante, quizás de la misma ave, correspondiente a 1 ej. de la ssp. nominal. El ave observada en Santa Pola en 2013, asignada a la subespecie *horta*, no ha sido evaluada de momento por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Tadorna ferruginea**Tarro canelo - Ànec canyellat - Ruddy Shelduck**

Estatus: Visitante del N de África, escapado de cautividad. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 30.XI: 10 ej. volando a baja altura sobre el Cavall y hacia el interior zonas inundadas del vedat nou de Sueca (JMÑ,JRN,SSI)

La Vila Joiosa: 14.IX: 1 ej. (TZL)

2013

Albufera de València: 29.VII: 1 h. o juv. observado de forma continua hasta el 06.XI. A pesar que inicialmente se muestra bastante desconfiado, en las últimas fechas el ave llega a acercarse al paso de barqueros que le ofrecen alimento (AAC)

El Fondo d'Elx: 1 ej. el 18.VI, observado de nuevo el 26.VI en el parque de la Montcada (VGC,CMA)

El grupo de l'Albufera en 2012 es el mayor del que se tiene constancia en la CV. Los datos recibidos de estos dos años no hacen pensar en divagancia natural y si en aves procedentes de escapes de núcleos zoológicos o de colecciones privadas.

Tadorna tadorna**Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck**

Estatus: Migrante e invernante moderado, nidificante escaso localizado. Conservación: SAH

2012

Grau de Castelló: 20.V: 2 ad.; citas postnupciales de 1 ej. entre el 30.VIII y el 27.IX (MBM); 16.VIII: 1 juv. presente también el 30.VIII (PGR)

Desem. riu Millars: Cita prenupcial de 1 ej. el 18.II (GUM). Única cita postnupcial de 1 ej. el 17.IX (MBM)

Marjal d'Almenara: 14.I: 2 ej. Única cita anual (JBC,JLB)

Albufera de València: 01.II: 102 ej. en el Racó de l'Olla, subiendo a 246 el 15.II. Descenso a 144 ej. el 02.III comiendo, sesteando y realizando pautas de cortejo y a 53 ej. el 02.IV, con mínimo de 14 ej. el 18.IX y nuevos aumentos a 30 (el 02.XI) y a 80 el 30.XI (JID,MCH,IRU,AAC,GGA); En noviembre conteo de 85 ej. en el entorno del lago (SEO). 12 ej. emparejados en el tancat de Milia haciendo cortejos el 12.III (AAC)

Xeraco: 25.VIII: 26 ej. en la playa (AAC,IBR)

Serra de Fontcalet: 29.IV: 2 ej. observados en balsa de riego (JDL)

Salines de Santa Pola: Censos destacados de 781 ej. el 13.I y de 591 ej. el 19.XII (AJR)

Illa de Tabarca: 23.III: 2 ej. (AAR)

El Fondo d'Elx: Máximos destacados en la localidad: 09.II: 1.271 ej.; 15.V: 905 ej.; 13.VI: 578 ej.; 17.IX: 326 ej.; 21.XI: 396 ej.; 01.XII: 973 ej. (CMA)

2013

Albufera de València: 226 ej. el 08.II en el Racó de l'Olla (JID,MCH,GCA,IRU) con máximo prenupcial de 267 el 06.III (JID,MCH), descenso gradual durante la primavera a 42 ej. el 21.V (JID); máximo postnupcial de 24 ej. el 06.IX (JID,MCH,GGA,IRU); 18.XII: 359 ej. en la laguna y la mata del Fang (MCH,GGA); 14.VIII: 28 ej. en el tancat de Milia, con numerosas aves juv. (AAC). Censo destacado de 143 ej. en los vedats de Sueca el 27.XI (EGO,BDJ)

Serra de Fontcalent: 08.VI: 1 ej. observado en balsa de riego. Podría criar por la zona en alguna de las charcas en graveras de la zona (JDL)

Clot de Galvany: 08.III: 30 ej. (AJR)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: Censo anual destacado de 198 ej. el 09.IX (SAR)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Marjal dels Moros	0	17	0	8
Albufera de Valencia	4	130	8	144
Salinas de Calpe	2	3	2	5
Clot de Galvany	0	0	1	2
Salinas de Santa Pola	4	454	7	1.055
El Fondo	3	1.520	3	1.694
El Hondo de Amorós	0	0	0	4
Lagunas de la Mata-Torrevieja	0	31	2	6
Embalse de la Pedrera	10	8	8	11
EDAR Pilar de la Horadada	8	0	7	0

Censos de tarro blanco en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que apareció como nidificante o invernante. La especie se ha detectado como nidificante en un total de 7 y 8 (2012 y 2013) de 33 humedales censados, con un total de 33 y 34 par. Como invernante se ha detectado en 7 y 8 (2012 y 2012) de 48 y 50 humedales censados, con un total de 2.163 y 2.929 ej. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Durante el invierno 2012/2013 se alcanza la cifra de 2.163 ej. invernantes, con grandes concentraciones en el Fondo y las Salinas de Santa Pola. En el siguiente invierno 2013/2014 se vuelve a superar este récord histórico con un total de 2.929 ej. invernantes. Este aumento de la población invernante está acompañado por un aumento significativo de la población nidificante aunque con números mucho mas modestos, alcanzando totales de 34 parejas en 2012 y de 38 en 2013.

Anas penelope

Silbón europeo - Piuló - Eurasian Wigeon

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012**Marjal dels Moros:** 07.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV**Albufera de València:** 13.I: 48 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.III: Grupo de 18 ej. en zonas inundadas del marjal de Silla (PMP); 12.III: 6 m. en zonas inundadas del tancat de Naia (JAA,MPO,TPA,MCC,GLL); 01.VIII: 1 ej., aparentemente un m. en eclipse, en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial bastante temprana (CAV,AAC); 20.XI: 93 ej. censo de aves durante el inicio de la invernada (OGT)**Requena:** 11.III: 2 ej. (RMB)**Clot de Galvany:** 21.III: 1 m. (AJR)**Salines de Santa Pola:** 22.X: 12 ej. (SAR)**El Fondo d'Elx:** 09.II: 20 ej.; 21.XI: 102 ej.; 01.XII: 410 ej. (CMA)**Desemb. riu Segura:** 05.XII: 1 h. (AJR)**Desemb. del riu Algar:** 13.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV**2013****Albufera de València:** 11.I: 63 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.II: 10 ej. en el tancat de Milia (solo 1 m. ad.) (AAC,FGN); 14.II: 4 ej. en la punta de Llebeig (PVG); 01.X: 4 m. en eclipse en el tancat de Milia (AAC,FGN); 12.XI: 2 m. y 3 h. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO)**Clot de Galvany:** 04.I: 1 m. (AJR)**Salines de Santa Pola:** 25.X: 4 ej. (AJR); 21.XI: 5 ej.; 27.XI: 164 ej.; 04.XII: 195 ej. (AJR,SAR)**El Fondo d'Elx:** 18.I: 33 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 40 ej.; 16.XII: 4 ej. (CMA)**Emb. de La Pedrera:** 09.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

La tendencia de la especie durante la invernada continúa su camino descendente para sumar unos exiguos 51 y 104 ejemplares para los dos años de este anuario. Los números durante los últimos años del s. XX se encontraban habitualmente entre los 1.000 y los 2.000 ej., alcanzando ocasionalmente cerca de 5.000 (Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 2013). En diciembre de 2012 y 2013 se produce las máximas concentraciones de los últimos años en la región, con censos de 410 ej. en el Fondo d'Elx y de 195 ejemplares en las Salinas de Santa Pola.

Anas strepera

Ánade friso - Ascle - Gadwall

Estatus: Nidificante escaso localizado. Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Marjal dels Moros:** 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Albufera de València:** 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 13.I: 204 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 20.XI: 187 ej. (OGT). Citas destacadas en el tancat de la Pipa de 26 ej. el 17.IV. Presencia continuada de al menos 4 par., observándose comportamiento de cortejo entre algunos ej.; 11.VII: Al menos 3 juv. junto a 4 ad. (PVG)**Marjal de Xeresa-Xeraco:** 30 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JVI)**Salines de Santa Pola:** 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 23.X: 27 ej. (AJR)**El Fondo d'Elx:** 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 09.II: 108 ej.; 15.V: 17 ej.; 13.VI: 12 ej. (CMA)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Marjal dels Moros: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 11.I: 352 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 12.IV: 28 par. y 2 m. Máximo anual en el tancat de la Pipa (PVG); 04.VII: 2 h. seguidas de 8 y 4 pollos respectivamente de aproximadamente 3 semanas (PVG,BDJ,DMO); 14.II: 90 ej. en la punta de Llebeig (CAP,VDA,RGR,CSL,PVG)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 24 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 23.IX: 54 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 11.IX: 52 ej. (CMA)

Citas habituales de la especie, con máximos invernales en l'Albufera y Hondo, con una mayor importancia de l'Albufera en este periodo. Las concentraciones prenupciales destacadas en el tancat de la Pipa (l'Albufera) se traducen en la nidificación de una pareja en 2012 y dos en 2013, las primeras en este humedal desde 2001.

Anas crecca**Cerceta común - Sarset - Common Teal**

Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: EC

2012

Albufera de València: 26.VI: 1 m. en eclipse en el tancat de Milia (CAV,AAC); 16.VII: 5 ej. Primera cita postnupcial en el tancat de Milia (AAC); 07.IX: 27 ej. en un arrozal baldío del Pexinar (BDJ); 24.IX: 400 ej. en el tancat de la Pipa, máximo anual (PVG); 20.XI: 3.770 ej. la mayoría concentrados en el vedat nou de Sueca (OGT)

El Fondo d'Elx: 09.II: 653 ej. (CMA)

2013

Albufera de València: 16.VII: 2 ej. Primera observación postnupcial en el Racó de l'Olla (JID); 25.IX: 340 ej. en el tancat de la Pipa. Aumento notable de ej. respecto a días anteriores (PVG); 24.XI: 235 ej. salen volando de la bassa de Sant Llorenç (BDJ)

Clot de Galvany: 21.II: 380 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: Censos destacados de 617 ej. el 18.I y de 540 el 14.II; 2 ej. el 21.V (CMA)

Localidad	2012	2013
	Ejemplares invernantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	13	0
Embalse de M ^a Cristina	0	15
Desem. río Mijares	239	132
Marjal dels Moros	1.545	1.100
Marjal de Rafalell y Vistabella	12	28
Albufera de Valencia	2.502	2.909
Clot de Galvany	344	177
Salinas de Santa Pola	13	41
El Fondo	639	617

Censos de cerceta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se detectaron al menos 10 ej. invernantes. La especie se ha detectado como invernante en 8 (2012) y 11 (2013) de un total de 48 y 50 humedales censados, para un total de 5.307 y 5.034 ej. respectivamente. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Anas carolinensis**Cerceta americana - Sarset de Carolina - Green-winged Teal**

Estatus: Divagante de N América

2013

Albufera de València: 29.I: 1 m. integrado en un bando de cerceta común en el Racó de l'Olla. A pesar de buscarse de forma continuada, es relocalizado únicamente los días 12.II y 20.II (JID,MCH,IRU,GGA,JRA,BDJ)

Especie que no se citaba desde hace 8 años, tras un ej. que estuvo deambulando entre finales de febrero y principios de marzo de 2005 entre el Clot de Galvany y la Albufera de Valencia. Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al., 2017), supone la quinta para la CV.

Anas platyrhynchos

Ánade azulón - Coll-verd - Mallard

Estatus: Residente e invernante común. Conservación: EC

2012

Albufera de València: 24.IX: 2.750 ej. censo destacado en los filtros verdes del tancat de la Pipa (PVG); 20.XI: 20.680 ej. la mayoría concentrados en los vedats de Silla y Sueca (OGT). 18.V: 1 m. aparentemente híbrido *A. platyrhynchos* x *strepera* en Sollana. Sigue presente el 29.V (AAC,CAV)

2013

Albufera de València: 11.III: Se observa de manera continuada 1 m. híbrido *A. platyrhynchos* x *strepera* en el tancat de Milia hasta el 01.VII (AAC,FGN) 11.IV: 1 m. híbrido *A. platyrhynchos* x *strepera* alimentándose en campos labrados cerca de El Palmar (AAC)

El Fondo d'Elx: 14.II: 784 ej. máximo anual (CMA)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	16	179	12	47
Desem. río Mijares	10	63	8	21
Marjal de Almenara	120	26	100	4
Marjal dels Moros	98	356	110	500
Marjal de Rafalell y Vistabella	12	137	20	45
Barranc del Carraixet	15	24	8	57
Cauce nuevo del río Turia	13	10	18	34
Albufera de Valencia	2.715	24.055	1.985	16.993
Embalse de Bellús	9	176	41	190
Marjal de Xeresa-Xeraco	40	11	50	12
Marjal de Pego-Oliva	46	658	60	120
Salinas de Calpe	30	76	31	34
Salinas de Santa Pola	28	34	33	51
El Fondo	204	279	127	417
Embalse de la Pedrera	11	107	10	39

Censos de ánade azulón en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 15 parejas o invernaron 50 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 26 de 33 humedales (para un total de 3.416 par. en 2012 y 2.648 par. en 2013), mientras que como invernante se ha detectado en un total de 36 de 48 humedales censados para un total de 26.514 ej. en 2012 y 18.830 ej. en 2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. + no cuantificadas. - censo incompleto o no realizado

Anas acuta

Ánade rabudo - Cua de jonc - Northern Pintail

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 1 m. (RPB,ALR,ADP)

Marjal d'Almenara: 08.III: 2 ad. observados hasta el 16.III (JBC,JCS,JLB,SIJ)

Marjal dels Moros: 07.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 1.297 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.III: 15 ej. en zonas inundadas de la marjal de Silla (PMP); 22.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primer registro postnupcial (AAC); 01.X: 10 ej. posado en el mar a cierta distancia de la costa (MCH,JID,IRU,GGA); 20.XI: 464 ej. censo durante el inicio de la invernada, la mayoría concentrados en el vedat nou de Sueca y Silla (OGT)

Cullera: 15.XI: 230 ej. en zonas altas de la Bassa Rasa (JGR,BDJ)

Guadasequies: 21.I: 1 ej. (BOR)

Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 383 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Salines de Santa Pola: 18.I: 9 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 09.II: 139 ej. máximo prenupcial; última cita prenupcial de 2 ej. el 22.III; 17.X: 26 ej. máximo postnupcial; 01.XII: 1 ej. (CMA)

Cap Cervera: 22.X: 22 ej. (SAR)

2013

Albufera de València: 11.I: 534 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 3 par. en la punta de Llebeig y arrozales próximos (CAP,VDA,RGR,CSL,PVG). 2 m. en el tancat de la Pipa el 03.IV y 1 solo ej. el 16.IV presente desde el 21.III (PVG); 30.VIII: 1 m. en eclipse y 1 h. o juv. en el tancat de Milia. Subiendo a 5 ej. el 02.IX y máximo de 14 ej. el 02.X (AAC). 16.IX: 4 ej. alimentándose en un arrozal baldío de la Malva (BDJ)

Clot de Galvany: 09.II: 1 m.; 08.III: 1 m. (AJR)

Salines de Santa Pola: 23.IX: 3 ej.; 25.X: 6 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: Máximo prenupcial de 4 ej. el 14.II. Citas postnupciales de 1 ej. el 02.X y máximos anuales de 8 ej. el 15.XI y de 9 ej. el 16.XII (CMA)

Emb. de La Pedrera: 09.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Cifras con altibajos en l'Albufera que se traducen en los registros de la especie, dadas los excepcionalmente bajos censos en los humedales del sur de Alicante en 2012 y 2013, donde la especie se registra de manera ocasional.

Anas querquedula

Cerceta carretona - Roncadell - Garganey

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: EC

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 24 ej. (MBM); 19.III: 1 m. ad. (AMG)

Desem. riu Millars: 15.III: 4 ej. (GUM)

Marjal d'Almenara: 13.III: 1 par. (JBC,JLB); 17.III: 3 ej. (MBM)

Albufera de València: 13.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 10.III: 5 ej. moviéndose en pastizales encharcados a primera hora de la mañana (PVG); 14.III: 16 ej. en el tancat de la Pipa (MLA,PVG); 13.VII: 1 ej. Primer registro postnupcial en el tancat de Milia, máximo en paso postnupcial de 36 ej. el 10.VIII (AAC); 24.IX: 4 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 15.X: 3 ej. en el Racó de l'Olla (JID)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Pantà d'Elx: 02.IX: 1 ej. (OAP)

Clot de Galvany: 29.III: 6 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.III: 6 ej. (CMA)

Emb. de La Pedrera: 16.III: 7 ej. (SAR,AJR)

2013

Marjal dels Moros: 29.IV: 1 ej. (FFA)

Albufera de València: 11.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 20.II: 1 m. en el Racó de l'Olla, primera observación prenupcial (JID,MCH,GGA,IRU); 29.IV: 9 ej. en el tancat de Milia (solo 2 h.) (AAC); 29.V: 1 m. en la punta de Llebeig (PVG,APA); 02.VII: 2 ej. Primera observación postnupcial (JID,MCH,IRU,GGA); 30.VII: 4 ej., aparentemente 3 juv., en un arrozal baldío del Tremolar (BDJ); 14.VIII: 8 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 29.VIII: 11 ej. en el tancat de Milia y 2 ej. en el tancat de l'Illa (AAC,FGN); Citas postnupciales en la mata del Fang de 2 ej. el 13.IX (MCH,JID,GGA) y el 22.X (JID,MCH,IRU); 05.XII: 1 ej. (juv. o h.) en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU)

Requena: Citas en la balsa El Pontón de 1 m. el 01.III (PRP), de 1 ej. el 30.III y el 15.V (RMB) y 1 m. ad. el 23.V (PRP)

Emb. de Beniarrés: 07.IV: 2 ej. (BOR)

Pantà d'Elx: 20.VII: 1 ej.; 23.VIII: 2 ej.; 04.IX: 1 ej. (OAP)

Elx: 22.III: 1 m. (SAR)

Destacan las cifras alcanzadas en el paso prenupcial de 2012 en el Prat de Cabanes-Torreblanca y el tancat de la Pipa en l'Albufera, la nidificación de una pareja en Xeresa y el paso postnupcial en el tancat de Milia, en l'Albufera, con hasta 36 aves. En 2013 destacan las citas de un macho durante el periodo de reproducción y un ejemplar invernante, ambos en l'Albufera.

Anas discors**Cerceta aliazul - Sarset alablau - Blue-winged Teal**

Estatus: Divagante de N América. Escapado o liberado de cautividad.

2012

Albufera de València: 02.V: 1 m. en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 09.XI: 1 m. nadando junto con cerceta común en la mata del Fang. Es observado de forma regular en esta localidad y el Racó de l'Olla hasta el 24.XI (MCH,JID,IRU,GGA,BDJ,AAC)

Requena: 27.III: 1 ej. aparentemente híbrido *A. clypeata* x *discors*, nadando junto a cerca de 40 cucharas comunes (PRP)

Las citas de la Albufera han sido homologadas por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017) y suponen la cuarta y quinta citas para la CV. La cita de Requena ha sido rechazada (ver explicación en Copete et al. 2015)

Anas clypeata**Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler**

Estatus: Invernante común, migrante moderado. Conservación: EC

2012

Desem. riu Millars: 24.I: Máximo anual en la localidad de 24 ej. (RPB,JBC)

Albufera de València: 04.III: 375 ej. en Catarroja (BDJ); 23.III: 74 ej. en el tancat de la Pipa, la mayor parte emparejados; 30.V: 1 h. seguida de 3 pollos y 1 m. en eclipse en el tancat de la Pipa (SEOV); 02.VII: 6 ej., 4 de ellos m. en eclipse, a primeras horas de la mañana en el tancat de Milia (JID,AAC); 20.XI: 6.890 ej. censo completo invernal, la mayoría concentrados en los vedats de Sueca (OGT); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Guadasequies: 18.II: 338 ej. (BOR)

El Fondo d'Elx: 22.III: 3.202 ej.; 21.XI: 6796 ej. (CMA)

Emb. de La Pedrera: 16.II: 68 ej. (SAR)

2013

Albufera de València: 06.V: 5 m. realizando continuos cortejos a una h. en el tancat de Milia (AAC); 13.VI: Primera observación de 1 h. tras cerca de dos meses de ausencia. Presente también el 21.VI (PVG); 17.VI: 2 m. en eclipse en el Racó de l'Olla (JID); 22.VII: 6 ej. en el tancat de Milia presentes también el 31.VII (AAC,FGN); 08.VIII: 20 ej. en el tancat de Milia (AAC); 27.XI: 10.160 ej. máximo otoñal previo al inicio de las tiradas en los vedats de caza (OGT)

El Fondo d'Elx: Censos destacados de 2.341 ej. el 18.I; 6.172 ej. el 14.II y 1.786 ej. el 26.III (CMA); 02.VII: 1 par. (AJR); 16.VII: 12 ej. (CMA)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Marjal de Almenara	0	24	0	12
Marjal dels Moros	0	2.121	0	800
Marjal de Rafalell y Vistabella	0	5	0	21
Albufera de Valencia	1	5.608	0	9.164
Embalse de Bellús	0	220	0	158
Marjal de Pegó-Oliva	0	109	0	1
Clot de Galvany	0	39	0	41
Salinas de Santa Pola	0	53	0	57
El Fondo	0	4.053	0	2.341
Embals d'Elx	0	12	0	17
EDAR Pilar de la Horadada	0	12	0	66

Censos de cuchara común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se detectó como nidificante o invernante. Como nidificante se ha detectado en un único humedal de 33 censados, mientras que como invernante se ha detectado en un total de 11 de 48 humedales censados para un total de 12.256 ej. en 2012 y 12.678 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

De igual manera que con otras anátidas, los humedales artificiales de l'Albufera acogen importantes grupos en el paso prenupcial tanto en 2012 como 2013, que se traduce en la reproducción de una pareja en el tancat de la Pipa en 2012 (aunque se registra la presencia continuada de ejemplares durante el periodo nupcial de 2013, sin constatar su reproducción). En cuanto a la población invernante, periodo con cifras ligeramente mayores a las de los años anteriores, aunque lejos de los máximos de principios de los años 90, cuando se superaban las 30.000 aves.

Marmaronetta angustirostris**Cerceta pardilla - Roseta - Marbled Teal**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Conservación: PE

2012

Albufera de València: 26.III: 3 ej. en el Racó de l'Olla del grupo de 4 aves liberadas el 22.III el marco del plan de conservación de la especie desarrollado por la Generalitat Valenciana, y presentes de forma continua hasta el 19.IV (JID); Nuevas citas en el Racó de l'Olla de 5 ej. el 26.IV, 2 de las aves forman pareja y no llevan anilla. Presentes hasta el 02.V (JID,MCH); Citas de 1 par. el 15.V (JID) y hasta 3 ej. el 25.V (2 m. y 1 h.) mostrando pautas de cortejo (MCH,JID) y de nuevo 3 m. el 01.VI (MCH,JID,IRU); Citas primaverales en el tancat de Milia entre el 02.V y el 29.VI de hasta 4 ej. (CAV,AAC,PMP). Tras ausentarse durante

el periodo reproductor. Vuelven a observarse 3 ej. en el tancat de Milia el 26.VII; por último, varias citas de 1 o 2 ej. hasta el 08.VIII (CAV,AAC). Citas postnupciales en el Racó de l'Olla de 1 ej. el 05.VII (JID) y varias citas de hasta 2 ej. durante el mes de agosto (JID,GGA,MCH); 28.XI: 1 ej. no anillado en el Racó de l'Olla (JID). 25.X: 2 ej. junto con cercetas comunes en la punta de Llebeig (PVG); 18.XII: 3 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH)

Marjal de Pego-Oliva: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 14 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 17.IX: 25 ej. (CMA)

2013

Marjal dels Moros: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 22.V: 1 par. en la zona de saladar. Primera observación anual de la especie (JID,MCH); 07.VI: 1 par. en el tancat de Milia, que podría ser la observada días atrás en el Racó de l'Olla; 11.VII: 1 ad. acompañado por 7 pollos (JID,MCH,IRU); 05.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC); 29.VIII: 2 ej. en el tancat de Milia y 1 ej. en el tancat de l'Illa. Aparentemente el mismo grupo de aves se observa en el Racó de l'Olla y la mata del Fang hasta el 18.X (la víspera del inicio de la apertura de la veda de caza de acuáticas) (AAC); Citas de 1 ej. el 14.XI en la mata del Fang (MCH,DNA,JID,GGA) y de 3 ej. el 20.XII (MCH,GGA)

Salines de Santa Pola: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 22.IV: 6 ej. (CMA); 29.IV: 2 ej. (SAR); 21.V: 23 ej.; 18.VI: 10 ej.; 16.VII: 18 ej. (CMA)

Cifras muy modestas durante la reproducción de 2013 en los humedales del sur de Alicante, poniendo de manifiesto un año más la delicada situación de la especie en nuestra región (12 parejas en 2012)

Netta rufina

Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard

Estatus: Residente y nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Conservación: EC

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 270 ej. (MBM); 01.V: 45 ej. (AMG)

Albufera de València: 20.XI: 4.885 ej. la mayoría concentrados en el vedat nou de Sueca (OGT); 18.VI: 85 ej. en la replaza de Zacarés. Importante concentración en pleno periodo reproductor (EGO,PVG,JME,FPA,BDJ)

Pantà d'Elx: 09.VI: 1 h. seguida de 8 pollos. El mismo grupo familiar, con los pollos totalmente crecidos, es observado el 06.VIII (OAP)

Clot de Galvany: 29.V: 2 par. con pollos (AJR)

Salines de Santa Pola: 12.VIII: 68 ej. (SAR)

El Fondo d'Elx: 09.II: 616 ej. (CMA)

Emb. de La Pedrera: 16.III: 230 ej. (SAR,AJR)

2013

Sant Jordi: 16.II: 108 ej. (ELL)

Marjal d'Almenara: 04.IV: 140 ej. (63 h. y 90 m.) (JLB)

Albufera de València: 12.III: 520 ej. (323 m. y 197 h.) en el tancat de la Sardina (SEOV); 18.V: 58 ej. en el tancat de Milia, de los cuales 36 son m., y se observan 2 h. seguidas de pollos (AAC); 20.VII: 1 h. seguida de 4 pollos cercanos a los dos meses de vida en arrozales del tancat de la Sardina (PVG); 22.X: 2.070 ej. en la mata del Fang. Notable aumento de efectivos en los últimos días que cuadruplica el máximo censado hasta la semana pasada (JID,MCH,IRU); 23.XI: 1 m. mostrando rasgos de hibridación con ánade azulón. Observado posteriormente el 23.XI, 04.XII, 05.XII y 18.XII (GGA)

El Fondo d'Elx: 26.III: 311 ej.; 22.IV: 230 ej.; 18.VI: 154 ej. (CMA)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	6	47	6	35
Marjal de Almenara	4	32	13	8
Marjal dels Moros	33	124	75	500
Albufera de Valencia	30	4.821	39	3.204
Marjal de Xeresa-Xeraco	10	1	5	1
Marjal de Pego-Oliva	4	24	4	0
Salinas de Santa Pola	7	0	38	16
El Fondo	191	409	85	258

Censos de pato colorado en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican localidades con al menos 10 parejas nidificantes o 20 ej. invernantes. Como nidificante se ha detectado en 11 (2012) y 12 (2013) humedales de 33 censados, con unos totales de 289 y 271 par. respectivamente, mientras que como invernante se ha detectado en un total de 11 (2012) y 10 (2013) de 48 humedales censados para un total de 5.491 ej. en 2012 y 4.409 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Censos discretos de aves invernantes, con cerca de 5.500 aves en 2012 y 4.000 aves en 2013, mientras que la población nidificante tiene un ligero aumento en 2012 con 289 parejas concentradas en humedales del sur de Alicante, aunque lejos de los máximos de 650 parejas en los años 80 o las 500 parejas en los años 1995-1996.

Aythya ferina

Porrón europeo - Boix - Common Pochard

Estatus: Migrante e invernante común, nidificante escaso. Conservación: EC

2012

Marjal dels Moros: 07.I: 29 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 30 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 44 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 52 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 20.IV: 75 ej. (32 h.) en el Racó de l'Olla (JID,MCH)

El Fondo d'Elx: 12.I: 976 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 3.043 ej.; 15.V: 3.108 ej.; 13.VI: 2.666 ej.; 01.VIII: 1.368 ej.; 21.XI: 3.511 ej. (CMA); 904 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Emb. de La Pedrera: 16.III: 229 ej. (SAR,AJR)

EDAR Pilar de la Horadada: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Marjal platja Benavites: 19.VIII: 7 ej. (MBM)

2013

Marjal dels Moros: 50 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 11.I: 545 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 48 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 80 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 18.I: 1.863 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 2.307 ej. ; 26.III: 2.847 ej.; 22.IV: 1.680 ej.; 21.V: 1.499 ej.; 18.VI: 1.014 ej.; 16.VII: 371 ej. (CMA); 466 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Periodo de recuperación de la población invernante tras 5 años de tendencia negativa, alcanzando las 2.479 aves, concentradas principalmente en el Hondo y, en menor medida, en l'Albufera. Cifras prenupciales destacadas en el Hondo en ambos años, que se traducen en el máximo número de parejas registrado desde 1980.

Aythya nyroca**Porrón pardo - Roget - Ferruginous Duck**

Estatus: Migrante raro. Conservación: PE

2012**Desem. riu Millars:** 17.IX: 1 ej. observado hasta el 23.IX (MBM)

Albufera de València: 02.III: 1 par. comiendo y sesteando en el Racó de l'Olla, se mantiene cohesionada en todo momento (JID), nueva cita de 1 m. el 21.III (JID,MCH) y de nuevo 1 ej., aparentemente m., el 16.VIII (BDJ); 27.VII: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP,MPB); 01.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia (AGU,JDO); 03.X: 1 m., seguramente ad., en la mata del Fang. Primera cita postnupcial (JID,MCH); 19.X: 1 m., posiblemente de 1.^{er} inv., en el Racó de l'Olla (JID,IRU,GGA); 21.X: 1 m. en compañía de otros porrones en la mata del Fang, observado también los días 29.X y 03.XI (JHZ,BDJ), aumento a 3 ej. el 05.XI (2 m. y 1 h) (JID) y a 4 ej. el 09.XI (3 m. y 1 h.). Se observan reiteradas pautas de cortejo entre ellos y junto con porrón europeo. Observados también el 20.XI (MCH,JID,IRU,GGA,BDJ,AAC); Máximo anual de 6 ej. (4 m. y 3 h.) el 30.XI (AAC) aún 5 ej. el 08.XII (3 m.) (JHZ,BDJ); 04.X: 1 m. mostrando caracteres propios de los híbridos *A. nyroca x ferina* (MCH,JID); se vuelve a observar los días 12.XI y 11.XII (MCH,JID,IRU,GGA); 29.X: 1 ej. alimentándose junto con fochas comunes en zonas inundadas del Malvinar (BDJ); 21.XI: 3 ej. aparentemente un sólo m. en el tancat del Dulero (MAB,BDJ,OGT,CMA); 29.XI: 1 m. en el tancat de Milia (AAC)

Pantà d'Elx: 01.VIII: 3 ej.; 08.VIII: 1 m.; 10.VIII: 2 m. y 1 h. o juv.; 16.VIII: 2 m. (OAP)

Emb. de La Pedrera: 09.III: 1 ej. (SAR,AJR)**2013****Marjal dels Moros:** 19.III: 4 ej. (MBM)

Albufera de València: Citas de 1 m. en la mata del Fang los días 11.I (MCH,JID,IRU,GGA) y 25.I, aumentando a 3 ej. (2 m. y 1 h.) el 14.II (JID,MCH,IRU); 04.II: 1 m. en el Racó de l'Olla con aspecto de híbrido *A. nyroca x ferina*. Se observa también los días 18.II, 7 y 15.III, 11.IV y 07.V (JID,MCH); 18.II: 1 m. en el Racó de l'Olla presente también el 26.II; 04.III: 1 m. y 1 h. en lugares distintos del Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU,GGA); 31.X: 1 m. en la mata del Fang con aspecto de híbrido *A. nyroca x A. ferina*. Observado en la misma localidad el 07.XI y 19.XII (MCH,DNA,JID). Nuevas citas en la mata del Fang de 4 ej. el 14.XI (seguramente 2 m. y 2 h.) (MCH,DNA,JID,GGA) y el 27.XI (JID,IRU), solo 1 m. el 18.XII (AAC) y máximo anual de 6 ej. el 19.XII (4 m.) (MCH,GGA); 05.XII: 1 m. Única cita tras la primera tirada de caza en los vedats (MCH,JID,GGA)

Pantà d'Elx: 23.VIII: 1 h. o juv. citado en varias ocasiones hasta el 12.IX (OAP,SAR)**El Fondo d'Elx:** 14.II: 2 ej. (CMA)

Cifras discretas para esta especie catalogada como *En Peligro de Extinción* en la Comunidad Valenciana, destacando los censos de la primera parte del invierno de 2013/2014 en l'Albufera y las observaciones de varias aves en agosto de 2012 entre l'Albufera y el pantano de Elche.

Aythya fuligula**Porrón moñado - Morell capellut - Tufted Duck**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012

Albufera de València: 13.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 06.III: 1 m. inm. en el Racó de l'Olla observado también los días 09.III y 02.IV (JID,MCH); 30.VIII: 1 m. en eclipse en el Racó de l'Olla. Se observa también los días 6, 13 y 21.IX y el 26.X, verificándose que realiza la muda completa (primer caso documentado en l'Albufera) (JID,GGA); 05.XI: 23 ej. en la mata del Fang, una de las mayores concentraciones de los últimos años (JID); 29.XI: 1 h. en el tancat de Milia (AAC); Cita en zonas inundadas del

Malvinar de 2 ej. el 30.X (m. y h.) (JHZ,BDJ) y de 5 ej. el 03.XI (GLL,JHZ,BDJ); 19.XII: 52 ej. (solo 4 m. ad.) en la replaza de Zacarés. Máximo anual (AAC,FGN)

El Fondo d'Elx: 09.II: 5 ej. (CMA)

Emb. de La Pedrera: 27.I: 2 ej. (AJR)

2013

Sant Jordi: 26.III: 1 m. ad. en balsa de riego (ELL)

Marjal d'Almenara: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Marjal dels Moros: Citas prenupciales de 2 ej. (m. y h.) el 20.IV (RMB) y de 1 h. el 01.V (JFM)

Albufera de València: 11.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16.I: 16 ej. (solo 1 m.) en el tancat de Milia (AAC); 14.II: 31 ej. (solo 6 m. ad.) en la replaza de Zacarés (AAC,FGN); 21.V: 1 m. ad. en el tancat de Milia, observado también el 23.V (AAC); 18.X: 1 m. en la mata del Fang (JID,MCH,IRU)

Emb. de Bellús: 13.I: 5 ej.; 21.XII: 7 ej. (BOR)

El Fondo d'Elx: 25.I: 23 ej. (AJR,SAR); 14.II: 32 ej. máximo prenupcial; 16.XII: 20 ej. (CMA)

Se mantiene la tendencia negativa de la especie, que en este periodo apenas ha alcanzado los 3 ejemplares invernantes en 2012 y 9 en 2013. Los máximos anuales se dan en el paso prenupcial en l'Albufera y el Hondo.

Aythya marila

Porrón bastardo - Morell buixot - Greater Scaup

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 09.XI: 1 ej. en la replaza de Zacarés, observado también los días 12, 16 y 19.XI, y el 19.XII (AAC,MCH,JID,GGA)

2013

Albufera de València: 14.II: 1 h. asociada a porrones moñudos en la replaza de Zacarés (AAC); 14.II: 1 h. asociada a un pequeño grupo de porrones moñudos en la punta de Lebeig (PVG)

Periodo en el que únicamente se reciben citas correspondientes a 3 aves en el lago de l'Albufera, evidenciando una invernada progresivamente más débil en nuestra región.

Somateria mollissima

Eider común - Èider - Common Eider

Estatus: Invernante raro

2012

València: 19.XI: 1 h. aparentemente ad. y 1 ej. de 1.^{er} inv. alimentándose de cangrejos en las escolleras próximas al litoral. Estas aves podrían llevar en esta zona al menos una semana. Se observan de manera continuada hasta el 11.XII (TPR,EGO,AAC,BDJ,PVG,CAP,TPE,AAR)

Primer registro en el litoral de l'Albufera después de un largo periodo de ausencia de citas (las últimas observaciones son de 1989) y segunda cita reciente tras la presencia de un ave en marzo de 2010 en Peñíscola.

Melanitta nigra**Negrón común - Morell de mar negra - Black Scoter**

Estatus: Migrante e invernante moderado.

2012**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.I: 6 ej. (RPB,VOO)**Marjal d'Almenara:** 14.I: 7 ej. Cens d'aus marines al litoral de la Comunitat Valenciana (JBC, JLB)**Albufera de València:** 17.II: 12 ej. frente a la playa de la Malladeta (EGO,BDJ); 01.III: 13 ej. (al menos 2 m. ad.) en el mar (PLP,HFO); 06.XII: 24 ej. en el mar alimentándose a 500 m de la costa (JAI); 08.XII: 98 ej. todos aparentemente h. o juv. en diferentes grupos (JHZ,BDJ,LAA); 13.XII: 40 ej. grupos de 19 ej. en el Dosel, 13 en el Recatí y 8 la playa del Rei (BDJ); 16.XII: 52 ej. en la playa del Perellonet (PPF,JMI); 28.XII: 72 ej. en dos grupos de 46 y 26 aves; observados de nuevo el 29.XII (VPA,JRU)**Cap de Cullera:** 01.XII: 77 ej. en vuelo hacia el N en tres bandos (MAL,JAA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)**Gandía:** 29.II: 16 ej. (TMF); 27.III: 20 ej. (PLP)**Elx:** 16.XII: 32 ej. en vuelo hacia el N (SAR); 28.XII: 25 ej. (TMF,TZL,LHE)**Santa Pola:** 14.XII: 84 ej. (OAP,SAR)**Desemb. riu Segura:** 06.XII: 129 ej.; 11.XII: 197 ej. (AJR); 16.XII: 192 ej. en tres grupos entre playa Llisa y la desem. del río Segura (SAR); 26.XII: 95 ej. (AJR)**2013****Albufera de València:** 10.I: 144 ej. en dos grupos comiendo frente a la playa de la Creu. Se trataría de la mayor cifra de invernantes registrada hasta la fecha en el frente litoral de l'Albufera (MCH,JID); 29.I: 98 ej. en dos grandes grupos entre el Pujol y el Perellonet (BDJ); 30.I: 141 ej. en diferentes grupos entre las golas del Pujol y el Perellonet (JHZ); 21.II: aproximadamente 150 ej. frente a la playa del Recatí (JRU); 04.IV: 1 ej. en frente de la playa de la Malladeta (BDJ)**Cap de Cullera:** 06.IV: 14 ej. (al menos 2 m.) en vuelo hacia el N cerca de la costa (CAP,VDA,LAA)**Tavernes de la Vallidigna:** 08.IV: 92 ej. (LAA)**Elx:** 05.XII: 44 ej. (SAR)**Desemb. riu Segura:** 16.I: 147 ej. máximo invernal (AJR)

Periodo con cifras destacadas en el litoral, destacando los grupos cercanos a las 150 aves en el litoral de l'Albufera (máximo histórico en la localidad) y el de 197 ejemplares en la desembocadura del río Segura.

Melanitta fusca**Negrón especulado - Morell de mar fosc - White-winged Scoter**

Estatus: Invernante raro

2012**Albufera de València:** 04.I: 2 m. de 1.^{er} inv. frente a la gola del Perellonet, ya observados el pasado mes de diciembre (VPA,JRU); 13.II: 1 m. aparentemente de 1.^{er} inv. frente a la playa del Perelló (JRU); 17.II: 5 ej. (al menos 2 m.) frente a la playa de la Malladeta, observados también el 11.III y 13.III (EGO,BDJ,VPA,FLL); 23.XII: 2 ej. (juv. o h.) en el mar frente al tramo de costa entre la gola del Pujol y casal d'Esplai, observadas también el 27.XII y el 28.XII (JRU)**Cap de Cullera:** 01.XII: 3 ej. en vuelo hacia el N (MAL,JAA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)**Elx:** 28.XII: 4 ej. en el Pinet (TMF,TZL,LHE)**Salines de Santa Pola:** 16.XII: 1 ej. observado también el 17.XII (SAR)**Desemb. riu Segura:** 12.XII: 1 h. observada también el 26.XII (AJR)

2013

Albufera de València: 04.I: 2 m. inm. próximos a la gola del Perellonet. Se trata de las mismas aves observadas desde el pasado mes de diciembre (BDJ); 18.I: 1 m. inm. frente a la playa del Recatí y 2 m. inm. frente a la gola del Perellonet (VPA,JRU); 20.I: 1 ej. en compañía de negrón común, en vuelo hacia el N desde el Perelló. Aparentemente el mismo ej. es observado en la playa de la Malladeta el 29.I (BDJ) y el 30.I (JHZ,VDA,CAZ); 27.XII: 1 ej. junto a 3 negrones comunes en la playa de la Malladeta (MPO,MRG,TPE)

Santa Pola: 16.II: 1 m. (JMT,JMG,GMG,AVDH)

Desemb. riu Segura: 07.I: 1 h. observada también el 12.I (SAR)

Especie con presencia muy irregular y escasos ejemplares. Las citas de esta especie aumentan de acuerdo a la crudeza de los inviernos en las zonas costeras del Atlántico y el Cantábrico.

Mergus serrator**Serreta mediana - Bec de serra mitjà - Red-breasted Merganser**

Estatus: Invernante raro.

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.I: 1 ej. presente al menos hasta el 15.I (ALR,RPB,VOO)

Albufera de València: 08.I: 1 ej. observado también el 21.I, el 22.I y el 31.I (BDJ); 20.II: 3 ej. frente a la playa del Saler (PVG,MRG,APL)

Cap de Cullera: 01.XII: 1 m. posado en el mar lejos de la costa (MAL,JAA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)

Cap de l'Horta: 22.I: 1 ej. observado también el 24.I (MAA)

Desemb. riu Segura: 06.XII: 1 h. ad. (AJR)

2013

Canet d'en Berenguer: 12.I: 1 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)

Cap de l'Horta: 12.I: 1 ej. (EGM)

Cap Cervera: 27.XI: 1 ej. (SAR)

Periodo con observaciones aisladas y escasas, prácticamente en todos los casos referidas a individuos solitarios.

Oxyura leucocephala**Malvasía cabeciblanca - Ànec capblanc - White-headed Duck**

Estatus: Invernante escaso, nidificante raro. Conservación: PE

2012

La Vall d'Uixó: 10.X: 1 par. en la bassa de la Mezquita, presente sólo por la mañana (JGM)

Marjal d'Almenara: 06.VIII: 2 ej. (JBC); 08.X: 1 ej. (JBC,JLB)

Marjal dels Moros: 31.III: 16 ej. (GLL); 06.IV: 5 m. y 2 h. (SBA); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 01.VI: 1 ej. sobrevolando la laguna de l'Albufera hacia el E (MCH,JID,IRU); 26.VII: 1 ej. (h. o juv.) en el tancat de Milia. Sigue presente los días 27.VII, 30.VII, 01.VIII y 07.VIII (AAC), el 06.VIII: Se encuentra un ave muerta distinta a la presente en los anteriores días (CAV,AAC); 03.VIII: 1 ej. (juv. o h.) en uno de los filtros verdes del tancat de la Pipa, observado también el 16.VIII (BDJ); 13.VIII: 1 ej. en el Racó de l'Olla tras varios días de ausencia (MCH); 21.IX: 1 ej. tipo h. observado también el 03.X en el Racó de l'Olla, no se puede descartar que sea uno de los ej. presentes en la localidad en agosto, aunque

habían dejado de ser vistos desde mediados del mes anterior (MCH,JID,IRU,GGA)

Clot de Galvany: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Santa Pola: 10.XI: 1 ej. (OAP)

El Fondo d'Elx: 144 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 12.I: 162 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Hondo de Amorós: 28.III: 4 m. y 1 h. (SAR)

EDAR Pilar de la Horadada: 11.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Marjal platja Benavites: 19.VIII: 3 ej. (MBM)

2013

Marjal dels Moros: 21.IX: 1 h. (RMB); 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 18.IX: 1 ej. observado caminando entre vegetación palustre en una zona poco profunda y mudando las plumas del ala (PLP,BMI,PMI); 16.XII: 1 ej. (h. o juv.) en el Racó de l'Olla presente también el 18.XII y el 20.XII (MCH,GGA)

Pantà d'Elx: 20.V: 1 h. y 2 m. Los m. son observados de forma continuada hasta final de año. Primeras citas de la especie en el paraje (SAR)

Clot de Galvany: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Santa Pola: 13.X: 1 ej. (OAP)

El Fondo d'Elx: 128 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

EDAR Pilar de la Horadada: 26 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Buen año en cuanto al número de parejas nidificantes en 2012 en el Hondo d'Elx, duplicando la cifra de los censos de la última década, dentro de las fluctuaciones. Sin embargo, no se disponen de datos para valorar el éxito reproductor y la supervivencia de la descendencia. Se consolida la reproducción de esta especie catalogada *En Peligro de Extinción* en el Marjal del Moro y que podrían estar asociado a la proliferación de observaciones postnupciales e invernales en l'Albufera

Fecha censo	9.II	22.III	15.V	13.VI	1.VIII	17.X	21.XI	1.XII
total	239	246	257	148	466	244	476	504
hembras	104	108	42	32	208	14	237	240
machos	135	138	100	116	258	105	239	264

Censos destacados de malvasía cabeciblanca en el Fondo en el año 2012. Todos los censos por la Conselleria de Medio Ambiente.

Fecha censo	18.I	14.II	21.V	18.VI	16.VII
total	661	748	141	198	286
hembras	325	384	24	24	96
machos	336	364	117	174	190

Censos destacados de malvasía cabeciblanca en el Fondo en el año 2013. Todos los censos por la Conselleria de Medio Ambiente.

GALLIFORMES

PHASIANIDAE

Alectoris rufa**Perdiz roja - Perdiz comuna - Red-legged Partridge**

Estatus: Residente moderado. Conservación: EC

2013**Villena:** 01.VI: 23 h. ad. acompañada de 22 perdigones (AAC)

Segunda cita que recibimos en la historia del anuario (la anterior el año 2008) de un grupo familiar de esta entidad. Teniendo en cuenta que el límite del tamaño máximo de puesta reportado es de 20 huevos (Ehrlich et al. 1994) esta observación resulta de gran interés.

Coturnix coturnix**Codorniz común - Guatlla - Common Quail**

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: EC

2012**Borriol:** 17.X: 1 ej. salta en coscojar extenso y cerrado (LPC)**2013****València:** 24.III: 1 ej. cantando (JBL)**Bicorp:** 01.I: 1 ej. (JBF)***Phasianus colchicus*****Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant**

Estatus: Liberado o escapado de cautividad, naturalizado. Conservación: EC Categoría: C1.

2012**San Rafael del Río:** 11.III: 1 m. ad. del grupo *torquatus*, observado comiendo en un olivar de la pda. Molí Canet (ELL)**2013****Massalfassar:** 28.IV: 2 ej. (m. y h.) (XGP)

Chera: 20.XI: 1 h. con comportamiento muy confiado. Debe de tratarse de un animal escapado o liberado con fines cinegéticos (PRP); 27.XII: 1 m. pertenece a alguna variedad con destacada ceja blanca. Camina entre el herbazal de la cuneta de la carretera y vuela torpemente (PRP)

Incluimos las escasas citas recibidas, todas derivadas de escapes o sueltas cinegéticas.

GAVIIFORMES

GAVIIDAE

Gavia stellata**Colimbo chico - Agullat petit - Red-throated Diver**

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012**Marjal d'Almenara:** 14.I: 1 ej. Censo de aves marinas invernantes de la CV (JBC,JLB)**Marjal dels Moros:** 01.I: 1 ej. (RBR,TPE,MRG); 15.XII: 1 ej. a unos 100 m de la costa (CAZ,VDA)**Albufera de València:** 06.XII: 2 ej., al menos 1 ad., en el frente litoral de Pinedo, a escasa distancia de la playa y buceando constantemente. Presentes hasta el día siguiente (JRU,JAI,BDJ); 08.XII: Sigue presente el ad. hasta el 11.XII (LAA,GBA); 15.XII: 1 ej. de 1.º inv. encontrado muerto en la playa del Saler. Muy probablemente se trate de uno de los observados durante la pasada semana. El cadáver es depositado en el Centro de Recuperación de Fauna de la Granja del Saler, donde la autopsia reveló un traumatismo pectoral severo y permitió determinar que se trataba de un m. (EVP,JOB)**Cullera:** 15.XII: 1 ej. en vuelo bajo hacia el N a aprox. 300 m. de la costa (LAA,MAL)**Cap de l'Horta:** 14.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV**2013****Albufera de València:** 23.XII: 1 ej. en la devesa del Saler. Primer registro invernal. Con ésta son ya cinco las citas de esta especie obtenidas desde 1985 en el entorno de l'Albufera (BDJ)**Elx:** 12.I: 1 ej. en la playa del Pinet (AJR)

Numerosas citas recibidas en ambos años, teniendo en cuenta que la especie no había sido citada en la Comunidad Valenciana desde 2002. Durante el invierno de 2011-2012 se observó en las 3 provincias (en Castellón no se citaba desde 1991 y es tan solo la tercera cita para la provincia). En el invierno de 2012-2013 tan solo se observa en Valencia y Alicante. Finalmente, en el invierno de 2013-2014 tan solo se produce un único contacto en Valencia; provincia donde se concentran el mayor número de citas de colimbos de otras especies. Todas las observaciones han sucedido durante el periodo plenamente invernal, como es típico en los colimbos.

Gavia arctica**Colimbo ártico - Agullat àrtic - Black-throated Diver**

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012**València:** 07.XII: 1 ej. junto con un colimbo chico. Primera cita de la temporada. Muy posiblemente había un segundo ej. en la zona pero no se pudo confirmar (JID,MCH,GGA,MTB,DOC,AAC); 09.XII: 1 ej. va tomando altura hasta desaparecer en dirección NO. Podría tratarse del mismo observado hace unos días (BDJ,BMA)

Gavia immer**Colimbo grande - Agullat gros - Great Northern Diver**

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 21.I: 1 ej. Podría tratarse del mismo ejemplar observado el pasado mes de diciembre (VLG,BDJ); 10.II: 1 ej. cerca de la gola del Pujol (JRU,VPA)

Orihuela: 21.XI: 1 ej. observado desde el Cabo Roig (HAH)

2013

Albufera de València: 01.II: 1 ej. (JRU)

Cap de Cullera: 02.III: 1 ej. dirección S (MAL,ATE,JTN)

Durante los últimos años, el colimbo grande se ha convertido en el colimbo más citado en nuestro litoral. Dichas citas se han estado produciendo casi siempre en la costa de la provincia de Valencia, por ello destaca la cita de 2012 realizada en cabo Roig (Orihuela) que además es el registro más tempranos del que tenemos constancia. La cita de 2013 en cabo de Cullera es, por otro lado uno de los más tardíos, tras la cita de 1 ej. el 10.III en el Prat de Cabanes-Torreblanca en 2000.

PODICIPEDIFORMES**PODICIPEDIDAE*****Tachybaptus ruficollis*****Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe**

Estatus: Migrante y nidificante moderado. Conservación: IE

2012

Ares del Maestrat: 02.VI: 3 ej. (RPB,ALR,ADP)

Marjal de Sagunt: 18.IX: 35 ej. (JBC,JGS)

Requena: 14.IV: 5 ej. en una balsa de riegos entre viñedos. Probable reproductor; 06.X: 21 ej. máximo postnupcial (JAI)

El Fondo d'Elx: 15.V: 537 ej.; 21.XI: 603 ej. (CMA)

2013

Sant Mateu: 25.III: 2 par. construyendo nidos en la laguna (ALR)

Requena: 05.X: 59 ej. máximo registro postnupcial (PRP); 02.XI: 61 ej. máximo anual (JAI)

Periodo sin citas fuera de lo habitual, en el que se mantiene la tendencia ligeramente positiva de la especie mostrada a largo plazo por la población reproductora y a medio plazo por la población invernante, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a escala suprarregional (González y Pérez-Aranda, 2011). Es importante resaltar que en el caso de las aves nidificantes estas valoraciones se han basado en las poblaciones nidificantes en humedales, sin tener en cuenta la fracción de la población que utiliza balsas de riego e infraestructuras similares (Sebastián-González et al., 2015), ambientes que utiliza la especie de manera generalizada especialmente en la Vega Baja, región donde se concentra la población reproductora de la Comunidad Valenciana.

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	91	82	87	66
Desem. río Mijares	17	7	11	8
Marjal de Almenara	38	37	20	22
Marjal dels Moros	45	74	65	18
Albufera de Valencia	47	56	46	76
Marjal de Xeresa-Xeraco	13	15	20	15
Embalse de Bellús	0	0	37	0
Salinas de Santa Pola	47	343	46	100
El Fondo	294	335	198	471
El Hondo de Amorós	15	27	0	6
Embals d'Elx	20	46	9	24
EDAR Pilar de la Horadada	16	15	23	12

Censos de zampullín común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se detectaron al menos 15 par. nidificantes. Como nidificante se ha detectado en 21 (2012) y 20 (2013) de 33 humedales censados, para un total de 684 y 590 par. respectivamente, mientras que como invernante se ha detectado en un total de 23 (2012) y 24 (2013) de 48 humedales censados para un total de 1.102 ej. en 2012 y 927 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe

Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 11.I: 30 ej. en el Pujol Vell (SEOV)

Salinas de Santa Pola: 18.I: 40 ej. máximo invernante; 07.IX: 166 ej.; 15.XI: 184 ej. (AJR,SAR)

El Fondo d'Elx: 17.IX: 149 ej.; 17.X: 219 ej. (CMA)

Emb. de La Pedrera: 21.XII: 64 ej. (SAR,AJR)

2013

Sant Jordi: 24.X: 27 ej. descansando y pescando en balsa de riego (ELL)

Albufera de València: 04.IV: 1 par. en l'estany del Pujol. Cita primaveral algo tardía en esta localidad típica de invernada (BDJ)

Villargordo del Cabriel: 27.I: 30 ej. (RMB)

Emb. de Bellús: 21.XII: 163 ej. (BOR)

Emb. de Beniarrés: 24.II: 63 ej.; 30.XI: 73 ej. (BOR)

Salinas de Santa Pola: 25.X: 203 ej. máximo anual (AJR)

El Fondo d'Elx: 16.VII: 130 ej. (CMA)

Los datos recibidos refrendan la tendencia que la especie muestra a escala regional y nacional, tanto de la población nidificante como de la invernante. Destacan las concentraciones invernantes registradas en el embalse de Bellús y en Santa Pola. Sin embargo, algunas localidades, especialmente l'Albufera, muestran una tendencia negativa en ambos periodos.

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Balsa de Sant Jordi	0	20	0	17
Prat de Cabanes-Torreblanca	6	10	7	6
Marjal dels Moros	3	4	5	0
Embalse de Loriguilla	0	23	0	75
Albufera de Valencia	25	52	22	34
Embalse de Forata	0	39	0	12
Embalse de Benabéguer	-	-	0	34
Embalse de Beniarrés	-	9	9	-
Embalse de Bellús	20	53	0	128
Salinas de Santa Pola	0	20	6	4
El Fondo	45	0	94	3
Embalse de la Pedrera	18	41	10	29

Censos de somormujo lavanco en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se detectaron al menos 5 par. nidificantes o 20 ej. invernantes. Como nidificante se ha detectado en 8 de 33 humedales censados, para un total de 121 y 155 par. respectivamente, mientras que como invernante se ha detectado en un total de 17 (2012) y 14 (2013) de 48 humedales censados para un total de 302 ej. en 2012 y 358 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro - Cabussó coll-negre - Black-necked Grebe

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 13.I: 18 ej. en zonas inundadas del Malvinar (JGR,BDJ); 13.I: 29 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 28.II: 16 ej. en la orilla S de lago (AAC); 02.V: 3 ad. en el Racó de l'Olla, observados también el 07.V (JID,MCH), de nuevo 2 ej. el 17.V: 2 ej. (JID); 05.VI: 1 ej. con plumaje invernal, acosado por zampullines chicos territoriales en una de las lagunas. Continúa presente hasta el 26.VI (SEOV); 27.VII: 1 ej. con plumaje invernal en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (MCH); 03.VIII: 1 ej. todavía con plumaje reproductor, observada también el 09.VIII (MPB,PMP,FFA)

Requena: 21.I: 8 ej. censo invernal (JAI)

Salines de Santa Pola: 12.XII: 100 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 1.626 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 12.I: 101 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 1.707 ej.; 13.VI: 1691 ej.; 01.VIII: 1.816 ej.; 17.X: 1.147 ej. (CMA)

EDAR Pilar de la Horadada: 11.I: 18 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

2013

Pantà d'Elx: 21.VII: 2 ad. alimentando a pollo crecido (OAP)

Santa Pola: 13.X: 59 ej. (OAP)

El Fondo d'Elx: 18.I: 154 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 26.III: 1.268 ej.; 21.V: 1.518 ej. (CMA); 2.106 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.IX: 2.949 ej. (SAR)

Periodo en el que las condiciones hídricas del Fondo d'Elx permiten establecerse de nuevo a una importante concentración de parejas reproductoras (813 parejas en 2012 y 1.053 parejas en 2013). Las importantes concentraciones de La Mata i Torrevieja tiene su origen en esta población nidificante.

PROCELLARIIFORMES

PROCELLARIIDAE

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta - Baldriga cenrosa - Cory's Shearwater

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: PE

2012

Borriana: 02.VI: 1 ej. en dirección N (JBC)

Albufera de València: 01.VI: 5 ej. en dirección S (VPA); 20.VII: 16 ej. observadas a lo largo de un transecto en embarcación entre las 4 y 6 millas de la costa (JME,PVG,BDJ)

Cap de Cullera: 05.V: 2 ej. dirección N (JLO,LAA); 02.VI: 30 ej. dirección S (LAA); 07.VII: 2 ej. dirección S (CAP,VDA,LAA); 04.VIII: 4 ej. (LAA); 01.IX: 25 ej. dirección S (JLO,JCM,ASL,LAA); 06.X: 19 ej. dirección S (JLO,VPA,LAA)

Gandía: 20.XII: 2 ej. cita tardía (TMF)

Cap de l'Horta: 04.XI: 1.068 ej. (MAA)

Illa de Tabarca: 24.V: 1 ej. (SCR); 06.IX: 28 ej. (SAR)

Cap Cervera: 15.X: 5 ej.; 19.X: 288 ej. (SAR); 20.X: 159 ej. (AJR,SAR); 22.X: 569 ej.; 23.X: 115 ej. (SAR)

2013

Peníscola: 06.VII: 6 ej. (ELL)

Albufera de València: 21.VIII: 3 ej. dirección S (BDJ); 09.XI: 2 ej. cita tardía (GLL)

Cap de Cullera: 02.III: 1 ej. Primer registro prenupcial (LAA); 06.VII: 6 ej. dirección S (ASL,LAA); 05.X: 1 ej. (LAA)

La Vila Joiosa: 17.V: 10 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)

Cap Cervera: 21.X: 22 ej. dirección S; 23.X: 128 ej. (SAR); 25.X: 214 ej. (AJR); 26.X: 183 ej.; 27.X: 250 ej.; 28.X: 177 ej. (SAR)

El número de avistamientos de esta especie en nuestro litoral se incrementa notablemente con respecto a años anteriores. Destacan positivamente las altas concentraciones observadas en la provincia de Alicante en ambos años, en torno a finales de octubre - principios de noviembre, donde se observan centenares de individuos en paso, principalmente en cabo Cervera, con un máximo de 1.068 ej. en el cabo Huertas. Todas las citas se encuentran dentro de la fenología habitual de la especie, salvo una cita plenamente invernal en Gandía (20.XII) en 2012 y la primera cita prenupcial de 2013, algo temprana (02.III)

Puffinus yelkouan

Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater

Estatus: Invernante y migrante escaso

2012

Albufera de València: 10.I: 17 ej. integrados en un gran bando de pardela balear (VPA); 24.I: 11 ej. integrados en un grupo de aprox. 200 pardelas baleares (BDJ)

Cap de Cullera: 14.I: 5 ej. (JTN,JSN,MMN,JPR,CAZ,VDA,VPA,LAA); 10.XI: 1 ej. entre un grupo de pardela balear (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)

Xàbia: 14.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

Cap Cervera: 14.I: 3 ej. junto a pardela balear; 20.I: 5 ej. junto a pardela balear, dirección S (AJR)

2013

Albufera de València: 08.I: 45 ej. integradas entre pardelas baleares frente al faro de Cullera. Se trata de una de las cifras más elevadas registradas hasta la fecha en el entorno litoral de l'Albufera (VPA); 09.XI: 4 ej. (GLL)

Cap de Cullera: 12.I: 6 ej. integrados en bandos de pardela balear (MAL,PVG,VPA,LAA); 09.XI: 1 ej. dirección N (MAL,ATE,JTN,LBA,VBJ,GCH,DMF,BOR); 10.XII: 15 ej. junto a pardelas baleares (VPA)

La Vila Joiosa: 17.V: 5 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)

Cap de l'Horta: 12.I: 2 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

Cap Cervera: 12.I: 1 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

A diferencia de las zonas más septentrionales del litoral mediterráneo ibérico, donde esta especie se observa con bastante regularidad, en nuestra latitud se vuelve más escasa. A este hecho hay que sumarle la dificultad en la correcta identificación de la especie, y su separación de los ejemplares más pálidos de pardela balear, especie a la que suele asociarse habitualmente (Rodríguez, et al. 2005).

Puffinus mauretanicus**Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater**

Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: PE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.I: 760 ej. dirección S (RPB,VOO)

Borriana: 02.VI: 45 ej. dirección N (JBC)

Almenara: 14.I: 700 ej. (JBC,ILB)

València: 27.XII: 1.480 ej. (RMB)

Albufera de València: 05.I: 3.600 ej. (EGO,BDJ); 10.I: 4.000 ej.; 31.I: 737 ej. dirección N; 01.VI: 28 ej. dirección S (VPA)

Cap de Cullera: 14.I: 2.221 ej. (JTN,JSN,MMN,JPR,CAZ,VDA,VPA,LAA); 02.VI: 123 ej. dirección S (LAA); 07.VII: 11 ej. (CAP,VDA,LAA); 04.VIII: 4 ej. (LAA); 17.XII: 550 ej. (VPA)

Cap de l'Horta: 05.I: 700 ej. (JMT)

Desemb. riu Segura: 04.I: 1.000 ej. (MAA)

Guardamar del Segura: 14.I: 500 ej. (AJR)

2013

Peníscola: 14.XII: 346 ej. (ELL)

Illes Columbretes: 13.IV: 300 ej. (LGB)

València: 12.I: 1.639 ej. (RMB)

Albufera de València: 11.I: 2.200 ej. Primeras concentraciones de importancia de este año (BDJ); 14.VI: 25 ej. (VPA); 11.XII: 4.600 ej. (EGO,BDJ); 14.XII: 1.056 ej. (TPA,VBJ,BOR,DMF,MNY,JSU,LHE,JRU)

Cap de Cullera: 12.I: 820 ej. dirección N (MAL,PVG,VPA,LAA); 06.VII: 11 ej. dirección S (ASL,LAA); 03.VIII: 27 ej. (JAA,PPF,GCH,BOR); 14.XII: 1.056 ej. (LAA)

Xàbia: 12.I: 95 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

La Vila Joiosa: 17.V: 20 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)

Cap de l'Horta: 17.XI: 336 ej. (JMT); 29.XII: 500 ej. (AJR)

Cap de Santa Pola: 19.XII: 125 ej. (AJR)

Cap Cervera: 12.I: 109 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

Lejos de las grandes concentraciones de más de 10.000 ejemplares que se produjeron en 2009 y 2011; 2012 y 2013 siguen manteniendo, no obstante, una buena representación de las concentraciones invernales

que se producen de esta especie en nuestras aguas, donde, además, se recogen varias citas estivales de individuos entre los meses de junio y agosto.

HYDROBATIDAE

Hydrobates pelagicus

Paño europeo - Escateret - European Storm-petrel

Estatus: Nidificante moderado localizado. Conservación: VUL

2012

Borriana: 02.VI: 3 ej. censo RAM (JBC)

Sagunt: 25.IV: 6 ej. en las piscifactorías (TMF)

València: 15.XII: 1 ej. encontrado muerto (VPA)

Albufera de València: 20.VII: 13 ej. observados a lo largo de un transecto en embarcación entre las 5 y 6 millas de la costa entre el Perelló y el cabo de Cullera (JME,PVG,BDJ); 12.X: 1 ej. últimos registros postnupciales de esta especie que parece haberse presentado en reducido número en el frente litoral de l'Albufera (TPR)

Cap de Cullera: 02.VI: 3 ej. censos RAM (LAA); 18.VI: 1 ad. (JRU); 07.VII: 2 ej. censos RAM (LAA)

Isla de Benidorm: 15.VIII: Se revisaron 304 nidos de paño europeo, 192 en la cueva grande o cueva del Llop Marí y 112 en la cueva pequeña o de Bombo. Se capturaron 295 aves adultas, número ligeramente inferior al de los últimos años, que ha oscilado entre las 300 y 350 capturas. La disminución en el número de capturas se debió a la bajada del número de puestas y al retraso en la fecha media y rango de puesta (durante el mes de agosto se detectaron las puestas más tardías). Se anillaron 84 pollos, un número inferior al de 2011 debido al menor éxito reproductor y mayor asincronía en fechas de puesta y eclosión. Éxito de eclosión=0.67; éxito de emplumamiento=0.90; éxito reproductor=0.59. Tanto el éxito de eclosión, como el de emplumamiento y el reproductor han sido bastante más bajos que los de años anteriores (ASZ)

2013

Albufera de València: 26.V: 1 ej.; 02.VI: 1 ej. (TPR); 14.VI: 4 ej.; 15.VI: 1 ej. (VPA); 26.VI: 1 ej. (MMO,TPR,BDJ)

Isla de Benidorm: 15.VIII: Se capturaron 362 ad., número superior al de los últimos años que ha oscilado entre las 300 y 350 capturas. El aumento en el número de capturas se debió al crecimiento de la colonia y aumento del esfuerzo de muestreo que permitió incluir en el seguimiento algunos nidos que normalmente no se capturaban por su dificultad en la cueva 2. Se anillaron 110 pollos, un número superior al de 2012 (a pesar del bajo éxito reproductor de la presente temporada) debido al mayor número de puestas y esfuerzo. Éxito eclosión=0.53; éxito de emplumamiento=0.81; éxito reproductor=0.43 (ASZ)

Se revisaron 608 nidos en la Isla de Benidorm durante el verano de 2012 y 648 nidos durante 2013. Con estos números y teniendo en cuenta la dificultad de acceso a la totalidad de los nidos, podemos concluir que la población de la Isla de Benidorm se mantiene estable como una de las principales colonias de esta especie en nuestras aguas. Sin datos para otras colonias menores como Columbretes, Tabarca o Isla Mitjana. 2012 supuso un buen año de citas de esta pelágica especie desde tierra, especialmente desde el Cabo de Cullera.

Oceanodroma monorhis**Paíño de Swinhoe - Petrel de Swinhoe - Swinhoe's Storm-petrel**

Divagante del E de Asia

2013

Isla de Benidorm: 15.VI: 1 ej. capturado para su anillamiento científico en la colonia de paíño europeo (GMG,RAR)

Especie cuya distribución de cría principal se halla en el este de Asia. Se trata de una especie bastante migradora que inverna en latitudes tropicales del Pacífico oriental y el N del Índico, por donde alcanza en ocasiones el mar Rojo. Desde los años ochenta se han venido produciendo capturas de ejemplares en diferentes lugares del NE del Atlántico y el Mediterráneo más occidental, al menos en Madeira, Inglaterra, Francia, Noruega, Portugal continental, España e Italia, debidas normalmente a anilladores que operaban durante el verano en colonias de cría del paíño europeo. Precisamente de este modo es como tuvo lugar este encuentro, donde el ejemplar fue localizado primero por el canto en la cueva grande de la isla de Benidorm y posteriormente capturado para su anillamiento científico. Presencia continuada en la colonia por unos días. Esta cita supondría la quinta cita para España y la segunda para Alicante y la Comunidad Valenciana tras la cita de 1994 en la misma localidad.

PELECANIFORMES**SULIDAE****Morus bassanus****Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Peníscola: 03.III: 25 ej. subad. y ad. durante el censo RAM. Flujo constante hacia el S (ELL,FRJ)

Borriana: 02.VI: 10 inm., 7 ad. y 3 indet. (JBC); 10.XI: 41 ej. censo RAM (JBC,ILB,VAT)

La Pobla de Farnals: 14.I: 27 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)

Albufera de València: 02.VI: 3 inm. frente de la playa de la Garrofera (JID,BDJ)

Cap de Cullera: 02.VI: 15 ej. censo RAM (LAA); 18.VI: 4 inm. (JRU); 07.VII: 6 ej. en vuelo hacia el S. Censo RAM. Aves aparentemente de 2.º año (CAP,VDA,LAA); 04.VIII: 1 ej. censo RAM. Un 2.º año hacia el S (LAA); 06.X: Primera cita anual de un juv. acompañado de un 2.º año (JLO,VPA,LAA); 10.XI: 47 ej. (34 ad. y 4 juv.) La mayoría en paso hacia el N (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)

Alacant: 21.XII: 28 ej. (AJR)

Desemb. riu Segura: 06.XII: 58 ej. (AJR)

Cap Cervera: 14.I: 44 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

2013

Peníscola: 02.II: 48 subad. y ad.; 06.IV: 21 subad. y ad.; 01.VI: 9 subad. y ad. (ELL); 07.IX: 3 ej. (ELL, FRJ)

Albufera de València: 06.VI: 1 ej. de 1.º ver. (JID,IRU); 26.VI: 7 ej. (MMO,TPR,BDJ)

Cap de Cullera: 02.II: 45 ej. dirección S. Todos ad. menos un ej. de 2.º año (CAP,VDA); 01.VI: 13 ej. sólo un ad. y el resto subad. de 2.º y 3.º año. En paso dirección S (JTN,JMS,ATE,LAA); 06.VII: 16 ej. dirección S. Todos ellos de 2.º año (ASL,LAA); 03.VIII: 8 ej. (JAGP,PPF,GCH,BOR); 09.XI: 42 ej. de las cuales 28 ad. y 4 juv. (MAL,ATE,JTN,LBA,VBJ,GCH,DMF,BOR)

Gandía: 12.I: 30 ej. (BOR)

La Vila Joiosa: 17.V: 50 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)

Cap de l'Horta: 12.I: 26 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

Cap Cervera: 12.I: 23 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 26.X: 26 ej. (SAR)

Interesantes concentraciones invernales en ambos años, como suele ser habitual en esta especie. Destacan las citas estivales, en la mayoría de los casos correspondientes a subadultos, con excepción de los 7 adultos observados en Burriana el 02.VI y el adulto de Cullera el 01.VI.

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant

Estatus: Migrante e invernante abundante. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 114 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Desem. riu Millars: 13.I: 538 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Borriana: 26.I: 32 ej. Anilla azul [635]; 09.II: 48 ej. Anilla azul [970]; 15.II: 54 ej. lecturas: anillas PVC azules [970] y [635]; 15.II: 54 ej. Anillas azules [970] y [635]; 02.VI: 1 ej. (JBC); 10.XI: 361 ej. máximo invernial (JBC,JLB,VAT); 27.XII: 53 ej. Anilla azul [653] (JBC)

Marjal d'Almenara: 08.II: 650 ej.; 27.VII: 1 ej. (JBC)

Canet d'en Berenguer: 14.I: 875 ej. (MGP)

Sagunt: 29.II: 800 ej. en las piscifactorías (TMF)

Marjal dels Moros: 07.I: 2121 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 2.240 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 05.VI: 6 ej. 3 de ellos ad. (RGR,LSO,MSM,PVG); 29.VIII: 5 ej. Primera cita postnupcial algo temprana; 18.X: 260 ej. Primera concentración otoñal destacada; 30.X: 1.600 ej. bando destacado, presentes hasta el 05.XI (AAC)

Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 95 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Benidorm: 14.I: 351 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

Salines de Santa Pola: 10.I: 104 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 29.XII: 234 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 13.VI: 1 ej.; 01.XII: 436 ej. máximo invernial (CMA)

Desemb. riu Segura: 04.I: 103 ej. (MAA)

2013

Peníscola: 02.III: 302 ej. (ELL, FRJ); 01.VI: 3 subad. (ELL)

Alcossebre: 12.III: 260 subad. y ad. (DES)

Desem. riu Millars: 19.VIII: 1 ej. (GUM); 22.XII: 200 ej. (MBM)

Canet d'en Berenguer: 12.I: 1.132 ej. (MGP)

Marjal dels Moros: 01.I: 2.000 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 11.I: 3.835 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16.VII: 2 subad. (PVG); 05.IX: 7 ej. Primeras citas postnupciales (AAC,FGN); 30.XI: 2.000 ej. llegada destacada de invernantes (GTR)

Requena: 28.IV: 6 ej. máximo anual (PRP)

Emb. de Beniarrés: 31.VIII: 2 ej. (BOR)

Salines de Santa Pola: 15.I: 216 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 14.II: 330 ej. máx. anual; 18.VI: 1 ej. presente hasta el 16.VII (CMA)

Phalacrocorax aristotelis **Cormorán moñudo - Corba marina emplomallada - European Shag**

Estatus: Nidificante raro localizado, invernante y migrante escaso. Conservación: VUL

2012**Grau de Castelló:** 07.VI: 2 juv. (PGR)**Borriana:** 02.VI: 2 ej. volando al S (JBC); 10.XI: 1 ej. (JBC,JLB,VAT)**Nuevo cauce del Turia:** 04.II: 3 inm. (AAC); 22.II: 6 juv. (JRU,AAC)**Albufera de València:** 19.VI: 1 inm. (MCH,JID,IRU); 22.X: 1 ej. (JHZ); 31.X: 1 inm. (GLL); 09.XI: 1 inm. (BDJ)**Cap de Cullera:** 03.III: 1 ej.; 02.VI: 1 subad. (LAA); 18.VI: 2 juv. (JRU); 04.VIII: 1 ej. (LAA); 10.XI: 1 inm. (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)**Gandía:** 30.IX: 1 ej. Especie rara en el puerto de Gandía. Apareció días posteriores a fuertes tormentas (PLP)**Oliva:** 14.I: 1 ej. (FAN)**Xàbia:** 14.I: 4 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV**La Vila Joiosa:** 14.I: 20 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV**Cap de l'Horta:** 07.III: 1 ej. (EGM)**2013****Vinaròs:** Citas de 1 juv. el 30.V y el 04.VI (ELL)**Peníscola:** 04.V: 5 ej. (subad. y ad.); 01.VI: 8 ej. (inm. y ad.); 06.VII: 16 ej. (ELL); 07.IX: 10 ej. (ELL, FRJ); 05.X: 10 ej. (ELL)**Nuevo cauce del Turia:** 27.XII: 6 inm. (CAV,AAC)**Albufera de València:** 08.V: 2 juv. y 2 ej. de 2.º año (PVG,EGO,MMO); 07.XI: 1 inm. (EGO,BDJ); 22.XII: 3 inm. (BDJ)**Cap de Cullera:** 09.IV: 1 inm. Presente hasta el 04.V (MPB); 06.VII: 1 ej. (ASL,LAA); 05.XII: 1 juv. presente hasta el 10.XII (VPA)**Xàbia:** 12.I: 3 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV**Benidorm:** 12.I: 6 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV**La Vila Joiosa:** 12.I: 4 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV**Cap de Santa Pola:** 13.X: 71 ej. concentración destacada (OAP); 19.XII: 22 inm. (AJR)**Cap Cervera:** 28.X: 1 juv. presente hasta el 30.X (SAR)**CICONIIFORMES****ARDEIDAE****Botaurus stellaris****Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: PE

2012**Marjal d'Almenara:** 02.II: 1 ad. posado entre las cañas moviéndose muy lentamente. Salta con un vuelo muy pesado y con las patas colgando (JBC)**Marjal dels Moros:** 31.III: 1 ej. (GLL)**Albufera de València:** Citas invernales de 1 ej. entre el 02 y el 23.I en el tancat de la Pipa (MLA,SEOV);

Cita de 1 ej. el 02.I en el tancat de Milia. Aparentemente el mismo ejemplar es observado en múltiples ocasiones hasta el 19.IV (AAC); 11.I: 1 ej. sale volando al paso de la embarcación desde una de las orillas de l'Alteró (VES); 14.II: 1 ej. emitiendo el canto nupcial por un breve lapso de tiempo en el tancat de la Pipa (PVG,LMR,MLA); 07.III: Varias citas a lo largo del día en el tancat de la Pipa que parecen corresponder al menos a 2 ej. diferentes (JBO,PVG), posteriormente se observa 1 ej. desde el 14.III de forma continuada hasta el 23.IV (SEOV); 12.III: 1 ej. en orillas del saladar del Racó de l'Olla, donde es acosado por gaviotas reidoras hasta internarse en un pequeño carrizal (JID,MCH,IRU); 26.III: 1 ej. al atardecer en el tancat de la Ratlla (PMP); 26.III: 1 ej. aparentemente de 1.^{er} inv. muerto recientemente en la playa de la Punta en la devesa (IRU,JID) 25.V: 1 ej. Primera observación en el tancat de la Pipa en periodo estrictamente reproductor tras un mes sin detectar la especie. Se observa y escucha reclamar en varias ocasiones los días 28.V y 29.V pero no en días posteriores (MLA); Múltiples citas postnupciales en el tancat de la Pipa entre el 02.X (1 ej. emitiendo el reclamo) (PVG) hasta un máximo de 2 ej. a partir del 23.XI hasta el 28.XII (JLR,LMR,MLA,SEOV); 16.X: 1 ej. Primera cita postnupcial en el tancat de Milia. Aparentemente el mismo ej. es observado en varias ocasiones hasta el 10.XI (AGU,AAC); 03.XI: 1 ej. en el tancat de l'Illa (MAN,JAA,MGO); desde el 13.XI se observan 2 ej. con regularidad hasta el 13.XII (AAC)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 09.XII: 1 ej. levanta el vuelo junto al camino que discurre por la marjal (DGS)

2013

Albufera de València: 1 ej. el 07.I en el tancat de Milia, observado hasta el 07.II en varias ocasiones; 25.I: 1 ej. en el tancat de l'Illa, aparentemente el mismo ej. es observado el 14.II y 28.II (AAC); 03.III: 1 ej. en orillas de la laguna junto al cementerio de El Palmar (IRU); 24.III: Se observan 2 ej. en vuelo en dirección a la punta de Lebeig (PVG); 05.IV: 1 ej. en el tancat de l'Illa (AAC); 11.IV: 1 ej. en vuelo en el tancat de l'Illa, sale del carrizo y se eleva emitiendo un par de graznidos alejándose hacia el S (JRU); 19.VIII: 1 ej. en el tancat de la Pipa, primera observación postnupcial; 24.IX: 1 ej. pescando en el tancat de la Pipa. Posiblemente el mismo ej. observado a lo largo del invierno en varias ocasiones hasta el 11.XII (MLA); 05.X: 1 ej. acosado por un aguilucho lagunero en el tancat de Milia (GTR), nuevas citas en este enclave el 06.XI, observado en varias ocasiones hasta el 06.XII (JJI,PVG,GTR); Citas postnupciales en el tancat de l'Illa los días 15.XI: 1 ej. y de 2 ej. el 29.XI (PVG)

Las citas recibidas corresponden principalmente a l'Albufera y concretamente a los humedales artificiales, que continúan albergando una pequeña población invernante tras la restauración dels tancats de la Pipa y de Milia.

Ixobrychus minutus

Avetorillo común - Gomet - Little Bittern

Estatus: Nidificante moderado, invernante raro. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 16 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Marjal d'Almenara: 30 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Marjal dels Moros: 19 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 13.II: 1 ej. emitiendo reclamos en el Pujol Vell (AAC); 05.III: 1 ej. Primera cita anual en la mata del Fang, donde no se han obtenido citas invernales esta temporada (JID); 84 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 23.X: Todavía 2 ej. en el tancat de Milia (AAC); 05.XI: Se escuchan 3 ej. el 12.XII y 18.XII exactamente en los mismos puntos en el tancat de la Pipa (PVG)

Turis: 23.VI: 1 ej. (VBJ)

Cullera: 23.XII: 1 ej. en una pequeña charca cerca del Brosquil (LAA)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JVI)

Pantà d'Elx: 20.II: 1 ej. (OAP)

Salines de Santa Pola: 10.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 128 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

2013

Marjal dels Moros: 70 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (MYB)

Albufera de València: 08.I: 6 ej. reclamando al atardecer en distintos puntos del entorno del tancat de la Pipa y la punta de Llebeig (VLG,PVG); 08.I: 1 ej. en la mata de Torre (RSH,JAGP); 23.I: 3 ej. en el tancat de Milia (AAC); 08.II: 1 ej. en la sequia de El Palmar (MCH); 110 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 14.IX: 2 pollos reclamando alimento desde una mata de carrizo en la mata del Fang. Cita reproductora tardía (GCH,PVG)

Cullera: 07.I: 1 m. en l'estany (VPA); 22.I: 1 ej. en una pequeña charca junto a las dunas de la playa del Brosquil (LAA)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 50 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de Gaianes: 17.XI: 1 ej. (BOR)

Pantà d'Elx: 16.XII: 1 ej. (OAP)

Salines de Santa Pola: 34 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 21.XII: 3 ej. (JAI); 154 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Periodo para el que se registran censos que muestran una tendencia ligeramente positiva de la población nidificante. Destaca la cita reproductora tardía de un nido con pollos reclamando alimento a mediados de septiembre y una mayor presencia en humedales durante el periodo invernal (l'Albufera, Marjales al sur del Xúquer, Albufera de Gaianes, Pantano de Elche y el Hondo).

Nycticorax nycticorax

Martinete común - Martinet - Black-crowned Night-heron

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: VUL

2012

Marjal d'Almenara: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 25.I: 543 ej. salen volando al anochecer de un dormidero en la devesa (VLG,MGI); 79 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 15.I: 2 ej. (SAR)

Illa de Tabarca: 26.III: 2 ej. llegan desde el mar y paran a descansar en la isla (AAR)

El Fondo d'Elx: 24.XI: 1 ej. (OAP,RLM)

Desemb. riu Segura: 14.I: 1 juv. (SAR)

2013

Marjal d'Almenara: 17 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 334 ej. saliendo al atardecer de un dormidero en la devesa (VLG); 75 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Embalse de Beniarrés: 30.VII: 1 juv. y 1 ad. (BOR)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 93 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Emb. de La Pedrera: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Periodo con citas habituales para la especie aunque los censos muestran una reducción significativa del número de parejas reproductoras respecto a los años anteriores.

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron

Estatus: Nidificante escaso, migrante escaso e invernante raro. Conservación: PE

2012

Marjal d'Almenara: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Desemb. barranc del Carraixet: 11.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 11.I: 1 ej. de 1.^{er} inv. en un canal de la Calderería. Cita invernante (EGO,BDJ); 289 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 12.VI: Grupo de 34 aves alimentándose en el mismo arrozal en el tancat del Xato (FPA,BDJ)

Cullera: 02.XII: 1 ej. (JRA)

Salines de Santa Pola: 47 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 16.II: 1 ej. Primera cita prenupcial (MLP); 86 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Desemb. riu Segura: 13.I: 2 ej. (SAR,MAA); 05.XII: 1 ej. (AJR)

2013

Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 1 ej. (VET)

Marjal d'Almenara: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Desemb. barranc del Carraixet: 10.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 03.I: 1 ej. en la acequia dels Muntanyars (BDJ); 09.I: 1 ej. en el vedat de Sollana (AAC); 11.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 02.II: 1 ej. un arrozal fangueado en el Bony (BDJ); 09.II: 1 ej. en la marjal de Silla (GCH) 01.III: 1 ej. en Sollana (CAZ); 260 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 01.IX: 65 ej. en un tramo entre arrozales del Bony (BDJ); 20.XI: 1 ej. en arrozales del Petxinar (JTN)

Requena: 19.VIII: 1 juv. o h. ad. en el estanque grande, sedimentada hasta el 01.IX (JAI)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 29 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 35 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 168 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Emb. de La Pedrera: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Se mantienen las buenas cifras para la especie, principalmente por la recuperación registrada desde 2011 en la colonia de l'Albufera. Destacan las citas reproductoras en el Hondo de Amorós y la confirmación de reproducción en el embalse de Embarcaderos, que supone la localidad de cría situada más al interior de la Comunidad.

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Conservación: IE

2012

Desem. riu Millars: 31.I: 385 ej. en dormidero sobre cañas (JBC)

Onda: 11.III: 350 ej. (MBM)

Marjal d'Almenara: 10.I: 347 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 708 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.385 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Pantà d'Elx: 02.I: 2.808 ej. censo en dormitorio (OAP,RLM, CAG); 02.XII: 2.813 ej. censo en dormitorio (OAP,RLM,JGS,LUR)

Salines de Santa Pola: 1.990 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Emb. de La Pedrera: 91 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

2013

Albufera de València: 11.I: 769 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.347 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Emb. de Bellús: 13.I: 71 ej. (BOR)

Villena: 28.III: 100 ej. entrando al dormitorio situado en un cañar junto a grajillas (MCR)

Salines de Santa Pola: 650 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 3.900 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 600 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Hondo de Amorós: 70 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Emb. de La Pedrera: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Charca vivero El Realengo: 400 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Se mantiene la tendencia positiva, con un total de 3.509 parejas nidificantes en 2012, 3.265 en 2013, y una población invernante de 4.500-5.000 aves, respectivamente, concentradas en l'Albufera y humedales del sur de Alicante. En 2013 se registra la disgregación de la colonia reproductora de Santa Pola en varias localidades, destacando el establecimiento de 400 parejas en la charca vivero del Realengo.

Egretta gularis

Garceta dimorfa - Agró del esculls - Western Reef Egret

Estatus: Migrante e invernante raro

2012

Albufera de València: 26.V: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. *gularis* en arrozales del Brosquill. Aparentemente el mismo ej. es observado el 08.VI en el tancat de Zacarés (SMY), el 11.VI, el 22.VI y 04.VII en la colonia de reproducción de ardeidas de la mata del Fang (PVG, JME, SDA, BDJ), el 03.VIII en el tancat de la Pipa (LMR, MLA, BDJ) y el 22.VIII en arrozales de Albal (EGO,LAA,MAL)

Cita homologada por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (Copete et al., 2015). Las observaciones realizadas en la colonia de cría de ardeidas en l'Albufera, en todas las ocasiones alzando el vuelo en el mismo lugar, junto con la observación de un ejemplar joven mostrando rasgos de hibridación el 29.VIII.2012 en el tancat de la Pipa (junto a las observaciones del 25.II.2013 y 30.III.2013 en Valencia, y 19.III.2013 en Catarroja, probablemente referidas al mismo individuo mostrando caracteres de hibridación) podrían implicar la hibridación del ejemplar en esta localidad. Sin embargo, el seguimiento de nidos realizado en esta colonia no permitió confirmar este hecho (P. Vera com. pers.).

Egretta gularis* x *Egretta garzetta

Garceta dimorfa x garceta común

2012

Albufera de València: 04.I: 1 ej. en el Romaní (PMP). Por el estudio del plumaje, la misma ave es observada el 10.I en el Romaní (PMP), el 09.II en el tancat de Malta (AAC), el 18.II en Silla (GCH), el 18.IV en la

Foia (EGO, FPA), el 13.VI y 14.VI en el tancat de la Ratlla (TMF, AMA, JPE, SEOV), el 10.VII en el tancat de Milia (CVA, AAC), el 10.IX en el Malvinaret (EGO) y el 19.IX, el 24.IX, el 08.X y el 22.XI en la Foia (BDJ, JHZ); 28.I: 1 ej. en zonas fangueadas del Campot, de acuerdo con el plumaje observado en fotografías, se observa de nuevo en arrozales de Catarroja el 10.III y el 11.III (AAC, CAZ, VDA) y el 21.IX (AUR, BDJ); 29.VIII: 1 ej. en el tancat de la Pipa mostrando un plumaje predominantemente blanco, con algunas cobertoras mayores, medianas y pequeñas de color grisáceo claro, apreciables claramente en el vuelo con las alas extendidas. En todo momento se mantiene separada de un grupo de garcetas comunes que se alimentan en los filtros (PVG)

Salines de Santa Pola: 28.VI: 1 ej. aparentemente el mismo ejemplar es observado el 08.VII (CPG, ESE, PSC)

2013

Albufera de València: 02.II: 1 ej. mostrando rasgos propios de hibridación entre garceta dimorfa y garceta común, en un arrozal fangueado del Bony, cerca del port de Catarroja (BDJ). De acuerdo a la revisión de las fotos disponibles, este mismo ejemplar habría sido observado el 10.II (CAZ, VDA), 06.IX (PVG), 10.IX (PMP), 08.X y 10.X (PVG) siempre en arrozales de Catarroja; 25.II: 1 ej. presentando rasgos de hibridación entre garceta común y garceta dimorfa en zonas fangueadas del Campot (AAC). Atendiendo a las imágenes disponibles, se trataría de un ave juvenil, y habría sido observada posteriormente el 19.III en Catarroja (BMA, BDJ) y el 30.III en el Petxinar, Valencia (AAC, BDJ); 14.II: 1 ej. mostrando rasgos de hibridación entre garceta común y garceta dimorfa, en arrozales ya fangueados del tancat de Malta (EGO, BDJ). Atendiendo a las imágenes disponibles, este mismo ejemplar habría sido observado en la Foia el 12.III (EGO, BDJ), el 10.V (PVG), el 19.VI (JGR, BDJ), el 25.VIII (BDJ) y posteriormente en el tancat de la Ratlla el 12.IX (PMP), el 17.XII (EGO) y el 22.XII (GCH)

Requena: 26.IV: 1 ej. mostrando rasgos de hibridación entre garceta común y dimorfa. Primera cita comarcal (PRP)

Salines de Santa Pola: 03.II: 1 ej. (PSC)

El Fondo d'Elx: 31.VIII: 1 ej. (OAP)

Las observaciones realizadas en l'Albufera en 2012 y 2013, gracias al estudio de los patrones de plumaje realizado a través de las fotografías disponibles, son asignables probablemente a 3 únicos ejemplares, que muestran una sorprendente fidelidad a las localidades (arrozales de Valencia, Catarroja y Sollana, respectivamente). La observación realizada en Requena, atribuida con seguridad a un ejemplar distinto a los anteriores, supone la primera cita comarcal. Observaciones pendientes de homologación.

Egretta garzetta

Garceta común - Garseta blanca - Little Egret

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante común. Conservación: IE

2012

Marjal d'Almenara: 02.II: 562 ej. (JBC)

Albufera de València: 13.I: 6.169 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.010 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Montesa: 07.IV: 1 par. volando junta, presente de manera continua durante varias semanas (SSM)

Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 354 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 89 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 07.IX: 578 ej. (SAR)

2013

Marjal d'Almenara: 15.I: 209 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 11.I: 3.982 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 824 par. Censo de aves

acuáticas nidificantes de la CV

Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 455 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 18.I: 83 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.IX: 558 ej. (CMA); 380 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Egretta alba

Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.V: 1 ej. (AMG); 05.V: 1 ej.; 22.VII: 1 ej. (MBM)

Grau de Castelló: 19.VI: 2 ej. (MBM)

Marjal d'Almenara: 02.II: 6 ej. diseminadas por toda la marjal; 01.VIII: 26 ej. (JBC)

Quartell: 22.VII: 8 ej. (AAC, CVV)

Albufera de València: 10.I: 61 ej. entrando al atardecer a uno de los dormitorios de la punta de Llebeig (VLG,MMN,BDJ); 13.I: 190 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.I: 42 ej. juntas en una de las lagunas del tancat de Milia; 24.I: 84 ej. al atardecer volando en dirección NE (AAC); 04.II: 49 ej. en zonas inundadas de l'Estell (VLG,MGI); 10.III: 123 ej. en zonas inundadas de los tancats de Naia y dels Pescadors (BDJ); 29.V: 6 ej. en el tancat de Milia (AAC); 12.VI: 8 ej. en el tancat de la Pipa, uno de ellos mostrando comportamiento reproductor (SEOV); 05.VI: 12 ej. a primeras horas de la mañana (CAV,AAC); 16.VII: 19 ej. en el tancat de Milia (AAC); 03.VIII: 22 ej. en el tancat de la Pipa (BDJ); 18.IX: 55 ej. (3 ad.) pescando en una de las lagunas del tancat de la Pipa. Una de las aves porta una anilla húngara (SEOV); 10.X: 55 ej. entre Zacarés y la Baldovina (VPA); 18.X: 87 ej. en zonas inundadas del Malvinar (JHZ,BDJ); 30.XI: 31 ej. en zonas inundadas de Sollana (JHZ,BDJ)

Elx: 22.II: 18 ej. (SAR)

Salines de Santa Pola: 15.XI: 37 ej. máximo invernal (AJR); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 15.V: 20 ej. (CMA)

2013

Peníscola: 16.V: 1 ad. (ELL)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.IV: 11 ej. (RPB,ALR)

Albufera de València: 11.I: 145 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15.II: 86 ej. en zonas inundadas de la Sardina y els Pescadors (BDJ); 21.II: 56 ej. en el tancat del Abaetxo. Una de las aves presenta plumaje totalmente nupcial (AAC); 09.III: 74 ej. en zonas inundadas de Catarroja, Albal y Silla. Al menos dos de ellos con plumaje nupcial (BMA,BDJ); 09.V: 1 ej. con plumaje y rasgos reproductores en el tancat de la Pipa (CGM,PVG); 23.V: 2 ej. con plumaje no nupcial en el tancat de la Pipa (SEOV); 31.V: 4 ej. dos en el tancat de Milia y otras dos en el tancat de l'Illa. Ninguna de las aves presenta plumaje nupcial; 26.VI: 3 ej. en el tancat de Milia, ninguna de las aves presenta plumaje nupcial (AAC); 18.VII: 16 ej. en el tancat de la Pipa (BDJ); 28.IX: 14 ej. en arrozales cosechados cerca de Sollana (JGOM,UFU,VLO)

El Fondo d'Elx: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Mes de censo	I	II	III	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
2012	190	49	123	6	12	19	22	55	87	31
2013	145	86	74	4	2		16	14		

*Censos destacados de garceta grande en l'Albufera de Valencia. Años 2012 y 2013.
Autores de los censos en las citas.*

Se registra por primera vez la reproducción de la especie en la Comunidad Valenciana, con dos parejas en Santa Pola en 2012 y una pareja en el Hondo en 2013 tras varios años en los que han proliferado las observaciones tanto de aves invernantes como de aves inmaduras durante el periodo reproductor en l'Albufera y humedales del sur de Alicante.

Ardea cinerea

Garza real - Agró blau - Grey Heron

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Conservación: IE

2012

Marjal d'Almenara: 10.I: 287 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Marjal dels Moros: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 2.118 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 538 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 18.IX: 164 ej. concentración destacada en una de las lagunas del tancat de la Pipa (SEOV)

Guadasequies: 30.VIII: 130 ej. (BOR)

Salines de Santa Pola: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV. 27.XII: 178 ej. (AJR)

2013

Marjal dels Moros: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 09.I: 248 ej. en una parcela al N del tancat de la Sardina (PVG); 11.I: 2.377 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 360 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Emb. de Beniarrés: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 19.X: 290 ej. (AJR)

A pesar de la tendencia general positiva de la especie en la región, los últimos años han mostrado un descenso del número de parejas nidificantes, debido principalmente al declive experimentado en l'Albufera. La población invernante se mantiene al alza, superando los 3.000 ejemplares en 2013.

Ardea purpurea

Garza imperial - Agró roig - Purple Heron

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 24.III: 3 ej. (MBM)

Illes Columbretes: 06.III: 1 ej. (LGB)

Marjal d'Almenara: 19 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Marjal dels Moros: 9 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 12.I: 1 ej. entrando al dormidero de la punta de Llebeig. Cita invernante (MLA,PVG); 34 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 14.VI: 1 ej. en el sequiol de l'Or. Primera observación de un ej. nacido la presente temporada de cría (SEOV); 15.IX: Grupos de 5 y 12 aves el tancat de Milia (PMP,MPB); 25.X: 1 ad. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 25 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JVI)

Illa de Tabarca: 20.III: 1 ej. (AAR)

El Fondo d'Elx: 01.VIII: 25 ej. (CMA); 13 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

2013

Sant Mateu: 29.IV: 2 ej. (VET)

Desem. riu Millars: 21.IV: 16 ej. en lagunas artificiales y gola S (GUM)
Marjal dels Moros: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (MYB)
Albufera de València: 49 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 06.XI: 2 ej. en la Tancadeta (VVA); 25.VIII: 44 ej. en paso hacia el S al atardecer (GLL,BDJ)
Requena: 05.V: 1 ej. en charcas temporales formadas tras fuertes lluvias (RLO)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal de Pego-Oliva: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 27.III: 1 ej. Primera observación prenupcial (AJR)
El Fondo d'Elx: 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

CICONIIDAE

Ciconia nigra

Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: PE

2012

Morella: 02.VI: 1 ej. (RPB,ALR,ADP)
Ares del Maestrat: 15.IX: 3 ej. (ALR,RPB)
Benicàssim: 19.IX: 1 ej. (FJS,RPB)
Embalse del Regajo: 11.VIII: 1 juv. (MJS,JAT,EPL,CMU,JRS)
Paterna: 18.XII: 1 ej. (CAZ)
Albufera de València: 13.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.I: 2 ej. aparentemente inm. Uno de ellos porta anilla blanca de lectura a distancia de origen checo. Parece tratarse de los ej. observados el pasado mes de diciembre. Presentes hasta el 19.I (EGO,BDJ); 09.II: 1 ej. dirección NO (AAC); 14.II: 1 ej. que parece tratarse de uno de los presentes a lo largo de este invierno (JAU); 02.III: 1 ej. dirección N (CAZ); 12.III: 1 ej. en el tancat de la Pipa (JAA,MPO,TPA,MCC,GLL); 15.III: 1 ej. aparentemente juv. junto con una cigüeña blanca (SEOV,PMP); 07.IV: 1 ej. marcado con anilla PVC código [6308] (DJA,EJA); 21.IV: 1 ej. dirección O (ARO,CAP,VDA,BFM,LSO,FFA,MPB); 25.IV: 1 ej. presenta hasta el 27.IV (CAV,AAC); 24.IX: 1 ej. (MLA); 12.X: 1 ej. en arrozales de Sueca presente hasta el 15.XII (JHZ,BDJ) aumentando a 2 ej. el 31.X (JTN) y 3 ej. presentes hasta el 15.XII (JTN,AAC,BDJ); 22.X: 1 ej. (PMP); 19.XI: 1 ej. con marcas de lectura a distancia (PMP); 26.X: 1 ej. cicleando (AAC); 28.XII: 2 ej. (BDJ); 09.XII: 2 ej. uno de ellos marcado con anilla de lectura a distancia blanca [63CB], procedente de la República Checa. Ya fue observado el mes de enero de 2012 en este mismo sitio (RMT,AGI); 31.XII: 1 ej. (MPB)
Llaurí: 02.XII: 1 ej. presente desde el 10.X (ASL,JML)
Emb. de Beniarrés: 06.X: 1 ej. (BOR)
Pantà d'Elx: 10.IX: 1 ej. (OAP)

2013

Ares del Maestrat: 09.X: 2 ej. (RPB,ALR)
Albocàsser: 19.IX: 1 ej. (RPB)
Alcossebre: 21.XI: 1 ad. (DES)
Chelva: 01.IV: 1 ej. (JDL)
Olocau: 20.III: 1 ej. dirección N (TPA,MCC)
Massamagrell: 25.III: 1 ej. dirección N (EBA)
Paterna: 24.III: 1 ej. cicleando (JBL)
Mislata: 23.III: 1 ej. dirección NE (JAI,GPR,XXH)
Alaquàs: 28.XI: 2 ej. (MPR)

Camporrobles: 15.IX: 1 ej. (RMB)

Valencia: 23.II: 4 ej. (VBJ)

Albufera de València: 10.I: 2 ej. en zonas fangueadas de la Llonga. Se trata de las mismas aves observadas desde el pasado mes de diciembre. Una de ellas (marcado con anilla [63CB] procedente de la República Checa) parece mostrar una herida en el ala izquierda. Presentes hasta el 22.I (JGR,BDJ); 05.II: 5 ej. en el Malvinaret, se trataría la mayor concentración de aves registrada hasta la fecha en l'Albufera, presentes hasta el 10.II (IOL); 18.II: 1 juv. y 1 ad. volando dirección S (AAC,FGN); 23.II: 4 ej. en el Malvinar (VBJ); 27.II: 2 ej. presentes hasta el 08.III en el tancat de Milia (GTR); 27.II: 4 ej. en el Fangar (FFA); 12.III: 1 ej. en los arrozales del Saladar (PMP); 25.III: 4 ej. en el tancat de Baldoví (MCH); 06.XI: 3 ej. la Socarrada (BDJ); 13.XI: 4 ej. (BDJ); 17.XI: 3 ej. en l'ullal de Baldoví (JPH); 22.X: 1 inm. en la marjal de Alfafar. Presente hasta el 05.XI (PMP); 02.XI: 2 ej. en el vedat de Cullera (BDJ); 25.XI: 1 ej. cicleando sobre los arrozales entre Sollana (EGO); 21.XII: 2 ej. en los arrozales de Sollana (MAL,OAL,LAA)

Cullera: 12.I: 1 ej. sobrevolando zonas de arrozal del Brosquill (JRA)

Salines de Santa Pola: 26.I: 1 ej. (AJR)

Buen año de citas, tanto por el número de observaciones recibidas como por el número de ejemplares avistados. Destaca especialmente la provincia de Valencia por recoger varias citas plenamente invernales, como ya va siendo habitual desde años anteriores.

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 18.VIII: 174 ej. en un solo bando migrando rumbo S sobre el cuadro de Santiago (AAC,IBR)

Segorbe: 19.VIII: 6 ej. (JMA)

Alcublas: 17.VIII: 2 ej. (RCM)

Albufera de València: 08.II: 70 ej. sesteando en zonas fangueadas del tancat de la Platera. Se trata de la mayor cifra registrada hasta la fecha en l'Albufera (VLG); 18.III: 1 ej. con anilla de lectura a distancia en el Malvinar (RMQ); 19.IV: 25 ej. descansando en el tancat de Milia. Dos de las aves portan anillas de lectura alemanas (CAV,AGU,FLL,JMAG,AAC); 25.IV: 13 ej. descansando en el tancat del Fangar (CAV,AAC); 04.VI: 1 ej. dirección NO en el Racó de l'Olla (JID); 05.IX: 1 ej. en los arrozales del Malvinaret. Presente hasta el 28.XII (EGO); 05.XI: 1 ej. cicleando sobre el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)

Camporrobles: 23.IX: 6 ej. (RMB)

Requena: 19.XII: 3 ej. cita invernal (RLO)

Villena: 08.V: 1 ej. (MCR)

Elx: 20.V: 1 ej. (MAA)

El Fondo d'Elx: 18.IV: 4 ej. (SAR); 17.X: 6 ej. (CMA); 19.XII: 2 ej. (OAP)

2013

Sant Mateu: 16.VI: 1 ej. posado en una torre de alta tensión al atardecer (JBC)

Alcossebre: 06.V: 5 ad. volando al N. Única cita anual (DES)

Marjal d'Almenara: 04.IV: 4 ej. (JLB)

Cauce nuevo del río Turia: 10.IV: 25 ej. cicleando y ganando altura (PVG)

Albufera de València: 26.IV: 9 ej. que se detienen por un instante en arrozales de Ravisanxo (VVA); 16.IV: 8 ej. en migración activa sobre el Borronar (AAC,FGN); 25.VII: 1 ej. sobrevolando la marjal de Sollana, primera observación postnupcial (PMP)

Alacant: 13.V: 7 ej. (VGS)

Villena: 10.III: 2 ej. (DMM)

El Fondo d'Elx: 02.II: 3 ej.; 13.II: 2 ej. presentes hasta el 26.III; 19.X: 4 ej. (OAP)

Presencia de grupos relativamente numerosos durante ambas migraciones. Tan solo se ha recogido una cita plenamente invernal en Requena en 2012.

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Morito común - Picaport - Glossy Ibis

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Marjal d'Almenara: 22.XII: 200 ej. en arrozales de la Llosa (JBC); 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV.

Albufera de València: 55 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Calp: 03.IV: 1 juv. presencia poco usual en este paraje (CPF)

Salines de Santa Pola: 63 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 26.VII: 136 ej. (SAR)

Dolores: 25.XII: 25 ej. en cultivos cercanos al pueblo (OAP)

2013

Marjal de Sagunt: 20.XII: 275 ej. en Quartell (JLB)

Marjal dels Moros: 55 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 17.VI: 23 ej. (juv. y ad.) primera cita de aves nacidas en la presente temporada en el tancat de Milia (AAC); 91 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Hondo de Amorós: 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 26 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Mes de censo	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	530	519	422	6	33	45	390	252	600	136	350	677
	(JME, EGO, BDJ)	(JDI, MCH, IRU)	(LMR, MLA, PVG)	(EGO, FPA, BDJ)	(JBE, BDJ)	(FPA, BDJ)	(MGL, VLG)	(AAC)	(CAV, AAC)	(AAC)	(AAC)	(PVG, MLA, LMR)
2013	978	1.060	722	34	24	68	230	400	275	270	220	623
	(BDJ)	(JPH)	(JPH)	(PVG)	(AAC, FGN)	(AAC, FGN)	(AAC, FGN)	(AAC, FGN, GTR)	(BDJ)	(BDJ)	(DMO, PVG)	(BDJ)

Censos destacados de morito en l'Albufera de Valencia. Años 2012 y 2013.

Especie en claro aumento poblacional en nuestro territorio, tanto durante la época de cría, donde alcanza las 119 parejas distribuidas en 3 humedales en 2012 y 182 parejas distribuidas en 5 humedales en 2013 (concentrándose en l'Albufera, Marjal del Moro y Santa Pola), como durante la época invernal, donde se registra un nuevo máximo histórico con 1.060 ejemplares en febrero de 2013 en l'Albufera.

Platalea leucorodia**Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill**

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012**Marjal de Sagunt:** 22.VII: 1 ad. y 1 juv. en Quartell (AAC, CVV)**Albufera de València:** 25.I: 7 ej. en el Racó de l'Olla (JID, MCH); 12.II: 14 ej. volando en sentido N sobre la devesa, y posteriormente descendiendo y dirigiéndose hacia arrozales de Catarroja (CAP, VDA, MSM, JGR, PLP, PVG); 03.III: 14 ej. en el Saladar (PMP, GMA); 29.IX: 28 ej. descansando en el tancat de la Pipa (LMR); 20.IX: 36 ej., la mayoría juv., alimentándose en los filtros verdes del tancat de Milia (CAV, AAC)**Salines de Santa Pola:** 10.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 31.VIII: 10 ej. Primera cita postnupcial; 01.X: 46 ej. (AJR)**2013****Les Alqueries:** 06.III: 1 ej. muy alto hacia el N (JCS)**Marjal dels Moros:** 21.III: 6 ej. volando hacia el N (CAZ)**Albufera de València:** 16.I: 4 ej. en el Racó de l'Olla (JID, IRU, GGA); 01.II: 1 ej. presente desde el otoño con una anilla de lectura a distancia en el Racó de l'Olla (JID); 07.II: 1 juv. (AAC); 22.II: 1 ad. en el tancat del Abaetxo (AAC); 13.II: 3 ej. (2 ad.) en el Racó de l'Olla (JID, MCH, IRU); 19.III: 2 ej. (ad. e inm.) alimentándose en zonas inundadas del tancat dels Pescadors. El inm., marcado con anilla de lectura a distancia, se ha presentado regularmente en el tancat de Milia desde el pasado mes de noviembre (BMA, BDJ); 23.IV: 4 ej. (3 ad.) en el tancat de Milia. Todas las aves portan anillas de lectura a distancia de Francia. Entre ellas sigue presente el ave joven presente desde noviembre (AAC); 09.IX: 1 ad. primera observación postnupcial en el Racó de l'Olla (JID); 01.X: 16 ej. parando por un breve periodo de tiempo en el tancat de Milia (AAC); 06.X: 15 ej. sesteando en el tancat de la Pipa, y 10 observados en migración activa a última hora de la mañana (PVG); 07.X: 12 ej. en el tancat de Milia. Varias portan anillas procedentes de Francia y Holanda (AAC); 08.X: 21 ej. alimentándose y sesteando en el tancat de la Pipa (SEOV); 04.XII: 3 juv. en el tancat de la Pipa (PVG); 14.XII: 1 juv. en el tancat de la Pipa (JFE, PVG); 30.XII: 1 juv. (GTR)**El Fondo d'Elx:** 02.II: 2 ej. (OAP); 18.VI: 4 ej. (CMA); 14.VIII: 1 ej. (SAR)**Salines de Santa Pola:** 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Mes de censo	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2013	18	24	22	-	4	-	3	-	25	27	48	40

Censos mensuales destacados de espátula común en las salinas de Santa Pola en 2013. Todos los censos por Antonio Jacobo Ramos.

Dos años con abundantes observaciones, concentrándose en los periodos migratorios y en la invernada. Los humedales artificiales en l'Albufera y las Salinas de Santa Pola suponen dos puntos de parada utilizados con frecuencia durante los pasos migratorios de la especie, recogiendo abundantes citas a lo largo de la primavera y el otoño. Se mantiene la invernada en dos humedales en Santa Pola y l'Albufera.

PHOENICOPTERIFORMES

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus**Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo**

Estatus: Nidificante ocasional muy localizado, migrante moderado. Conservación: IE

2012

Marjal d'Almenara: 18.II: 86 ej. (JCS), aumento gradual hasta un máximo prenupcial de 196 ej. el 10.III (JCS,SIJ); última cita prenupcial de 35 ej. el 19.III (JCS). Primera cita postnupcial de 28 ej. el 20.VII. Cita invernal de 1 ej. el 15.XII (JBC)

Albufera de València: 13.I: 152 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.II: 245 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU). Censos prenupciales destacados en el tancat de la Ratlla de 220 ej. el 20.II, de 266 ej. en el vedat de Silla el 25.II (AAC) y de 297 el 04.III (BDJ); 14.III: 385 ej. en el interior de la mata del Fang comiendo y sesteando (MCH,JID); 13.XII: 472 ej. presencia continuada en la reserva del Racó de l'Olla, suponiendo la cifra más alta registrada hasta la fecha en l'Albufera (JID,MCH)

Salines de Santa Pola: 10.I: 1.702 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 12.I: 1.750 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: Censo destacado de 4.390 ej. el 22.III y de 5.093 ej. el 13.VI (máximo anual) (CMA); 90 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV.

2013

Albufera de València: 11.I: 606 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.II: 1.183 ej. censo en el Racó de l'Olla. Incremento gradual de efectivos a lo largo del mes pasado, hasta alcanzar la actual cifra récord de presencia de la especie en l'Albufera (JID,MCH,IRU,GGA); 27.II: 1.375 ej. en zonas inundadas del tancat del Corral y en los tancats de la Sardina y de Naia (JGR,BDJ); 09.III: 1.769 ej. en campos inundados cerca del Saladar y campos inundados del tancat de Naia (JPH,BMA,BDJ)

Emb. de Bellús: 28.VII: 6 ej. (BOR)

Salines de Santa Pola: 15.I: 933 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 07.VIII: Máximo anual de 3.580 ej. el 07.VIII (MFS); censo destacado de 2.255 ej. el 08.IX (SAR,AJR)

El Fondo d'Elx: 18.I: 201 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 02.X: Máximo anual de 1.227 ej. (CMA)

Se produce la nidificación en el Hondo, con 90 parejas en 2012 y registrándose un máximo anual superior a los 5.000 ejemplares. L'Albufera de Valencia alcanza sus máximos registrados, con 1.769 ejemplares en marzo de 2013. Ambos datos son coherentes con el aumento experimentado por la población mediterránea occidental, el asentamiento de nuevas colonias y establecimiento de nuevas áreas de invernada.

Phoenicopterus minor**Flamenco enano - Flamenc menut - Lesser Flamingo**

Estatus: Divagante del S del Sahara y SO de Asia. Escapado de cautividad. Categoría: A, D, E3

2012

Albufera de València: 06.II: 1 ej. integrado en un bando de flamenco común. Sigue presente el 8.II. (MCH,JID,IRU)

Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017)

ACCIPITRIFORMES

ACCIPITRIDAE

Pernis apivorus**Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard**

Estatus: Migrante abundante, ¿nidificante?. Conservación: IE

2012

Desert de les Palmes: 28.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 01.IX: 3.528 ej. en 4 horas de censo. Fuerte paso de ad. asociado a borrasca y vientos moderados del O. Habitualmente el flujo postnupcial de adultos no se detecta desde la costa; 17.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 3.783 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)

Castelló de la Plana: 10.IV: 16 ej. (RPB)

Marjal d'Almenara: 21.V: 3 ej. volando hacia el NO, muy bajos a causa del fuerte viento. Van en solitario (JBC)

Fuentes de Ayódar: 09.IX: 30 ej. a media altura hacia el S (LPP)

València: 05.IV: 1 ej. volando hacia el N sobre el casco urbano (PAB)

Albufera de València: 21.V: 73 ej. en paso hacia el N entre las 9 y las 14 h. sobre la devesa. Marcado paso de migrantes coincidiendo con el fuerte viento de poniente (BDJ,EGO); 22.V: 68 ej. a lo largo de la mañana sobrevolando el tancat de Milia (AAC); 31.X: 2 ej. volando muy bajo debido al fuerte viento de poniente observados desde la muntanyeta dels Sants (JTN)

Camporrobles: 01.IX: 68 ej. en distintos grupos vuelan hacia el S en 4 h. de censo (JAI)

Alacant: 26.IX: 14 ej. (JMT,GMG,PFV)

Hondo de Amorós: 22.X: 2 ej. (SAR)

Cardete: 01.IX: 19 ej. (RMB)

2013

Vinaròs: 18.V: 47 ej. en varios grupos cicleando a partir de las 9 h. por Soterranyes baixes (ELL,AMS,JAM); 21.V: 23 ej. en migración cerca del casco urbano (AGC)

Cervera del Maestre: 29.VIII: 40 ej. volant en cercles agafant altura (SMS)

Torreblanca: 20.IV: 21 ej. en paso hacia el NO (IMR)

La Vall d'Uixó: 29.VIII: 224 ej. durante el control de la migración postnupcial en 3 h. de censo (JBC); 09.X: 10 ej. durante el control de la migración postnupcial en 4 h. de censo (JBC,JLB)

Albufera de València: 02.IV: 4 ej. en migración activa sobre el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 16.V: 81 ej. volando con rumbo N sobre la devesa a lo largo de la mañana en pequeños grupos. Las primeras observaciones se realizan poco después del amanecer, mientras toman altura sobre la pinada, indicando que podrían haber pasado la noche en la localidad (MCH,JID,IRU,GGA); 09.VI: 9 ej. en paso hacia el N sobre la devesa. Cita tardía que coincide con una jornada de fuerte viento del O (VLG)

Requena: 24.III: 1 ej. Primera cita en migración prenupcial; 30.III: 3 ej. en paso al N por Ganaciendas; 30.VIII: 52 ej. en tres grupos en paso al S (JAI)

Pantà d'Elx: 30.IX: 6 ej. migrando (OAP)

Hondo de Amorós: 20.V: 1 ej. (SAR)

Chera: 27.VIII: Bando de 12 ej. cicleando. Primera cita postnupcial (PRP)

Elanus caeruleus **Elanio común - Esparver d'espattes negres - Common Black-shouldered Kite**

Estatus: Nidificante raro ocasional, migrante e invernante raro. Conservación: IE

2012

Requena: 01.I: 1 ej. (RLO)

El Fondo d'Elx: Citas de 1 ej. los días 08.X (SAR,AJR,SCR) y 11.X (AJR)

2013

Caudiel: 23.X: 1 ej. (FLL)

Marjal dels Moros: 18.III: 1 ej. (FLL)

El Fondo d'Elx: 11.II: 1 ej. (SAR)

Hondo de Amorós: 28.III: 1 ej. sedimentado desde febrero (AJR,SAR)

Milvus migrans**Milano negro - Milà negre - Black Kite**

Estatus: Migrante común, nidificante raro muy localizado. Conservación: IE

2012

Vinaròs: 06.IV: 1 ej. (JLA)

Vilanova d'Alcolea: 03.VI: 1 ej. volando muy bajo (JBC)

Desem. riu Millars: 08.IV: 2 ej. en volando al N (MBM); 04.X: 1 ej. (GUM)

Borriana: 16.IV: 2 ej. volando al N muy bajos (JBC)

La Vall d'Uixó: 31.VIII: 2 ej. censo migración en 3 h. (JBC)

Vallanca: 29.IV: 4 ej. (RMB)

Albufera de València: 11.IV: 4 ej. pasan escalonadamente a lo largo de la mañana sobre el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (CAV,AAC); 23.IV: Grupo de 10 ej. tomando altura sobre la devesa y volando luego hacia el N (JID,IRU)

Utiel: 12.IV: 1 ej. en migración (JAI)

Requena: 02.VIII: 1 juv. primer registro postnupcial. Descansa posado en el fondo de la balsa grande totalmente seca (PRP)

2013

Palanques: 18.VII: 2 ej. volant per la zona (SMS)

Morella: 11.IV: 3 ej. volant per la zona (SMS)

Vilanova d'Alcolea: 29.IV: 1 ej. campeando (VET)

Benlloch: 27.II: 1 ej. volando por la zona (SMS)

El Toro: 09.III: 3 ej. en paso al N (MGT)

Lliria: 15.III: 1 ej. cruza volando la autovía (VMV)

Albufera de València: 12.III: 1 ej. en paso hacia el N. Primer registro prenupcial (EGO,BDJ); 28.III: 1 ej. a primeras horas de la mañana en paso hacia el N sobre la devesa (BDJ); 10.IV: 7 ej. dispersos en paso hacia el N sobre la devesa a lo largo del día con viento de Poniente (MCH,JID,IRU,GGA)

Caudete de las Fuentes: 27.IV: 10 ej. en paso sobre el casco urbano (RLO)

Requena: 10.III: 1 ad. primera cita anual (JAI); 31.III: 3 ej. (RMB); 24.VIII: 6 ej. en paso al S (JAI)

Chiva: 27.VIII: 8 ej. volando a baja altura en paso hacia el S (TPA)

Laguna de Sant Mateu: 02.VI: 1 ej. (VET)

Milvus milvus**Milano real - Milà reial - Red Kite**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012**Vinaròs:** 02.XI: 1 ad. en vuelo hacia el E (ELL,JAM)**Les Coves de Vinromà:** 06.XI: 1 ej. volando muy bajo (SMS)**Vilanova d'Alcolea:** 02.XI: 1 ej. (JBC,JLB)**Desert de les Palmes:** 27.X: 1 ej. Única cita anual en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)**Castelló de la Plana:** 25.VIII: 1 ej. volant a baixa altura en el casc urbà. Comença a pujar una tèrmica, agarrant molta altura (PGR)**Albufera de València:** 18.IV: 1 ej. en paso hacia el N a primeras horas de la mañana sobre la devesa (BDJ); 12.X: 1 ej. sobrevolando zonas del Ràfol (JHZ,BDJ)**Villena:** 12.X: 1 ad. (DMM)**2013****Morella:** 09.XII: 1 ej. observat durant 10 min. volant per la zona (SMS)**Vinaròs:** 06.X: 1 ej. censo postnupcial de rapaces 2013 (en 3 h. de observación) (ELL)**Vilanova d'Alcolea:** 20.IV: 1 ej. planeando sobre el aeropuerto y luego dirección NO. Posible cita tardía de migración prenupcial (JBC)**Benlloch:** 31.III: 1 ej. volant per la zona (SMS)**València:** 16.III: 1 ej. posado en un árbol (SLB); 26.III: 1 ej. (ACB)**Requena:** 16.IV: 1 ej. volando hacia el N (GLL)**Villena:** 02.IV: 1 ej. volando dirección N (MCR); 04.X: 1 ad. (DMM)**El Fondo d'Elx:** 12.X: 1 ej. (OAP)**Gypaetus barbatus****Quebrantahuesos - Trenchalòs - Bearded Vulture**

Estatus: Visitante raro de los Pirineos. Conservación: PE

2013**Sumacàrcer:** 25.VII: 1 ej. volando hacia el SO (NMA)

Sexta cita del presente siglo en la CV y primera estival.

Neophron percnopterus**Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture**

Estatus: Nidificante y migrante raro. Conservación: IE

2012**Catí:** 13.III: 1 ad. 1.ª cita anual (ALR)**Ares del Maestrat:** 11.VI: 1 ej. volando (SMS)**2013****Albocàsser:** 30.VII: 2 ad. volant per la zona (SMS)**Sinarcas:** 1 par. nidificante (ALO)

Gyps fulvus**Buitre leonado - Vultur comú - Eurasian Griffon**

Estatus: Residente y migrante moderado. Conservación: IE

2012

Herbeset: 21.X: 30 ej. sobre pinar (JBC)

Cabanes: 03.VI: 30 ej. ciclando sobre el casco urbano. Posiblemente desplazados del interior por los frentes de lluvia (VET)

Desert de les Palmes: 27.X: 5 ej. máximo anual en seguimiento de la migración postnupcial (MTB)

Vila-real: 18.VIII: 1 ej. sobre el pueblo (JBC)

La Vall d'Uixó: 17.IX: 1 ej. censo de migración de aves en 3 h. de censo (JBC,JGS)

El Toro: 26.V: 12 ej. (JBC)

València: 04.XII: 1 ej. (JBL)

Albufera de València: 04.XII: 1 ej. en la devesa a escasos 10 m de altura. El ej., probablemente arrastrado por los fuertes vientos de poniente predominantes durante toda la mañana, era acosado constantemente por águilas calzadas (PVG,FJC); 05.XII: 1 ej. en el frente litoral del Perelló posado en las dunas y volando después hacia unos edificios. Debe tratarse del ejemplar observado el día anterior en la devesa (JUL)

Camporrobles: 01.IX: 20 ej. dispersivos de la provincia de Cuenca; 27.X: 50 ej. (JAI)

Ontinyent: 17.III: 1 ej. echado en un nido que el 1.II ya estaba ocupado (ASL,JML)

Elx: 28.X: 12 ej. (OAP)

2013

Herbés: 07.IV: 7 ej. ciclando cerca del pueblo a medio día (ELL)

Laguna de Sant Mateu: 02.VI: 4 ej. (VET)

Torrechiva: 19.III: 21 nidos con ad. incubando o cubriendo pollos pequeños (JLB)

Titaguas: 08.IX: 40 ej. posados en el muro de un corral (SLB,RGG)

Utiel: 23.II: 45 ej. (subad. y ad.) (JBS)

Requena: 22.XII: 6 ej. (RAA)

Buñol: 21.XI: 4 ej. sobrevolando el parque eólico (TPA); 18.XII: 1 ej. ciclando junto a la autovía (PRP)

Yátova: 30.XII: 10 ej. (TAL)

Montesa: 01.I: 1 ej. (SSM); 22.XI: 2 ej. provenientes de la sierra de Enguera, posteriormente ciclando sobre el valle del Canyoles (TPA)

Localidad	2012	2013
	Parejas nidificantes	Parejas nidificantes
Morella	57	63
La Pobra de Benifassà	132	143
Penyagolosa	75	72
Montanejos	198	171
Titaguas	5	6
Alcoi	32	28

Censos de buitre leonado en la Comunidad Valenciana. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Aegypius monachus**Buitre negro - Vultur negre - Eurasian Black Vulture**

Estatus: Visitante raro procedente del interior de la península Ibérica. Conservación: IE

2012

Tinença de Benifassà: 24.II: 1 ej. con marcas alares, anillado en el nido el 02.VII.2010 en la colonia de Mostejours en el departamento de l'Aveyron en el Midi-Pyrenees. (Diario Crítico de la CV)

Vallibona: 09.III: Observación del mismo ej. anillado en Francia. (Diario Crítico de la CV)

Torreblanca: 02.XII: 1 juv. liberado en el pre Pirineo catalán en el proyecto de reintroducción del buitre negro en Pirineos, y nacido en el centro de recuperación de GREFA en Madrid, aparece muerto por electrocución en una zona rural (es.blackvulture-pyrenees.org)

Oliva: 11.X: 1 juv. recogido desnutrido, entra en el Centro de Recuperación de Fauna del Saler. Después de su recuperación se entrega al grupo GREFA (CMA)

2013

Oropesa del Mar: 21.IX: 1 ej. localizado desnutrido y trasladado al centro de recuperación (CMA)

Circus aeruginosus**Culebrera europea - Águila serpera - Short-toed Snake-eagle**

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012

Els Rosildos: 05.III: 1 ej. volando con una culebra en el pico (SMS)

Desert de les Palmes: 27.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 47 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)

Desem. riu Millars: 07.III: 1 ej. (GUM)

Borriana: 18.VII: 1 ej. (JBC)

La Vall d'Uixó: 04.III: 1 ad. volando al N cerca de la ciudad (ELL); 24.IX: 7 ej. censo de migración de aves de 11:00 a 14:00 (JBC)

Marjal d'Almenara: 31.VIII: 2 ej. (JBC)

Albufera de València: 01.XI: 1 ej. de plumaje claro sobrevolando las afueras de Sueca en dirección S. Cita postnupcial tardía (MPB); 17.XI: 2 ej. sobrevolando el port de Catarroja. Cita tardía (SAO)

Villena: Citas extremas el 29.II y el 11.XI (JAG)

Pantà d'Elx: 01.XII: 1 ej. (OAP)

Serra del Mondúber: 21.XI: Cita tardía de 1 ej. cazando en lo alto de la sierra (JML)

2013

Borriol: 27.II: 1 ej. cicleando (LPC)

Desem. riu Millars: 02.III: 1 ej. (GUM)

La Vall d'Uixó: 07.IX: 4 ej. en 3 h. de censo en el control migración postnupcial en la Punta (JBC); 11.X: última cita de 1 ej. en el control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)

Chóvar: 09.III: 5 ej. (ELL)

Requena: 08.III: 2 ej. Primera cita anual; 17.III: 36 ej. Marcado paso prenupcial detectado a lo largo de la mañana en la zona O del término municipal (PRP)

Albufera de València: 04.IV: 7 ej. en apenas 2 h. migrando sobre el tancat de Milia por la tarde y otros 2 ej., también en paso activo hacia el N, por la mañana sobre l'Alter (AAC,FGN)

Canals: 26.II: 1 ej. (JBS)

Gaïanes: 12.III: 2 ej. (ROL)

Pantà d'Elx: 29.XI: 1 ej. (OAP)

Circus aeruginosus**Aguilucho lagunero occidental - Arpellot de marjal - Western Marsh-harrier**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: PE

2012

Vilanova d'Alcolea: 06.VI: 1 h. volando sobre el aeropuerto intentando cazar (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Desert de les Palmes: 26.VIII: 1 ej. Primer migrante en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X; 18.IX: Máximo diario de 24 ej. en 3 h.; 28.X: Últimos 2 ej. migrantes. Total de 299 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB)

Desem. riu Millars: 02.I: 2 ej. 26.VIII: 4 ej. (GUM)

La Vall d'Uixó: 11.IX: 7 ej. (2 m.) en 3 h. en censo paso migratorio (JBC); 02.X: 7 ej. en 3 h. en el censo de migración (JBC)

Marjal d'Almenara: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 02.II: 11 ej. (JBC); 08.X: 27 ej. (JBC,JLB); 15.XII: 18 ej. de ellos 2 m. (1 ad. y 1 subad.). Diez de ellos en zona límite con provincia de Valencia (JBC)

Albufera de València: 10.I: XIII censo invernal de aguilucho lagunero en dormitorio en el P. N. de l'Albufera. Se contabilizan un total de 380 ej. acudiendo a dormitorios localizados en orillas y matas de la laguna y 11 ej. (5 m.) en la bassa de Sant Llorenç. Se trata de una cifra algo superior a la obtenida el año pasado (357 ej.) e inferior a la obtenida en 2010 (405 ej.), donde se obtuvo la cifra más elevada desde el inicio de este censo. Por lo tanto, podemos seguir afirmando que l'Albufera, junto al delta de l'Ebre, es el humedal más importante del litoral mediterráneo español para la invernada de la especie (SVO); 06.IV: 20 ej. en migración activa sobre el tancat de Milia a lo largo de la mañana (AAC); 15.VII: Se confirma la reproducción de al menos 2 par. en matas de vegetación palustre de la laguna. Una logra sacar adelante tres pollos. Existen referencias que describen esta especie como reproductora hasta principios de los años 70 del pasado siglo, periodo a partir del cual parece haberse ausentado como nidificante. Además existen registros históricos antiguos de su presencia como nidificante, al menos hasta finales del s. XIX. Primeros registros de reproducción reciente confirmados para l'Albufera (CMA); 17.VII: 1 par. (h. ad. y m. de 3.^{er} ver.), y posteriormente 1 juv. realizando cortos vuelos tras el macho reclamando continuamente alimento (PVG,CAP,VDA,CMI,MLA,JLR); 27.IX: 46 ej. en arrozales de Sueca y Sollana (BDJ)

Marjal de Pego-Oliva: 14.I: 16 ej. en dormitorio a última hora de la tarde (Censo de aguilucho lagunero en dormitorio) (JML)

Salines de Santa Pola: 02.IX: 1 ej. Primera cita de la migración otoñal (SCR)

El Fondo d'Elx: 12.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 09.II: 14 ej.; 17.X: 14 ej.; 21.XI: 35 ej.; 01.XII: 18 ej. (CMA)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 16.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Desem. riu Millars: 13.I: 1 ej. (MBM); 30.IX: 5 ej.; 27.XII: 1 ej. (GUM)

La Vall d'Uixó: 30.VIII: 11 ej. en 4 h. en el control de la migración postnupcial en la Punta (JBC); 01.X: 7 ej. en 4 h. control migración postnupcial en la Punta de Vall d'Uixó (JBC,JLB)

Marjal d'Almenara: 15.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Marjal dels Moros: 01.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 08.I: 495 ej. (al menos 36 m.) acudiendo a los diferentes dormitorios localizados en el entorno de l'Albufera (matas y orillas de vegetación palustre y enclaves puntuales como la bassa de Sant Llorenç). Se trataría de la cifra más elevada obtenida desde el inicio de este censo invernal coordinado por la SVO (hace 14 años), superando la cifra máxima de los 405 ej. obtenida en el año 2010 (SVO); 26.IX: 35 ej. dispersos y en pequeños grupos en arrozales de Sueca y Cullera (BDJ,JGR); 01.X: 16 ej. (1 m.) en paso hacia el S sobre zonas próximas al Palmar en varias horas de observación (BDJ)

Requena: 14.X: 1 juv. (PRP)

Xeresa: 13.I: 8 ej. en dormitorio (Censo de aguilucho lagunero en dormitorio) (JML)

Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 9 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Villena: 07.IV: 1 ej. (MCR); 02.VI: 1 h. ad. (MRG)

Salines de Santa Pola: 15.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 03.XII: 18 ej. (MFS,AJR)

El Fondo d'Elx: 18.I: 20 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 06.II: 41 ej. censo en el dormitorio, número escaso (SAR,MFS); 29.IV: 3 ej. (SAR); 15.XI: 39 ej. (CMA)

Marjal de Pego-Oliva: 12.I: 18 ej. en dormitorio (Censo de aguilucho lagunero en dormitorio) (JML)

Circus cyaneus**Aguilucho pálido - Arpallot pàl·lid - Hen Harrier**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012**Cálig:** 23.XII: 1 m. ad. en vuelo por un olivar (ELL,JGL)**Peníscola:** 28.XII: 1 inm. (RPB,ALR)**Sant Mateu:** 07.I: 2 m. ad. (ALR,RPB)**Desert de les Palmes:** 03.IX: 1 juv. Primer migrante. Cita muy temprana (MTB,VET); 18.X: 5 ej. en 3 h. de censo. Máximo anual. Muy buen año de paso, con un total de 11 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)**Desem. riu Millars:** 18.II: 1 ej.; 22.IV: 1 ej. (GUM)**Barracas:** 23.I: 1 m. ad. (DBS)**Estivella:** 29.III: 1 ej. (SBA)**Albufera de València:** 11.I: 1 h. ad. cazando en el tancat de Milia (AAC); 25.I: 1 m. ad. cazando en arrozales próximos a Sollana (PVG); 18.IX: 1 m. ad. sobrevolando la Pipa (SEOV); 10.X: 1 ej., aparentemente juv., en la Pipa (JHZ,BDJ); 23.X: 1 h. en la Carderera (JHZ,BDJ); 24.X: 1 h. ad. en el tancat de Milia (AAC); 15.XI: 1 ej. en el marjal de Silla (PMP); 12.XII: 1 m. ad. en el tancat de la Pipa (LMR,MLA)**Requena:** 04.III: 1 m. ad. posible invernante en el llano agrario o ya de paso prenupcial (JAI)**Sierra de Aitana:** 03.III: 1 m. ad. (BOR)**Salines de Santa Pola:** 31.X: 1 h. (AJR)**El Fondo d'Elx:** 02.I: 1 m. (AJR); 16.III: 1 ej. (SAR,AJR); 03.XI: 1 m. y 1 h. (OAP,RLM)**Serra del Mondúber:** 10.X: 1 ej. vuela a baja altura en la cresta de la sierra (JML)**2013****Laguna de Sant Mateu:** 05.I: 1 h. ad. (ALR)**Alcossebre:** 06.III: 1 m. ad. ultima cita prenupcial; 16.XII: 1 m. ad. primera cita invernal (DES)**Illes Columbretes:** Únicas citas anuales de 1 ej. el 13.IV y el 15.IV (LGB)**Desem. riu Millars:** 23.I: 1 ej. (GUM)**Moncofa:** 09.XII: 1 h. ad. volado y cazando paseriformes (JBC)**Marjal d'Almenara:** 04.III: 1 m. (JLB)**Barracas:** 12.III: 1 h. (MGT)**Llíria:** 05.IV: 1 h. (TPA,MCC)**Albufera de València:** 09.I: 1 h. ad. en arrozales próximos al tancat de la Torreta Ampla (PVG); 09.II: 1 ej. (h. o juv.) en zonas de l'Alter de Sollana (GCH); 20.III: 1 m. ad. por la marjalería de Silla (RSH); 20.III: 1 ej. (aparentemente h. ad.) en la punta de Llebeig. Al parecer, este mismo ej. lleva en esta zona varias semanas (DMO); 23.III: 1 ej. (h. o juv.) en la devesa del Saler (JPH); 02.IV: 1 h. en migración sobre el tancat de Milia (AAC,FGN); 26.IX: 1 ej. (h. o juv.) en la Llonga. Primer registro otoñal (JGR,BDJ)**Cullera:** 05.I: 1 ej. un ave aparentemente juv. en los arrozales del Brosquil (MAL,LAA); 06.XII: 1 m. ad., probablemente el mismo observado días atrás, sobrevolando la partida del Peirat (PMP,MPB); 03.II: 1 h. en los campos de arroz en la ribera del Xúquer (ASL,JML)**Requena:** 16.XII: 1 m. sobrevuela a baja altura el herbazal que se ha creado sobre el vertedero clausurado (PRP)**Quatretondeta:** 19.I: 1 m. subad. y 1 m. ad. sobrevolando el municipio (ROL)**El Campello:** 14.IX: 1 ej. (ALL,TZL,EGM)**El Fondo d'Elx:** 18.II: 2 ej. (AJR); 19.X: 1 h.; 21.XII: 1 h. (OAP)

Circus macrourus**Aguilucho papialbo - Arpella pàl·lida russa - Pallid Harrier**

Estatus: Migrante raro procedente del E y el extremo NO de Europa.

2012

Desert de les Palmes: 12.IX: 1 m. ad. en paso hacia el S. Pendiente de homolgar por el CR-SEO (MTB)

2013

Massamagrell: 8.XII: 1 juv. observado desde mediados de noviembre (JMH,GAH)

La cita de Massamagrell está homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017)

Circus pygargus**Aguilucho cenizo - Arpello cendrós - Montagu's Harrier**

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Desert de les Palmes: 23.X: 1 h. ad. última cita anual. Total de 7 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)

Grau de Castelló: 09.VIII: 1 ej. El primer individu detectat a la zona, du anella de PVC (PGR)

Barracas: 26.V: Sin citas. Un año más sin observar ningún aguilucho en la zona de cría debajo de los aerogeneradores ¿abandono definitivo? (JBC)

Albufera de València: 23.IV: 3 h. en migración activa, 2 sobre el tancat de Milia y 1 sobre la devesa (AAC); 15.IX: 2 ej. en paso en arrozales de Sueca (FJG)

Villena: 18.III: 1 m. (MRG); 01.V: 1 h. ad. en vuelo, realiza varios intentos infructuosos de caza en una parcela de cereal (MCR)

Salines de Santa Pola: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 22.III: 4 ej.; 13.VI: 4 ej. (CMA); 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 18 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Titaguas: 08.IX: 5 ej. (m. h. y juv.) (SLB,RGG)

Marjal dels Moros: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 20.III: 1 m. sobrevolando el tancat de la Pipa. Primer registro prenupcial (SEOV)

Godelleta: 19.IV: 1 h. ad. en paso hacia el N. Primera cita prenupcial (PAB)

Salines de Santa Pola: 12.VIII: 4 ej. (MAA)

El Fondo d'Elx: 26.III: 3 ej. (CMA)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Accipiter gentilis**Azor común - Astor - Northern Goshawk**

Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante raro. Conservación: IE

2012

Vilanova d'Alcolea: 11.I: 1 juv. comiendo una presa (JBC,JLB)

Desert de les Palmes: 07.IX: 1 ad. aparentemente migrante. 2 citas más de ej. aparentemente migrantes los días 1 y 3.X y de nuevo 2 juv. (1 m.) los días 22 y 27.X (MTB)

Benicàssim: 01.XII: 1 m. ad. cae en la red de anillamiento mientras perseguía a un verderón en una zona de acebuches y lentiscos. Se cita de nuevo 1 ej. el 08.XII posado en un almendro, no es habitual como invernante (MTB)

Illes Columbretes: 03.IV: 1 ej. (LGB)

Tales: 06.VII: 2 ej. volando por separado en pinar (JBC)

Albufera de València: 03.X: 1 ej. sobrevolando zonas de huerta del Palmar en vuelo hacia el S (JHZ)

Requena: 22.VIII: 1 par. ciclean juntos. Pareja local previamente no conocida (JAI)

Enguera: 24.XI: 1 ej. acosado por 2 cernícalos (ASL,JML)

2013

Vinaròs: 06.X: 1 ej. en 3 h. de observación. Censo postnupcial de rapaces (ELL)

La Vall d'Uixó: 01.X: 1 ej. en 4 h. de censo. Control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)

Chera: 29.XI: 1 ej. en la ribera de la cola del embalse de Buseo en vuelo raso con un zorzal en las garras recién capturado, que chillaba desesperadamente (PRP)

Accipiter nisus

Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk

Estatus: Nidificante e invernante moderado, migrante común. Conservación: IE

2012

Desert de les Palmes: 07.IX: 421 ej. Total en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X; 19.IX: Máximo diario de 35 ej. en 3 h. (MTB)

Illes Columbretes: Citas de 1 ej. los días 2 y 03.IV (LGB)

La Vall d'Uixó: 24.IX: Máximo anual de 53 ej. en 3 h. de censo (JBC)

Albufera de València: 18.IV: 3 ej. en paso hacia el N sobre la devesa (BDJ); 25.IX: 6 ej. en migración activa sobre el tancat de Mília (AAC); 15.XI: 1 ej. en el marjal de Silla (PMP); 08.XII: 1 ej. cazando paseriformes cerca de l'estany del Pujol (JHZ,BDJ)

Utiel: 21.VIII: 1 h. ad. muerta en el cauce hormigonado, probablemente electrocutada (PRP,JAI)

Salines de Santa Pola: 12.XII: 1 ej. (AJR)

2013

La Vall d'Uixó: 13.IX: 6 ej. en 3.5 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC); 09.X: 9 ej. en 4 h. en control de la migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)

Albufera de València: 27.III: 5 ej. dispersos en paso hacia el N con el viento moderado de componente O sobre la devesa (MCH,JID); 30.III: 5 ej. en paso hacia el N sobre la devesa en apenas 1 h. de observación (AAC,BDJ); 09.IV: 7 ej. en paso hacia el N sobre el Dosel (BDJ,EGO); 09.IV: 9 ej. migrando a lo largo de la mañana sobre el tancat de Mília (AAC,FGN)

Requena: 07.X: 3 ej. en paso postnupcial al S (JAI)

Pantà d'Elx: 30.IX: 4 ej. migrando (OAP)

Clot de Galvany: 20.XII: 3 ej. (AJR)

Buteo buteo

Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzard

Estatus: Residente y migrante escaso, invernante moderado. Conservación: IE

2012

Vilanova d'Alcolea: 09.I: 5 ej.; 11.I: 6 ej. (JBC,JLB); 21.XII: 4 ej. (JBC)

Desert de les Palmes: 30.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial. Total de 30 ej. en programa de seguimiento de

la migración postnupcial 24.VIII a 31.X; 28.X: 8 ej. máximo anual (MTB)

Desem. riu Millars: 02.I: 2 ej.; 07.III: 1 ej. (GUM)

Borriana: 27.XII: 5 ej. dispersos por el clot y alrededores (JBC)

La Vall d'Uixó: 19.IX: 5 ej. en 4 h. Censo de migración de aves (JBC,JGS); 10.X: 4 ej. (JGS)

Marjal d'Almenara: 08.II: 3 ej.; 17.XII: 8 ej. distintos repartidos por la marjal (JBC)

Albufera de València: 24.X: 3 ej. en marjales de Alfafar y Massanassa posados en postes eléctricos y telefónicos a lo largo de la carretera (BDJ)

El Fondo d'Elx: 12.I: 4 ej. (CMA); 23.XII: 5 ej. (OAP)

2013

Vinaròs: 09.X: 6 ej. en 3 h. Censo postnupcial de rapaces (ELL)

Sant Jordi: 21.XII: 1 ej. (ELL)

Vilanova d'Alcolea: 05.III: 5 ej. volando cerca del pueblo (SMS)

Desem. riu Millars: 02.III: 4 ej. Vuelos nupciales (GUM)

La Vall d'Uixó: 19.IX: 8 ej. en 4 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC); 09.X: 20 ej. en 4 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)

Albufera de València: 04.I: 13 ej. dispersos en zonas del marjal (BDJ)

Cullera: 06.XII: 6 ej. diferentes en zonas del marjal (PMP,MPB)

El Fondo d'Elx: 16.XII: 11 ej. (CMA)

Buteo rufinus

Busardo moro - Aligot rogenic - Long-legged Buzzard

Estatus: Divagante del N de África y del Sudeste de Europa.

2012

Albufera de València: 16.IX: 1 juv., mostrando rasgos propios de la subespecie oriental *rufinus*, cicleando y tomando altura sobre arrozales próximos al tancat de la Ratlla hasta perderse (PLP,SBE); 25.IX: 1 ad. de la ssp. nominal cicleando y tomando altura sobre el tancat de Milia. Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO (AAC)

La cita del 16 de septiembre ha sido rechazada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Aquila clanga

Águila moteada - Àguila cridanera - Greater Spotted Eagle

Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa

2012

El Fondo d'Elx: 11.II: 2 ej. (MAA); 19.II: 1 ej. presente hasta el 03.III; 20.II: 1 inm. (MQB,COA); 29.II: 1 subad. presente hasta el 10.III; 23.III: 1 ej. (no Tönn) (OAP); 03.III: 1 juv. comiendo una gaviota reidora (RMB); 08.X: 1 ej. (SCR); 16.X: 1 ej. (Tönn) presente hasta el 16.III (AJR); 24.XII: 1 ej. de 1.º inv. (ADQ)

2013

Elx: 04.I: 1 ej. de 1.º inv. visto en la peña de las Águilas a 8 km del Hondo. Muy posiblemente el visto allí el 24.XII (ADQ)

El Fondo d'Elx: 18.I: 3 ej. (CMA); 13.II: 1 ej. (OAP); 14.II: 2 ej. (CMA); 16.II: 1 ej. Se podía observar la antena del radio transmisor, por lo que dedujimos que se trataba de Tönn (JMT,JMG,GMG,AVDH); 19.X: 1 ad.; 30.X: 1 subad.; 11.XI: 1 ej. (Tönn) (OAP); 15.XI: 3 ej. (CMA); 29.XI: 1 ej. de 1.º y 1 de 2.º inv. (AJR,SAR); 16.XII: 3 ej. (CMA); 21.XII: 1 juv., 1 subad. y 1 ad. (OAP)

Especie de presencia cada vez más regular en el sudeste peninsular durante la invernada en los últimos años. Esta especie amenazada parece haber encontrado en el P. N. El Hondo un enclave ideal para establecer un pequeño núcleo invernante en nuestro territorio, llegando a albergar hasta 4 ejemplares distintos en el invierno de 2011-2012 y 2012-2013: Tönn, otro adulto, un subadulto y un 1.º inv.; y nuevamente 4 ejemplares durante el invierno de 2013-2014: Tönn, otro adulto, un 2.º año y un 1.º inv.

Aquila pennata

Aguila calzada - Àguila calçada - Booted Eagle

Estatus: Nidificante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Vinaròs: 11.VIII: 1 ej. de FC ciclea a baja altura (VET)

Atzeneta del Maestrat: 18.VIII: 4 ej. de FC realizando picados (JBC)

Desert de les Palmes: 26.VIII: Primer ej. migrante. Total de 8 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB); 10.IX: 1 ej. en paso hacia el NE. Total de 5 ej. hacia el NE hasta el 18.IX. Al menos 1 ad. (MTB)

Bovalar de Vistabella: 18.VIII: 2 ej. de FO (JBC)

Desem. riu Millars: 02.I: 2 ej. (GUM)

Xilxes: 13.I: 3 ej. de FC (JBC)

Marjal d'Almenara: 02.II: 6 ej. una de FO; 11.IV: 1 ej. de FC (JBC); 08.X: 10 ej. (9 de FC y 1 de FO) (JBC,JLB); 22.XII: 8 ej. Buena concentración. Todas de FC (JBC)

Albufera de València: 02.II: 13 ej. en diferentes grupos cicleando sobre la devesa (EGO,BDJ); 24.IX: 6 ej. (4 de FO) sobrevolando la devesa. Llegada marcada de migrantes (BDJ); 06.III: 12 ej. en migración activa sobre el tancat de Milia, todas en dirección S (AAC)

Cullera: 12.X: 3 ej. de FC en la muntanya de Cullera (JHZ,BDJ); 15.XII: 1 ej. de FC en los arrozales del Brosquill (MAL,LAA)

Clot de Galvany: 08.II: 2 ej. (AJR)

Salines de Santa Pola: 02.X: 5 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 12.I: 22 ej. (CMA); 19.II: 9 ej.; 10.III: 8 ej. (SAR); 19.IV: 1 ej. (SCR); 25.IX: 8 ej. (OAP)

2013

Alcossebre: 13.IV: 1 ad. Única cita anual (DES)

Els Ibarsos: 25.XI: 1 ej. (RPB,ALR)

Les Coves de Vinromà: 13.III: 1 ej. volando por la zona en actitud de caza (SMS)

Benlloch: 12.IV: 1 ej. volant per la zona (SMS)

Borriol: 18.I: 1 ej. FO. Parecía buscar refugio para pasar la noche; 27.XII: 1 ej. de FC vigilante en el extremo de un gran pino (LPC)

Desem. riu Millars: 19.VIII: 1 ej. (GUM); 28.XII: 1 ad. FC (MBM)

La Vall d'Uixó: 23.VIII: 5 ej. (4 FC y 1 FO) en 3 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC); 11.X: 9 ej. (2 de FO) en 4 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)

Marjal d'Almenara: 04.III: 2 ej. de FC (JLB)

València: 28.IX: 58 ej. en paso en 30 min. (JTN); 2 ej. cazando palomas y tórtolas turcas (JGG)

Albufera de València: 22.II: 2 ej. de FC sobrevolando el tancat de la Sardina (JPH); 24.II: 6 ej. aves en la devesa (GCH); 01.X: 14 ej. en paso durante varias horas, cicleando y tomando altura la mayoría de ellas, y desplazándose hacia el O. Presencia marcada que coincide con un día de fuerte viento del SO. Algunos deben corresponderse con los primeros ej. invernantes (BDJ); 28.IX: 20 ej. en paso en unos 20 min. (DMF,BOR,GTR); 21.X: 5 ej. sobrevolando el tancat de Milia (AAC); 05.XI: 11 ej. sobrevolando la devesa aguantando el fuerte viento de poniente (EGO); 05.XII: 7 ej. tomando altura a primeras horas de la tarde

sobre el Racó de l'Olla y la devesa (MCH,JID)

Cullera: 02.XI: 4 ej. (2 de FO) en la falda N de la sierra de les Rabosses (BDJ); 05.XII: 1 ej. de FC cicleando sobre los arrozales del Brosquil (LAA)

Sinarcas: 19.V: 10 ej. (JBS)

El Fondo d'Elx: 18.I: 12 ej.; 16.XII: 9 ej. (CMA)

Aquila chrysaetos

Águila real - Àguila reial - Golden Eagle

Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

2012

Traiguera: 04.VI: 1 juv. (ABC)

Vilanova d'Alcolea: 09.I: 2 ej. cicleando altas sobre el aeropuerto; 02.XI: 1 juv. posada en tendido eléctrico (JBC,JLB)

Desert de les Palmes: 22.IX: 2 ej. Censo de migración de aves (JBC, JLB)

Ludiente: 27.VI: 1 inm. (LPP)

Bicorp: 01.III: 1 subad. sale de unos pinos donde estaba posada, a la media hora se vuelve a ver haciendo un picado (JBS)

Requena: 03.VIII: 1 juv. volandero en el Cinto de los Vencejos (RMB)

Monòver: 16.X: 1 par. planeando por zona de cultivos vistas durante los años siguientes por los mismos lugares (VGC)

El Fondó de les Neus: 29.I: 2 ej. (SCR)

Salines de Santa Pola: 26.I: 1 ej. (SCR)

2013

Morella: 03.VI: 1 subad. volant per la zona (SMS)

Alborache: 14.IX: 1 juv. (VBJ)

Chera: 17.IX: 1 juv. del año vuela a baja altura llevando un palo en las garras, que deja caer y se lanza a por él con un rapidísimo quiebro, antes de que llegue al suelo. Lo repite con éxito en tres ocasiones, y a la cuarta falla al atraparlo y le cae. Entonces, toma algo de altura y hace una pasada sobre una encina, arrancando con las garras una pequeña rama. Finalmente es expulsado por un adulto de águila perdicera que ha acudido en veloz vuelo al detectarlo (PRP)

Aquila fasciata

Águila perdicera - Àguila de panxa blanca - Bonelli's Eagle

Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

2012

Traiguera: 03.IX: 2 ej. (ABC)

Xert: 19.X: 2 ej. (ABC)

La Llosa: 20.VII: 1 juv. (JBC)

Almenara: 27.II: 1 inm. (JGM)

Emb. d'Arenós: 10.III: 1 subad. (JBC)

Altura: 31.III: 1 ad. (JBC)

Albufera de València: 25.III: 1 ad. sobrevolando el tancat de la Pipa a mediodía junto con un águila calzada y un aguilucho lagunero (SEOV); 03.X: 1 ej. de 1.º año posado en la zona del saladar del Racó de l'Olla. (JID,GGA,MCH,IRU), observado también el día 04.X (JID,MCH) y el 05.X (MCH,IRU,GGA). Nueva cita de 1 ej. de 1.º inv., acosado por 2 ratoneros mientras ciclea sobre la zona de la bassa de Sant Llorenç y el

Cabeçol. Por las características del plumaje podría ser un ave distinta (MPB)

El Fondo d'Elx: 14.XII: 1 subad. (OAP)

Sierra de Escalona: 20.XI: 1 juv. (SCR)

2013

Vinaròs: 18.V: 1 ad. cazando por la zona Soterranyes baixes. Se mantiene en la zona varios minutos y luego vuela al S (ELL,AMS,JAM,AGC)

La Vall d'Uixó: 07.IX: 1 juv. observado en el control de la migración postnupcial en la Punta (JBC)

Requena: Seguimiento de 13 territorios ocupados en la comarca de Requena-Utiel e inmediaciones. Parámetros reproductores: Nº de parejas que se reproducen = 3; Productividad = 0.31; Éxito reproductor = 0.67; Tasa de vuelo = 1.33. Las bajas tasas reproductivas se explican por el alto número de amenazas que afectan a esta población y que condicionan su viabilidad futura (PRP, JAI)

El Fondo d'Elx: 27.XI: 1 inm. le dan pasadas 4 laguneros y 2 calzadas (SAR)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.IX: 1 ej. (SAR)

Aquila adalberti

Águila imperial ibérica - Águila imperial - Spanish Imperial Eagle

Estatus: Visitante raro del interior de la península Ibérica. Conservación: PE

2013

Villena: 01.VI: 1 ej de 2º año calendario (AAC)

Tercera cita para la CV tras los ejemplares observados en Ares (Castellón) en 2008 y en la sierra de Escalona (Alicante) en 2010.

PANDIONIDAE

Pandion haliaetus

Águila pescadora - Águila pescadora - Osprey

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: PE

2012

Desert de les Palmes: 04.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 14 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)

Marjal de Xilxes: 10.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Marjal d'Almenara: 16.III: 1 ej. con un gran pez en las garras (JCS)

Albufera de València: 27.III: 3 ej. migrando sobre el tancat de Milia. Una de ellas hace varios intentos de pesca y descansa por unos instantes en una de las torres de la reserva; 09.IV: 3 ej. en el tancat de Milia y alrededores; 22.V: 1 ej. un ave en migración activa sobre el tancat de Milia. Cita algo tardía (AAC); 26.V: 1 ej. tomando altura sobre la devesa portando un mujol de gran tamaño en sus garras. Observación prenupcial tardía (ADV); 13.IX: 4 ej. posados en postes de alta tensión entre la Ratlla y la Llonga (BDJ); 04.X: 5 ej. en arrozales de Sueca (BDJ,EGO); 08.X: 4 ej., posiblemente 5, en la replaza de Zacarés y zonas adyacentes. 1 juv. con anilla alemana, ya observado anteriormente, continua en la zona; 26.X: Mínimo de 2 ej. en la orilla SO del lago (AAC)

Salines de Santa Pola: 14.IX: 3 ej. (OAP); 14.XII: 1 ej. (SAR,OAP)

El Fondo d'Elx: Censo destacado de 3 ej. el 09.II; En postnupcial censos destacados de 4 ej. el 17.IX y de 5 ej. el 17.X; y 4 ej. el 01.XII (CMA)

Emb. de La Pedrera: 13.VI: 2 ej. (AJR)

2013

Vinaròs: 27.IV: 1 ej. cerca de la desembocadura del bco. de Aiguaoliva. El ave hace un intento de pesca lanzándose en picado, y tras fracasar y dar un par de vueltas más, se dirige al N (JMD)

Alcossebre: 08.IV: 2 ad. al NE. Última cita prenupcial (DES)

Desem. riu Millars: 17.X: 1 ej. sedimentado por varios días (GUM)

Albufera de València: 07.I: 1 ej. sobrevolando el tancat de Càbiles (JID,MCH,IRU,GGA); 03.IV: 3 ej. (2 en migración activa y 1 pescando) en el tancat de Milia (AAC,FGN); 27.VIII: 2 ej. juntos volando hacia el S a baja altura sobre la devesa al amanecer. Primera observación postnupcial. Uno de los ej. emite una llamada con regularidad (MCH,JID,IRU,GGA); 31.VIII: 3 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 20.IX: 4 ej. en migración activa (3 juntas) y otras 2 que parecen sedimentadas en la zona en el tancat de Milia (AAC,FGN); 30.IX: 6 ej. posados en postes de alta tensión a lo largo de todo el perímetro de la laguna (JGR,BDJ); 01.X: 3 ej. volando y pescando sobre el tancat de Milia (AAC,FGN); 05.X: 2 ej. el tancat de la Ratlla (JPH)

Salines de Santa Pola: 03.I: 3 ej.; 23.XII: 3 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 18.I: 4 ej. (CMA); 18.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (JLEC,MFS); 21.V: 4 ej. (CMA); 21.XII: 3 ej. invernantes en el humedal (JAI)

Marjal de Pego-Oliva: 21.XI: 1 ej. comiendo en lo alto de una torreta de la línea eléctrica que atraviesa el parque natural (JML)

FALCONIFORMES**FALCONIDAE*****Falco naumanni*****Cernícalo primilla - Xoriguer petit - Lesser Kestrel**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Conservación: PE

2012

Desert de les Palmes: 22.IX: 1 ej. (h. o juv.) única cita anual (MTB)

Albufera de València: 24.IX: 2 ej. (h. o juv.) en paso hacia el S sobre la Ratlla (BDJ); 25.IX: 1 m. inm. posado en el primer cordón de dunas en la playa de la Malladeta cazando insectos. Otros 6 cernícalos pudieron ser vistos pasando hacia el S con el viento de poniente en 0.5 h. de observación pero no pudieron ser identificados con seguridad (JID,MCH,IRU,GGA); 25.IX: 22 ej. probablemente más, ya que se observan otros 32 cernícalos indeterminados y vulgares en migración activa hacia el SO sobre el tancat de Milia. La mayor parte de las aves migrando en pequeños grupos de entre 3 y 6 ej. Solo se observan 3 m. (CAV,AAC)

Villena: 06.IV: 16 ej. en 2 grupos, uno de 6 y otro de 10 volando en distintos puntos de la Cañada de Almela (MCR); 06.VII: 25 ej. volando en el entorno del embalse de San Diego (MCR)

2013

Albufera de València: 28.III: 1 m. posado en campos recién labrados en arrozales cercanos al tancat de Milia (AAC,FGN); 04.IV: 1 h. en paso activo hacia el N sobre las dunas (BDJ); 29.IX: 2 ej. (h. o juv.) en paso hacia el S sobre la Ratlla (BDJ); 01.X: 3 ej. (1 m.) cazando insectos sobre campos de arroz cercanos al tancat de Milia (AAC,FGN); 03.X: 1 m. en arrozales del Bony (PVG,RGR)

Villena: 04.V: 22 ej. posándose en una casa cercana al cabezo Cantalar, tanto m. como h. (MCR); 01.VI: 14 ej. en dos núcleos diferentes en los alrededores de sendas casas (AAC); 15.VIII: 15 ej. en una parcela con cultivos de regadío junto a 4 carracas posados en los aspersores de riego (MCR)

Falco tinnunculus**Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel**

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE

2012

Desert de les Palmes: 10.X: Máximo anual de 35 ej. en 3 h. de censo; última cita anual de 7 ej. migrantes el 26.X. Total de 169 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)

Desem. riu Millars: 12.XII: 6 ej. (JBC)

La Vall d'Uixó: 24.IX: Máximo anual de 23 ej. en 4 h. en censo de migración de aves (JBC)

Marjal d'Almenara: 02.II: 6 ej. (JBC)

Marjal de Sagunt: 15.XII: 15 ej. en Quartell (JBC)

El Fondo d'Elx: 03.XI: 11 ej. se alimentan juntos capturando insectos al vuelo (OAP,RLM)

Bovalar de Vistabella: 18.VIII: 8 ej. (JBC)

2013

Vinaròs: 09.X: 4 ej. en 3 h. Censo postnupcial de rapaces (ELL)

La Vall d'Uixó: Censos destacados durante el censo postnupcial de rapaces desde la Punta de 15 ej. el 19.IX; 28 ej. el 01.X; 21 el 09.X y de 18 ej. el 11.X. Todos los censos en 4 h. (JBC,JLB)

Requena: 07.X: 10 ej. en paso postnupcial al S en distintos grupitos (JAI)

El Fondo d'Elx: 09.XI: 10 ej. se alimentan juntos de insectos en vuelo (OAP)

Serra de la Carrasca: 29.VII: 10 ej. en vuelo en lo alto de la montaña (JML)

Falco vespertinus**Cernícalo patirrojo - Falco cama-roig - Red-footed Falcon**

Estatus: Migrante raro del E de Europa. Conservación: IE

2012

Pinedo: 18.IV: 1 h. aparentemente ad. en zonas de huerta. Primer registro prenupcial (BDJ,AAC,CAV)

Albufera de València: 28.IV: 1 m. volando hacia el mar sobre la devesa poco antes de la llegada del frente de lluvias de esa tarde (JID,BDJ)

2013

Marjal dels Moros: 30.IV: 1 ej. (CAZ,VDA)

Llíria: 26.IV: 1 ej. (PPA,VMV)

Godella: 28.IV: 1 h. (GLL)

Albufera de València: 30.IV: 1 ej. con aspecto de h. tomando altura sobre la mata del Fang y alejándose hacia el NO. Primera observación anual (MCH,JID); 03.V: 1 ej. con aspecto de h. cazando en zonas de huerta y después volando hacia el N (BDJ); 17.V: 1 m. (2º año calendario) en paso hacia el N sobre zonas de huerta de El Palmar (BDJ); 11.VI: 1 m. ad. observado en la devesa. Posteriormente vuelve a observarse cerca de Pinedo. Cita tardía (AAC,FGN)

Cullera: 18.V: 1 m. realizando vuelos de caza en los arrozales del Brosquill (MMG,LAA)

Quatretonda: 28.IV: 1 subad. (PLP)

Falco columbarius**Esmerejón - Esmerla - Merlin**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Cervera del Maestre: 25.II: 1 ad. posado en una carrasca (ELL)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 1 h. en parcela roturada entre limícolas. Cita tardía (VET)

Desert de les Palmes: 02.IX: 1 h. Única cita anual muy temprana en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (VET,MTB)

Marjal dels Moros: 21.I: 1 ej. (SBA,JES)

Albufera de València: 17.I: 1 ej. (h. o inm.) en el tancat de Milia (AAC); 25.I: 1 ej. (h. o inm.) en arrozales del tancat de l'Estell (JID,MCH,IRU,JVM); 27.III: 1 h. a primera horas de la mañana en el tancat de Milia (AAC); 21.V: 1 m. en el tancat de la Pipa alimentándose de una presa en un herbazal (BFM,RGR,PVG); 25.IX: 1 ej. intentando capturar hirundínidos al amanecer en el tancat de Milia (CAV,AAC); 06.XI: 1 ej., aparentemente h. ad., cazando paseriformes en el Malvinaret (BDJ); 09.XII: 1 ej. cerca del muntanyeta dels Sants (CAZ); 14.XII: 1 ej. en arrozales de la Partideta (MPB)

Camporrobles: 27.X: 1 ej. en paso al S (JAI)

Cullera: 18.II: 1 m. en los arrozales del Brosquil (MAL,LAA); 19.XII: 1 m. posado en un lindero del arrozal. Hace unas semanas, ya se observó en un lugar próximo (JML,ASL)

Villena: 17.III: 1 ej. en vuelo (MCR)

El Fondo d'Elx: 15.I: 1 ej.; 19.X: 2 ej. (AJR); 28.XII: 2 ej. (TMF,TZL,LHE)

2013

Albocàsser: 21.I: 1 ej. (ALR)

Alcossebre: 21.XII: 1 ad. (DES)

Albufera de València: 17.II: 1 ej. en arrozales próximos al tancat de la Ratlla (GCH); 06.IV: 1 ej., aparentemente h., en l'Ale (GCH); 07.IV: 1 m. en el tancat de la Ratlla cazando paseriformes (BDJ); 30.IX: 1 h. en el Pinedo (BDJ,JGR); 01.X: 2 ej. en paso hacia el S sobre zonas próximas al Palmar (BDJ); 09.X: 1 m. sobrevolando al atardecer el tancat de la Ratlla (JPH,GCH)

Chera: 28.XI: 1 ej. posado en poste de teléfono, en zona de ecotono forestal-pastizal abierto (PRP)

Cullera: 06.XII: 1 ej. (h. o juv.) en el Peirat (PMP,MPB)

El Fondo d'Elx: 02.II: 1 ej. (OAP); 06.III: 1 h. (AJR); 11.X: 1 ej. (SAR,AJR); 20.XII: 1 ej. (AJR)

Falco subbuteo

Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: IE

2012

Desert de les Palmes: 24.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 17.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 52 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)

Vila-real: 25.VIII: 1 ej. vuelo bajo al S (JBC)

Albufera de València: 21.V: 2 ej. sobre la devesa en paso hacia el N (BDJ)

Villena: 13.VII: 1 ej. cazando libélulas al anochecer sobre un embalse de riego (MCR,ASN)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: 2 ej. en vol baix cap al NE (VET)

Vila-real: 16.V: 1 ej. en día de tormenta volando al N dificultosamente sobre los edificios del pueblo (JBC)

La Vall d'Uixó: 11.X: 9 ej. en 4 h. Control migración postnupcial en la Punta de Vall d'Uixó (JBC,JLB)

Marjal dels Moros: 29.IV: 15 ej. (VPA)

Albufera de València: 16.IV: 3 ej. en migración sobre el tancat de Milia (AAC,FGN); 16.V: 1 ej. junto con numerosos vencejos volando sobre el Racó de l'Olla (MCH, JID, IRU, GGA)

Pantà d'Elx: 30.IX: 7 ej. migrando; 16.X: 2 ej. capturando libélulas (OAP)

Falco eleonora**Halcón de Eleonora - Falcó de la reina - Eleonora's Falcon**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante escaso. Conservación: VUL

2012

Desert de les Palmes: 13.VIII: 1 ej. de FC mudando primarias sedimentado en las agujas de Santa Águeda (VET); 18.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 18 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X. Probablemente varios ej. sedimentados en la zona durante este periodo que se ven en repetidas ocasiones. Se observan tanto ad. como inm. (MTB,VET)

Illes Columbretes: 54 par. nidificantes. Informe sobre seguimiento del halcón de Eleonor en la Comunidad Valenciana (CMA)

Onda: 03.VI: 1 ej. de FC volando y capturando un ave en vuelo, después desaparece hacia en N (JBC)

Borriana: 08.VI: 1 ej. de FO. Volando a media altura y aleteando hacia en N (JBC)

Canet d'en Berenguer: 15.VIII: 1 ej. de FO sobrevolando la costa (JAI)

Albufera de València: 10.VI: 1 ej. de FO sobre la devesa y los arrozales de l'Alcatí volando hacia el N con viento de poniente (JID,MRG,MOT,JID); 07.IX: 1 ej., aparentemente ad. de FC, cazando paseriformes en zonas de hurta del Borronar (BDJ)

La Vila Joiosa: 27.VI: 1 ad. (MLP)

Villena: 28.VI: 1 ej. (MRG,RLM,VUR,JMG,UME,OAP); 29.VI: 3 ej.; 01.VII: 5 ej. (MRG)

Elx: 23.IX: 2 ej. volando en el mar (SCR)

El Fondo d'Elx: 09.IX: 1 ej. (SAR)

2013

Alcossebre: 30.IV: 1 ad. (DES)

Illes Columbretes: 56 par. nidificantes. Informe sobre seguimiento del halcón de Eleonor en la Comunidad Valenciana (CMA)

La Pobla Tornesa: 17.VI: 1 ej. de FO volando a baja altura sobre pinar cercano a la población (JBC); 27.VI: 29 ej. al anochecer. Se alimentan de insectos en el aire (JMI); 21.VII: 7 ej. volant al capvespre. Tal volta més exemplars, vistos des de l'autovia (VET)

La Vall d'Uixó: Citas de 1 ej. el 05.IX y el 13.IX, ambos de FO. Control migración postnupcial en la Punta (JBC)

Albufera de València: 08.VII: 1 ej. sobrevolando el Racó de l'Olla sin rumbo fijo (JID,GGA); 07.VIII: 1 ej. de FC sobrevolando l'estany del Pujol (VLG,MGI); 03.IX: 1 ej. de FC tomando altura sobre el Racó de l'Olla (MCH,JID)

Cortes de Pallás: 26.VI: 1 ej. de FC cicleando desde baja altura. Hace un picado hacia un vencejo común y fracasa (PRP)

Xeraco: 27.VII: 4 ej. (VBJ)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 28.VII: 1 ej. entrando desde el mar capturando libélulas junto a varias gaviotas reidoras y pagazas piconegras. Minutos más tarde, a mucha altura, se observaban 4 falconiformes que probablemente fueran también halcones de Eleonora (VBJ)

Villena: 02.VI: 1 ej.; 27.VI: 1 ej. (MRG)

Falco peregrinus**Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon**

Estatus: Residente moderado, migrante raro. Conservación: VUL

2012

Illes Columbretes: Citas prenupciales de 1 ej. el 01.III y el 27.IV y de 2 ej. el 04.III; Cita estival de 1 ej. el 06.VII y última cita anual de 1 ej. el 22.X (LGB)

Desem. riu Millars: 31.XII: 1 ej. amb vol lent riu avall (MBM)

Albufera de València: 21.I: 1 ej. intentando cazar un chorlito dorado en la Socarrada (SEOA); 11.III: 1 ej. en la Pipa (CAZ,VDA,PVG); 16.III: 1 juv. intentando capturar cercetas comunes en el tancat de Milia (AAC); 09.VIII: 1 h. juv. sobrevolando a baja altura el tancat de Milia (CAV,AAC); 12.X: 1 ej. en la Socarrada posado en una torre de alta tensión (JHZ,BDJ); 04.XII: 1 juv. intentando cazar sobre el saladar del Racó de l'Olla (MCH,JID,GGA,IRU); 18.XII: 1 juv. realizando lances de caza en el tancat de Milia (AAC,FGN)

Cullera: 17.XI: 1 ej. en arrozales del Brosquill (JRA)

Requena: 30.XII: 1 m. ad. invernante en la vega del rio Magro (JAI)

Salines de Santa Pola: 11.XII: 1 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 17.X: 2 ej. (CMA)

2013

Illes Columbretes: 15.II: 2 ej. (LGB)

Castelló de la Plana: 20.XII: 1 ej. cazando en el paseo Ribalta (RPB)

Desem. riu Millars: 08.XII: 1 ej. vist a diari des de el 30.XI (GUM)

Marjal d'Almenara: 04.III: 1 ej. (JLB)

Albufera de València: 09.I: 1 ej. (h. o juv.) acosando a palomas bravías en arrozales de Massanassa (PVG); 20.I: 1 ej., aparentemente h. ad., en el tancat de la Ratlla (GCH); 25.I: 1 ej., aparentemente h., en el entorno del puerto de Catarroja (PVG); 26.IV: 1 ad. a la altura de Pinedo y 1 juv. en las inmediaciones de la muntanyeta dels Sants (AAC,FGN); 26.IX: 1 juv. realizando lances de caza en el tancat de Milia (AAC,FGN); 01.XII: 1 ej. en la devesa (ASD); 14.XII: 1 ej. en el vedat nou de Sueca (DMF,JSU,BOR,MNY)

Cap de Cullera: 09.XI: 1 ej. con un paseriforme entre las garras entrando desde el mar hacia la serra de les Rabosses. (MAL,LAA)

Cullera: 29.I: 1 ej. en la partida de Xafarines (MPB)

Pantà d'Elx: 21.VII: 2 ej. persiguiendo hirundínidos (OAP)

Salines de Santa Pola: 23.XII: 1 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 05.I: 1 ej. (AJR); 26.III: 2 ej. (CMA); 30.XI: 2 ej. (OAP)

GRUIFORMES

GRUIDAE

Grus grus

Grulla común - Grua - Common Crane

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012

Morella: 04.XI: 50 ej. volando al S (JBC)

Borriol: 01.XI: Bando de 59 ej. que se reorganiza con trompeteo y se dirigen al S (LPC)

Les Alqueries: 29.X: 13 ej. volando al amanecer hacia el SO (JCS)

Marjal d'Almenara: 01.XI: 58 ej. sin dirección determinada huyendo de los disparos de cazadores (JCS)

Villahermosa del Río: 28.X: 70 ej. migrando hacia en SE (JLB)

Tuéjar: 29.XI: 10 ej. (CAV)

Torrent: 01.XI: 31 ej. (CAZ)

Albal: 29.X: 70 ej. en dirección O sobre la población (JBE)

Albufera de València: 20.II: 12 ej. sobrevolando el tancat de Milia a primeras horas de la mañana; 28.II: 22 ej. volando sobre el tancat de Zacarés dirección NE (AAC); 23.II: 21 ej. volando hacia el N sobre la devesa

(COM,MCH,IRU,JID); 28.II: 26 ej. tomando altura sobre el tancat de Baldoví (LMA); 14.III: 19 ej. en migración activa a escasa altura en sentido N (MLA,PVG,NRA); 01.XII: 50 ej. sobrevolando el casco urbano de Catarroja (JVM); 29.X: 292 ej. en migración activa en diferentes bandos a lo largo del día. Llegada patente de aves coincidiendo con avistamientos por diferentes puntos de la CV de bandos migradores; 30.X: 10 ej. en vuelo sobre el Mallorquín (JHE); 02.XI: 22 ej. volando en dirección NO (AAC); 10.XI: 45 ej. al amanecer tomando el vuelo desde un arrozal en Sueca (MPB); 10.XI: 14 ej. en l'ullal de Baldoví (CAZ); 30.XI: 32 ej. volando en dirección NO (JPH)

Requena: 28.X: 70 ej. en dirección NO en día con temporal generalizado en la península Ibérica y nevadas en Francia y centro de la península. Otro bando de 11 ej. el mismo día (JAI)

Buñol: 01.XI: 20 ej. (VBJ)

Cullera: 11.II: 15 ej. presentes en los arrozales del Brosquil (LAA); 15.XI: 57 ej. (5 juv.) (JGR,BDJ)

El Fondo d'Elx: 10.II: 22 ej. (AJR); 31.X: 12 ej. (SAR); 24.XI: 14 ej. (OAP,RLM); 15.XII: 40 ej. (SAR); 21.XII: 28 ej. (OAP)

Dolores: 25.XII: 21 ej. en cultivos cercanos al pueblo (OAP)

2013

Alcossebre: 16.III: 360 ej. Máximo histórico en la zona (DES)

Les Alqueríes: 29.I: 60 ej. volando en distintos grupos hacia el N (JCS)

Marjal dels Moros: 03.XI: 11 ej. volando hacia el SO (JPH); 15.XII: 11 ej. volando hacia el SO (JPH,SOR)

Casinos: 05.XI: 10 ej. volando sobre la población (SLB)

Llíria: 24.I: 50 ej. volando al atardecer con viento fuerte del NO (PPA)

Albufera de València: 09.IV: 1 ad. sobrevolando el tancat de Milia a baja altura. Cita tardía (AAC,FGN); 09.XI: 67 ej. en dos grupos, uno posado en zonas inundadas del vedat de Sueca y el otro en vuelo (DMF); 16.XI: 39 ej. (al menos 5 juv.) en arrozales encharcados de las zonas altas del Cavall (BDJ); 27.XI: 12 ej. (1 juv.) en zonas altas de la partida del Cavall (EGO,BDJ); 27.XI: 36 ej. en campos con rastrojos (PVG,SEO)

Bellús: 02.XI: 18 ej. (15 ad. y 3 juv.) (BOR,DMF)

Emb. de Bellús: 02.XI: 18 ej. (BOR,DMF)

El Fondo d'Elx: 15.I: 59 ej.; 07.II: 50 ej. (AJR); 22.III: 4 ej. (SAR); 29.XI: 15 ej. (AJR,SAR); 07.XII: 66 ej. (OAP)

Hondo de Amorós: 15.II: 44 ej.; 23.XII: 23 ej. (AJR)

RALLIDAE

Rallus aquaticus

Rascón europeo - Rascló - Water Rail

Estatus: Residente escaso localizado. Conservación: EP

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	37	23	52	12
Marjal de Almenara	14	2	-	-
Marjal dels Moros	27	15	50	12
Albufera de Valencia	8	+	10	15
Marjal de Xeresa-Xeraco	5	3	10	5
Clot de Galvany	0	32	-	-
Salinas de Santa Pola	17	12	11	2
El Fondo	78	9	53	11
Hondo de Amorós	6	1	-	2

Censos de rascón en la Comunidad Valenciana. Se indican localidades con al menos 5 par. nidificantes. Se ha detectado como nidificante en 10 de 33 humedales censados para un total de 195 (2012) y 190 (2013) parejas nidificantes. - Censo no disponible. + No cuantificado. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Porzana porzana**Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crake**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012**Marjal d'Almenara:** 16.III: 1 ej. (JCS)**Marjal dels Moros:** 11.III: 2 ej. presentes hasta el 16.III, el 17.III tan solo 1 ej. (GLL)**Alboraya:** 04.III: 1 ej. (CAZ)

Albufera de València: 17.II: 5 ej. en apenas 100 m. alimentándose en campo recién fangueado en el tancat de Malta. 4 ej. hasta el día siguiente (VPA,FLL,AAC); 22.II: 2 ej. en el tancat de Milia. Llegada notable de aves el día 23.II con 7 ej., aumentando a 10 ej. el 26.II. Este es uno de los registros simultáneos más numerosos de los registrados hasta la fecha en l'Albufera. Siguen 7 ej. el día 01.III. El día 02.III una de las aves presentes es capturada y devorada por un águila calzada (AAC); 15.III: 1 ej. en el tancat de la Pipa presente hasta el 01.IV (LMR,MGAR,PVG); 27.III: 2 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC); 29.III: 1 ad. capturado para anillamiento científico (GTR); 02.IV: 2 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 08.IV: 1 ej. en l'ullal de Baldoví (BDJ); 16.IV: 1 ej. en el tancat de Milia. Se trata de un ejemplar anillado hace más de una semana en la reserva. Nuevamente se observan 2 ej. anillados el 23.IV, por lo que parece tratarse de las aves anilladas hace ya semanas en la reserva (AAC) y de nuevo 1 ej. con anilla el 01.V. Presencia prolongada de este ej., que como mínimo permanece en la zona tres semanas (IBR,AAC)

Cullera: 25.II: 1 ej. presente hasta el día siguiente (LAA)**Marjal de Pego-Oliva:** 16.II: 1 ej. (SCR)**Altea:** 01.III: 3 ej. presentes hasta el 19.III (JMF); 05.IV: 2 ad. (CPF)**Monòver:** 23.IV: 2 ej. (VGC)**Clot de Galvany:** 28.III: 1 ej. (AJR)**2013**

Albufera de València: Citas prenupciales de 1 ej. en el tancat de Milia los días 28.II y 14.III (AAC,FGN); 05.IV: 1 ej. en el Racó de l'Olla presente hasta el 10.IV (JID,MCH,IRU); Citas de 1 ej. en el tancat de la Pipa los días 04.V (PVG) y 06.V (MLA,PVG); 28.IX: 1 ej. en el tancat de Milia (JGOM,UFU,VLO); 19.X: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)

El Fondo d'Elx: 15.XI: 1 ej. (CMA)

2012 se posiciona como un año excepcional en cuanto a observaciones de esta especie a lo largo de los humedales de la CV, tanto en número de contactos, como en concentración de individuos. Llegando a contabilizarse hasta 10 ejemplares en los marjales de Sollana. Todos los contactos recibidos en 2012 entran dentro del periodo de migración prenupcial, donde suelen realizarse la mayoría de avistamientos. Destacan 3 citas durante la migración postnupcial en 2013 en los marjales de Sollana y en el P. N. del Hondo de Elche.

Porzana parva**Polluela bastarda - Picardó - Little Crake**

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012**Marjal dels Moros:** 16.III: 1 m. (GLL)

Albufera de València: 31.III: 1 ej. en el tancat de Milia, primera cita anual (GTR); 01.IV: 2 ej. (m. y h.) en el tancat de la Pipa (GLL); Citas prenupciales en el tancat de Milia de 1 m. el 06.IV y de 1 h. el 09.IV (AAC); 01.VI: 1 h. observada alimentándose entre carrizo. Cita prenupcial tardía (PVG); 18.IX: 1 h. en el tancat de

Milia. Las citas postnupciales de polluelas suelen ser bastante escasas en nuestra zona (AAC)

Altea: Citas en el río Algar de 1 ej. el 31.III (TMF,GMG) y de 3 ej. el 20.IV presentes toda la semana (TMF,JMF)

2013

Albufera de València: 03.IV: 1 h. primera cita prenupcial. Presente hasta el 10.IV (AAC,FGN); 29.VIII: 1 ej. en el tancat de la Pípa (PVG,LMR)

Al igual que para la polluela pintoja, 2012 se posiciona como un buen año de observaciones de esta especie. Destaca el río Algar, conocido como uno de los mejores lugares de Alicante para la observación de esta especie, y las citas postnupciales, siempre escasas, recogidas ambos años en la provincia de Valencia.

Porzana pusilla

Polluela chica - Picardonet - Baillon's Crake

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012

Marjal dels Moros: 15.III: 1 m. ad. (GLL)

Albufera de València: 03.V: 1 ej. alimentándose en herbazales en el tancat de Milia (CAV,AAC); 12.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia (GTR)

Gallinula chloropus

Gallineta común - Polla d'aigua - Moorhen

Estatus: Residente nidificante común, migrante e invernante común. Conservación: EC

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	-	103	-	15
Desembocadura del Millars	21	68	21	30
Marjal de Almenara	150	554	190	110
Marjal dels Moros	150	200	25	-
Cauce nuevo del río Turia	15	16	27	-
Barranc del Carraixet	23	127	12	64
Albufera de Valencia	+	+	+	+
Marjal de Xeresa-Xeraco	300	183	200	200
Marjal de Pego-Oliva	48	23	46	56
Salinas de Santa Pola	154	278	58	418
El Fondo	411	283	314	456
Hondo de Amorós	35	31	3	21
Embalse d'Elx	25	16	6	2
Desem. río Segura	25	59	5	19

Censos de gallineta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades en las que nidificaron más de 20 parejas o con más de 50 ej. invernantes. La especie se ha detectado como nidificante en un total de 24 de un total de 33 humedales censados. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. + no cuantificadas. - censo incompleto o no realizado

Porphyrio porphyrio**Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen**

Estatus: Nidificante escaso localizado. Conservación: PE

2012

Albufera de València: 05.II: 1 juv. de aproximadamente un mes de vida junto con un ad. en el tancat de la Pipa. Cita reproductora invernal (PVG,SEL); 21.XI: Grupos destacados de 48 ej. alimentándose en zonas inundadas del tancat de la torreta Estreta y de 56 ej. en el tancat de Zacarés (MAB,BDJ); concentración destacada de 48 ej. en la marjal de Sueca (JHZ,BDJ)

2012 y 2013 han supuesto un gran empujón a la nidificación del calamón en los humedales de la provincia de Alicante, pasando de las apenas 19 par. en 2009 a las 101 par. en 2012 y 2013. Continúa la expansión de la especie a lo largo de los humedales de la provincia, donde aparecen nuevas localizaciones de cría fuera de los grandes parques naturales como el Hondo o Santa Pola. Destaca la reproducción plenamente invernal en el tancat de la Pipa y Catarroja en 2012.

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	12	17	12	14
Marjal de Almenara	25	18	25	27
Marjal dels Moros	29	21	42	14
Albufera de Valencia	82	+	82	109
Marjal de Xeresa-Xeraco	15	13	15	7
Salinas de Santa Pola	10	4	12	7
El Fondo	84	2	79	8

Censos de calamón común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades en las que nidificaron más de 10 parejas. La especie se ha detectado como nidificante en un total de 15 (2012) y 16 (2013) de un total de 33 humedales censados para un total de 283 y 289 par. nidificantes respectivamente. En primavera se ha detectado en la misma cantidad de humedales y los totales han ascendido a 101 y 213 ej. respectivamente. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. + no cuantificadas.

Fulica atra**Focha común - Fotja - Common Coot**

Estatus: Nidificante localizado, migrante e invernante común. Conservación: EC

2012

Albufera de València: 14.III: 636 ej. concentración destacada en diferentes grupos (BDJ)

Requena: 21.I: 20 ej. máx. numérico invernal (JAI)

El Fondo d'Elx: Concentraciones destacadas de 2.931 ej. el 09.II y de 2.837 ej. el 17.X (CMA)

2013

Marjal d'Almenara: 04.III: 618 ej. (JLB)

Albufera de València: 05.VI: 1 par. acompañada de 5 pollos recién eclosionados en el tancat de Milia. Primeros pollos nacidos en la reserva. Cita muy tardía de nacimiento de los primeros pollos (AAC,FGN)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	33	527	43	528
Desembocadura del Millars	29	76	29	40
Marjal de Almenara	22	623	50	127
Marjal dels Moros	65	186	75	35
Albufera de Valencia	12	631	19	373
Embalse de Tous	-	63	-	186
Marjal de Xeresa-Xeraco	35	63	40	57
Salinas de Santa Pola	52	2475	39	1102
El Fondo	160	1467	92	2169
Hondo de Amorós	10	231	0	34
Embalse de la Pedrera	4	257	6	0
Embalse d'Elx	26	133	16	174

Censos de focha común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades en las que nidificaron más de 25 parejas y con más de 150 ej. invernantes. La especie se ha detectado como nidificante en un total de 22 localidades en 2012 y 21 en 2013 de un total de 33 humedales censados, con un total de 563 par. en 2012 y de 506 par. en 2013. En invernada se detecta 27 de 44 humedales censados para unos totales de 7.429 ej. 3n 2012 y 5.284 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. - censo incompleto o no realizado

Fulica cristata

Focha moruna - Fotja banyuda - Red-knobbed Coot

Estatus: Residente y nidificante raro muy localizado. Conservación: PE

2012

Marjal d'Almenara: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; Citas primaverales de 2 ej. (1 con collar [24C]) (JBC,JCS)

Albufera de València: 13.I: 19 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25.I: 8 ej. (6 de ellos marcados con collar de lectura a distancia) en el tancat de la Pipa (PVG,MLA); 11.II: 6 ej., todos marcados con collares de lectura a distancia, en el tancat de Milia (GTR); 01.VI: 5 ej., una sin collar, en el tancat de Milia (AAC); 23.VI: 3 ej., 2 sin collar de lectura a distancia. Una sin anilla metálica, por lo que aparentemente se trata de un ave nacida en libertad (PVG); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de Gaianes: 21.VII: 1 ej. anillada. Fue liberada en Gandía meses antes (BOR)

El Fondo d'Elx: 20.V: 2 ej. anilladas. Provenientes de una suelta. Siguen en la charca del Centro de Interpretación hasta el 06.VII (MAA)

2013

Marjal d'Almenara: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Albufera de València: 11.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 17.VII: 2 ej. sin collar, y por lo menos una de ellas sin anillas, presentes hasta el 22.VII en el tancat de Milia (AAC,FGN); 20.IX: 1 ej. sin collar de lectura a distancia en el tancat de la Pipa. Primera observación postnupcial en la reserva. Presente hasta el 25.IX (PVG)

Emb. de Beniarrés: 11.VIII: 2 ej. anillados procedentes de la suelta en la albufera de Gaianes (BOR)

Albufera de Gaianes: 10.III: 1 ej. liberada en el plan de reintroducción. Anilla [25N]. Presente hasta el 12.V (BOR)

El Fondo d'Elx: Citas de 4 ej. el 14.II; de 5 ej. el 22.IV y de nuevo 4 ej. el 15.XI (CMA)

OTIDAE

Tetrax tetrax**Sisón común - Sisó - Little Bustard**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: VUL

2012**Morella:** 08.X: 2 ej. que saltan a volar a mi paso (SMS)**Marjal de Xilxes:** 10.I: 1 ej. se levanta a nuestro paso y se esconde en el carrizo (JBC,SMS,JLB)**Cortes de Pallás:** 2 ej. (MGE)**Villena:** 16.IV: 1 m. ad. en una parcela sin cultivar; 22.IV: 1 m. en el margen entre dos parcelas labradas (MCR); 15.V: 1 m. ad. (MLP)**El Fondo d'Elx:** 16.X: 3 ej. (AJR)**2013****Villena:** 23.III: 1 m. en una parcela sin cultivar con abundante vegetación silvestre. Primera cita primaveral; 11.V: 2 m. persiguiéndose en vuelo (MCR); 01.VI: 1 m. realizando cantos nupciales (AAC); 29.VII: 1 h. en una parcela de rastrojo (MCR)**El Fondo d'Elx:** 23.IX: 6 ej. (SAR)

Se repite la presencia postnupcial en la zona de Almenara-Xilxes. Las citas de Elx corresponden también a una zona de típica presencia postnupcial mientras que las de Villena y Cortes de Pallás corresponden a las escasas zonas donde nidifica en la Comunidad Valenciana.

CHARADRIIFORMES

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus**Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012**Grau de Castelló:** 13.III: 1 ej. presente hasta el 16.III (PGR)**Albufera de València:** 06.VII: 1 ad. en l'estany del Pujol. Primera cita postnupcial. Presente hasta el 13.VII (MCH,JID,IRU); 24.VII: 4 ej. volando frente a la playa de la Garrofera rumbo S (JID,MRG); 27.VII: 1 ad. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 01.VIII: 2 ad. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 11.VIII: 2 ad. y 1 juv. en l'estany del Pujol (BMA,BDJ); 08.VIII: 1 ad. y 1 juv. en el Racó de l'Olla (MCH); 09.IX: 5 ej. en l'estany del Pujol (VLG); 12.XI: 1 ej. en la playa de la Malladeta (JGR,BDJ)**Cap de Cullera:** 04.VIII: 10 ej. en vuelo rumbo S (LAA)**Salines de Santa Pola:** Citas invernales de 1 ej. el 28.I (AJR) y el 07.II (SCR)**Cap Cervera:** 15.X: 1 ej. (SAR)**2013****Vinaròs:** Citas de 2 ad. el 28.II y de nuevo 2 ej. junto con otros limícolas y lárvidos el 01.III (ELL)**Peníscola:** Citas de 2 ad. el 28.II y de 3 ej. el 05.III (ELL)**Albufera de València:** 29.IV: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 03.V: 2 ad. en

la playa de l'Alcatí (MCH,JID,IRU,GGA); 18.V: 2 ej. en la desembocadura de la gola del Perellonet (ACB); 01.VI: 1 ej. en la marjal de Sueca alimentándose de un pez muerto. Cita prenupcial tardía (VLG); 11.VI: 1 ad. en el Racó de l'Olla. Cita estival (JID); 05.VIII: 1 ej. en l'estany del Pujol. Primera cita postnupcial (VLG,MGI,BMA,BDJ); 11.VIII: 1 ej. en la playa del Recatí (JID,MRG,JID); 16.IX: 1 juv. en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 21.X: 1 ad. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)

Salines de Santa Pola: 03.II: 1 ej. cita invernal (MAA)

Desemb. riu Segura: 28.II: 1 ej. cita invernal (SAR)

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt

Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III primera cita prenupcial de 4 ej. (IMR)

Puerto de Castellón: 19.III 4 ej. Primera cita prenupcial (PGR)

Illes Columbretes: 05.IV: 3 ej. (LGB)

Albufera de València: 12.IV: Censo destacado de 216 ej. en los filtros verdes del tancat de la Pipa. Se observan continuos comportamientos de cortejo, defensa de pareja y las primeras cópulas (SEOV)

Requena: 17.VI: 23 juv. y ad.; 14.VII: 1 par. en balsa de riego entre viñedos. Cría 3 pollos. Pareja no indicada en Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JAI)

Balsa El Pontón: 08.VII: 4 par. con 9 pollos. No indicadas en censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (RMB)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	35	0	9	0
Marjal de Almenara	132	214	106	31
Marjal dels Moros	23	0	25	0
Albufera de Valencia	497	104	528	42
Marjal de Pego-Oliva	52	0	145	0
Salinas de Calpe	30	1	28	0
Saladar de Agua Amarga	0	0	19	0
Clot de Galvany	2	3	15	1
Salinas de Santa Pola	86	71	206	190
El Fondo	470	209	230	41
Hondo de Amorós	20	0	0	19
Lagunas de la Mata-Torrevieja	144	11	25	2
Embalse d'Elx	1	11	1	0

Censos de cigüeñuela común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades con más de 10 parejas nidificantes o más de 10 ej. invernantes. Se detecta como nidificante en 18 (2012) y 19 (2013) localidades de un total de 33 humedales censados para un total de 1.519 (2012) y 1.359 (2013) parejas nidificantes. Como invernante los totales han ascendido a 629 ej. en 2012 y a 331 en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural

2013

Illes Columbretes: 03.IV: 12 ej. (LGB)

Desem. rio Mijares: 17.III primera cita prenupcial (MBM)

Marjalera de Castelló: 25.III primera cita prenupcial de 2 ej. (XBC)

Marjal de Sagunt: 20.XII: 307 ej. (JLB)

Marjal dels Moros: 19.III: 24 ej. (MBM)

Albufera de València: 03.IV: 245 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 07.VIII: 158 ej. en marjales de Silla, Sollana, Catarroja y Alfafar (BDJ); 27.VIII: 115 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,BDJ); 04.XI: 238 ej. en el Racó de l'Olla (JID,DNA)

Requena: 28.IV: 30 ej., en la balsa El Pontón, 2 de ellos incubando (RMB); 15.V: 40 ej.; 09.VI: 19 ad. 5 par. reproductoras. No indicadas en el Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JAI)

Villena: 12.IV: 6 ej. en balsa de aguas residuales; 03.VII: 8 ej. en balsa de riego (MCR)

El Fondo d'Elx: Censo postnupcial destacado de 847 ej. el 16.VII (CMA)

Recurvirostra avoetta**Avoceta común - Alena - Pied Avocet**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 25.VIII: 8 ej. volando al S (RPB)

Grau de Castelló: Citas de 2 ej. el 24.V (PGR), el 09.VI (MBM) y el 27.VIII (PGR)

Borriana: 10.XI: 17 ej. observados durante el censo de la RAM (JBC,JLB,VAT)

Albufera de València: Censos destacados en el Racó de l'Olla de 128 ej. el 22.III (JID) y de 117 ej. el 02.IV (JID,MCH,IRU); En el tancat de Milia censos destacados de 90 ej. el 26.III (AAC) y de 126 ej. el 03.IV (CAV,AAC)

Salines de Santa Pola: Máximo anual de 1.169 ej. el 10.II (AJR); 16.III: 1 ej. anillado en Doñana en 1996, construye nido en el Pinet (SAR); 21.III: Censo destacado de 773 ej. (SAR,AJR)

El Fondo d'Elx: Aumento de ej. el 09.II con 113 ej.; máximo anual de 4.973 ej. el 13.VI (CMA). Concentraciones postnupciales destacadas de 1.692 ej. el 27.VIII (SAR) y de 1.755 ej. el 17.IX (CMA) con descenso progresivo a 166 ej. el 17.X y tan solo 71 ej. el 01.XII (CMA)

2013

Albufera de València: 26.III: Concentración prenupcial destacada de 197 ej. en el Racó de l'Olla (JID,IRU);

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Marjal de Almenara	1	0	0	0
Marjal dels Moros	4	2	4	0
Albufera de Valencia	69	19	65	25
Salinas de Santa Pola	405	466	455	514
El Fondo	180	29	142	18
Hondo de Amorós	12	0	0	8
Lagunas de La Mata-Torrevieja	102	0	70	0

Censos de avoceta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se ha detectado. La especie se nidificó en 7 localidades (2012) y en 5 (2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 773 par. en 2012 y de 736 par. en 2013. Los invernantes han totalizado 516 ej. en 2012 y 565 en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

26.III: 103 ej. en el tancat de Milia; 03.IV: 40 ej. en el tancat de Milia. Un ave porta anilla de lectura procedente de Francia (AAC,FGN); 26.VI: 142 ej. en el Racó de l'Olla. Primer juv. de la presente temporada (JID)
Requena: 28.IV: 1 ej. en la balsa El Pontón (RMB)
Gandía: 04.IV: 1 ej. en el puerto (PLP)
Emb. de Bellús: 21.IX: 2 ej. (BOR,DMF)
Elx: 09.IV: 334 ej. en el Pinet (JMT,MFS)
Salines de Santa Pola: 14.II: Aumento de ej. a 1.050 (AJR); 17.X: 1.610 ej. máximo anual (JMT,MFS)
El Fondo d'Elx: 26.III: 295 ej.; 16.VII: Censo postnupcial destacado de 704 ej. (CMA); 19.VIII: Máximo anual de 1.300 ej. (JMT,MFS); 16.XII: 40 ej. (CMA)

BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew

Estatus: Residente escaso localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Ares del Maestrat: 23.IV: 3 ej. (RPB)
Serra d'Irta: 16.II: 1 ej. cerca del Castillo; 09.III: 1 ej. en la pista del Coll d'Amberri (JCL)
Alcossebre: 28.II: 21 ej.; 11.III: 4 ej. (IMR)
Illes Columbretes: 03.IV: 4 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 24.I: 9 ej. (RPB,JBC); 02.XII: 6 ej. (MBM)
Marjal d'Almenara: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Villena: 25.III: 5 ej. en un transecto; 22.IV: 2 ej. junto al embalse de San Diego; 01.V: 3 par. (MCR); 27.IX: 18 ej. (JAG)
Elx: 22.X: 166 ej. (SCR); 21.XI: 168 ej. (SAR)
El Fondet de la Senieta: 19.I: 5 ej. (AJR)
Clot de Galvany: 08.II: 2 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 24.I: 11 ej. (AJR); 07.IX: 23 ej. (SAR); 25.X: 100 ej.; 16.XI: 91 ej. (AJR)
El Fondo d'Elx: 15.VI: 4 par. (SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16.XI: 50 ej. (AJR)
Charca Carrizales: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

2013

Morella: 09.VI: 2 ej. cantando (RPB,ALR)
Ares del Maestrat: 05.VII: 1 par. junto al nido con dos huevos (RPB,ALR)
Alcossebre: 13.II: 15 ej. (DES)
Casinos: 08.X: 17 ej. agrupación postnupcial (SLB)
Requena: 10.IX: 6 ej. en la vega del río Magro. Llevan observándose en la zona desde el 02.VIII (PRP)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Sant Vicent del Raspeig: 16.III: 22 ej. (JDL)
Villena: 07.IV: 2 ej. en una parcela de cereal (MCR)
Saladar de Agua Amarga: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 08.V: 1 ej. incubando (AJR)
Clot de Galvany: 09.I: 18 ej. (JDL); 20.XII: 24 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 18.IX: 33 ej. máximo anual (SAR,AJR); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CRF,MFS,SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 22.II: 11 ej. (SAR,OAP); 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

GLAREOLIDAE

Glareola pratincola**Canastera común - Carregada - Collared Pratincole**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: VUL

2012

Marjal d'Almenara: 08.VI: 22 ej.; 20.VI: 114 ej. 4 pollos pequeños; 01.VIII: 187 ej. zona inundada en limite con provincia Valencia (JBC)

Albufera de València: 05.VIII: 400 ej. en dos grupos en las marjales de Silla y Sollana. Máximo anual; 03.IX: Apenas 14 ej. en la Ratlla. Las concentraciones postnupciales este año han sido muy modestas y con apenas presencia desde este mes de septiembre; 03.X: 5 ej. en la marjal de Sueca, última cita postnupcial (BDJ)

Charca de San Isidro: 19.VI: 80 ej. (SAR);
Vuelve a criar en este espacio tras 3 años sin hacerlo (SAR)

El Fondo d'Elx: 22.III: 47 ej.; 13.VI: 51 ej. (CMA)

2013

Alcossebre: 31.V: 4 ad. Última cita prenupcial (DES)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 20.IV: 20 ej. (MBM)

Marjal dels Moros: 20.IV: 150 ej. (RMB)

Albufera de València: 23.III: 3 ej. en el tancat de Milia. Primera cita anual (GTR); 14.VI: 2 juv. en la marjal de Alfafar. Primera cita de aves juv. (PMP); 11.VII: 65 ej. en la marjal de Sollana (BDJ,JGR); 04.IX: 236 ej. en el tancat de la Pipa. Máximo anual (SEOV); 01.X: 2 ej. en el tancat de Milia. Última cita postnupcial (AAC,FGN)

Salines de Santa Pola: 18.IX: 9 ej. (SAR,AJR)

El Fondo d'Elx: 29.IV: 25 ej. (SAR)

	2012	2013
Localidad	Parejas nidificantes	Parejas nidificantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	31	9
Puerto de Castellón	3	0
Marjal de Almenara	42	43
Marjal dels Moros	38	40
Puerto de Valencia	0	7
Albufera de Valencia	100	77
Marjal de Pego-Oliva	6	7
Salinas de Santa Pola	114	27
El Fondo	0	37
Charca de San Isidro de Albaterra	50	0
Charca Carrizales	10	15

Censos de canastera en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se ha detectado. La especie se ha detectado como nidificante en 9 localidades de un total de 33 humedales censados con un total de 394 par. en 2012 y de 262 par. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

CHARADRIIDAE

Charadrius dubius**Chorlitejo chico - Corrioleto - Little Ringed Plover**

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Grau de Castelló: 29.IV: 10 ej. (MBM)

Moncofa: 17.III: 12 ej. (JBC)

Marjal de Sagunt: 08.III: 32 ej. en zona inundada. Censos postnupciales destacados de 62 ej. el 20.VII con decenas de otros limícolas y de 75 ej. el 27.VII (JBC)

Albufera de València: 28.II: 80 ej. en el tancat de Milia (AAC); 06.VIII: 120 ej. en dos puntos de las marja-

les de Silla y Sollana; 10.VIII: 271 ej. en marjales de Silla, Sollana y Catarroja; 28.XII: 33 ej. en marjales de Catarroja y Sueca (BDJ)

Requena: 15.IV: 26 ej. máximo prenupcial; 14.VII: 17 ad. y 7 pollos (JAI)

El Fondo d'Elx: 02.I: 15 ej. (AJR); 17.IX: 42 ej. (CMA)

Emb. de La Pedrera: 26.IX: 40 ej. (SAR)

Marjal de Pego-Oliva: 19.II: 9 ej. (JFL)

2013

Desem. riu Millars: 31.V: 15 ej. en el badén de la Cossa (GUM)

Albufera de València: 25.III: 40 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 12.VII: 50 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 19.VIII: 45 ej. en la Ratlla (EGO,BDJ); 30.VIII: 84 ej. en la marjal de Massanasa (BDJ); 20.IX: 44 ej. en la marjal de Silla (BDJ); 18.XI: 42 ej. en la marjal de Sollana (EGO,BDJ)

Requena: 04.IV: 16 ej. (JAI); 28.IV: 35 ej. (RMB); 19.VIII: 30 ej. presencia postnupcial en los estanques (JAI)

Cullera: 22.VIII: 31 ej. en l'estany (EGO,BDJ)

Emb. de Beniarrés: 27.VII: 10 ej. (BOR)

El Fondo d'Elx: 29.IV: 150 ej. máximo anual (SAR); 25.VIII: 1 h. con anilla de PVC anillada en Holanda, anillado en 2003 (SAR); 16.IX: 53 ej. (SAR,AJR)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Cuecas del Bergantes, Caldes y Cantavieja	17	-	-	-
Marjal de Almenara	40	47	25	23
Marjal dels Moros	8	0	4	0
Albufera de Valencia	49	0	38	14
Marjal de Xeresa	7	0	3	0
Marjal de Pego-Oliva	7	4	8	0

Censos de chorlito chico en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se ha detectado más de 5 parejas nidificantes. La especie se ha detectado como nidificante en 15 localidades (2012) y en 12 (2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 144 par. en 2012 y de 91 par. en 2013. - No censado. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Además de las aves censadas en el marco del seguimiento de aves acuáticas nidificantes de la Comunidad Valenciana (cuadro adjunto), se han detectado parejas sueltas o pequeñas concentraciones en un buen número de localidades, fundamentalmente costeras pero también de interior, que no reproducimos en su totalidad.

Charadrius hiaticula

Chorlito grande - Corriol gros - Great Ringed Plover

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 5 ej. (RPB,ALR,ADP)

Illes Columbretes: 05.IV: 1 ej. (LGB)

Puerto de Castellón: Máximo prenupcial de 10 ej. el 30.IV; última cita prenupcial de 4 ej. el 07.VI (PGR)

Marjal d'Almenara: 21.V: 150 ej. máximo anual (JBC)

Albufera de València: 15.V: 40 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 29.VIII: 60 ej. en el tancat de Milia (AAC); 17.IX: 124 ej. en marjales de Valencia y Silla; 03.IX: 92 ej. en marjales de Sollana (BDJ); 12.XI: 26 ej. en la playa de la Malladeta (JGR,BDJ); 30.XI: 33 ej. en marjales de Catarroja (JHZ,BDJ); 12.XII: 21 ej. en la playa del Recatí (BDJ)

Salines de Santa Pola: 10.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.X: 20 ej. (SAR)

El Fondo d'Elx: 17.IX: 145 ej. (CMA)

Cap Cervera: 18.I: 12 ej. (SAR)

2013

Illes Columbretes: 13.IV: 1 ej. (LGB)

Albufera de València: 11.I: 40 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.IV: 60 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 09.V: 37 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP,BDJ); 29.VII: 4 ej., entre ellos 1 juv., en el tancat de Milia. Primera cita de un ave juv. (AAC,FGN); 06.IX: 71 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 15.IX: 141 ej. en marjales de Silla y Catarroja. Máximo anual (BDJ); 21.X: 45 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)

Requena: 22.IX: 2 juv. en paso postnupcial por los estanques. Hay muy pocas citas de esta especie en la localidad (JAI)

Emb. de Bellús: 09.X: 12 ej. (BOR)

Salines de Santa Pola: 18.IX: 39 ej. (SAR,AJR)

El Fondo d'Elx: 21.V: 9 ej. (CMA); 30.VIII: 8 ej. (SAR)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 06.VI: 12 ej. cita estival (SAR)

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro - Corriol camanegra - Kentish Plover

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (MBM); 22.IV: 12 ej. entre la playa y parcelas roturadas (VET)

València: 11.XII: 19 ej. (CAZ)

Albufera de València: 28.VI: 24 ej. en el tancat de Milia. No se ha reproducido en esta localidad (AAC);

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	4	0	8	0
Puerto de Castellón	4	0	6	0
Marjal de Almenara-Chilches	34	64	5	0
Marjal dels Moros	14	0	12	0
Albufera de Valencia	22	23	32	28
Saladar de Agua Amarga	0	0	6	0
Salinas de Santa Pola	71	21	67	1
El Fondo	48	22	48	0
Lagunas de La Mata-Torrevieja	38	58	87	18

Censos de chorlitejo patinegro en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se han detectado 5 o más parejas. La especie se ha detectado como nidificante en 11 localidades (2012) y en 14 (2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 239 par. en 2012 y de 278 par. en 2013. Como invernante los totales ascienden a 188 ej. en 2012 y a 47 en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

28.VIII: 52 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH)

Requena: 07.IV: 1 ej. Primer registro comarcal (PRP)

Gandía: 13.VI: 13 par. con huevos o pollos entre la playa de l'Ahuir y el puerto de Oliva. No recogidas en censo oficial (AMG)

Salines de Santa Pola: 17.IX: 84 ej. (SAR,OAP)

El Fondo d'Elx: 22.III: 261 ej. máximo anual; 13.VI: 114 ej. (CMA)

2013

Albufera de València: 27.III: 30 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 03.IV: 20 ej. en el tancat de Milia. Una de las aves porta anilla de PVC procedente de Normandía (Francia) (AAC,FGN)

Salines de Santa Pola: Censos postnupciales destacados de 128 ej. el 14.VIII (AJR), de 141 ej. el 18.IX (SAR,AJR) y de 100 ej. 25.X (AJR)

Charadrius morinellus

Chorlito carambolo - Corriol pit-roig - Eurasian Dotterel

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 07.IX: 1 juv. presente hasta el 09.IX en barbecho cerca del Romaní (BDJ,PMP); 13.IX: 2 juv. en un campo roturado en el Borronar (BDJ)

Guadasequies: 30.VIII: 19 ej. máximo anual (BOR)

El Fondo d'Elx: 17.IX: 1 ej. (SAR)

2013

Camporrobles: 31.VIII: 1 ej. (RMB)

Emb. de Bellús: 18.VIII: 1 ej. (BOR)

Los Montesinos: 30.VIII: 4 ej. (PPP)

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover

Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

2012

Alcossebre: 28.II: 7 ej. (IMR)

Illes Columbretes: 23.XI: 1 ej. (LGB)

Desem. riu Millars: 17.II: 25 ej. (GUM)

Marjal d'Almenara: 17.XII: 69 ej. (JBC)

Requena: 01.XII: 12 ej. en los Ruices (RLO)

Albufera de València: 16.II: Censo destacado de 1.560 ej. en marjales de Sueca (BDJ,JGR)

Bellús: 21.I: 4 ej. (BOR)

El Fondet de la Senieta: 19.XII: 160 ej. (AJR)

Saladar de Agua Amarga: 28.I: 356 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 21.XII: 450 ej. (OAP)

Llacunes de La Mata i Torreveja: 18.I: 160 ej. (SAR)

Localidad	2012	2013
	Ejemplares invernantes	Ejemplares invernantes
Riu Sec de Castelló	58	29
Marjal dels Moros	60	0
Albufera de Valencia	1.765	1.866
Marjal de Pego-Oliva	26	0
El Fondo	217	0
Lagunas de La Mata-Torreveja	61	91

Censos de chorlito dorado europeo en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se ha detectado. La especie ha aparecido como invernante en 6 localidades (2012) y 3 (2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 2.187 ej. en 2012 y de 1.986 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

2013

Benicarló: 03.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (JLA)
Alcossebre: 19.II: 15 ej. volando al S. Única cita anual (DES)
Albufera de València: 07.X: 1 ej. en huertas de Sollana (AAC,FGN)
El Fondet de la Senieta: 02.I: 296 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 29.I: 180 ej. (AJR)
El Fondo d'Elx: 25.I: 238 ej. (AJR,SAR)

Especie que puede resultar difícil de detectar durante el invierno, ya que los bandos, muy cohesionados, pueden ser difíciles de localizar o pueden cambiar de lugar de descanso. Esto provoca que haya un buen número de aves que han pasado desapercibidas en los censos de la Conselleria.

Pluvialis squatarola**Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 03.I: 62 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ); 28.I: 64 ej. en la gola del Perellonet (RMB); 02.III: 32 ej. en la playa de la Malladeta (JID,MCH,IRU); 04.V: 2 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 26.VI: Cita estival de 1 ej. en el Racó de l'Olla (JID); 19.VII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC); 30.XI: 41 ej. en la playa de la Punta (VPA); 08.XII: 46 ej. en la playa de la Malladeta (JHZ,BDJ)
Fortaleny: 08.XII: 35 ej. en campos de arroz (JML)
Salines de Santa Pola: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 18.III: 20 ej. (SCR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.XII: 7 ej. (SAR,AJR)

2013

Vinaròs: 08.V: 1 m. ad. permanece en la playa de Aiguaoliva hasta el 10.V (ELL,FRJ)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.V: 2 ej. (RPB)
Albufera de València: 11.I: 47 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Máximo anual; 15.IV: 5 inm. en el Racó de l'Olla (JID); 04.V: 2 ej. en el tancat de Milia (GTR); 18.V: 3 ej. en la marjal de Sollana (AAC,FGN); 05.VI: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Cita estival (JID,MCH,IRU); 19.VI: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita estival (AAC,FGN); 12.X: 8 ej. en el tancat de Milia (GTR)
Elx: 21.IX: 5 ej. (JMT,AVDH)
El Fondo d'Elx: 03.X: 5 ej. (SAR)

Vanellus vanellus**Avefría europea - Merita - Northern Lapwing**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante común. Conservación: EC

2012

Peníscola: 04.II: 250 ej. volando al S durante el censo RAM (ELL)
Sant Mateu: 07.I: 23 ej. (ALR,RPB)
Alcossebre: 28.II: 17 ej. (IMR)
Vilanova d'Alcolea: 04.I: 20 ej. (JBC,JLB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Illes Columbretes: Citas de 1 ej. los días 10.I, 29.X y 07.XII (LGB)
Marjal de Sagunt: 15.XII: 640 ej. en Quartell (JBC)
Marjal dels Moros: 04.II: 250 ej. (RMB)

Albufera de València: 05.VI: 2 ej. en arrozales de la Socarrada (FPA,BDJ); 21.VI: 1 ej. cita estival; 20.VII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC)

Requena: 29.VI: 3 juv y 2 ad. Cita postnupcial temprana que debe corresponder a ej. de la población ibérica reproductora (PRP); 15.I: 7 ej. en la balsa El Pontón (RMB)
El Fondo d'Elx: 13.VI: 2 ej. (CMA)

2013

Benicarló: 11.XI: 15 ej. (AGC)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Illes Columbretes: 09.VII: 2 ej. (LGB)

Desem. riu Millars: 20.XI: 50 ej. camp de tir (GUM)

Albufera de València: 15.VII: 1 ej. en la marjal de Massanasa. Primer registro postnupcial (CAZ); 23.VI: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita estival; 29.VII: 6 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN)

Emb. de Bellús: 21.XII: 58 ej. (BOR)

El Fondo d'Elx: 16.I: 667 ej. (SAR); 16.XII: 1005 ej. (CMA)

Localidad	2012	2013
	Ejemplares invernantes	Ejemplares invernantes
Desem. río Mijares	75	-
Marjal de Almenara	650	235
Marjal dels Moros	100	60
Albufera de Valencia	5.611	5.450
Embalse de Bellús	91	21
Marjal de Pego-Oliva	353	110
El Fondo	649	-

Censos de avefría europea en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican localidades con más de 50 ej. La especie ha aparecido como invernante en 10 localidades (2012) y 9 (2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 7.540 ej. en 2012 y de 5.912 ej. en 2013. - Sin datos. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Continúa establecida una pequeña población nidificante en el Prat de Cabanes-Torreblanca, que la especie colonizó a finales del siglo XX. Estos últimos años sin embargo, parece haber desaparecido de la marjal de Almenara, donde criaron unas pocas parejas entre 2008 y 2011

SCOLOPACIDAE

Calidris canutus

Correlimos gordo - Territ gros - Red Knot

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012

Albufera de València: Primeras citas prenupciales de 1 ad. en plumaje nupcial el 02.V (CAV,AAC) y de 2 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 28.VIII: 1 ad. y 1 juv. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC); 09.IX: 4 ej. (3 juv.) en el tancat de Milia (GTR), sigue presente el 10.IX (CAV,BDJ); 13.IX: 1 juv. en l'estany del Pujol presente hasta el 21.IX (BDJ); 26.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla (AAC)

Salines de Santa Pola: 02.I: 3 ej. cita invernal; 02.X: 3 ej. Máximos anuales de 7 ej. los días 05.X y 17.X (AJR)
El Fondo d'Elx: 13.IX: 2 ej. (AJR); 13.IX: 6 ej. (SAR); 05.X: 7 ej. (SAR,AJR)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.V: 1 ej. (RPB)

Albufera de València: 29.IV: 2 ej. en plumaje nupcial en el tancat de la Ratlla. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 03.V: 4 ej. en marjales de Sueca (VPA); 20.V: 2 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,GGA); 06.IX: 3 juv. en el tancat de la Ratlla (AAC,FGN); 30.IX: 7 juv. en el tancat de la Ratlla presentes hasta el 03.X. Máximo anual (PMP,BDJ); 01.X: 4 juv. en el tancat de Milia (AAC,FGN)

Salines de Santa Pola: 12.IX: 2 ej. (AJR,SAR); 17.XII: 4 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 04.IX: 2 ej. Primera cita postnupcial (AJR)

Llacunes de La Mata i Torreveja: 06.VI: Cita estival de 4 ej. (SAR)

Calidris alba**Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 04.II: 190 ej. en la playa de l'Alcatí (PLP,JRH); 13.III: 500 ej. en la playa de la Punta. Máximo anual (JME,JID); 08.VI: 1 ej. todavía en plumaje invernal en el tancat de Milia. Cita estival. Presente hasta el 09.VI (CAV,AAC,GTR); 31.VII: 22 ej. ad. en el Racó de l'Olla (MCH)

Cullera: 03.V: 54 ej. en las playas del mareny de Sant Llorenç (BDJ)

Guardamar de la Safor: 21.XI: 39 ej. (AMG)

Salines de Santa Pola: 10.I: 30 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 12.I: 28 ej. (SAR,AJR); 07.IX: 32 ej. en El Pinet (SAR)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 37 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Cap Cervera: 18.I: 29 ej. (SAR)

2013

Marjal dels Moros: 10.IV: 3 ej. (JPH)

Albufera de València: 11.I: 153 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Máximo anual; 04.II: 40 ej. en la playa de la Malladeta (MSC,GLL); 17.V: 1 ad. en el Racó de l'Olla. Presente hasta el 21.V (JID,MCH,GGA); 03.VIII: 1 ej. en marjales de Sollana. Primera cita postnupcial (BDJ); 23.VIII: 26 ej. en la playa de la Malladeta. Primera concentración postnupcial (EGO,BDJ)

Gandía: 29.III: 7 ej. (PLP)

Salines de Santa Pola: 15.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 03.V: 1 ej. leucístico (FEC,TZL,TMF)

Desemb. riu Segura: 11.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Guardamar del Segura: 18.I: 8 ej. (JDL)

Cap Cervera: 28.X: 43 ej. (SAR)

Calidris minuta**Correlimos menudo - Territ menut - Little Stint**

Estatus: Migrante común, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Grau de Castelló: 27.VIII: 4 ej. (PGR)

Marjal de Sagunt: 22.VII: 20 ej. (AAC,CVV)

Albufera de València: 28.I: Cita invernal de 300 ej. en la gola del Perellonet (RMB); 12.III: 150 ej. en el tancat de Milia (AAC); Cita estival en la marjal de Sueca de 5 ej. el 01.VI (BDJ); Citas estivales en el tancat de Milia de 1 ej. el 05.VI y de 4 ej. el 08.VI; 17.VII: 2 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC); 10.VIII: 180 ej. en las marjales de Silla, Sollana y Catarroja (BDJ); 11.VIII: 110 ej. en el tancat de Milia (1 juv.) primer registro de un ave juv.; 16.X: 93 ej. en el tancat de Milia (AAC); 24.IX: 115 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ)

Requena: 21.VIII: 1 ej. en la balsa El Pontón en paso postnupcial (JAI)

Salines de Santa Pola: 10.I: 43 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.X: Censo destacado de 200 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 12.I: 417 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 502 ej. máximo anual; Cita estival de 76 ej. el 13.VI; 17.IX: 350 ej. (CMA)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 137 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CRF,ASM,MFS)

Cap Cervera: 18.I: 8 ej. (SAR)

2013

Marjal de Peníscola: 14.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 11.I: 136 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25.III: 130 ej. en el tancat de Milia. Presentes hasta el 27.III. Una de las aves porta anilla de PVC procedente de una isla del O de Noruega (AAC,FGN); 13.VI: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Cita estival (JJU); 29.VII: 63 ej., todos ad., en el tancat de Milia (AAC,FGN); 10.VII: 1 ej. en l'estany del Pujol. Primera cita postnupcial (JRA,MJC); 19.VIII: 112 ej. (5 juv.) en el tancat de Milia. Primera cita de aves juv. (AAC,FGN); 10.X: 103 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 21.X: 115 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)

Balsa El Pontón: 04.VIII: 5 ej. (RMB)

Emb. de Bellús: 09.X: 3 ej. (BOR)

Emb. de Beniarrés: 27.VII: 3 ej. (BOR)

Salines de Santa Pola: 15.I: 83 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.II: 132 ej.; 18.IX: 304 ej. máximo anual (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.IV: 152 ej.; 16.XII: 20 ej. (CMA)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 10.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Cap Cervera: 28.X: 26 ej. (SAR)

Calidris temminckii**Correlimos de Temminck - Territ de temminck - Temminck's Stint**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

La Pobla Tornesa: 21.IV: 1 ej. (VET,MTB,AAC)

Albufera de València: *Seguimiento en el tancat de Milia:* Primera cita prenupcial de 1 ej. el 28.II; Censos destacados en marzo de 4 ej. el 1 (AAC) y el 15 (FLL,AAC); Máximos prenupciales de 5 ej. el 09.IV (AAC) y de 6 ej. el 15.V (CAV,AAC); Durante el paso postnupcial citas de 5 ej. el 23.VII; 4 ej. el 24.IX y de nuevo 5 ej. los días 08.X y 05.XI (AAC).

26.III: 2 ej. en el tancat de la Ratlla (SEOV); 01.VIII: 6 ad. en un arrozal fangueado de la Palmella (PMP); 07.VIII: 8 ej. en marjales de Sollana (CAV,AAC); 11.VIII: 11 ej. en marjales de Silla y Sollana (AAC); 13.VIII: 7 ej. en marjales de Silla y Sollana (BDJ); 16.VIII: 14 ej. en marjales de Silla y Sollana. Máximo anual (CAV,AAC); 28.VIII: 10 ej. 8 ad. y 2 juv. en marjales de Sollana. Primera cita de aves juv. (AAC); 29.VIII: 3 ad. y 1 juv. en el tancat de la Pipa (SEOV); 01.IX: 1 ad. y 2 juv. en el tancat de la Pipa; 17.IX: 4 ad. y 2 juv. en arrozal fangueado del Recatí; 24.IX: 3 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ);

Salines de Santa Pola: 12.IV: 3 ej. (SCR)

Emb. de La Pedrera: 26.IX: 5 ej. (SAR)

2013

Albufera de València: *Seguimiento en el tancat de Milia:* Primera cita prenupcial de 2 ej. el 02.III (CAZ); Máximo prenupcial de 4 ej. el 25.III y censos destacados de 3 ej. el 15.IV (AAC,FGN) y el 07.V (PMP); Censos postnupciales de 4 ad. el 15.VII, de 1 ej. el 26.VIII; 12 ej. (ad. y juv.) el 16.IX; 2 ej. el 04.X (AAC,FGN) y última cita anual de 1 ej. el 22.XII (GTR)

28.IV: 4 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC,BDJ); 09.V: 3 ej. en marjales de Sollana y Silla (AAC,FGN); 11.V: 2 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 10.VII: 1 ej. en la marjal de Massanasa. Primera cita postnupcial (PMP); 11.IX: 2 ej. juv. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 06.IX: 1 ad. en el tancat de la Pipa (PVG); 29.IX: 3 ej. en marjales de Silla y Sollana (JGOM,UFU,VLO); 13.X: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 21.X: 1 ej. asociado a otros limícolas en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)

Salines de Santa Pola: 02.V: 1 ej. (SAR)

Calidris melanotos**Correlimos pectoral - Territ pectoral - Pectoral Sandpiper**

Estatus: Divagante E de Asia y N de América

2012

Albufera de València: 27.VIII: 1 juv. en el tancat de Milia. Presente hasta el 30.VIII. Primer registro postnupcial (CAV,AAC); 13.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Presente hasta el 25.IX (FJG,CAV,BDJ); 21.IX: 2 juv. en marjales de Valencia (VPA)

El Fondo d'Elx: 23.X: 1 ej. presente hasta el 24.X (AJR)

Emb. de La Pedrera: 21.IX: 1 ej. (AJR,SAR)

2013

Albufera de València: 05.V: 2 ej. en marjales de Catarroja. Uno de ellos presente hasta el 09.V (MAP); 07.VIII: 1 ad. en el tancat de Milia. Presente hasta el 08.VIII (AAC,FGN); 29.VIII: 1 juv. en marjales de Alfafar. Presente hasta el 01.IX; 15.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Presente hasta el 20.IX (BDJ); 20.IX: 1 juv. en el tancat de Milia. Presente hasta el 01.X (AAC,FGN); 04.X: 1 ej. en el tancat de la Pipa (FLL,JMAG); 05.X: 1 juv. en el tancat de Milia (MNY)

El Fondo d'Elx: 16.IX: 1 ej.; 08.X: 1 ej. presente hasta el 13.X (SAR)

Calidris ferruginea**Correlimos zarapitín - Territ bec-llarg - Curlew Sandpiper**

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 7 ej. en parcela roturada (VET)

Grau de Castelló: 02.V: 29 ej. (PGR)

Marjal de Sagunt: 22.VII: 50 ej. (AAC,CVV); 27.VII: 108 ej. en zona inundada (JBC)

Albufera de València: 02.V: 65 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); En el tancat de Milia, citas estivales de 3 ej. el 01.VI (AAC), de 1 ej. el 05.VI (CAV,AAC) y el 09.VI (GTR) y de 10 ej. el 15.VI (CAV,AAC); Censos postnupciales destacados de 160 ej. el 23.VII en el tancat de Milia (CAV,AAC), de 52 ej. el 03.VIII en el tancat de la Pipa (BDJ) de 171 ej. el 11.VIII en marjales de Silla y Sollana (AAC) y de 165 ej. el 16.VIII en el tancat de la Ratlla; 22.VIII: Primer registro de 1 juv. en el tancat de la Ratlla (BDJ)

Emb. de Beniarrés: 29.VIII: 1 ej. (BOR)

Elx: 29.IV: 20 ej. (SCR)

Salines de Santa Pola: 16.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (SAR); 17.IV: 500 ej. (AJR); 18.VI: 2 ej. cita estival (SAR)

El Fondo d'Elx: 01.VIII: 1.096 ej. máximo anual (CMA)

2013

Albufera de València: *Seguimiento en el tancat de Milia:* Primera cita prenupcial de 1 ej. el 28.III; censo prenupcial destacado de 41 ej. el 15.IV; Citas estivales de 2 ej. el 17.VI y de 1 ej. el 03.VII; Censos postnupciales destacados de 199 ad. el 29.VII y de 110 ej. el 06.VIII (AAC,FGN); 15.X: 1 ad. Última cita postnupcial (GTR)

Balsa El Pontón: 04.VIII: 1 ej. (RMB)

Saladar de Agua Amarga: 31.VII: 5 ej. (AJR)

Salines de Santa Pola: 28.III: 200 ej. Primera cita prenupcial; 30.IV: 350 ej. (AJR); 02.V: 280 ej. (SAR); 07.V: 404 ej. máximo anual (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.IV: 115 ej. (CMA)

La concentración de más de 1.000 correlimos zarapitines en el Fondo en 2012 se trata de un posible máximo histórico para la CV.

Calidris maritima

Correlimos oscuro - Territ fosc - Purple Sandpiper

Estatus: Invernante raro del Atlántico norte y del Ártico. Conservación: IE

2012

Borriana: 01.XII: 1 ad. junto a un vuelvepedras (JCU,JBC,JLB)

Séptima cita para Castellón y decimosegunda para la Comunidad Valenana de este raro limícola. La primera desde 2001, precisamente en esta misma localidad.

Calidris alpina

Correlimos común - Territ variant - Dunlin

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Grau de Castelló: 30.IV: 2 ej. (PGR)

Marjal de Xilxes: 10.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Marjal d'Almenara: 10.I: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.V: 12 ej. (JBC)

Albufera de València: 13.I: 731 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Máximo anual; 28.I: 539 ej. en la gola del Perellonet (RMB); 04.II: 133 ej. en marjales de Sueca (AAC); 03.III: 80 ej. en marjales de Silla (PMP,GMA); 22.VIII: Primera cita anual de 2 juv. en el tancat de Milia (AAC); 23.IX: 105 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 12.XI: 114 ej. en la playa de la Malladeta (JGR,BDJ); 24.X: 75 ej. en la playa de la Punta (VPA)

Salines de Santa Pola: 10.I: 211 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 12.I: 214 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 321 ej.; 13.VI: 35 ej. cita estival que podría corresponder al primer registro postnupcial; 01.VIII: 333 ej. (CMA)

Llacunes de La Mata i Torreveja: 09.I: 146 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.XII: 22 ej. cita invernante (SAR,AJR)

Cap Cervera: 08.I: 82 ej. (SAR)

2013

Albufera de València: 11.I: 300 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 90 ej. en marjales de Sueca. Cita invernante (AAC,FGN); 25.VI: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Cita estival (JID,MCH); 20.VII: 25 ej. en el tancat de Milia (GTR); 26.VIII: 13 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 21.X: 220 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ); 23.IX: 106 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 01.X: 60 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 15.X: 114 ej. en el tancat de Milia (GTR); 11.XII: 130 ej. en marjales de Sueca. Cita invernante (BDJ)

Requena: 28.IV: 2 ej. (RMB); 02.XI: 1 ej. cita postnupcial en los estanques (JAI)

Emb. de Bellús: 09.X: 10 ej. (BOR)

Salines de Santa Pola: 15.I: 134 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 18.IX: 230 ej.; 17.XII: 380 ej. máximo anual (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.IV: 87 ej.; 16.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 16.XII: 40 ej. cita invernante (CMA)

Llacunes de La Mata i Torreveja: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Calidris falcinellus**Correlimos falcinelo - Territ becadell - Broad-billed Sandpiper**

Estatus: Divagante de Escandinavia y Siberia

2012**Albufera de València:** 01.V: 2 ad. en plumaje nupcial en el tancat de Milia (IBR,AAC)**El Fondo d'Elx:** 07.IX: 1 ej. única cita postnupcial (AJR)**2013****Albufera de València:** 08.V: 2 ad. en el tancat de la Ratilla. Aumentan a 3 ej. el 09.V (AAC,PVG,PLP)

Estos años han resultado excepcionales para esta especie, que solo contaba con cuatro citas previas de ejemplares solitarios en la Comunidad Valenciana. Las anteriores eran todas en l'Albufera salvo una antigua de 1986 en las salinas de Santa Pola.

Calidris pugnax**Combatiente - Redonell - Ruff**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012**Grau de Castelló:** 14.V: 2 ej. (PGR)**Marjal de Sagunt:** 22.VII: 20 m. (AAC,CVV)

Albufera de València: 13.I: 71 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.II: 100 ej. en marjales de Sueca (AAC); 04.III: 165 ej. en marjales de Catarroja y Silla. Máximo anual (BDJ); 15.III: 52 ej. en marjales de Catarroja (PVG); 10.VIII: 44 ej. en marjales de Silla y Sollana, entre ellos 1 juv. Primer registro anual de un ave juv. (BDJ); 21.IX: 64 ej. en el Racó de l'Olla (JID,GGA); 23.XI: 60 ej. en marjales de Sueca (JHZ,BDJ); 15.XII: 73 ej. en marjales de Sueca (BDJ)

Clot de Galvany: 21.III: 3 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 10.III: 46 ej. uno de ellos completamente blanco salvo una mancha gris en el ala (SAR); 15.V: 36 ej.; 17.IX: 11 ej.; 21.XI: 11 ej. (CMA); 12.XII: 3 ej. cita invernal (AJR)

Llacunes de La Mata i Torreveja: 09.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV**2013**

Albufera de València: 11.I: 111 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.II: 60 ej. en la marjal de Alfafar (AAC); 19.III: 75 ej. en marjales de Catarroja (BMA,BDJ); 19.VI: 1 ej. en marjales de Silla. Cita estival (PMP); 01.VII: 2 ej. en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (MCH,JID,IRU,GGA); 07.X: 140 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual (AAC,FGN)

Balsa El Pontón: 20.IV: 3 ej. (RMB)**El Fondo d'Elx:** 29.IV: 64 ej.; 18.X: 26 ej. (SAR)***Lymnocyptes minimus*****Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe**

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

2012**El Toro:** 29.XII: 1 ej. (JMA,FLL,JBF,RBB)

Albufera de València: 14.I: 1 ej. en la devesa (GCH); 30.I: 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 23.II: 2 ej. en marjales de Sollana; 01.III: 2 ej. en el tancat de Milia; 12.III: 4 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual (AAC); 14.V: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita prenupcial tardía (CAV); 03.VI: 1 ej. en marjales de Sueca. Cita

estival (VLG,MGI); 16.XI: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC)

Cullera: 20.I: 1 ej. abatido en el vedat (VLG,BDJ)

Monòver: 30.III: 1 ej. en el río Vinalopó (VGC)

2013

El Toro: 08.III: 1 ej. (FLL,VPA,MGT)

Albufera de València: 22.I: 1 ej. en marjales de Sueca (PVG,AAC); 20.II: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 09.III: 1 ej. en el tancat de Milia. Capturada para anillamiento (GTR); 19.X: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial temprana (GTR); Citas en el tancat de la Pipa de 2 ej. el 04.XII (PVG,SEO) y el 14.XII (JFE,PVG) y solo 1 ej. el 30.XII (PVG,RGR)

Clot de Galvany: 22.XI: 1 ej. (AJR)

Gallinago gallinago

Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe

Estatus: Migrante común e invernante moderado. Conservación: EC

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.III: 2 ej. (IMR)

Cabanes: 06.II: 5 ej. (VET)

Marjal d'Almenara: 10.I: 63 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15.XII: 20 ej. volando en distintos grupos por la presencia de cazadores (JBC)

Albufera de València: Máximos anuales en el tancat de Milia de 400 ej. los días 06.III (AAC) y 17.XII (AAC,FGN)

El Fondo d'Elx: 17.X: 24 ej. (CMA); 14.XII: 23 ej. (SAR,OAP)

2013

Sant Mateu: 29.IV: 1 ej. (VET)

Marjal d'Almenara: 15.I: 20 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 12.VII: 1 ej. en marjales de Massanasa. Primera cita postnupcial temprana (PMP); 11.IX: 257 ej. en marjales de Sollana y Catarroja (BDJ)

Utiel: 12.I: 4 ej. censo invernal en la presa del Sebillar (JAI)

Requena: 12.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 24.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP)

Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 25 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Salines de Santa Pola: 15.I: 13 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 03.X: 85 ej. (SAR)

Scolopax rusticola

Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

2012

Borriol: 19.II: 1 ej. junto al bco. de les Ermites (LPC)

El Toro: 04.I: 1 ej. (MGT)

Xeresa: 15.I: 1 ej. volando sobre naranjos (JML)

Pantà d'Elx: 08.II: 1 ej. en campo de naranjos (OAP)

2013

València: 14.XI: 1 ej. partida de Dalt cerca del casco urbano de València en una acequia de la huerta (JAI); 28.XI: 1 ej. recogido en el casco urbano y posteriormente liberada (RMB)

Albufera de València: 31.I: 1 ej. en un arrozal cercano al barranco de Beniparrell (PMP); 25.I: 1 ej. en el Racó de l'Olla (MCH,IRU); 28.XI: 1 ej. al amanecer que atraviesa volando la carretera frente al Saler. Primera cita invernal (JID)

Picassent: 10.XII: 1 ej. (DCM)

Xeresa: 03.I: 1 ej. a baja altura sobre los huertos de naranjos a última hora de la tarde (JML)

Sant Vicent del Raspeig: 26.XI: 1 ej. (JMT,AVDH)

Biar: 22.I: 1 ej. (JAG)

Chera: 20.XI: 1 ej. en el barranco del Agua, levanta el vuelo a nuestro paso (PRP)

Sot de Chera: 13.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP)

Limosa limosa**Aguja colinegra - Tètol cuanegra - Black-tailed Godwit**

Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 6 ej. (MBM)

Marjal de Sagunt: 27.VII: 1 ej. (JBC)

Albufera de València: 13.I: 96 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 08.II: 1.172 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU); 09.II: 1.950 ej. en la marjal de Alfafar (BDJ); 21.II: 3.300 ej. en marjales de Sueca. Máximo anual (BDJ,AAC); 28.II: 1.500 ej. en marjales de Silla (PMP); 03.III: 1.500 ej. en marjales de Catarroja (PMP,GMA); Citas estivales de 11 ej. el 03.VI en marjales de Sueca (BDJ), de 27 ej. el 12.VI en marjales de Sueca y Sollana (FPA,BDJ) y de 5 ej. el 15.VI en el tancat de Milia (CAV,AAC); 06.VIII: 53 ej. en marjales de Sollana (BMA,BDJ); 02.IX: 44 ej. en marjales de Valencia (BDJ); 11.XII: 132 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH)

Salines de Santa Pola: 10.I: 36 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15.II: 263 ej. (SAR,AJR); 18.VI: 148 ej. cita estival; 17.IX: 181 ej. (SAR)

El Fondo d'Elx: 12.I: 102 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 09.II: 319 ej.; 13.VI: 35 ej. cita estival (CMA); 28.VIII: 275 ej. (SAR)

2013

Albufera de València: 26.II: 2.250 ej. en marjales de Sueca. Máximo anual (AAC,JGR,BDJ); 19.III: 570 ej. en marjales de Catarroja (BMA,BDJ); 16.VIII: 51 ej. en marjales de Catarroja y Alfafar (BDJ); Cita estival de 1 ej. el 03.VI en el tancat de Milia presente hasta el 12.VI (AGU,AAC,FGN) y de 26 ej. el 20.VI en marjales de Sueca (AAC,FGN)

Salines de Santa Pola: 15.I: 134 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.IX: 498 ej. (SAR)

El Fondo d'Elx: 02.VII: 9 ej.; 12.VII: 218 ej. (AJR)

Limosa lapponica**Aguja colipinta - Tètol cuabarrat - Bar-tailed Godwit**

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012

Grau de Castelló: Citas prenupciales de 2 ej. el 26.IV, y de 1 ej. el 30.IV y el 14.V (PGR)

Albufera de València: 03.I: 2 ej. en la playa de la Malladeta junto con otros limícolas (EGO,BDJ); 18.IV: 2 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 20.IX: 1 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC)

Salines de Santa Pola: 02.I: 10 ej. presentes hasta el 12.I. Máximo anual (AJR); 15.II: 4 ej. (SAR,AJR); 12.IX: 2 ej.; 16.XI: 1 ej. (AJR); 14.XII: 1 ej. (SAR,OAP); 04.XII: 2 ej.; 13.XII: 2 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 07.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR)

2013

Vinaròs: 29.IV: 11 ad. en la zona SO resguardándose del temporal marino y de lluvia. La mayor parte en plumaje nupcial (ELL)

Peníscola: 29.IV: 1 ad. en la playa S en un día de temporal marino (ELL)

Marjal dels Moros: 29.IV: 1 ej. en la colonia de larolimícolas (VPA)

Albufera de València: 29.IV: 54 ej. en marjales de Sollana. Máximo anual (AAC,FGN); 29.IV: 25 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,GGA); 01.V: 15 ej. en marjales de Silla y Sollana (GCH); 09.V: 2 ej. en marjales de Catarroja (JPH,CAP,VDA,GLL); 21.V: 2 ej. en marjales de Sollana. Última cita prenupcial (AAC,FGN); 13.IX: 5 juv. en la Ratlla (GCH,BDJ); 16.IX: 3 ej. juv. en el tancat de Milia. Presentes hasta el 23.IX (AAC,FGN) 19.IX: 3 ej. en las praderas del campo de golf de la devesa (BDJ); 12.XI: 2 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO); 20.XI: 2 ej. en el Racó de l'Olla (JID,IRU,GGA)

Requena: 28.IV: 1 m. ad. primera cita para la comarca (PRP); 19.VIII: 1 ej. en paso postnupcial en los estanques (JAI)

Salines de Santa Pola: Cita invernal de 3 ej. el 22.I; 30.IV: 10 ej. máximo prenupcial; 03.V: 6 ej.; 25.X: 3 ej.; 12.XII: 4 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 30.IV: 2 ej. (AJR)

Numenius phaeopus

Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012

Peníscola: 08.XII: 1 ej. (RPB,ALR)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 3 ej. (RPB,ALR,ADP); 19.VIII: 2 ej. en la playa de carabineros (AMG)

Grau de Castelló: 27.VIII: 2 ej. (PGR)

Desem. riu Millars: 16.IV: 8 ej. descansant al cordó de graves de la desembocadura, després eixen en vol cap al N; Cita invernal de 1 ej. el 02.XII (MBM)

Marjal d'Almenara: 27.VII: 2 ej. (JBC)

Albufera de València: 13.II: 3 ej. en el tancat de Milia; 11.III: 2 ej. en marjales de Catarroja (AAC); 20.IV: 4 ej. en marjales de Sueca (EGO,BDJ); 05.VII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial de 1 ej. el 05.VII en el tancat de Milia (AAC); censos destacados en este encalve de 15 ej. el 19.VII (AGU,AAC) y de 5 ej. el 23.VII (AAC); 09.VIII: 17 ej. entran desde el mar rumbo SO en la playa de la Garrofera (JID,MRG); 10.VIII: 4 ej. en la Ratlla (BDJ); 01.VIII: 10 ej. en el tancat de Milia (AGU,JDO); 12.VIII: 44 ej. entrando desde el mar con rumbo NO en la playa del Brosquil. Máximo anual (MCH); 29.VIII: 2 ej. en el tancat de la Pipa (PVG)

Cap de l'Horta: 04.XI: 1 ej. (MAA)

Illa de Tabarca: 06.IX: 3 ej. (SAR)

Desemb. riu Segura: 06.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Cap Cervera: 15.X: 1 ej. (SAR)

2013

Platja d'Aiguaoliva: 04.VI: 2 ej. cita estival (ELL)

Desem. riu Millars: 02.II: 1 ej. (MBM)

Albufera de València: 10.II: 5 ej. en la marjal de Silla (MCC); 03.VII: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Primera

cita postnupcial (JID,JVM); 14.VII: 3 ej. en marjales de Sollana (BDJ); 22.VII: 3 ej. en el Racó de l'Olla (MCH,IRU); 29.VII: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,MLA); 01.VIII: 16 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual; 14.VIII: 8 ej. en el tancat de Milia; 26.VIII: 11 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 29.VIII: 5 ej. en las praderas del campo de golf de la devesa (BDJ); 15.IX: 5 ej. en el tancat de la Pipa (PVG)

Marjal de Pego-Oliva: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Salines de Santa Pola: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 16.VII: 2 ej. (CMA)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 06.VI: 1 ej. cita estival (SAR)

Cap Cervera: 21.X: 1 ej. (SAR)

Numenius arquata

Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 1 ej. (RPB,ALR,ADP)

Grau de Castelló: 14.II: 1 ej. descansant darrere d'unes herbes ruderals (PGR)

Albufera de València: 23.II: 12 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual; 26.III: 3 ej. en el tancat de Milia (AAC); 13.VI: 1 ad. en el tancat de la Ratlla. Cita estival (AMG); Cita estival de 1 ej. el 15.VI en el tancat de Milia (CAV,AAC) y censo destacado de 4 ej. el 16.VII (AAC); 14.XII: 2 ej. en marjales de Silla. Cita invernacional (PVG)

Cullera: 18.XI: 6 ej. en las marjales (JRA)

Salines de Santa Pola: 02.I: 7 ej. cita invernacional; 28.VI: 1 ej. cita estival; 19.X: 2 ej.; Cita invernacional de 3 ej. el 13.XII (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.XII: 1 ej. cita invernacional (AJR)

2013

Albufera de València: 24.II: 9 ej. en marjales de Sueca (GCH); 25.II: 6 ej. en marjales de Valencia (AAC,FGN); 14.III: 4 ej. en marjales de Silla (PMP). En el tancat de Milia cita de 3 ej. el 10.IV (AGU,AAC,FGN), 2 ej. el 09.V (AAC,FGN); nueva cita de 3 ej. el 03.VI, uno de los cuales permanece hasta el 20.VI (AGU,AAC,FGN); el 26.VI se observa un bando de 4 ej. en vuelo que podría tratarse de una temprana migración postnupcial (AAC,FGN); Por último, cita de 2 ej. el 09.VIII (GTR) y de 3 ej. el 16.IX (AAC,FGN)

Salines de Santa Pola: 05.I: Cita invernacional de 3 ej.; 03.V: 2 ej.; 27.IX: 4 ej.; 14.XI: 3 ej.; 19.XII: 2 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 19.VIII: 1 ej. (SAR)

Tringa erythropus

Archibebe oscuro - Xuí - Spotted Redshank

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 13.I: 101 ej. en el Racó de l'Olla. Máximo anual (JID,IRU); 14.III: 12 ej. en marjales de Catarroja (GLL); 18.III: 9 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 11.VII: 1 ad. en plumaje nupcial en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC); Censos destacados en esta localidad de 6 ej. el 22.VIII y de 17 ej. el 16.X (AAC) 24.IX: 18 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 05.XI: 53 ej. en el Racó de l'Olla. Concentración destacada (JID,GGA,IRU)

Requena: 13.IV: 1 ej. en paso prenupcial (JAI)

Salines de Santa Pola: 08.I: 13 ej. (MAA); 10.II: 12 ej.; 29.XII: 10 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.III: 6 ej.; 15.V: 6 ej. (CMA); 07.IX: 95 ej. concentración destacada (AJR)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: 2 ej. en el camí de la gola del Trenc (VET)

Marjal dels Moros: 29.IV: 1 ej. en la colonia de larolimícolas (FFA)

Albufera de València: 14.II: 12 ej. en marjales de Sueca; 07.III: 26 ej. en el Racó de l'Olla (BDJ); 26.IV: 11 ej. en el tancat de Mília (AAC,FGN); 28.IV: 4 ej. en marjales de Sollana (AAC,BDJ); 20.VI: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Cita estival (JID); 31.VII: 1 ej. en el tancat de Mília; 16.IX: Bando destacado de 24 ej. en el tancat de Mília (AAC,FGN); 20.IX: 12 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 11.X: 27 ej. en el tancat de la Pipa. Máximo anual (PVG,SEO); 22.XI: 16 ej. en el Racó de l'Olla (JID,GGA)

Requena: 04.IV: 1 ej. en paso prenupcial por los estanques (JAI)

Salines de Santa Pola: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25.I: 4 ej. cita invernal (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.IV: 1 ej.; 11.IX: 8 ej. (CMA); 06.XI: 16 ej. (SAR)

Desemb. riu Segura: 07.III: 3 ej. (SAR)

Tringa totanus**Archibebe común - Tifort - Common Redshank**

Estatus: Visitante estival, migrante moderado, invernante escaso. Conservación: EP

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 28 ej. 1 en la playa junto a la gola del Trenc y el resto en parcela roturada (VET)

Grau de Castelló: 27.IV: 42 ej. concentración destacada (PGR); 25.VII: 3 ej. Primera cita postnupcial (MBM)

Marjal d'Almenara: 21.V: 8 ej. (JBC)

Marjal dels Moros: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 31.V: 1 ej. en la marjal de Massanassa. Última cita prenupcial (VVA); Citas estivales de 1 ej. el 05.VI en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU) y de 2 ej. el 20.VI en el tancat de Mília (CAV,AAC); 16.VII: 70 ej. en el tancat de Mília. Concentración destacada (AAC)

Requena: 14.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (JAI)

Salines de Santa Pola: 10.I: 29 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.IV: 100 ej. máximo anual (AJR)

El Fondo d'Elx: 12.I: 9 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: Concentración destacada de 25 ej.; 17.X: 13 ej. (CMA)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.IV: 6 ej. (RPB,ALR)

Illes Columbretes: 06.VII: 1 ej. (LGB)

Desemb. riu Millars: 28.IV: 5 ej. (MBM)

Marjal de Sagunt: 20.XII: 1 ej. Cita invernal (JLB)

Marjal dels Moros: 26.IV: 2 ej. en la colonia de larolimícolas, cópulas y cebas (FFA)

Albufera de València: Cita invernal de 1 ej. el 27.I en l'estany del Pujol (GCH); 12.III: 40 ej. en el tancat de Mília. Una de las aves porta anilla de lectura procedente de Holanda (AAC,FGN); 19.III: 80 ej. dispersos por zonas fangueadas de la Naia, els Pescadors y la Sardina (BMA,BDJ); 29.IV: 91 ej. en marjales de Sollana (AAC,FGN); 19.V: 27 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 23.V: 42 ej. en dos grupos en campos recién encharcados del tancat de la Sardina (SEOV); 07.VI: 1 ej. en el tancat de Mília. Cita estival (AAC,FGN); 26.VII: 6 ej. (4 juv.) en marjales de Sollana (BDJ); 17.VII: 26 ej. en el tancat de Mília (AAC,FGN)

Requena: 28.IV: 5 ej. (RMB)

Salines de Santa Pola: 15.I: 57 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 29.IV: 38 ej. (SAR); 21.V: 31 ej. (CMA)

Hondo de Amorós: 05.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR)

Tringa stagnatilis

Archibebe fino - Siseta - Marsh Sandpiper

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012

Albufera de València: Citas en el tancat de Milia de 2 ej. el 28.VI Primera cita postnupcial; 4 ej. el 29.VI (CAV,AAC) y 3 ej. el 30.VI (GTR); 1 ej. el 02.VII (AAC) y el 16.VII; última cita anual de 2 ej. el 17.VII (CAV,AAC)

Clot de Galvany: 17.IV: 1 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 02.I: 1 ej. cita invernal (MLP); 21.IV: 2 ej. única cita prenupcial (SCR); 28.VIII: 6 ej. concentración destacada (MLP); 30.VIII: 16 ej. máximo anual (AJR); 02.IX: 6 ej. (OAP); 13.IX: 9 ej. concentración destacada; 02.X: 5 ej. (AJR); 17.X: 1 ej. (CMA)

2013

Desem. riu Millars: 28.IV: 1 ej. vist varios dies a una zona fangejada menjant amb un grup de camallongues i de tiforts (MBM)

Albufera de València: 16.III: 1 ej. en l'estany del Pujol. Primera cita prenupcial (EGN,JWE,SBNT); 17.IV: 1 ej. en el tancat de Milia; cita estival de 1 ej. el 17.VI en el tancat de Milia y primera cita postnupcial de 2 ej. el 11.VII (AAC,FGN); 18.VII: 1 ej. en marjales de Sollana. Presente hasta el 21.VII (PMP); 16.VIII: 3 ej. en el tancat de Milia. Ya con plumaje invernal (AAC,FGN)

El Fondo d'Elx: 19.VIII: 1 ej.; 25.VIII: 2 ej. (SAR); 04.IX: 2 ej.; 19.IX: 1 ej. (AJR); 11.XI: 1 ej.; 07.XII: 1 ej. cita invernal (OAP)

Tringa nebularia

Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Grau de Castelló: Concentraciones destacadas de 17 ej. el 20.IV y de 24 ej. el 27.IV (PGR); 18.VIII: 2 ej. (MBM)

Albufera de València: 10.I: Concentración destacada de 55 ej. en el Racó de l'Olla (JID); cita estival de 1 ej. el 20.VI en el tancat de Milia; concentración postnupcial de 12 ej. el 16.VII (CAV,AAC); 03.VIII: 24 ej. en el tancat de la Pipa (BDJ); Máximo anual de 67 ej. el 28.VIII en marjales de Sollana (AAC); 24.IX: 28 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 20.XI: 23 ej. en marjales de Sueca (EGO,BDJ); 26.XI: 32 ej. en el Racó de l'Olla (JID); 08.XII: 24 ej. en l'estany del Pujol (JHZ,BDJ)

Salines de Santa Pola: 17.IV: 25 ej. (AJR)

El Fondo d'Elx: 22.III: 7 ej.; 17.IX: 34 ej. (CMA)

Desemb. riu Segura: 02.I: 3 ej. (AJR)

2013

Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 4 ej. (VET)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: Estol de 40 ej. en el camí de la gola del Trenc (VET)

Albufera de València: Citas invernales de 34 ej. el 27.I en l'estany del Pujol (GCH) y de 19 ej. el 26.II en marjales de Valencia (AAC,FGN); 07.III: 21 ej. en el Racó de l'Olla (BDJ); Máximo prenupcial de 52 ej. el 29.IV en el tancat de Milia y citas estivales de 3 ej. el 03.VI, con 1 ej. presente aún el 11.VI; Máximo postnupcial

de 54 ej. el 29.VII (AAC,FGN); 06.VIII: Grupo de 28 ej. en la Travessa (GLL); 26.VIII: 52 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 02.IX: 11 ej. en el tancat de la Ratlla; 07.XII: 26 ej. en l'estany del Pujol. Cita invernal (BDJ)
Requena: 27.IV: 25 ej. (PRP)

Embalse de Beniarrés: 28.IV: 17 ej. (BOR)

Salines de Santa Pola: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 10.X: 5 ej. (SAR,AJR); 15.XI: 3 ej. (CMA)

Desemb. riu Segura: 05.I: 2 ej. cita invernal (AJR)

Tringa flavipes

Archibebe patigualdo chico - Tifort groc petit - Lesser Yellowlegs

Estatus: Divagante del N de América

2013

Albufera de València: 23.IX: 1 juv. en el tancat de Milia. Sigue observándose en diferentes puntos de l'Albufera hasta el 12.X (AAC,FGN)

Cita homologada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Tringa ochropus

Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper

Estatus: Visitante estival e invernante escaso, migrante moderado. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 2 ej. (MBM); 06.V: 10 ej. (RPB,VOO)

Desem. riu Millars: 29.III: 4 ej. (GUM); 17.X: 5 ej. (MBM)

Marjal d'Almenara: 10.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 03.II: 9 ej. (JBC)

Marjal dels Moros: 07.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 13.I: 20 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 12.III: 22 ej. en el tancat de Milia (AAC); 21 ej. el 05.VIII en marjales de Sollana (BDJ) subiendo a 32 ej. el 09.VIII (CAV,AAC); Máximo anual de 102 ej. el 12.VIII en marjales de Silla y Sollana (JRU,BDJ)

Requena: 04.III: 16 ej. aprovechando el bajo nivel de agua que ha dejado al descubierto la mitad de la superficie de la balsa (PRP); 31.VIII: 10 ej. máximo numérico postnupcial; 31.XII: 7 ej. (JAI)

Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 01.X: 8 ej. (SAR); 13.XII: 9 ej. (AJR)

2013

Embalse de M^a Cristina: 09.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Desem. riu Millars: 29.III: 5 ej. (MBM)

Marjal d'Almenara: 15.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Olocau: 13.I: 1 ej. en una balsa de riego (TPA, MCC)

Lliria: 13.I: 3 ej. (TPA,MCC,MHS,RGG)

Albufera de València: 11.I: 16 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 09.IV: 5 ej. en l'estany del Pujol (BDJ); citas estivales de 1 ej. el 15.VI en el tancat de la Ratlla (GCH) y el 19.VI en marjales de Valencia (MCH,IRU); 08.VII: 23 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 18.VIII: 23 ej. en marjales de Catarroja (BDJ); 27.VIII: 34 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,BDJ)

Utiel: 12.I: 2 ej. censo invernal presa del Sebillar (JAI)

Requena: Censos destacados en la balsa el Pontón 12.I: 7 ej. censo invernal de aves acuáticas; 17.III: 9 ej.; 19.VIII: 8 ej. en paso postnupcial; 22.IX: 9 ej. en paso postnupcial; 02.XI: 9 ej.; 07.XII: 3 ej. presencia

invernal (JAI)

Emb. de Forata: 12.I: 2 ej. censo invernal (JAI)

Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Monòver: 30.I: 2 ej. recorriendo las orillas de río Vinalopó (VGC)

El Fondo d'Elx: 02.VII: 2 ej. (AJR); 24.IX: 10 ej. (SAR)

Tringa glareola

Andarríos bastardo - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper

Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 38 ej. en parcelas roturadas (VET)

Marjal de Moncofa: 11.IV: 9 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: Cita estival de 1 ej. el 20.VI; 27.VII: Concentración destacada de 68 ej. (JBC)

Albufera de València: 13.I: 34 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 27.III: 26 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC); 15.VI: 3 ej. en el tancat de Milia. Cita estival (CAV,AAC); 12.VII: 30 ej. en el tancat de Milia (AAC); 10.VIII: 166 ej. en marjales de Silla, Sollana y Catarroja. Máximo anual; Concentraciones postnupciales destacadas de 95 ej. el 06.VIII en marjales de Silla y Sollana; de 73 ej. el 09.IX en marjales de Silla y Valencia y de 43 ej. el 23.IX en la Ratlla (BDJ)

Requena: 15.IV: 1 ej. en paso prenupcial. Llevan al menos 3 días (JAI)

El Fondo d'Elx: 02.I: 4 ej. (AJR); 15.V: 38 ej.; 17.X: 18 ej. (CMA)

2013

Albufera de València: 18.II: 6 ej. en marjales de Catarroja. Primera cita prenupcial (PMP); 09.III: 23 ej. en marjales de Albal (BMA,BDJ); 01.VII: 5 ej. en marjales de Alfafar. Primera cita postnupcial (BDJ); 10.VII: 25 ej. en marjales de Massanasa (PMP); 14.VII: 44 ej. en marjales de Alfafar, Massanasa y Sollana (BDJ); 06.VIII: 45 ej. en marjales de Catarroja. Máximo anual (BDJ); 03.IX: 35 ej. en el tancat de la Ratlla (JGN,PMP,BDJ)

Requena: 26.IV: 34 ej. Grupo numeroso sedimentado durante varios días (PRP); 22.VIII: 4 ej. en paso postnupcial en los estanques (JAI)

El Fondo d'Elx: 15.I: 3 ej. Cita invernal (AJR); 29.IV: 18 ej.; 19.VIII: 7 ej.; 23.IX: 35 ej. (SAR); 07.XII: 2 ej. cita invernal (OAP)

Hondo de Amorós: 18.I: 9 ej. cita invernal (AJR)

Actitis hypoleucos

Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper

Estatus: Visitante estival, migrante común, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 24.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (MBM); 22.IV: 14 ej. concentrados en la playa junto a la gola del Trenc (VET); 06.V: 17 ej. concentración destacada (RPB,VOO)

Grau de Castelló: 15.I: Cita invernal de 2 ej. (MBM); 12.IV: 6 ej.; 27.VIII: 8 ej. (PGR)

Marjal d'Almenara: 20.VII: 3 ej. zona inundada límite con provincia de Valencia; 01.VIII: 5 ej. (JBC)

Emb. de Benagéber: 21.IV: 4 ej. en la cola del embalse (JAI)

Requena: 15.IV: 20 ej. concentración destacada en la balsa El Pontón (JAI)

Albufera de València: 06.V: 6 ej. en la playa del Brosquil (MAL,LAA); 12.VII: 3 ej. en el tancat de Milia, primera cita postnupcial; 02.VIII: 16 ej. en el tancat de Milia (AAC)

Piles: 05.V: 4 ej. (AMG)

Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Monòver: 19.IV: 2 par. en el río Vinalopó peleando por el territorio (VGC)

Pantà d'Elx: 21.VIII: 5 ej. (OAP)

Salines de Santa Pola: 10.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

El Fondo d'Elx: 06.VIII: 23 ej. máximo anual (SAR)

2013

Vinaròs: 24.V: 8 ej. en las rocas del espigón S (ELL)

Sant Jordi: 07.III: 1 ej. la balsa de riego, primera cita prenupcial (ELL)

Desemb. del Sènia: 06.VIII: 2 ej. (FPV)

Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 4 ej. (VET)

Desem. riu Millars: 12.V: 4 ej. (MBM)

Torrebaja: 05.V: 1 par. en zona apropiada para la reproducción (RMB)

Albufera de València: 06.V: 8 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 07.V: 10 ej. en l'estany del Pujol (JID,MCH); 08.VIII: 34 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 22.VIII: 9 ej. en el estany de Cullera (EGO,BDJ); 03.IX: 13 ej. en l'estany del Pujol (VBJ)

Requena: Citas en la balsa El Pontón: 27.IV: 60 ej. máximo anual (PRP); 15.V: 10 ej.; 04.VIII: 20 ej. (RMB); 19.VIII: 14 ej. Paso postnupcial en los estanques (JAI)

Cap de Cullera: 07.IX: 23 ej. migrando por el mar (MAL,ASL,JCM,LAA)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 27.VII: 8 ej. (VBJ)

Pantà d'Elx: 28.VII: 6 ej. (OAP)

El Fondo d'Elx: 16.VII: 7 ej. (CMA)

Hondo de Amorós: 05.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial (AJR)

Desemb. riu Segura: 31.VII: 42 ej. Concentración destacada (AJR)

Arenaria interpres

Vuelvepiedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Grau de Castelló: 30.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (PGR)

Borriana: 27.I: 5 ej. (JBC); 14.IV: 1 ej. Censo aves marinas RAM (JBC,JLB)

Albufera de València: 26.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 08.VIII: 2 ej. en el tancat de la Ratlla (FLL,JRU); 28.VIII: 3 juv. en el tancat de Milia (AAC); 04.IX: 2 juv. en el tancat de la Ratlla (CAV,AAC); 18.IX: 1 ej. en l'estany del Pujol (BDJ)

2013

Benicarló: 06.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (JLA)

Alcossebre: 10.V: única cita anual de 5 ej. (DES)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: 16 ej. en la gola del Trenc. Primera cita prenupcial y máximo anual (VET)

Marjal dels Moros: 16.V: 1 ej. Última cita prenupcial (PRP); 14.VIII: 4 ej. (VBJ); Máximo anual de 6 ej. el 04.IX (VPA); 21.IX: 2 ej. (RMB); 15.X: 1 ej. Última cita postnupcial (PRP)

Albufera de València: 29.IV: 6 ej. en el Racó de l'Olla. Primera cita anual de la especie. Una de las mayores concentraciones de la especie registrada en l'Albufera (JID,MCH,GGA); aún 3 ej. el 03.V (JID,MCH,IRU,GGA); 29.IV: 2 ad. en el tancat de Milia; 03.IX: 2 juv. y 1 ad. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 14.IX: 2 ej. en los filtros verdes del tancat de la Pipa (GCH,PVG); 03.IX: 2 juv. en l'estany del Pujol (VBJ)

Santa Pola: 01.II: 3 ej. cita invernal (JDL)

Limícola de llegada tardía y relativamente escaso en la CV que ha dejado en 2013 una concentración inusual de 16 ej. en el Prat de Cabanes-Torreblanca. Tan solo una cita invernal de 5 ej. en el puerto de Burriana.

Phalaropus lobatus**Falaropo picofino - Escuraflascons bec-fi - Red-necked Phalarope**

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2013**Albufera de València:** 23.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN)***Phalaropus fulicarius*****Falaropo picogruoso - Escuraflascons bec-gros - Grey Phalarope**

Estatus: Migrante e invernante raro. Conservación: IE

2012**Requena:** 18.V: 1 ej. presente hasta el 20.V. Primera cita de la especie en esta zona de interior (PRP)

STERCORARIIDAE

Stercorarius pomarinus**Págalo pomarino - Paràsit cuaample - Pomarine Skua**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012**Cap de Cullera:** 01.XII: 1 ej. de FC, aparentemente ad., observado en vuelo hacia el N (MAL,JAA,JTN, PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)**Desemb. riu Segura:** 30.XII: 1 ej. (MAA)**Cap Cervera:** 19.X: 1 ej. (SAR)**2013****Cap de Cullera:** 02.III: 1 ej. de FC en vuelo hacia el S (LAA,MAL,ATE,JTN)

El invierno de 2012 ha supuesto un buen año para la presencia de aves marinas invernantes en el litoral de la Comunidad Valenciana, también para el caso del págalo pomarino que aunque no es raro, sus citas son poco abundantes por tener costumbres más pelágicas que el grande y el parásito.

Stercorarius parasiticus**Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua**

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012**Borriana:** 10.XI: 1 ej. (JBC,JLB,VAT)**Sagunt:** 26.III: 1 ej. (TMF)**València:** 06.XII: 1 ej. (JAI)**Cap de Cullera:** 14.IV: 1 ej. FO, dirección N (MAL,JLO,LAA); 10.XI: 2 ej. dirección S (MAL,JTN,ASL, JCM,MRG,TPE,LAA)**Cap Cervera:** 13.I: 2 ej.; 14.I: 1 ej. FO hacia el N (AJR); 24.X: 1 ej. (SAR)

2013**Benicarló:** 29.VIII: 2 ej. (JLA)**Alcossebre:** 13.I: 2 ad.; 30.X: 1 ad. (DES)**Cap de Cullera:** 02.III: 1 ej. de FC en dirección S (MAL,ATE,JTN); 06.IV: 1 ej. de FO acosando a charranes patinegros (LAA,GCH,CAZ,VDA)**Tavernes de la Vallidigna:** 07.XII: 1 ej. de FO (LAA)**Gandía:** 07.I: 1 ej. (PLP)**Cap Cervera:** 27.X: 2 juv. (SAR)

De entre todas las citas recibidas destaca la observación temprana de 2 ej. el 29.VIII en Benicarló, el resto se encuentran dentro del periodo habitual de presencia de la especie.

Stercorarius longicaudus**Págalo rabero - Paràsit cuallarg - Long-tailed Skua**

Estatus: Divagante del Ártico

2012**Albufera de València:** 25.XI: 1 juv. de FO observado a corta distancia desde la gola del Pujol (JRU,APLA)**2013****Tavernes de la Vallidigna:** 07.XII: 1 ej. junto a un págalo parásito acosando a un charrán patinegro (LAA)

Segundo y tercer año consecutivo que recibimos citas de esta especie en la provincia de Valencia, en este caso, ambas durante el periodo invernal.

Stercorarius skua**Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012**Borriana:** 10.XI: 2 ej. (JBC,JLB,VAT)**La Pobla de Farnals:** 14.I: 1 ej. (TPA)**València:** 27.XII: 1 ej. (RMB)**Albufera de València:** 21.I: 3 ej. (VLG,BDJ); 29.I: 1 ej. (JRU); 20.XII: 2 ej. (VPA); 23.XII: 1 ej. (JRU)**Cap de Cullera:** 14.I: 1 ej. (JTN,JSN,MMN,JPR,CAZ,VDA,VPA,LAA); 14.IV: 5 ej. uno de ellos acosando a un charrán patinegro (MAL,JLO,LAA); 05.V: 1 ej. dirección S (JLO,LAA); 01.XII: 1 ej. dirección N (MAL,JA,AA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)**Gandía:** 19.XII: 3 ej. (TMF,PAS)**Cap de Santa Pola:** 14.III: 1 ej. (MLP)**Desemb. riu Segura:** 30.XII: 1 ej. (MAA)**Guardamar del Segura:** 14.I: 1 ej. (AJR)**2013****Benicarló:** 26.IX: 1 ej. (JLA)**Cap de Cullera:** 12.I: 1 ej. dirección N (MAL,PVG,VPA,LAA); 02.II: 2 ej. (LAA); 06.IV: 2 ej. dirección N (CAP,VDA,LAA); 06.VII: 2 ej. dirección S (ASL,LAA); 27.XII: 2 ej. (CAV,AAC); 29.XII: 1 ej. (MNY)**Tavernes de la Vallidigna:** 01.XI: 2 ej. (LAA,MAL)**Cap de l'Horta:** 12.I: 5 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 29.XII: 2 ej. (AJR)

LARIDAE

Larus melanocephalus**Gaviota cabecinegra - Gaviota capnegra - Mediterranean Gull**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante y migrante común. Conservación: IE

2012

Peníscola: 04.II: 202 ej. en 3 h. de observación (censo RAM) (ELL)

Grau de Castelló: 30.IV: 7 ej. (PGR)

Desem. riu Millars: 10.II: 250 ej. dentro del puerto (JBC)

Borriana: Concentraciones destacadas de 573 ej. el 19.I; 600 ej. el 23.II y de 556 ej. el 14.XI; primera cita postnupcial de 1 ej. el 18.VII (JBC)

Nuevo cauce del Turia: 04.II: 230 ej. sesteando en la desembocadura (AAC)

Albufera de València: 550 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 21.VI: 2 ej. volando en el Racó de l'Olla. Primera cita de aves en vuelo nacidas la presente temporada (JID,MCH); 14.XI: 200 ej. en arrozales de Pinedo volviendo al mar al atardecer. Es muy probable que los fuertes vientos de levante hayan hecho que el grupo se refugiara en los arrozales y volvieran al mar para dormir (AAC)

Salines de Santa Pola: Concentraciones destacadas de 779 ej. el 31.VIII (AJR) y de 887 ej. el 17.IX (SAR); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 23.VII: 350 ej. (SAR); 82 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

2013

Port de Vinaròs: 05.VIII: 5 ej. (FPV)

Peníscola: Censos destacados de la RAM de 311 ej. el 12.I (ELL, FRJ); 476 ej. el 02.II en día de fuerte viento (ELL); 563 ej. el 02.III. En la playa sur se controlan varios ej. anillados: 1 ad. con anilla blanca [32P2] anillada en Bélgica el 31.V.2004. 1 ad. con anilla verde [T982] anillada en Turquía el 13.VI.2009 (ELL, FRJ); 06.VII: 3 ad. (ELL); 14.XII: 526 ej. varias con anillas azules (ELL)

Prat de Cabanes-Torreblanca: Cita tardía de 2 ej. el 04.V (MBM)

Nuevo cauce del Turia: 28.II: 235 ej. en el mar (mayoría ad. y solo 6 aves de 1.ª inv.). Fuerte arribada de aves asociada con el fuerte temporal del NE; 28.XI: 387 ej. (21 de 1.ª inv.). Presencia destacada coincidente con la entrada de un temporal de mar del NE; aún 234 ej. el 01.XII (BDJ)

Albufera de València: 286 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 04.VII: 2 ej. realizando vuelos cortos en el Racó de l'Olla. Primera observación de jóvenes en vuelo de la temporada, en una fecha algo más tardía que en años anteriores (JID,MCH); 25.VII: 32 ej. (11 juv.) alimentándose en un campo en barbecho recién inundado en zonas de huerta de Massanassa (BDJ); 08.VIII: 38 ej. en el tancat de Milia, curiosamente, todos de 2.º año (AAC,FGN)

Cap de Cullera: 02.II: 5 ej. Censos RAM (LAA)

Salines de Santa Pola: 18.IX: 643 ej. (SAR); 242 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

El Fondo d'Elx: 02.X: 384 ej. (CMA); 92 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Desemb. riu Segura: 12.IX: 250 ej. (SAR,AJR)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 174 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Larus ridibundus**Gaviota reidora - Gavina vulgar - Black-headed Gull**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

2012**Peñíscola:** 04.II: Censo destacado de 239 (ELL)**Port de Borriana:** 27.II: 250 ej.; concentración postnupcial de 42 ej. el 27.VII; 20.XII: 190 ej. (JBC)**Marjal d'Almenara:** 20.VII: 117 ej. zona inundada límite con provincia de Valencia (JBC); 17.XII: 1.265 ej. (JBC)**Albufera de València:** 11.VI: Primera cita de 1 juv. nacido la presente temporada volando en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU)**Cap de Cullera:** 04.II: 2.560 ej. en el censo de la RAM (LAA)**El Fondo d'Elx:** Censos destacados de 1.559 ej. el 22.III y el 15.V; 3.098 ej. el 01.VIII y 1.585 ej. el 21.XI (CMA)**2013****Peñíscola:** 12.I: Censos destacados en la RAM de 452 ej. el 12.I (ELL, FRJ) y de 278 ej. el 14.XII (ELL)**Canet d'en Berenguer:** 12.I: 707 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)**Albufera de València:** 12.VI: 1 juv. realizando vuelos cortos en el Racó de l'Olla. Primera observación de un joven de la especie nacido la presente temporada (JID)**Requena:** 08.VI: 3 ej. en plumaje nupcial en paso (JAI)**Cap de Cullera:** 12.I: 251 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 01.VI: 10 ej. en censo de la RAM (LAA)**El Fondo d'Elx:** 26.III: 4.133 ej.; 16.VII: 2.351 ej.; 15.XI: 1.388 ej. (CMA)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Marjal de Peñíscola	0	130	0	378
Marjal de Almenara	0	2.433	0	1.525
Marjal dels Moros	3	62	25	-
Cauce nuevo del río Turia	0	430	0	90
Albufera de Valencia	1.324	20.675	858	15.282
Marjal de Pego-Oliva	0	126	0	250
Clot de Galvany	0	0	9	0
Salinas de Santa Pola	86	162	368	34
El Fondo	1.529	3.276	181	3.450
Desem. del río Segura	0	354	0	240
Lagunas de la Mata-Torrevieja	207	623	81	138

Censos de gaviota reidora en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que nidifica y aquellas con más de 100 ej. invernantes. Se detecta como nidificante en 5 (2012) y 6 (2013) localidades de un total de 33 humedales censados para un total de 3.149 (2012) y 1.522 parejas (2013). Como invernante los totales ascienden a 28.478 ej. (2012) y a 21.620 (2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. - Dato no disponible

Larus cirrocephalus**Gaviota cabecigrís - Gavina capgrisa - Grey-headed Gull**

Divagante de Sudamérica y de África subsahariana

2013

Albufera de València: 11.VI: 1 ad. con plumaje nupcial sesteando en el saladar del Racó de l'Olla. Se observa durante un breve espacio de tiempo, hasta que la gaviota sale volando hacia los arrozales. Tras una intensa búsqueda a lo largo del día, el ejemplar no es relocalizado. La especie se distribuye por el África subsahariana y por Sudamérica. De ser aceptada por el comité de rarezas de SEO/BirdLife supondría la tercera cita española, tras las observaciones realizadas entre junio y agosto de 1971 en las marismas del Guadalquivir y en febrero de 2005 en la isla de Gran Canaria. Las citas de esta especie al N del Sáhara son muy raras y coincidiendo con esta cita se conoce la presencia de otro ejemplar con aspecto de adulto cerca de Bari, en la costa adriática al S de Italia (JID,MCH)

Larus genei**Gaviota picofina - Gavina capblanca - Slender-billed Gull**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: VUL

2012

Puerto de Castellón: Muy escasa en Castellón. Citas de 2 ej. el 30.IV, 1 ej. el 02.V, y 3 ej. los días 07.V y 07.VI (PGR)

Albufera de València: 41 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Citas en la colonia del Racó de l'Olla: 16.III: 13 ej. (JID,MCH,IRU); 02.V: 10 ad. Cifras de presencia muy moderada hasta la fecha durante la presente temporada; 28.V: 127 ej. alimentándose de invertebrados. Notable aumento de efectivos a lo largo del mes (JID,MCH); 05.VII: Varios juv. volando. Primera cita de aves en vuelo nacidas la presente temporada (JID); 02.VIII: 1 juv. Es el único ejemplar que queda en la reserva (JID,MCH).

18.III: 1 ej. en un campo encharcado próximo al Malvinar (RMQ); 08.VIII: 1 ad. acompañado de 1 juv. en el tancat de Milia. Las citas de esta especie en la reserva son bastante escasas (CAV,AAC); 13.XI: 1 ej. de 1.º inv. en arrozales inundados cerca del tancat de Noira. Apenas existen citas tardías después del mes de septiembre (BDJ)

Salines de Santa Pola: 05.I: 272 ej. (AJR); 378 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 15.VII: 486 pollos (SAR); Censo invernal destacado de 273 ej. el 13.XII (AJR);

El Fondo d'Elx: Censos primaverales y estivales de 47 ej. el 15.V (SAR) y de 79 ej. el 13.VI; Censos post-nupciales destacados de 319 ej. el 01.VIII (CMA); 700 ej. el 13.VIII (SAR) y última cita de 7 ej. el 17.IX (CMA)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

2013

Grau de Castelló: 21.I: 1 juv. lleva anilla de PVC. Anillada como pollo el 03.VII.2012 en Almería. Nuevas citas los días 8 y 11.II (PGR)

Albufera de València: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 22.II: 1 ad. alimentándose en campos fangueados en el tancat del Fangar. El ave porta anilla de lectura a distancia. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 21.III: 3 ad. realizando vuelos de cortejo sobre el Racó de l'Olla. Primera cita prenupcial en la reserva (MCH,JID,GGA,IRU); 11.VII: 2 juv. volando en el Racó de l'Olla. Es la primera observación de jóvenes en vuelo de la temporada (JID,MCH)

Cap de Cullera: 04.V: 2 ej. durante el censo de la RAM (LAA)

Alacant: 08.V: 78 ej. en la desem. del bco. de las Ovejas (AJR)

Salines de Santa Pola: 544 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV: 15.I: 133 ej. Censo de aves

acuáticas invernantes de la CV; Censos postnupciales destacados de 836 ej. el 18.IX (SAR,AJR) y de 1.200 ej. el 25.X (AJR);

Salines de Santa Pola: 01.II: 2 ej. (JDL)

El Fondo d'Elx: 22.IV: 3 ej.; 18.VI: 120 ej. (CMA); 19.VIII: 1.200 ej.; 11.IX: 200 ej. (SAR)

Desemb. riu Segura: 11.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Llacunes de La Mata i Torreveija: 09.IX: 106 ej. (SAR)

Larus audouinii

Gaviota de Audouin - Gavina corsa - Audouin's Gull

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante común, invernante escaso. Conservación: PE

2012

Platja d'Almassora: 03.I: 15 ej. (MBM)

Desem. riu Millars: 06.I: 6 ej. (MBM)

Borriana: 19.I: Censo invernal de 52 ej.; Censos destacados de 218 ej. el 09.III y de 220 ej. el 25.VI (JBC)

Albufera de València: 31.I: 141 ad. en zonas fangueadas de la Partideta (EGO,BDJ); 10.III: 500 ej. en varios grupos entre el Malvinar y l'estany de la Plana. Fuerte entrada de aves en migración prenupcial (PVG)

Salines de Santa Pola: 20.I: 142 ej.; 16.XI: 294 ej. (AJR)

Llacunes de La Mata i Torreveija: 26.II: 589 ej. (SAR)

2013

Peñíscola: Censos destacados durante la RAM de 2 ej. el 12.I (ELL,FRJ) y de 100 ej. el 06.IV y de 120 ej. el 06.VII (ELL)

Canet d'en Berenguer: 12.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)

Albufera de València: 31.I: 62 ej. dispersos por zonas ya fangueadas de la Partideta y la Calderería. Primeros grupos de importancia asociados con los trabajos de fangueo de los arrozales (BDJ); 19.III: 290 ej.

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Marjal de Peñíscola	0	0	0	12
Prat de Cabanes-Torreblanca	1	0	0	4
Puerto de Castellón	1.642	0	2.741	0
Marjal de Almenara	3	0	0	0
Marjal dels Moros	0	4	0	0
Marjal de Rafalell y Vistabella	0	0	0	3
Albufera de Valencia	742	0	474	5
Marjal de Pego-Oliva	0	43	0	137
Saladar de Aguamarga	0	12	0	10
Salinas de Santa Pola	0	39	0	21
Desem. río Segura	0	2	0	0
Lagunas de la Mata-Torreveija	2.525	0	2.189	12

Censos de gaviota de Audouin en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se ha detectado como nidificante o invernante. La nidificación se ha registrado en 5 (2012) y 3 (2013) localidades de un total de 33 humedales censados para un total de 3.149 (2012) y 1.522 parejas (2013). Como invernante los totales ascienden a 108 (2012) y 205 ej. (2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

en zonas inundadas y fangueadas (BMA,BDJ)

Cap de Cullera: 12.I: 5 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (LAA); 03.VIII: 68 ej. hacia el S (JAA,PPF,GCH,BOR); 14.XII: 10 ej. observados en el censo de la RAM (LAA)

Gandía: 12.I: 20 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (BOR)

Oliva: 12.I: 4 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)

Cap de l'Horta: 12.I: 57 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

Llacunes de La Mata i Torreveija: 22.II: 1.557 ej. (SAR,OAP); 21.III: 1.607 ej. (SAR)

Larus delawarensis

Gaviota de Delaware - Gavina de Delaware - Ring-billed Gull

Estatus: Divagante de Norteamérica

2012

Grau de Castelló: 02.IV: 1 ad. integrado en un grupo de audouines, posiblemente se trata del ej. de Burriana (PGR)

Borriana: 01.II: 1 ad. posiblemente, el mismo de años anteriores; nuevas citas de este ej. el 26.III, el 23.XI y el 27.XII (JBC)

Albufera de València: 13.II: 1 ej. de 1.º inv. mudando a 1.º verano en el tancat de Caro (AAC)

2013

Grau de Castelló: 06.III: 1 ad. (PGR)

Borriana: 26.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 19.XI: De nuevo el ad. que nos visita todos los inviernos desde el año 2005. Varias citas más hasta final de año (JBC)

Estany de Nules: 31.XII: 1 ad. limpiándose el plumaje en l'estany junto a gaviotas de Audouin, reidoras y cabecinegras (JBC,ILB)

En 2013, la gaviota que nos visita desde 2005, cuando era un ej. juvenil, ha extendido algo el rango geográfico en el que se ha observado: desde el puerto de Castellón hasta l'estany de Nules. Aunque, salvo el primer año, cuando se observó mudando en verano en el puerto de Castellón y en el Burriana, las citas se restringen de finales de noviembre a finales de marzo o finales de abril según los años.

Larus canus

Gaviota cana - Gavina cendrosa - Mew Gull

Estatus: Invernante raro, migrante escaso. Conservación: IE

2012

Vinaròs: 05.XII: 1 ej. 2.º inv. posado y descansando en la zona SO del puerto junto a otras especies de gaviota (ELL); 27.XII: 1 subad. posado en el puerto junto a gaviota de Audouin (ELL,FRJ)

Port de Castelló: 25.I: 1 ad.; 10.II: 1 inm. y 1 ad. Por los detalles del plumaje, se aprecia que al ad. es diferente al detectado en enero; 22.II: 1 ej. sembra un 2.º hivern, però la llum no és bona i podria ser un adult; 30.IV: 1 ej.; 16.XI: 1 ad. diferent de l'observat fa pocs dies a Borriana; 20.XI: 2 juv., un d'ells sembra ser el observat fa uns dies a Borriana; 29.XI: 1 juv. (PGR)

Port de Borriana: 15.II: 1 ad. alimentándose de los peces que tiran de los barcos junto a otras especies; Citas de 1 ej. de 1.º inv. los días 13, 21 y 23.XI; 1 ad. el 14.XI (JBC)

Albufera de València: 09.I: 1 ad. en la playa de Pinedo (MCH,JID,IRU); 28.I: 1 ad. en zonas recién fangueadas del Petxinar (AUR,BDJ); 31.I: 1 ej. de 1.º inv. en zonas fangueadas de la Partideta (EGO,BDJ); 06.II: 1 ej. de 1.º inv. en zonas recién fangueadas del tancat de la Platera (BDJ,JGR); 08.II: 2 ej. (1.º y 2.º inv.), en zonas fangueadas de Alfafar (JMB); 09.II: 1 ej. de 1.º inv. en campos fangueados de la marjal de

Alfamar entre gaviotas reidoras; 16.II: 1 ej. de 1.^{er} inv. en el tancat del Fangar; 10.III: 1 ej. de 1.^{er} inv. en zonas fangueadas del tancat de la Naia (AAC)

Villena: 30.VI: 1 ej. (MRG)

Elx: 03.I: 1 ej. (SCR)

Illa de Tabarca: 24.V: 1 ej. (SCR)

Desemb. riu Segura: 08.III: 1 ej. (AJR)

Marjal de Pego-Oliva: 12.II: 1 juv. (JFL)

2013

Vinaròs: 08.I: 1 ad. en la zona SO del puerto junto a gaviota de Audouin. Más de 20 observaciones del mismo ej. Última cita 07.III (ELL, FPV)

Peníscola: 10.II: 1 ej. de 1.^{er} inv. descansando en la playa S. Hasta 6 observaciones más a lo largo del invierno. Última cita 07.III (ELL, FRJ)

Puerto de Castellón: Citas de 1 ad. los días 02 y 03.I; el 08 y el 11.II y el 07.III; Cita de 1 juv. el 17.I; Citas de 1 subad. los días 07 y 14.II y el 04.III; 2 ej. (juv. e inm.) el 06.III (PGR)

Borriana: 01.III: 1 ej. de 1.^{er} inv. junto a gaviotas cabecinegras (JBC)

Puerto de Gandía: 25.III: 1 ad. (PLP)

Alacant: 29.XII: 1 ej. de 1.^{er} inv. junto a un grupo de gaviotas patiamarillas (JMT,AVDH)

Larus fuscus

Gaviota sombría - Gavinot fosc - Black-backed Gull

Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: EC

2012

Peníscola: 04.II: 93 ej. en el censo de la RAM (ELL)

Desemb. del riu Sec de Castelló: 10.I: 120 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Grau de Castelló: 29.I: 60 ej. (MBM); 24.V: 1 ad. (PGR)

Borriana: 14.VI: 12 ej.; 18.VII: 2 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 13.I: 100 ej. (JBC); 14.I: 78 ej. entran del mar hacia la marjal (JBC,ILB)

Albufera de València: 13.I: 3.737 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.IX: 1.000 ej. descansando en la replaza de Zacarés. Notable incremento de efectivos (AAC)

Llacunes de La Mata i Torreveija: 09.I: 420 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 26.II: 1.060 ej. censo máximo anual (SAR); 21.XII: 702 ej. (SAR,AJR)

2013

Peníscola: 12.I: 71 ej. durante el censo RAM. 1 ej. con anilla amarilla [N337] ej. capturado en el nido en Delta del Ebro el 03.VI.2007 (ELL, FRJ); 02.III: 112 ej. en el censo RAM. 1 ej. con anilla negra [J2UX] (anillada en Noruega el 07.IV.2011) (ELL, FRJ); 02.XI: 173 ej. playas N y S (ELL); 14.XII: 148 ej. censo RAM (ELL)

Desemb. del riu Sec de Castelló: 08.I: 108 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 04.I: 750 ej. en diferentes grupos en zonas fangueadas de la Socarrada y la Llonga. Comienzan a aumentar las aves presentes con el inicio de los trabajos de fanguero de los arrozales (BDJ); 11.I: 1.621 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.IV: 32 inm. sesteando en las estacas de la Manseguerota (JID,MCH,GGA,IRU); 05.VI: 3 inm. posados en las estacas de la Manseguerota (JID,MCH,IRU,GGA); 09.X: 190 ej. en arrozales cosechados y encharcados por las últimas lluvias (BDJ)

Salines de Santa Pola: 15.I: 18 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (MFS,SAR)

Llacunes de La Mata i Torreveija: 10.I: 450 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.II: 2263 ej. máximo anual (SAR,OAP)

Cap Cervera: 28.X: 74 ej. (SAR)

Larus argentatus**Gaviota argéntea europea - Gavinot argentat de potes rosa - Herring Gull**

Estatus: Invernante raro

2012

Albufera de València: 09.II: 1 ej. de 2º inv. en zonas fangueadas del tancat de Villalba (BDJ) observada de nuevo el día 10.II (AAC), el 20.II en el tancat de l'Abadejo y el 04.III en el tancat de Carota-Figuero (BDJ); 11.III: 1 ej. de 1.º inv. en el tancat de la Naia (AAC); probablemente la misma ave observada el 13.III en zonas fangueadas en la misma localidad (JMB); 01.XII: 1 ej., aparentemente ad., en la mota de Sant Pau junto con gaviotas sombrías. Podría tratarse del mismo ejemplar observado en Cullera el mes de noviembre (JHZ,BDJ)

Cullera: 20.XI: 1 ad. en el vedat, en compañía de gaviotas sombrías. Una de las citas más tempranas de las registradas hasta la fecha (EGO,BDJ)

2013

Port de Castelló: 23.I: 1 juv. (PGR)

Albufera de València: 16.IV: 1 ej. mudando a 2º ver. en el tancat de Milia; Nuevas citas de este ej. el 19 y el 23.IV esta es la cita más tardía hasta la fecha para la Albufera (AAC,FGN)

Larus cachinnans**Gaviota cáspica - Caspian Gull**

Estatus: Migrante raro

2012

Marjal dels Moros: 24.I: 1 ad. con caracteres típicos de la especie (JRU)

2013

Vinaròs: 05.IV: 1 ej. de 1.º ver. en la zona S del puerto. Porta una anilla de PVC con inscripción [032:S]. Tramitada la anilla, el ave procede en Eslovaquia, donde fue anillada como pollo el 15.VI (ELL)

Albufera de València: 11.II: 1 ej. de 1.º inv. mostrando rasgos intermedios entre gaviota patiamarilla y gaviota cáspica en zonas fangueadas del Ravisaxno (BDJ,EGO)

Larus michahellis**Gaviota patiamarilla - Gavinot argentat mediterrani - Yellow-legged Gull**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

2012

Peníscola: 04.II: 157 ej. en censo RAM (ELL)

Emb. de Sitjar: 04.XI: 800 ej. (JBC)

Borriana: 27.I: 138 ej. (JBC); 14.IV: 486 ej. (JBC,JLB); 11.X: 618 ej.; 15.II: 1 inm. anillado en balsa de Zolina, Navarra (JBC)

Marjal d'Almenara: 27.VII: 345 ej. en zona inundada en limite con Valencia (JBC)

València: 14.I: 374 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (RMB)

El Fondo d'Elx: 15.V: 928 ej.; 01.XII: 731 ej. (CMA)

2013

Sant Jordi: 16.II: 600 ej. en la balsa de riego (ELL)

Peníscola: 02.II: 230 ej. en día de fuerte viento durante la jornada RAM (ELL); 07.IX: 245 ej. censo RAM (ELL, FRJ)

Castelló de la Plana: 06.III: 2 ad. primera cópula observada en el año (PGR)

Albufera de València: 15.VI: Primera cita de 1 juv. del año sobrevolando la playa de la Garrofera (JID,MRG)

El Fondo d'Elx: 16.VII: 1.681 ej.; 15.XI: 1.526 ej. (CMA)

Localidad	2012		2013	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	2	124	3	39
Pantano de Sitchar	0	500	0	-
Puerto de Castellón	2	-	13	-
Marjal dels Moros	0	187	0	15
Puerto de Valencia	0	-	1	-
Albufera de Valencia	3	259	4	335
Marjal de Xeresa-Xeraco	7	0	4	8
Embalse de Amadoiro	0	732	0	132
Salinas de Santa Pola	63	316	76	475
El Fondo	0	2.309	0	1.521
Lagunas de la Mata-Torrevieja	43	291	53	272

Censos de gaviota patiamarilla en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se ha detectado como nidificante y localidades con más de 100 ej. invernantes. La nidificación se ha registrado en 6 (2012) y 7 (2013) localidades de un total de 33 humedales censados para un total de 120 (2012) y 154 parejas (2013). Como invernante los totales ascienden a 5.096 ej. (2012) y a 3.026 (2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. - Censo incompleto o no disponible (incluida la colonia de las islas Columbretes, donde en 2011 nidificaron 600 par.)

Rissa tridactyla

Gaviota tridáctila - Gavina de tres dits - Black-legged Kittiwake

Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

2012

Peníscola: 14.I: 1 ad. a primera hora en el dormitorio de gaviotas reidoras y cabecinegras en frente del espigón (ELL,MGT)

Port de Castelló: Cites d'1 juv. els dies 05.XI, el 26.XI (diferent a l'anterior), el 29.XI i el 10.XII (PGR)

Port de Borriana: 16.XI: 1 ej. de 1.º invierno entrando al puerto tras los barcos de pesca (JBC)

2013

Port de Castelló: Varies cites d'1 juv. entre els 29.I i 26.II; Cites de 2 ad. el 14.II i no més 1 ad. el 27.II: 1 ad. (PGR)

Port de Borriana: 03.III: 1 ad. limpiándose en balsa producida por acúmulo de agua de la lluvia, junto a gaviotas cabecinegras. Al momento salta y vuela hacia el N (JBC)

Cullera: 04.I: 1 ej. de 1.º inv. siguiendo a los arrastreros al atardecer en la entrada del puerto junto con gaviotas reidoras (VPA)

Hydrocoloeus minutus**Gaviota enana - Gavina menuda - Little Gull**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Marjal dels Moros: Citas de 1 inm. el 17.IV y el 08.V (JRU)

Albufera de València: 10.IV: 1 ej. de 1.^{er} ver. sesteando en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU). Observado de nuevo el 17.IV (JID,MCH)

El Fondo d'Elx: 23.II: 1 ad. (AJR); 13.VI: Concentración destacada de 36 ej. (CMA)

2013

Marjal dels Moros: 28.IV: 1 ej. (CAZ)

Albufera de València: 14.III: 1 ad. en zonas inundadas. Primer registro después de un largo periodo sin citas (BDJ); observado de nuevo el 15.III (PVG); 05.IV: 1 ej. de 1.^{er} ver. sesteando (JID,MCH,IRU); 09.V: 1 inm. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 10.VIII: 1 ej. de 1.^{er} ver. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR); 07.XI: 1 ej. de 1.^{er} inv. encontrado en la playa de la Garrofera con una fractura de ala. Es ingresado en el CRF "la Granja" para su recuperación (FJC)

Salines de Santa Pola: 02.V: 1 ej. (SAR)

STERNIDAE

Gelochelidon nilotica**Pagaza piconegra - Curroc - Gull-billed Tern**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante escaso. Conservación: IE

2012

Grau de Castelló: 24.V: 1 ej. (PGR)

Albufera de València: 816 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Requena: Primera cita conocida para la localidad de 1 ad. el 17.VI (JAI)

El Fondo d'Elx: 17.VI: 2 ej. (SAR)

2013

Alcossebre: 31.VII: 1 ad. única cita anual (DES)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.V: 1 ej. (MBM)

Albufera de València: 624 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 19.III: 1 ej. en zonas fan-gueadas de la Naia. Primer registro prenupcial (BMA,BDJ); 12.IV: 98 ej. juntos sesteando en una de las lagunas de el tancat de Milia (AAC,FGN); 05.VII: Grupo postreproductor de al menos 100 ej. en arrozales de la Palmera. Sólo se contabilizan 4 juv. (PMP); 20.X: 2 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO)

Emb. de Bellús: 31.VII: 3 ej. (BOR)

Elx: 22.IV: 6 ej. (SAR)

Salines de Santa Pola: 15.V: 7 ej. (AJR); 14.VIII: 2 ad. cebando 2 pollos (SAR)

Llacunes de La Mata i Torreveja: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Hydroprogne caspia**Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.IV: 2 ej. (RPB,ALR,ADP)

Albufera de València: 10.III: 1 ej., aparentemente ad., en zonas fangueadas del tancat de Naia. Primer registro prenupcial (BDJ); 11.III: 3 ad. descansando entre láridos en el tancat de Naia (AAC); aún 2 ad. el 12.III (JAA,MPO,TPA,MCC,GLL); 14.III: 4 ej., aparentemente ad., en zonas del tancat de Naia (JMB). En el Racó de l'Olla citas estivales de 1 ej. con aspecto de subad. el 12.VI (JID); y de 1 ad. con plumaje nupcial los días 26.VI (JID) y el 02.VII (JID,MCH); 17.IX: 2 ad. en un arrozal fangueado del Recatí y 1 ad. en el tancat de Milia (BDJ,AAC); 01.X: 2 ej. sesteando en la playa de l'Alcatí (JID,GGA)

Censos en el tancat de Milia: Presencia postnupcial regular en el tancat de Milia desde el 09.VII con 2 ej. (AAC). Censos destacados de 4 ad. el 21.VIII (CAV,AAC); 1 par. con un juv. al que ceban regularmente el 22.VIII (AAC) y 5 ej. el 23.VIII (CAV,AAC); el 28.VIII: 1 par. de ad. y 1 juv. con anilla sueca (CAV,AAC,MPB,SEL); el 06.IX concentración destacada de 14 ej. (solo 2 juv.) (CAV,AAC) y 15 ej. el 08.IX (PMP). Últimas citas anuales en este enclave de 4 ej. (3 ad. y 1 juv.) el 27.IX: (CAV,AAC) y 05.X: 5 ej., aparentemente todos ad., sobrevolando la reserva (AAC)

Emb. de Beniarrés: 16.IX: 2 ej. (BOR)**Elx:** 22.X: 1 ej. (SCR)

Salines de Santa Pola: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Registros en enero de 2 ej. el 11 (MAA), el 18, el 20 y el 24 (AJR). En febrero de nuevo citas de 2 ej. los días 10 (AJR), 15 (SAR,AJR) y 19, con 1 ad. con 1 juv. pidiendo alimento (MQB,COA). En marzo citas de 2 ej. el 04 (RMB) y el 08 (AJR), solo 1 ej. el 13 (SAR) y de nuevo 2 ej. el 29. Nuevas citas en mayo de 1 ej. el 08 y de 2 ej. el 15 (AJR). Primera cita postnupcial de 1 ej. el 12.VIII (SAR); 2 ej. el 31.VIII; 1 ej. el 05.X y última cita anual de 2 ej. el 22.XII (AJR)

Illa de Tabarca: 24.V: 1 ej. (SCR)**Desemb. riu Segura:** 29.I: 3 ej.; 20.IV: 1 ej. (AJR); 19.X: 1 ej. (SAR)**2013**

Peníscola: 01.IV: 1 ej. sigue presente el día 03.IV; Citas de 1 ad. descansando en la playa S los días 02.V, 22.V y 03.VI (ELL)

Albufera de València: 27.I: 1 ad. encontrado herido en la gola del Pujol, que muere poco después. La autopsia realizada en el Centro de Recuperación de Fauna reveló que había recibido un disparo de escopeta. Se trata de la tercera cita plenamente invernal de la especie conocida en l'Albufera (la última era de 2005). Portaba anilla de Suecia y fue anillado como pollo en 2006 (CDR); 28.II: 1 ej. pescando en l'estany de la Plana (AAC,FGN); 13.III: 1 ej. en arrozales del Saladar (PMP); 19.III: 2 ej. sesteando en arrozales del tancat dels Pescadors (BMA,BDJ); 28.III: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa en dirección N (SEOV); 22.IV: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa durante gran parte del día (VDA,CAP,PVG); 28.IV: 2 ej. en la Ratlla (GCH); Máximo prenupcial de 5 ej. sesteando en el Racó de l'Olla el 29.IV (JID,MCH,GGA); 29.IV: 1 ej. descansando en un campo de la marjal de Sollana (AAC,FGN); 17.V: 1 inm. sesteando en el Racó de l'Olla. Su aspecto y la anilla metálica en la pata derecha permiten indicar que podría ser el mismo ejemplar presente aquí desde mediados de abril (JID,MCH,GGA); 23.VIII: 1 ad. en la playa de la Malladeta, junto con gaviotas (EGO,BDJ); 15.V: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 13.IX: 2 juv. y 1 ad. sobrevolando el Racó de l'Olla (JID,MCH,GGA); 14.IX: 8 ej. (1 juv.) sobrevolando el tancat de la Pipa (GCH,PVG), y posteriormente entrando en el tancat de Milia (GTR); 23.XI: 1 ej. en zonas inundadas del vedat de Cullera. Cita tardía (MNY)

Citas en el tancat de Milia: 27.III: 1 ej. pescando, le faltan algunas primarias en el ala derecha, ya observado

el mes pasado; 03.IV: 1 ej. diferente al observado días atrás; 15.IV: 1 ej. sesteando; Última cita primaveral de 1 ad. el 09.V (AAC,FGN); Primera cita postnupcial de 1 ad. sesteando gran parte del día el 17.VII (AAC,FGN); Citas de 2 ad. distintos los días 14.VIII y 16.VIII (AAC,FGN); Aumento a 4 ej. (1 juv.) el 18.VIII (GTR); el 22.VIII 1 ad. acompañado por 1 juv. que aún reclama alimento (AAC,FGN); 02.IX: 1 juv. y 2 ad. sesteando (AAC,FGN) observado de nuevo el 20.IX (GTR); 05.IX: 3 ad. y 1 juv. Máximo postnupcial de 18 ej. el 18.IX (solo 1 juv.) (AAC,FGN); 01.X: 6 ej. (2 juv.); 07.X: 6 ej. (1 juv.) (AAC,FGN). Última cita anual de 1 juv. y 1 ad. sobrevolando el tancat el 17.X (GTR)

Gandía: 09.IX: 1 ad.; 23.X: 2 ej. (PLP)

Emb. de Bellús: 28.VII: 1 ej. (BOR); 01.IX: 1 ej. (BOR,FAN,PLP); 15.IX: 3 ej. (BOR)

Saladar de Agua Amarga: 30.IV: 1 ej. (SAR)

Salines de Santa Pola: Citas invernales de 1 ej. el 05.I y de 2 ej. el 22.I y el 07.II; última cita de 1 ej. el 06.III (AJR)

Desemb. riu Segura: 26.I: 1 ej. (AJR)

Sterna bengalensis

Charrán bengalí - Xatrac bengalí - Lesser Crested Tern

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012

Vinaròs: 25.X: 1 ad. en la zona O del puerto junto a un nutrido número de charranes patinegros (130 ej.) (ELL)

Cap de Cullera: 10.XI: 1 ej., aparentemente de esta especie, desplazándose hacia el N junto a charranes patinegros. Se trata de una observación bastante tardía pero que podría ser el ej. observado a finales de octubre en el puerto de Vinaròs (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)

Primera cita para Castellón y decimocuarta y decimoquinta citas publicadas para la CV. La cita de Castellón ha sido homologada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Sterna sandvicensis

Charrán patinegro - Xatrac bec-llarg - Sandwich Tern

Estatus: Nidificante moderado muy localizado, migrante abundante, invernante moderado. Conservación: IE

2012

Peníscola: 14.I: 109 ej. en el censo de la RAM (ELL,MGT)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 47 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Grau de Castelló: Máximos anuales de 250 ej. el 31.III (MBM) y de 500 ej. el 26.IV (PGR)

Desemb. riu Millars: 13.I: 43 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Borriana: 16.I: 43 ej.; 02.VI: 60 ej. en el censo de la RAM volando principalmente al N (JBC); 10.XI: 104 ej. censo RAM (JBC,ILB,VAT)

Canet d'en Berenguer: 14.I: 45 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)

València: 14.I: 45 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (RMB)

Albufera de València: 13.I: 215 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.528 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Salines de Santa Pola: 31.VIII: 100 ej. (AJR); 07.IX: 86 ej. (SAR); 13.XII: 46 ej. (AJR)

Desemb. riu Segura: 05.XII: 54 ej. (AJR)

Cap Cervera: 14.I: 60 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV

2013

Port de Vinaròs: 05.VIII: 30 ej. (FPV)

Peníscola: Censos destacados durante la RAM de 71 ej. el 12.I y el 02.III (ELL, FRJ); 62 ej. el 01.VI (ELL); máximo anual de 352 ej. el 07.IX (ELL, FRJ); 84 ej. el 05.X (se observa 1 ej. con anilla de PVC roja [ICK] observado también el día 14.XII; último censo destacado de 120 ej. el 14.XII (ELL)

Grau de Castelló: Censos destacados de 50 ej. el 23.I y de 300 ej. el 27.IV (MBM)

Desem. riu Millars: 13.I: 67 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV

Albufera de València: 11.I: 128 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 2.013 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Oliva: 12.I: 44 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)

Cap de l'Horta: 29.XII: 25 ej. (AJR)

Elx: 09.IV: 1.050 ej. (SAR)

Salines de Santa Pola: 09.V: 100 ej. (AJR)

Desemb. riu Segura: 27.II: 70 ej. (SAR)

Cap Cervera: 26.X: 29 ej. (SAR)

Sterna elegans**Charrán elegante - Xatrac elegant - Elegant Tern**

Divagante del océano Pacífico americano

2012

Albufera de València: 11.IV: 2 ad. mostrando rasgos de la especie en el Racó de l'Olla junto con charrán patinegro. Al menos uno de ellos es el mismo ejemplar observado en l'Albufera todos los años desde 2006, cuando se le colocó una anilla amarilla y que es portador de una anilla metálica colocada en las marismas del Odiel (Huelva) en 2002. Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (JID,MCH); 16.VII: Se observa en vuelo al juv. nacido este año, acompañado de cerca por uno de los ad. (el marcado con una anilla amarilla). El joven eclosionó el pasado 27.V y muestra una lesión en el ala izquierda que ha crecido descolgada, pese a lo cual puede volar aunque con cierta dificultad. (JID,MCH,IRU,GGA); 30.VII: 3 ej. todavía siguen presentes los 2 ad. y el juv. nacido la presente temporada. El abandono de la colonia por estas aves parece demorado por una lesión que el joven muestra en el ala, lo que le impide volar con normalidad (JID,GGA,MCH,IRU)

2013

Albufera de València: 03.IV: 1 ad. con aspecto de charrán elegante junto con charrán patinegro entrando en el Racó de l'Olla. Primera cita anual (JID); 01.VII: La presencia continuada de una par. de charranes con aspecto de charrán elegante desde finales de abril, da lugar al crecimiento de un pollo que hoy es visto en vuelo sobre la reserva por primera vez junto con los adultos. Representa el sexto caso de cría verificada de este tipo de charranes en l'Albufera desde 2006 y la cuarta ocasión en la que se producen aves jóvenes (JID,MCH,GGA,IRU); 04.VII: 1 tercer ad. con aspecto de charrán elegante en el Racó de l'Olla (MCH,GGA); 12.VII: Siguen presentes el juv. y el m. reproductor realizando vuelos juntos a bastante altura por primera vez y regresando poco después (JID,MCH); 16.VII: 1 presencia de 1 ad., seguramente la h. ad. reproductora (JID)

Elx: 08.V: 1 ej. (AJR,SAR)

Sterna hirundo**Charrán común - Xatrac d'albufera - Common Tern**

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: VUL

2012**Grau de Castelló:** 07.VI: 24 ad. (PGR)**Borriana:** 02.VI: 23 ej. censo mensual RAM (JBC)**Marjal d'Almenara:** 20.VII: 9 ej. zona inundada límite con provincia de Valencia (JBC); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Marjal dels Moros:** 200 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Albufera de València:** 16.III: 5 ej. sobre el Racó de l'Olla con vuelos nupciales. Primera cita anual; 1.438 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Salines de Santa Pola:** 23.III: 3 ej. Primera cita anual; 223 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Llacunes de La Mata i Torrevieja:** 165 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 31.VIII: 412 ej. (SAR,MAA); 05.X: 6 ej. Última cita anual (SAR,AJR)**2013****Port de Vinaròs:** 05.VIII: 6 ej. (FPV)**Peníscola:** 06.VII: 5 ad. en el censo RAM (ELL)**Marjal d'Almenara:** 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Marjal dels Moros:** 200 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Albufera de València:** 13.III: 1 ad. sobrevuela el Racó de l'Olla. Primera cita anual (MCH,JID,IRU,GGA); 1.444 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Requena:** 08.VI: 1 ad. primera cita conocida para la comarca Requena-Utiel. Cita tardía para el paso. Sobrevuela a ras del agua y picotea en ella de vez en cuando (JAI)**Salines de Santa Pola:** 27.III: 30 ej. Primera cita anual (AJR); 413 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**El Fondo d'Elx:** 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 11.IX: 3 ej. Última cita anual (CMA)**Llacunes de La Mata i Torrevieja:** 160 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV**Sternula albifrons****Charrancito común - Mongeta - Little Tern**

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: VUL

2012**Marjal d'Almenara:** 21.V: 42 ej.; 27.VII: 63 ej. en zona límite con Valencia (JBC)**Albufera de València:** 04.IV: 1 ej. volando junto a canasteras sobre el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (CAV,AAC); 11.IX: 5 ej. pescando en una de las lagunas de el tancat de la Pipa (ALO,RGR,RMQ,PVG)**Elx:** 15.VI: 97 par.; 12.VIII: 397 ej. (SAR); 05.X: 2 ej. (SAR,AJR)**El Fondo d'Elx:** 13.VI: 39 ej. (CMA)**2013****Elx:** 26.IV: 251 ej. (SAR)**Saladar de Agua Amarga:** 14.V: 35 ej. (SAR)**Desemb. riu Segura:** 10.V: 162 ej. (AJR)

	2012	2013
Localidad	Parejas nidificantes	Parejas nidificantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	11	2
Puerto de Castellón	57	0
Marjal de Almenara	6	3
Marjal dels Moros	75	70
Puerto de Valencia	0	57
Albufera de Valencia	88	48
Salinas de Santa Pola	190	221
El Fondo	0	33
Lagunas de la Mata-Torrevieja	57	125

Censos de charancito común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades de cría. La especie ha nidificado en 7 localidades (2012) y 8 (2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 484 par. en 2012 y de 559 par. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Chlidonias hybrida**Fumarel cariblanco - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern**

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro. Conservación: VUL

2012**Grau de Castelló:** 27.V: 15 ej. (MBM)**Desem. riu Millars:** 24.IV: 20 ej. (GUM)**Marjal d'Almenara:** 16.III: 10 ej.; 08.VI: 230 ej. (JBC); 08.X: 1 juv. en zona inundada límite provincia de Valencia (JBC,JLB)**Albufera de València:** 28.I: 7 ej. en zonas fangueadas de l'Alter (AUR,BDJ); 13.III: 2 ej. en el tancat de la Sardina (SEOV); 29.V: Agrupación destacada al atardecer de hasta 280 aves en el Malvinar. Una de las aves porta anilla francesa, por lo que podrían tratarse de aves aún en migración hacia Europa (AAC); 05.VI: 116 ej. en el tancat de la Pipa a primera hora de la mañana (RGR,LSO,MSM,PVG); 12.VII: Concentración de unas 130 aves (todas ad.) en el tancat de Milia (AAC); 01.XII: 8 ej. alimentándose en arrozales apenas inundados del Petxinar (JHZ,BDJ)**Cullera:** 26.V: 32 ej. pescando y descansando en los arrozales del Brosquill (LAA)**El Fondo d'Elx:** 22.III: 317 ej.; 13.VI: 819 ej.; 01.VIII: 544 ej. (CMA)**Marjal platja Benavites:** 19.VIII: 7 par. amb pollets alguns encara menudets (MBM)**2013****Prat de Cabanes-Torreblanca:** 07.IV: 10 ej. (RPB)**Albufera de València:** 03.IV: 50 ej. sesteando en una de las lagunas de el tancat de Milia (AAC,FGN); 13.VI: 31 ej. en arrozales del Ravisanxo (BDJ); 14.VI: 70 ej. en el vedat de Sueca (AAC,FGN); 16.VII: 40 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 18.X: 1 juv. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO); 21.XI: 1 ej. comiendo en arrozales recién inundados del tancat del Fangar (MCH)**Requena:** 08.VI: 1 ej. en paso prenupcial por los estanques. Cita tardía (JAI)**Gandía:** 01.IV: 8 ej. (PLP)**El Fondo d'Elx:** 07.XII: 7 ej. (OAP)

Localidad	2012	2013
	Parejas nidificantes	Parejas nidificantes
Marjal de Almenara	58	72
Marjal dels Moros	95	50
Marjal de Rafalell	10	6
Marjal de Pego-Oliva	16	60
Clot de Galvany	0	1
El Fondo	908	642

Censos de fumarel cariblanco en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades de cría. La especie ha aparecido como nidificante en 6 localidades de un total de 33 humedales censados con un total de 1.089 ej. en 2012 y de 831 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Chlidonias niger**Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012**Albufera de València:** 11.IV: 1 ad. entrando en l'Albufera desde la devesa. Primer registro prenupcial (JID); 26.VII: 60 ej. sesteando en el Racó de l'Olla, la mayoría ad., aunque se observan 2 juv., los primeros de esta temporada (JID,GGA); 02.VIII: 72 ej. descansando en el tancat de Milia (AAC); 02.X: 1 juv. en zonas inundadas del Pinedo. Última cita postnupcial (BDJ)**Salines de Santa Pola:** 30.VIII: 9 ej. (AJR); 12.XII: 8 ej. (SAR)**2013****Albufera de València:** 05.IV: 1 ad. entrando en el Racó de l'Olla. Primera cita anual de la especie. Relativamente temprana (JID); 05.VI: 23 ej., casi todos ad., entran a sestar en el Racó de l'Olla en un bando

compacto (JID,MCH); 06.VI: 3 ad. pescando en el mar frente a la gola del Pujol junto con charrán común (MCH,JID); 26.VI: Bando de 8 ej., entre las que se observa 1 juv., en el tancat de Milia. Cita extremadamente temprana de un ave nacida el presente año, lo que podría inducir a pensar en un ej. nacido en alguna localidad de la península Ibérica (AAC,FGN); 21.VIII: 25 ej. en paso hacia el S en el mar observados desde la Garrofera (BDJ); 28.VIII: 16 ej. (solo 3 juv.) en el tancat de Milia (AAC,FGN); 08.X: 1 ad. en el tancat de Milia (MNY); 18.X: 1 ad. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO)

Emb. de Bellús: 01.IX: 1 ej. (BOR,FAN,PLP)

El Fondo d'Elx: 15.XI: 4 ej. (CMA)

Chlidonias leucopterus

Fumarel aliblanco - Fumarell d'ala blanca - White-winged Black Tern

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 30.V: 1 ad. con plumaje nupcial en arrozales de l'Angle. Primera cita prenupcial (MCH,IRU); 30.V: 1 ad. en arrozales cerca de Pinedo (TPE); Primera cita postnupcial en el tancat de Milia de 1 ad. el 17.VII; nuevas citas postnupciales de 1 ad. diferente al anterior el 24.VII, el 31.VII (CAV,AAC), el 01.VIII y el 02.VIII (AAC); 01.VIII: 1 ad. sesteando en un campo fangueado de la Palmella (PMP); un ej. distinto el día 03.VIII (MPB,PMP); 02.VIII: 1 ad. en plumaje nupcial casi completo, capturando insectos en vuelo junto con fumareles cariblanco, en arrozales de la Llonga (BDJ) 14.VIII: 2 ad. y 1 juv. acuden al atardecer a el tancat de la Ratlla. Primera cita de un ave joven (FLL,JMAG,JRU), los ad. presentes también el 19.VIII (PFP,JMI); 22.VIII: 1 ad. en el tancat de la Pipa (SEOV); Citas de 1 ad. descansando en el tancat de Milia el 08.VIII, el 22.VIII y el 23.VIII, aumento a 2 ej. el 27.VIII, y de nuevo 1 ej. el 28.VIII (AAC); 02.X: 1 juv. en zonas inundadas de Pinedo junto a otros fumareles (BDJ)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.V: 1 ej. amb un grup de fumarells de galta blanca (MBM)

Marjal dels Moros: 26.IV: 3 ej. en la colonia de larolimícolas (FFA)

Albufera de València: 28.IV: 4 ej., todos en plumaje nupcial, alimentándose en zona de huerta, observados aún el 04.V (PVG); 30.IV: 6 ej. en plumaje nupcial alimentándose junto a fumarel cariblanco en el tancat de Milia (AAC,FGN); 01.V: 11 ej. en l'Illa y 2 ad. en el tancat de Milia (AAC,BDJ); 10.VII: 1 ad. en arrozales del Ravisano. Primer registro postnupcial temprano (BDJ); 25.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Sigue presente el 27.VIII (GLL,BDJ); 01.IX: 1 juv. junto con fumareles cariblanco cazando insectos en vuelo sobre arrozales cerca del port de Catarroja (BDJ)

Salines de Santa Pola: 30.IV: 3 ej. (AJR)

ALCIDAE

Alca torda

Alca común - Cauet - Razorbill

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

La Pobla de Farnals: 14.I: 3 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)

Albufera de València: 31.I: 1 ej. (JRU); 10.II: 4 ej. (JRU,VPA); 03.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial (TPR); 25.XI: 1 ej. (JRU,APLA); 23.XII: 1 ej. dirección S (JRU)

Cap de Cullera: 14.I: 2 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 04.II: 2 ej. (JSN,VGA, LAA); 03.III: 2 ej. dirección S (LAA); 10.XI: 1 ej. dirección N (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)

Gandía: 29.XII: 1 ej. de 1.º invierno (PLP)

Oliva: 14.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)

Altea: 17.I: 1 ej. (TMF,JMF)

Elx: 12.I: 29 ej. (SAR,AJR); 07.II: 1 ej. (SCR)

Cap de Santa Pola: 15.XII: 1 ej. (MLP)

Desemb. riu Segura: 05.I: 6 ej. (AJR)

Guardamar del Segura: 14.I: 80 ej.; 29.XII: 1 ej. (AJR)

Cap Cervera: 13.I: 3 ej. (AJR); 23.III: 3 ej. (SAR,AJR)

2013

Albufera de València: 09.XI: 2 ej.; 24.XI: 1 ej. (GLL)

Cap de Cullera: 12.I: 2 ej. (MAL,PVG,VPA,LAA); 20.III: 12 ej. hacia el S (JRU); 09.XI: 1 ej. Primera cita otoñal (MAL,ATE,JTN,LBA,VBJ,GCH,DMF,BOR); 05.XII: 3 ej. dirección S (VPA); 27.XII: 9 ej. (CAV,AAC)

Gandía: 27.II: 1 ej. (ROL); 05.VI: 1 ad. que lleva al menos tres semanas en el club náutico (PLP)

Desemb. riu Segura: 14.XII: 1 ej. (AJR)

Notable diferencia entre los diferentes inviernos aquí recogidos. La presencia de esta especie en nuestras aguas se encuentra muy vinculada al éxito reproductor que hayan tenido las colonias en sus lugares de reproducción ese año. Muy alejadas de las citas de cientos de ejemplares de hace años, el invierno de 2011-2012 supone a día de hoy un buen año, teniendo en cuenta la tendencia negativa que está experimentando esta especie.

Fratercula arctica

Frailecillo atlántico - Fraret - Atlantic Puffin

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: IE

2013

Cap de Cullera: 14.VI: 1 ej. a dos millas de la costa. Los frailecillos que se observan en el Mediterráneo llegan a mitad de enero y se marchan a mediados de julio. En nuestras costas, el mes de junio, es muy bueno para verlos migrando hacia el S. Este paso empieza a notarse desde finales del mes de abril. Son individuos no reproductores, alejados de sus colonias de cría. Las principales dificultades para la observación van ligadas a su vida en alta mar (VPA)

PTEROCLIDIFORMES

PTEROCLIDIDAE

Pterocles orientalis

Ganga ortega - Xurra - Black-bellied Sandgrouse

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Conservación: VUL

2012

Villena: 25.III: Grupo de 15 ej. posados en un sembrado; 01.V: 6 ej. posados en una parcela de cereal (MCR); 15.V: 9 ej. (MLP); 23.X: 4 ej. salen volando de un rastrojo (MCR)

2013

Villena: 23.III: 3 par. dispersas por la zona (MCR); 01.VI: 11 ej. en varios grupos en diferentes zonas de la ZEPA (AAC)

Pterocles alchata**Ganga ibérica - Ganga - Pin-tailed Sandgrouse**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Conservación: IE

2012

Villena: 25.III: 18 ej. posados en un sembrado; 16.IV: Bando de 50 ej. volando por la zona; 14.VII: 1 h. junto a 1 juv. totalmente emplumado posados en un rastrojo (MCR)

2013

Albufera de València: 09.V: 1 ej. observado en vuelo sobre el tancat de la Torre Ampla en las orillas de la laguna emitiendo una voz típica en vuelo. Curiosamente, el primer día de mayo pudo ser observado, por un breve espacio de tiempo, un ave asignada inicialmente a una de las especies de la familia Pteroclididae en arrozales del Borronar (BDJ). Su presencia podría estar asociada con el episodio tardío de nevadas a finales de abril en localidades de Teruel, Albacete y Cuenca, donde esta especie está presente. Se trata del primer registro conocido para l'Albufera (MCH); 27.V: 1 ej. alza el vuelo de una de las islas de el tancat de Milia. Sin duda se trata del mismo ejemplar observado días atrás; 22.VII: Se observa de nuevo el mismo ejemplar sobrevolando el tancat de Milia dirección NO (AAC,FGN)

Villena: 23.III: Grupo de 6 ej. volando que se posa en una parcela cercana; 13.IV: Grupo de 30 ej. en vuelo (MCR); 01.VI: 6 ej. en los alrededores de la casa Moratillas (AAC)

Las poblaciones de ganga ibérica en la Comunidad Valenciana se consideraron extintas desde principios del s. XX, cuando aún se observaban en la plana de Utiel (Ferrer et al., 1986). Los datos de la Generalitat en el marco del seguimiento de las poblaciones de aves esteparias amenazadas (Alberdi, 2012), indica la presencia de entre 50 y 70 aves y la reproducción en el área de Moratillas (Villena). Los datos recogidos estos dos años concuerdan con estos datos e informan de los mayores bandos de ganga ibérica registrados en la Comunidad Valenciana.

COLUMBIFORMES**COLUMBIDAE*****Columba livia*****Paloma bravía - Colom roquer - Rock Dove**

Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Sin citas de interés.

Columba oenas**Paloma zurita - Xixella - Stock Dove**

Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012

Penyagolosa: 24.III: 7 ej. volando sobre campos de cereales y posadas sobre pinar de repoblación (JBC)

Vilanova d'Alcolea: 06.VI: 12 ej. en grupo (JBC)

Ademuz: 11.III: 1 ej. (RMB)

Vallanca: 21.VII: 2 ej. (RMB)

Casas Altas: 29.IV: 1 ej. (RMB)

Marjal dels Moros: 30.XII: 35 ej. (GCH)

Albufera de València: 11.I: 12 ej. asociadas a palomas torcaces (AAC); 21.I: 3 ej. posados en un tendido eléctrico (SEOA); 21.V: 2 ej. en el tancat de la Pipa (BFM,RGR,PVG); 24.IX: 1 ej. volando hacia el S con viento de Poniente (MCH); 09.XI: 6 ej. (PMP); 21.XI: 123 ej. en arrozales apenas inundados. Parece consolidarse la invernada de esta especie en estos últimos años (BDJ)

2013

Sorita: 16.VI: 1 par. (RPB)

Todolella: 10.V: 1 ej. (RPB)

Morella: 30.IV: 4 ej. (ALR,RPB)

Ares del Maestrat: 26.IV: 1 par. (ALR,RPB)

Vilanova d'Alcolea: 29.IV: 6 ej. (VET)

Albufera de València: 16.IV: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa (PVG)

Requena: 03.II: 3 ej. en un cinto terroso (JAI)

Columba palumbus

Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon

Estatus: Nidificante, migrante e invernante común. Conservación: EC

2012

Vilanova d'Alcolea: 06.VI: 95 ej. volando y posadas en campo de trigo recién cortado (JBC); 02.XI: 72 ej. (JBC,JLB); 21.XII: 35 ej. (JBC)

Desem. riu Millars: 14.X: 80 ej. refugian-se al riu dels tirs de caça al terme de Borriana (MBM)

Albufera de València: 09.IV: 108 ej. volando dirección S (AAC); 01.IX: 60 ej. en tendidos de Catarroja; 18.IX: 370 ej. concentración en zonas de arrozal (BDJ); 25.IX: 1.600 ej. en migración activa volando a gran altura hacia el SO (AAC); 16.X: 120 ej. en tendidos aéreos (JHZ,BDJ); 17.XII: 200 ej. (PMP)

2013

Castelló de la Plana: 02.VI: 130 ej. bando hacia el NE (LPC)

Albufera de València: 10.VII: 65 ej. en zonas de huerta de Massanassa. Primeros grupos postnupciales destacados; 20.VIII: 560 ej. en dos grandes grupos en zonas de huerta y arrozal; 26.IX: 1.450 ej. en tres grandes concentraciones en la Foia y el Borronar y en zonas de la Ratlla (BDJ); 03.XI: 400 ej. en diferentes grupos, desplazándose hacia el N sobre la devesa a lo largo de la mañana (GCH)

Elx: 07.XI: 250 ej. (SAR)

La Marina: 26.X: 600 ej. inusual concentración para el S de Alicante (SAR)

Hondo de Amorós: 18.I: 100 ej. (AJR)

Serra d'Oltà: 15.XI: 70 ej. salen de un pinar de la montaña (JML)

Streptopelia decaocto

Tórtola turca - Tórtola turca - Eurasian Collared-dove

Estatus: Residente común. Conservación: ET

2012

Illes Columbretes: 27.IV: 2 ej. ; 09.VII: 1 ej. (LGB)

Marjal d'Almenara: 11.IV: Concentración destacada de 25 ej. (JBC)

2013

Alcossebre: 27.IX: 168 ej. máximo histórico en la localidad (DES)

Illes Columbretes: 03.III: 1 ej.; 21.V: 2 ej.; 09.VI: 1 ej. (LGB)

Grau de Castelló: 27.II: 5 ej. alimentándose de restos de pescado en la entrada de la lonja del puerto (LPC)

Streptopelia turtur

Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: EC

2012

Vilanova d'Alcolea: 03.VI: 6 ej. (JBC)

Illes Columbretes: 10.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 01.VI: Cita tardía de 1 ej.; 26.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 03.X: 1 ej. Última cita anual (LGB)

Desem. riu Millars: 15.IV: 9 ej. máximo anual (JBC)

Albufera de València: 04.IX: Concentración destacada de 16 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,LMR); 30.X: 1 ej. de 1.º año alimentándose junto a otras aves en un maizal segado. Cita tardía (PMP)

Clot de Galvany: 17.X: 1 ej. cita tardía (AJR)

2013

Alcalá de Chivert: 14.IX: 15 ej. posados en almendros secos (IMR)

Illes Columbretes: 11.IV: 1 ej.; 10.V: 5 ej. (LGB)

Mislata: 03.X: 1 ej. Última cita postnupcial en la pinada del hospital militar (PAB)

Albufera de València: 09.IV: 1 ej. en vegetación de ribera del Racó de l'Olla. Primera cita prenupcial (MCH,JID,IRU,GGA); 11.IV: 1 ej. Primera cita en el tancat de Milia (AAC,FGN); 15.IV: 4 ej. Primera observación en el tancat de la Pipa (SEOV); 30.VII: 15 ej. alimentándose en los caminos perimetrales del tancat de la Pipa (PVG); 17.X: 2 ej. Última cita postnupcial (BDJ)

PSITTACIFORMES

PSITTACIDAE

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer - Cotorra de Kramer - Rose-ringed Parakeet

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET. Categoría: C1.

2012

Vila-real: 11.III: 1 ej. (JBC) ; 09.VII: 2 ej. (JBC,JLB)

Oliva: 12.II: 2 ej. (FAN)

Alacant: 09.I.2012: 3 ej. (JMT)

2013

Castelló de la Plana: 10.I: 7 ej. vuelan desde el Parque Ribalta a las afueras SE de la ciudad (LPC)

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina - Cotorra gris - Monk Parakeet

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET. Categoría: C1.

2012

Moncada: 23.I: 48 ej. (VBJ)

Benimuslem: 04.IV: 1 par. nidificando en nido ubicado en palmera datilera en una plaza del pueblo (PAB)

Sant Vicent del Raspeig: 08.V: 1 ej. (JMT)

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Clamator glandarius**Críalo europeo - Cucut reial - Great Spotted Cuckoo**

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: 16.I: 1 ej. muerto posiblemente después de ser atacado por una gaviota y caer al mar. Cita prenupcial temprana (LGB)

Castelló de la Plana: 20.I: 1 ej. Cita prenupcial temprana (RPB,TGS,PGR)

Albufera de València: 21.II: 1 ej. Primera cita prenupcial en el Racó de l'Olla (COM,JID); 22.VII: 2 ad. de urraca cebando a 1 pollo de críalo en la devesa. Primer registro de reproducción confirmado en l'Albufera, sin duda favorecido por la expansión que esta mostrando la urraca estos últimos años (VPA)

Clot de Galvany: 19.I: 1 ej. Primera cita prenupcial. Cita temprana (AJR)

2013

Albufera de València 26.VIII: 1 juv. en el Racó de l'Olla presente hasta el día 29 (EGO,BDJ)

Pese a que esta especie es de las que tiene la llegada más temprana entre las especies estivales, su llegada no suele generalizarse hasta mediados de febrero. En 2012, las citas recibidas, recogen una llegada de la especie más temprana de lo habitual, siendo detectada primero en Columbretes (16.I), seguido por el Clot de Galvany (19.I) y finalmente en Castellón (20.I). Además, ese mismo año añadimos nuevos territorios detectados de cría para la especie, seguramente relacionados con la reciente expansión de la urraca.

Cuculus canorus**Cuco común - Cucut - Common Cuckoo**

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012

Torreblanca: 21.IV: 1 par. Primera cita prenupcial (IMR)

Albufera de València: 02.VII: 1 ej. Primera observación de un joven del año en el Racó de l'Olla (MCH,JID)

Quatretonda: 02.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (JML)

Villena: 06.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (MCR)

2013

Alcossebre: 01.IV: 1 h. ad. Primera cita anual (DES)

Villena: 22.III: 1 ej. Primer canto anual (JAG)

STRIGIFORMES

TYTONIDAE

Tyto alba**Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl**

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 13.III: 1 ej. muy oscuro quizá perteneciente a la ssp. *guttata* (AAC); 19.XII: 3 ej. atropellados (VPA,AAC)

2013

Illes Columbretes: 10.VI: 1 ej. (LGB)

Marines: 06.VIII: 1 par. nidificando en la cámara de aire de una vivienda en el casco urbano (TPA,VMV)

El Fondo d'Elx: 14.IX: 3 ej. concentración destacada en este espacio natural (JMT,AVDH)

Al igual que en 2011, vuelven a observarse pequeñas pero importantes concentraciones dentro del P. N. del Hondo de Elche, donde esta especie es bastante más inusual que en el entorno de la Albufera. En este último paraje, destaca en 2012 la observación de un ejemplar muy oscuro que podría pertenecer a la ssp. *guttata* de Centroeuropa. También cabe destacar la observación de un ejemplar en junio en las islas Columbretes.

STRIGIDAE

Otus scops**Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl**

Estatus: Estival nidificante común, invernante raro. Conservación: IE

2012

Torrent: 26.XII: 3 ej. Cita invernal (JBS)

2013

Vila-real: 25.I: 2 ej. Primeros cantos en zona de cría al lado del cementerio de Vila-real (JBC)

Bubo bubo**Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl**

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2012

Oliva: 15.I: 3 par. (FAN)

2013

Albufera de València: 25.XI: 1 ej. en zonas de arrozal (PMP); 06.XII: 1 ej. (PMP,MPB)

Athene noctua**Mochuelo europeo - Mussol comú - Little Owl**

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Strix aluco**Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl**

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2012

Sant Vicent del Raspeig: 14.XI: 1 ej. (ERO)

Asio otus**Búho chico - Duc petit - Northern Long-eared Owl**

Estatus: Nidificante escaso, invernante moderado. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: Citas de 1 ej. el 4 y el 06.XI (LGB)

Vilafranca: 29.VIII: Se escuchan los reclamos de un pollo

Albufera de València: 16.IX: 1 ej. que acude a cazar a unas instalaciones agrícolas que se observa repetidamente hasta el 01.X; 03.XI: 2 ej. cerca de la laguna. Presentes desde el mes de septiembre (VVA)

Cullera: 27.XI: 1 ej. en árboles en el casco urbano (ASL)

Villena: 21.XII: 2 ej. en el casco urbano (MCR)

Illa de Tabarca: 25.IV: 1 ej. (PIC)

2013

Illes Columbretes: 13.IV: 1 ej. (LGB)

Albufera de València: 04.VI: 2 ad. atendiendo a 3 pollos en zona de pinada de la devesa (MGI, VLG); 15.XII: 3 o 4 ej. a primera hora de la noche en campos de arroz (ASL, JML)

Villena: 08.II: 1 ej. intentando cazar lavanderas blancas en un dormitorio (MCR)

El Fondo d'Elx: 25.VIII: 1 ej. atropellado (SAR)

Asio flammeus

Búho campestre - Mussol marí - Short-eared Owl

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 10.I: 1 ej. en zonas de huerta cerca de la torreta Ampla (PMP); 14.I: 1 ej. ente Silla y Catarroja (GCH); 21.II: 1 ej. en migración activa, dirección N, sobre el tancat de Milia (AAC); 24.III: 1 ej. entre el tancat de la Pipa y de la Sardina (CAP,VDA,LSO,BFM); 01.X: 1 ej. Primer registro postnupcial temprano en arrozales de l'Estell (PPL); 02.XI: 2 ej. en l'Egüeta (PMP,MPB); 20.XI: 1 ej. volando sobre el tancat de Milia (AAC); 21.XI: 1 ej. en el Borronar posado en arrozal seco (BDJ); 19.XI: 1 ej. cazando en la Llonga (EGO); 03.XII: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia a bastante altura (AAC); 11.XII: 1 ej. en arrozales cerca del puerto de Catarroja (RGR); 12.XII: 1 ej. en zonas de marjal cerca de El Malvinet (EGO)

Illa de Tabarca: 24.III: 1 ej. llega desde el mar acosada por gaviotas y descansa todo el día en la isla (AAR)

2013

Benicarló: 11.V: 1 ad. dirección N (JAM)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 29.IV: 1 ej. en vol erràtic cap al S (VET)

Marjal dels Moros: Citas de 1 ej. el 10.IV (JPH) y de 2 ej. el 29.IV (VPA)

Albufera de València: 04.I: 2 ej. posados en el margen de un arrozal (BDJ); 05.I: 1 ej. en Sueca (VGA,CMT); 13.II: 1 ej. en zonas de marjal (EGO); 02.III: 3 ej. al atardecer en zonas de arrozal (GCH); 12.III: 1 ej. en huertas de Catarroja antes del amanecer (PVG); 16.III: 1 ej. en el Borronar (GCH); 22.IV: 1 ej. en el tancat de la Ratlla presente hasta el 30.IV (JGR,BDJ); 14.XI: 1 ej. en el tancat de Milia (AGU); 09.XI: 1 ej. en Sueca. Primera cita otoñal (PMP)

Torrevieja: 10.IV: 1 ej. (SAR)

CAPRIMULGIFORMES

CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar

Estatus: Estival nidificante común. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: Cita excepcionalmente temprana de 1 ej. el 06.II (LGB)

El Campello: 13.X: 1 ej. Último registro postnupcial (JMT,AVS)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 29.IV: 1 ej. migrant aturat en tamariu (VET)

Albufera de València: 08.VI: 1 ej. en la devesa. Cita en el periodo reproductor en una zona en la que no parecen existir registros previos (MGI,VLG)

Caprimulgus ruficollis**Chotacabras cuellirrojo - Saboc coll-roig - Red-necked Nightjar**

Estatus: Estival nidificante moderado. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 09.X: Cita tardía de 1 ej. (IMR)

Albufera de València: 30.IV: 2 ej. Primer registro prenupcial (GCH); 04.VI: Cita prenupcial tardía, no cría en la zona, se observa también el día siguiente. Se aprecia una pequeña lesión, quizás por colisión, aunque vuela perfectamente (JID,MCH,IRU); 04.VIII: 10 ej. en arrozales de Sollana. Concentración destacada. Primeros registros postnupciales (PMP,MPB)

Guardamar de la Safor: 04.V: 1 ej. Primera cita anual (AMG)

2013

Alcossebre: 08.IV: Primera cita anual de 1 ej. (DES)

Xirivella: 03.IX: 1 ej. que entra en una nave industrial y es trasladado al CRF La Granja (DGS)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 10.VI: 7 ej. al llarg del camí del Mareny (DGS)

APODIFORMES

APODIDAE

Apus apus**Vencejo común - Falcia - Common Swift**

Estatus: Nidificante y migrante abundante. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 6 ej. Primera observación anual (MBM)

Benicàssim: 01.IV: 1 ej. Primera cita anual en colonia de cría; 05.VIII: 2.590 ej. cicleando al amanecer a gran altura; 18.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Moncofa: 21.V: Concentración destacada de 500 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 21.V: Concentración destacada de 3.000 ej. (JBC)

València: 13.III: 2 ej. Primera observación anual (AAR)

Albufera de València: 16.III: 1 ej. sobre el Racó de l'Olla (MCH); 05.V: Importante concentración de 6.000 ej. migrantes coincidiendo con fuertes vientos de poniente (BDJ)

Altea: 03.III: 2 ej. Primera cita anual (VSA,TZL)

Emb. de Beniarrés: 14.IV: Concentración destacada de 500 ej. (BOR)

2013

Vinaròs: 06.X: 20 ej. Última cita postnupcial (ELL)

Alcossebre: 30.IV: 3.580 ej. (DES)

Marjal d'Almenara: 09.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (JBC)

Albufera de València: 11.III: 1 ej. Primera cita prenupcial en el Racó de l'Olla (MCH,JID,GGA,IRU)

Sueca: 02.XII: 1 ej. recientemente muerto en el casco urbano. Cita excepcionalmente tardía de un ave que

podría haberse visto afectado por el marcado descenso de las temperaturas de las últimas jornadas (JTN)
Requena: 01.IX: 2 ej. Última cita postnupcial (JAI)

La llegada de esta especie, que de manera general se produce en el mes de abril, se ha ido adelantando un poco cada año llegando a finales de marzo en 2010 y a mediados de marzo en 2011. Estos años, 2012 y 2013, han seguido ligeramente dicha tendencia y la llegada de los primeros ejemplares se ha producido entre principios y mediados de marzo, aunque las grandes concentraciones no se han producido hasta mediados de abril. Curiosa, por excepcional, la cita plenamente invernal, de un ejemplar encontrado muerto en pleno casco urbano de Sueca.

Apus pallidus

Vencejo pálido - Falcia pàl·lida - Pallid Swift

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 08.IX: 6 ej. Última cita anual (MTB)

Requena: 11.IV: 4 ej. (JAI)

Albufera de València: 28.III: 4 ej. migrando junto a vencejo común sobre el tancat de Milia; 22.X: Cita tardía de 2 ej. (AAC)

Sueca: 01.IV: Primeras citas anuales de 10 ej. en localidad habitual de cría (MPB)

Emb. de Beniarrés: 14.IV: 50 ej. (BOR)

2013

Vinaròs: 09.X: 1 ej. Última cita postnupcial (ELL)

Alcossebre: 29.III: 1 ad. primera cita prenupcial (DES)

Albufera de València: Primeras citas anuales de 2 ej. sobrevolando el tancat de Milia el 11.III y de 1 ej. el 14.III (AAC,FGN); 03.X: Cita de 2 ej. algo más tardías que en años precedentes (MPB)

Requena: 01.IV: 3 ej. Cita de interior; 28.IX: 12 ej. en paso postnupcial (JAI)

Montesa: 20.IX: 6 nidos con pollos; 06.X: 1 pollo caído del nido pero que consigue volar. Aún se oyen juveniles en los nidos. Cita de reproducción tardía (SSM)

Destaca notablemente la cita de reproducción tardía en Montesa en 2013, donde se encontraron nidos activos tanto a finales de septiembre como primeros de octubre, periodo en el cual, la especie suele iniciar su migración hacia el S y en el que se suelen producir las últimas observaciones postnupciales.

Apus melba

Vencejo real - Falcia de panxa blanca - Alpine Swift

Estatus: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: IE

2012

Ares del Maestrat: 27.III: 2 ej. Primera cita anual (ALR,RPB)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 1 ej. Primera cita anual (MBM)

Desert de les Palmes: 21.X: 35 ej. Última cita anual de un bando en paso (MTB)

Benicàssim: 23.III: 2 ej. Primera cita anual; 23.IV: 2 ej. Última cita primaveral; 09.VII: 1 ad. Primera cita postnupcial en área de dispersión postnupcial; 12.VIII: Máximo postnupcial de 37 ej. en área de dispersión (MTB)

La Vall d'Uixó: 10.X: 4 ej. Última cita postnupcial (JGS)

València: 04.VII: 1 ej. (AAC)

Albufera de València: 16.III: 2 ej. Primera observación anual (MCH,JID,IRU)

Llaurí: 27.VI: 27 ej. (JML)

Albufera de Gaianes: 01.VII: 1 ej. (BOR)

Villena: 20.III: 1 ej. Primera cita anual (MCR)

2013

Vinaròs: 11.III: 2 ej. Primera cita anual (AGC); 08.IX: 67 ej. (ELL)

Albufera de València: 01.IV: 32 ej. Las últimas semanas se han venido repitiendo las citas de aves en paso favorecidas, aparentemente, por la persistencia de los vientos del O (BDJ)

Requena: 28.IX: Concentración destacada de 90 ej. (PRP); 28.IX: 50 ej. en migración (JAI)

CORACIIFORMES

ALCEDINIDAE

Alcedo atthis

Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher

Estatus: Residente, migrante e invernante moderado. Conservación: VUL

2012

Marjal d'Almenara: 03.II: Máximo anual de 7 ej. (JBC)

Albufera de València: 02.III: 1 par. desarrollando pautas de cortejo en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU); 16.VI: 1 ej. Podría tratarse de una de las aves nidificantes en el entorno del Racó de l'Olla (BDJ); 16.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita de aves nacidas esta temporada (GTR)

Cullera: 27.V: Se observa a 1 ad. entrando en nido con ceba en una acequia en El Brosquill. Se constata por primera vez la nidificación en esta zona (MAL,LAA)

2013

València: 1 par. reproductora en un talud del lago del parque de la Cabecera (JGG)

Albufera de València: 01.VII: Se observan en varias ocasiones 2 ej. con cebas en el tancat de Milia. Primera cita de reproducción en la reserva (AAC,FGN)

El Campello: 14.IX: Observación de 1 ej. en un árido espartal sin puntos de agua cercanos. Pasa volando a 1 m del suelo siguiendo el contorno de la loma. Posible desplazamiento hacia un punto con agua o migración (ALL,TZL,EGM)

El Fondo d'Elx: 16.XII: 6 ej. (CMA)

Siempre interesantes las citas de reproducción en los humedales costeros, para esta especie cuyo grueso de población reproductora se encuentra ligada a ríos de interior. Se han recibido citas en ambos años entre los meses de julio y agosto, que podrían corresponder a ejemplares dispersivos, ya que los movimientos de esta especie desde sus zonas de reproducción se producen muy temprano, por ello, solo mostramos las citas de reproducción segura.

MEROPIDAE

Merops apiaster

Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater

Estatus: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 02.IV: 1 ej. Primera cita anual (MTB)

Desierto de las Palmas: 10.IX: Máximo postnupcial de 224 ej. en paso en 3 h. de censo (MTB)
Desem. riu Millars: 14.VI: Sin actividad en la zona de cría posiblemente debido a molestias (JBC)
La Vall d'Uixó: 24.VIII: 147 ej.; 11.IX: 129 ej. (JBC)
Orxeta: 16.VI: 5 par. Bajada de parejas respecto a otros años (TZL,JMF)
Crevillent: 23.III: 5 ej. Primera cita prenupcial (MLP)

2013

Vinaròs: 25.VIII: 215 ej. Concentración destacada; 08.IX: 131 ej.; 06.X: 13 ej. Cita tardía (ELL)
Alcossebre: 29.IX: 1 ej. Última cita anual (DES)
Illes Columbretes: 06.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (LGB)
Desierto de las Palmas: 03.IX: Máximo postnupcial de 238 ej. en paso en 3 h. de censo (MTB)
Requena: 27.IX: 4 ej. Última cita postnupcial (PRP)
Albufera de València: 28.III: 12 ej. Primera cita prenupcial; 30.IV: Paso destacado de 600 ej. Sin duda el temporal de los últimos días ha retenido la migración y con la mejora del tiempo la han reanudado (AAC,FGN)
El Campello: 14.IX: 150 ej. (ALL,TZL,EGM)
El Fondo d'Elx: 09.IX: 106 ej. (SAR)

Fuertes concentraciones durante ambos pasos en ambos años. Todas las citas recibidas entran dentro de la fenología típica de la especie, salvo una cita tardía de 13 ej. el 06.X de 2013 en Vinaròs, ya que las citas en octubre de esta especie son muy poco habituales.

CORACIIDAE

Coracias garrulus

Carraca europea - Cavaller - European Roller

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012

Vinaròs: 15.IV: 1 ej. (JAM,CFA)
Traiguera: 22.VI: 1 ej. (ABC)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 05.V: 1 ej. posado y volando después hacia un eucalipto (IMR)
Benlloch: 27.VIII: 1 ej. (RBE)
Albufera de València: 01.VIII: 1 ad. volando a baja altura sobre el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC)
Pantà d'Elx: 08.VIII: 3 ej. Muy rara en la zona; 16.VIII: 1 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 23.VIII: 1 ej. (JDL)
El Fondo d'Elx: 06.VII: 7 ej. (ad. y juv.) (TZL,AJR)

2013

Ares del Maestrat: 20.VIII: 1 ej. (RPB)
Vilafranca: 13.VIII: 1 ej. (RPB)
Traiguera: 07.VII: 1 ej. (ABC)
Cálig: 07.V: 1 ej. (ABC)
Alcossebre: 22.IV: 1 ad. presente hasta el día 25.IV (DES)
Benicàssim: 07.V: única cita anual de 1 ej. (MTB)
Marjal dels Moros: 29.IV: 4 ej. (VPA); 01.V: 5 ej. (GLL)
Marines: 01.V: 1 ej. (VPA)

Casinos: 30.IV: 1 ej. (SLB)

Silla: 30.IV: 1 ej. presente hasta el 02.V (PMP)

Albufera de València: 06.V: 1 ej. posado en un tendido de teléfono; 28.V: 1 ej. volando hacia el NO (AAC,FGN)

Requena: Citas de 1 ej. posado en tendido telefónico el 7 y el 03.V (PRP); 07.VIII: 1 ej. (RAA)

Siete Aguas: 13.IX: 1 ej. (VPA)

Ayora: 23.V: 1 ad. (JBS)

Villena: 15.VIII: 4 ej. cazando junto a 15 primillas (MCR)

Salines de Santa Pola: 15.VI: 5 par. (AJR)

La Marina: 15.VI: 1 par. entrando a un tronco de algarrobo. El macho acude repetidas veces con ceba para la hembra (JSR,TZL,JMF,TMF)

Con más citas recibidas en 2013 que en 2012. Las zonas litorales de la provincia de Alicante, siguen estableciéndose como zonas de reproducción habitual de esta especie, especialmente en los palmerales asociados al P. N. de las Salinas de Santa Pola y el P. N. del Hondo de Elche. Encontramos también individuos aislados en otras zonas de la Comunidad Valenciana que, pese a no encontrarse evidencias de reproducción, no descarta la presencia de alguna pareja aislada.

UPUPIDAE

Upupa epops

Abubilla - Puput - Hoopoe

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Benicàssim: única cita en enero de 1 ej. el día 13 en una zona abierta de matorral (MTB)

Vilanova d'Alcolea: 04.I: 1 ej. cerca del aeropuerto (JBC)

Desem. del río Mijares: Varias citas de 1 ej. en enero (MBM,RPB,JBC)

Moncofa: 20.I: 2 ej. (JBC)

Xilxes: 10.I: 3 ej. (JBC,SMS,JLB)

Marjal d'Almenara: 13.I: 4 ej.; 17.XII: 12 ej. (JBC)

Tales: 08.I 1 ej. (JBC)

Requena: Citas de 1 ej. invernante en la vega del río Magro el 9 y el 29.XII (JAI)

Villena: 21.I: 5 ej. (DMM)

2013

San Rafael del Río: 30.XII: 12 ej. en grupo en una finca de olivos (ELL)

Benicàssim: Hasta 6 citas en enero en un área de cultivos de secano abandonados (MTB)

Borriol: 02.XII: 1 ej. (LPC)

Castelló de la Plana: 29.I: 1 ej. (LPC)

El Fondo d'Elx: 27.XII 1 ej. (FBE)

Como desde algunos años va siendo habitual, seguimos recibiendo citas de ejemplares invernantes, fundamentalmente en zonas de litoral y prelitoral (aunque también en zonas de frías como Requena), llegando a encontrar concentraciones de más de una decena de individuos. Las cálidas temperaturas de nuestros inviernos, que favorecen la presencia de insectos de los que se alimenta, permiten que aves migrantes como la abubilla, se vuelvan más sedentarias y puedan ser observadas durante todo el año.

PICIFORMES

PICIDAE

Jynx torquilla**Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck**

Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012**Xert:** 25.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (ALR,RPB)**Benicàssim:** Sin citas en enero, primera cita prenupcial el 11.II; 23.XII: última cita anual de 1 ej. (MTB)**Marjal d'Almenara:** 22.XII: 1 ej. cita invernal (JBC)**Paterna:** 08.XI: 1 ej. capturado para anillamiento. Cita postnupcial tardía (LSO)**Albufera de València:** 24.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (GTR); 08.XI: 1 ej. en zona de huertas de Silla. Cita postnupcial tardía (PMP)**Requena:** 18.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (RLO)**Montroy:** 21.XII: 1 ej. predado por un gato (PCR)**Desemb. riu Segura:** 16.XI: 1 ej. cita postnupcial tardía (AJR)**2013****Benicàssim:** Única cita para el mes de enero de 1 ej. el día 31; 22.XII: última cita anual de 1 ej. (MTB)**Vinaròs:** 29.XII: 1 ej. en la desem. del río Senia (FPV)**El Fondo d'Elx:** 15.II: 1 ej. (AJR)

Aumenta el número de citas plenamente invernales con respecto a años anteriores y también se expande el número de localidades donde es detectada la especie en invierno. Pese a encontrarse dentro del periodo invernal, no se puede descartar que algunas de estas citas sean en realidad citas prenupciales tempranas (aquellas dentro del mes de febrero) o citas postnupciales tardías (en el mes de noviembre).

Picus viridis**Pito real - Picot - Eurasian Green Woodpecker**

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012**Cap de l'Horta:** 31.V: 1 ej. dentro de una urbanización. Primera cita para la zona (JMT)***Dendrocopos major*****Pico picapinos - Picot garser gros - Great Spotted Woodpecker**

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2013**Buñol:** 17.II: 6 ej. en un tramo de 4 km de bosque de ribera en el río Mijares (JAI)

PASERIFORMES

ALAUDIDAE

Chersophilus duponti**Alondra ricotí - Alosa becuda - Dupont's Lark**

Estatus: Nidificante raro muy localizado. Conservación: PE

2012**Ademuz:** 17.VI: 2 ej. (RMB)**Vallanca:** 27.V: 1 ej. (RMB)**2013****Castielfabib:** 05.V: 1 m. en zona no habitual (RMB)***Melanocorypha calandra*****Calandria común - Calàndria comú - Calandra Lark**

Estatus: Nidificante raro localizado, invernante escaso. Conservación: IE

2012**Villena:** 01.V: 6 ej. distribuidos por la ZEPA Quebradas-Moratillas (MCR)**2013****Camporrobes:** 17.V: 7 ej. en campos de cereal, conteo mínimo (JAI)**Cortes de Pallás:** 31.V: Presencia de 2 ej. en época reproductora en lugar adecuado para la cría (campo de leguminosas) (JAI)**Cofrentes:** 31.V: 2 ej. en campo de leguminosas de 10 ha (JAI)**Villena:** 11.V: 4 ej. en parcela de cereal de la ZEPA Quebradas-Moratillas (MCR)**La Cabezuela:** 27.V: 3 par. en 10 ha de campos de cereal, herbazales y barbechos sembrados de leguminosa. Cantando y persiguiéndose en vuelo; 22.VI 1 ej. entra al suelo con ceba (PRP)***Calandrella brachydactyla*****Terrera común - Terrerola - Greater Short-toed Lark**

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012**Camporrobes:** 02.IX: 40 ej. Bando postnupcial destacado (RMB)**Alacant:** 11.IV: 1 ej. (MLP)**Villena:** 29.VIII: 5 ej. dispersos por el paraje de la Cañada de Almela (MCR)**2013****Boixar:** 23.VI: 1 ej. cantando y desplazándose por un páramo (JAM)**Marjal dels Moros:** 27.III: 5 ej. en el cordón litoral (FLL)**Albufera de València:** 08.III: 6 ej. en campos recién labrados. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 02.IV: 12 ej. en arrozales roturados (EGO,BDJ); 06.IV: 11 ej. en arrozales (BDJ); 30.IV: 2 ej. en un camino; 30.IV: 2 ej. (MPB)**Sinarcas:** 17.V: 6 ej. zona de cría en llano cerealista donde es muy común; 17.V: 11 ej. (JAI)**Camporrobes:** 17.V: 8 ej. en Casa de la Viña en zona de cría en campos de cereal; 17.V: Más de 10 ej. en la carretera a Villagordo del Cabriel. La población reproductora debe ser mayor aún (JAI)**Millares:** 21.V: 1 ej. haciendo vuelos de cortejo (PVG,MGR)

Calandrella rufescens **Terrera marismeña - Terrerola rojenca - Lesser Short-toed Lark**

Estatus: Nidificante raro localizado, migrante raro. Conservación: IE

2012

Villena: 03.III: 1 ej. (MCR)

El Fondo d'Elx: 10.III: 1 ej. cantando (SCR)

2013

Villena: 06.IV: 2 ej. en la ZEPA Quebradas-Moratillas (MCR)

Galerida cristata **Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark**

Estatus: Residente común, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Vilanova d'Alcolea: 15.XI: 16 ej. en el aeropuerto (JBC)

Marjal de Moncofa: 13.I: 15 ej. máximo anual (JBC)

Marjal d'Almenara: 17.XII: 12 ej. máximo anual (JBC)

Barracas: 21.I: 12 ej. (JBC)

2013

Alcossebre: 26.IX: 26 ej. Máximo anual (DES)

El paso postnupcial alcanza su máximo de mediados de septiembre a mediados de octubre, pero suele ser difícil de detectar, por lo que una concentración como la de Alcossebre es poco usual. Son también interesantes los máximos anuales detectados en invierno en zonas húmedas de Castellón, apuntando a una invernada en estas áreas.

Galerida theklae **Cogujada montesina - Cogullada fosca - Thekla Lark**

Estatus: Residente común, invernante escaso. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Lullula arborea **Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark**

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 11.X: 2 ej. única cita anual en campos abandonados de almendros (MTB)

Illes Columbretes: Citas de 1 ej. el 6 y el 07.V (LGB)

La Portera: 06.II: Bando invernal de 12 ej. (RMB)

Alauda arvensis **Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark**

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante común. Conservación: EP

2012

Illes Columbretes: 01.XI: Máximo postnupcial de 23 ej. (LGB)

Benicàssim: 29.II: 1 ej. pasa hacia el N. Primer ej. en paso prenupcial. Última cita prenupcial el 05.IV; 29.X:

Bando destacado de 25 ej. en paso hacia el S. Último migrante el 01.XI (MTB)

Albufera de València: 30.IV: 1 ej. en el Malvinaret. Cita primaveral tardía (BDJ); 30.IV: 1 ej. Cita tardía (CAV,AAC); 05.X: 1 ej. Primer registro postnupcial; 19.X: Paso de aves sueltas o en pequeños bandos a lo largo de la mañana sobre el tancat de Milia (AAC); 23.X: 20 ej. en migración activa durante la mañana (CAP,VDA,FCE,PVG)

Llaurí: 05.II: 125 ej. en los campos de arroz (ASL,JML)

2013

Alcossebre: 06.III: 20 ej. Última cita prenupcial; 17.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)

Illes Columbretes: Máximos prenupciales de 12 ej. el 01.II y de 14 el 08.II; última cita prenupcial el 15.IV (LGB)

Quadre de Santiago: 07.X primera cita postnupcial (MTB)

Marjal dels Moros: 10.IV: 2 ej. (JPH)

Valencia: 15.II: 80 ej. en unos barbechos recién labrados de la huerta de Campanar (JAI)

Albufera de València: 21.X: 1 ej. en dunas litorales. Primer registro otoñal (EGO,BDJ)

Requena: 27.X: 1 ej. en paso postnupcial al S. Primera cita del año para la comarca (JAI)

Cullera: 09.IV: 1 ej. en dunas litorales. Últimas citas prenupciales (EGO,BDJ)

HIRUNDINIDAE

Riparia riparia

Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante común. Conservación: VUL

2012

Vinaròs: 12.III: 1 ej. volando al N junto a una decena de golondrinas comunes (ELL)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 135 ej. en paso (RPB,ALR,ADP)

Albufera de València: 15.III: 1 ej. comiendo sobre el Racó de l'Olla junto con avión común. Primera cita anual (MCH,JID,IRU); 24.VII: Paso más o menos continuo a lo largo de la mañana de aves migrantes sobre el tancat de Milia y concentración de unas 200 aves posadas en cables eléctricos en la población de El Palmar (CAV,AAC); 29.VIII: 2.200 ej. posados sobre un tendido telefónico a las afueras de El Palmar (MCH); 06.XI: 10 ej. sobre el tancat de Milia. Última cita postnupcial (AAC)

Real de Gandía: 25.IV: 15 ej. en la colonia de cría (AMG)

Xixona: 15.III: 50 ej. colonia de reproducción (TZL)

2013

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.IV: 35 ej. en paso activo (RPB,ALR)

Albufera de València: 09.III: 1 ej. en compañía de golondrina común. Primer registro prenupcial (BDJ,BMA); 11.III: 6 ej. en migración activa junto a cientos de aviones comunes (AAC,FGN); 12.III: Varios centenares de ej. junto a golondrina común (PMP); 18.VI: 2 ej. junto con golondrina común (MCH); 27.VI: 2 ej. cazando insectos sobre l'estany de la Plana. Probablemente se trate de aves procedentes de alguna colonia reproductora cercana al parque; 05.VII: 10 ej. alimentándose en el tancat de Milia. Podría tratarse de aves dispersándose de sus colonias de cría. Aumento notable a 120 ej. Primeras concentraciones post-nupciales (AAC,FGN)

Vallada: 18.VI: 1 par. entra repetidamente a uno de los agujeros de la colonia de cría. Este año la colonia cuenta con una única pareja reproductora (JML)

Pantà d'Elx: 21.II: 30 ej.; 21.VII: 900 ej. en dormidero del carrizal; 07.X: 21 ej. (OAP)

Clot de Galvany: 21.II: 1 ej. Primera observación anual (AJR)

Ptyonoprogne rupestris**Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin**

Estatus: Residente nidificante e invernante común. Conservación: IE

2012**Benicàssim:** 12.III: 2 ej. Última cita prenupcial; 05.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB)**Marjal d'Almenara:** 13.I: Máximo anual de 700 ej.; 08.II: 344 ej. (JBC)**Pantà d'Elx:** 08.II: 300 ej. (OAP)**Santa Pola:** 31.X: Dormidero de 600 ej. en edificio junto al puerto (OAP)**2013****Alcossebre:** 20.III: 5 ej. Última cita prenupcial (DES)**Benicàssim:** 09.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)**Buñol:** 17.II: 4 ej. Escasa presencia invernal en los cintos del Quisal (JAI)**Cullera:** 10.X: 2 ej. sobrevolando el casco urbano. Primeras citas otoñales (MPB); 17.XII: Concentración destacada de 450 ej. Parecen alimentarse en las grandes nubes de quironómidos que se localizan en estas zonas (BDJ)**Elx:** 05.X: 2 ej. (OAP)**El Fondo d'Elx:** 21.XII: Gran grupo invernante de 70 ej. en el humedal (JAI)***Hirundo rustica*****Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow**

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante, invernante raro. Conservación: IE

2012**Torreblanca:** 22.II: 2 ej. alimentándose en terraplenes de la carretera (LPC)**Desert de les Palmes:** 02.X: 2.760 ej. en 2.5 h. de censo. Máximo anual (MTB)**Benicàssim:** 08.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB)**Illes Columbretes:** 03.II: 5 ej. (LGB)**Marjalera de Castelló:** 02.XII: 1 ej. solitario sobrevuela las acequias alimentándose (XBC)**Borriana:** 04.X: 1.000 ej. Importante paso continuo al S (JBC)**La Vall d'Uixó:** 19.IX: 2.249 ej. durante el censo de migración de rapaces en 3 h. (JBC,JGS); 24.IX: 1.193 ej. censo de migración de rapaces en 3 h. (JBC)**Albufera de València:** 20.I: 1 ej. entre aviones roqueros (CSK,VLG,BDJ); 16.II: 1 ej. en el Racó de l'Olla junto con avión roquero (BDJ); 06.XI: 20 ej. sobre el tancat de Milia. Últimas citas postnupciales; 23.XI: 4 ej. en el tancat de Milia y el Palmar (AAC); 08.XII: 1 ej. integrado en un grupo de aviones roqueros en el frente litoral del Perellonet. Cita tardía que podría corresponderse con la invernada (JHZ,BDJ); 10.XII: 1 ej. posado en un tendido telefónico. Cita otoñal tardía (MCH,JID)**Requena:** 09.XI: 1 ej. Última cita anual (JAI)**Marjal de Pego-Oliva:** 26.XII: 1 ej. junto con centenares de aviones roqueros (FAN)**Mutxamel:** 17.II: 1 ej. Primera observación del año (EGM)**El Fondó de les Neus:** 05.X: 1.000 ej. en migración (SCR)**Pantà d'Elx:** 20.IX: 15.000 ej. número destacado de individuos en dormidero del carrizal (OAP)**Clot de Galvany:** 10.XI: 1 ej. (OAP)**El Fondo d'Elx:** 02.I: 1 ej. (MLP); 19.XII: 1 ej. (OAP)**2013****Catí:** 13.II: 3 ej. (ALR)**Vinaròs:** 06.X: 1.045 ej. en 3 h. durante el censo postnupcial de rapaces (ELL)

Alcossebre: 30.IV: 800 ej. en 1 h. de censo en paso al NE (DES)

Illes Columbretes: 01.VI: Cita prenupcial tardía de 1 ej. (LGB)

València: 28.IX: 750 ej. en paso en 1 h. de censo (JTN)

Albufera de València: 23.I: 1 ej. Cita invernal (AAC); 18.II: 2 ej. en migración activa hacia el N (AAC,FGN); 16.XI: 1 ej. integrado en un bando de 40 aviones roqueros comiendo quironómidos en el tancat de la Pipa (MGE,PVG)

Requena: 04.IV: 100 ej. Congregación en paso prenupcial por los estanques (JAI)

Xixona: 16.II: 1 ej. en migración hacia el N (RAG)

El Campello: 29.IX: 1.500 ej. en paso en 2 h. (EGM)

Alacant: 19.II: 1 ej. migración hacia el N (VGS)

Pantà d'Elx: 21.VII: 3.000 ej. en dormitorio del carrizal; 14.XI: 2 ej. (OAP)

El Fondo d'Elx: 18.II: 4 ej.; 16.XI: 1 ej. (OAP)

Cecropis daurica

Golondrina dáurica - Oroneta cua-rogenca - Red-rumped Swallow

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012

Desert de les Palmes: 17.VIII: 21 ej. en varios puntos del bco. de Miravet (VET)

Altura: 31.III: 2 ej. (JBC)

Chelva: 23.VI: 1 par. inicia la construcción del nido (JAI)

Albufera de València: 06.III: 1 ej. volando hacia el N junto con golondrinas comunes sobre la devesa. Primera cita anual (MCH,IRU,JID)

Pantà d'Elx: 07.IX: 100 ej. en dormitorio (OAP)

2013

Marjal dels Moros: 24.II: 2 ej. Primera cita primaveral (JVE)

Albufera de València: 24.II: 2 ej. con un grupo de avión común y avión roquero. Cita temprana (GCH); 25.II: 1 ej. junto con avión roquero y avión común comiendo sobre una de las lagunas y la pinada del Racó de l'Olla. Primera cita prenupcial en la reserva (MCH,JID,IRU); 02.III: 1 ej. cerca del tancat de Milia (CAZ); 30.III: 10 ej. en paso activo hacia el N en apenas una hora de observación. Se trata del mayor número de aves en paso registrado hasta la fecha en l'Albufera (AAC,BDJ)

Requena: 25.IX: 50 ej. inusual agrupación de migrantes volando al E (PRP)

Yàtova: 07.VI: 15 ej. paso continuo al S de ejemplares aislados junto con golondrinas comunes; 25.V: 2 ej. mostrando rasgos de hibridación con golondrina común (JAI)

Pantà d'Elx: 21.II: 2 ej.; 18.IX: 500 ej. Gran concentración en dormitorio del carrizal (OAP)

Elx: 08.IX: 15 ej. se alimentan junto con golondrinas comunes (OAP)

El Fondo d'Elx: Citas tardías de 1 ej. el 19 y el 30.XI (OAP)

Delichon urbicum

Avión común - Oroneta cua-blanca - Northern House Martin

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante. Invernante raro. Conservación: IE

2012

Almassora: 29.II: 8 ej. volant sobre una zona ajardinada al costat del riu Millars, despres de varies pasades desapareixen (MBM)

Les Alqueries: 11.IX: 100 ej. volando bajo en paso al S (JBC)

Borriana: 07.IX: 200 ej. posados en cables (JBC)

La Vall d'Uixó: 24.IX: 178 ej. censo de migración de rapaces en 3 h. Máximo anual (JBC)

Teresa: 07.VII: 30 cebas de adultos en 1 h. a un total de hasta 15 pollos ya emplumados en el nido. El 95% del mismo ej. de la pareja (JBC)

Albufera de València: 08.II: 1 ej. entre aviones roqueros (PVG); 24.II: 2 ej. junto con avión roquero (MCH,JID,IRU)

Gandía: 10.VII: 130 ej. posados en unos cables de luz. Concentración postnupcial (JML)

Salines de Calp: 25.II: 1 ej. Primera cita anual (VSA,TZL)

Asp: 12.I: 1 ej. (SCR)

Pantà d'Elx: 08.I: Cita invernal de 1 ej.; 6 ej. el 24.II aumentando considerablemente a 60 ej. el 28.II; 07.XII: 1 ej. (OAP)

Salines de Santa Pola: 10.XI: 1 ej. (OAP)

El Fondo d'Elx: 14.XII: 3 ej. (OAP)

2013

Vinaròs: 06.X: 774 ej. durante el censo postnupcial de rapaces en 3 h. (ELL)

Illes Columbretes: 17.II: 2 ej. (LGB)

Castelló de la Plana: 26.II: 6 ej. en colonia de cría (XBC)

Marjal d'Almenara: 02.I: 1 ej. volant entre un grup de avió roquer (DOC)

Segorbe: 19.II: 12 ej. en grupo sobrevolando la ciudad (JAR)

Albufera de València: 08.II: 1 ej. asociado a avión roquero. Cita invernal que podría corresponder a las primeras arribadas de aves procedentes de África (AAC,FGN); 10.II: 5 ej. (TPA); 21.II: 1 ej. sobre el saladar del Racó de l'Olla junto con avión roquero (MCH,JID,IRU,GGA); 22.II: 30 ej. entre avión roquero sobre la devesa. Arribada patente de aves (AAC,FGN); 28.XI: 1 ej. con aviones roqueros. Cita tardía (BDJ)

Requena: 22.VI: Más de 100 nidos activos en el cantil fluvial de Peñas Altas junto al río Reatillo (JAI)

Tavernes de la Vallidigna: 30.XI: 1 ej. junto a un grupo de aviones roqueros (LAA)

Sant Vicent del Raspeig: 26.II: 3 ej. entrando en un nido del año anterior en una zona de nidificación del casco urbano. Al menos 1 ej. lleva probablemente varios días en la zona (JDL)

Pantà d'Elx: 4 ej. el 14.II, y llegada marcada de efectivos, con 200 ej. el 21.II; citas tardías de 1 ej. el 29.XI: 1 ej. y de 2 ej. el 16.XII (OAP)

Clot de Galvany: 07.II: 1 ej. Primera observación anual (AJR)

El Fondo d'Elx: 09.I: Cita invernal de 1 ej.; en febrero 2 ej. el 02.II, aumentando a 4 ej. el 06.II y ya 200 el 22.II (OAP)

Sot de Chera: 06.XI: 1 ej. junto a aviones roqueros. Cita tardía en una localidad de interior (PRP)

MOTACILLIDAE

Anthus richardi

Bisbita de Richard - Titeta de Richard - Richard's Pipit

Estatus: Invernante raro.

2012

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 16.XI: 2 ej. (AJR); 07.XII: 1 ej. (AJR,MSA)

2013

Marjal d'Almenara: 09.XII: 1 ej. solitario alimentándose en una zona de vegetación rala (JBC), nueva cita de este ej. el 19.XII y el 31.XII junto a un grupo de bisbitas pratenses. Zona con vegetación rala y algunas charcas de agua. Es la tercera cita de esta especie en este mes, posiblemente del mismo ej., aunque cada localización en una zona distinta (JBC,JLB)

Albufera de València: 19.XI: 1 ej. en dunas litorales del Perellonet, sale volando al paso de los observa-

dores y se desplaza en vuelo hacia la devesa (EGO,BDJ)

Cullera: 14.II: 1 ej. en zonas abiertas de matorrales y espartales del Cabeçol cerca del campo de tiro. Podría haber hasta 2 ej. Se trata del primer registro desde diciembre de 2011 en la localidad (BDJ,JGR)

Tras unos años que podemos considerar como excepcionales para esta rara especie del E de Europa (9 en 2010, 18 en 2012 y 13 en 2013) estos años han dejado registros mucho mas moderados, con tan solo 2 (o 3) ej. en 2012 y 3 (o 4) en 2013.

Anthus campestris

Bisbita campestre - Titeta d'estiu - Tawny Pipit

Estatus: Estival nidificante común y migrante escaso. Conservación: IE

2012

Vilafranca: 12.IV: 1 ej. Primera cita anual (RPB)

Benicàssim: 07.IV: 1 ej. Primera cita anual. Última cita prenupcial el 19.V; 05.X: 1 ej. única cita postnupcial en campos abandonados de almendros (MTB)

Illes Columbretes: 07.X: 2 ej. (LGB)

2013

Benicàssim: Único registro anual de 1 ej. el 20.IX (MTB)

Albufera de València: 09.IV: 1 ej. en paso hacia el N sobre las dunas de la devesa. Primer registro prenupcial (BDJ); 12.IX: 1 ej. un ave en huertas de Silla. Primer registro postnupcial (PMP)

Millares: 21.V: 3 ej. cantando y haciendo vuelos de cortejo (PVG,MGR)

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo - Titeta dels arbres - Tree Pipit

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 24.III 1 ej. Primera cita anual; 16.V: 1 ej. Última cita primaveral; 10.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 02.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Castielfabib: Citas estivales de 1 ej. el 24 y el 30.VI (CVV)

La Romana: 23.III. 1 ej. Primera cita anual (SCR)

2013

Benicàssim: 27.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 29.IV: 9 ej. en transecto de 1 km. Fuerte sedimentación por tormenta; el 30.IV ya solo 2 ej.; 19.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 12.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 29.X: 1 ej. Última cita postnupcial (MTB)

Albufera de València: 24.V: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Cita primaveral tardía (JID,MCH); 12.IX: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (MCH,JID,GGA,IRU)

Bocairent: 01.IX: 1 ej. (BOR)

Anthus pratensis

Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit

Estatus: Migrante e invernante común. Conservación: IE

2012

Llacuna de la Jana: 15.I: 55 ej. (JBC)

Vilanova d'Alcolea: 11.I: 98 ej. dos grupos de 30 y 32 ej. (JBC,JLB)

Benicàssim: 03.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Port de Borriana: 13.XI: 63 ej. máximo anual (JBC)

Marjal de Moncofa: 21.V: 1 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 10.I: Máximo anual de 50 ej. repartidos en pequeños bandos por la marjal (JBC)

Albufera de València: 03.III: 80 ej. en un campo. Primeras concentraciones prenupciales destacadas (PMP,GMA); 12.IV: 5 ej. en zonas inundadas del mareny de Sant Llorenç. Últimas citas prenupciales (BDJ); 28.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (PMP)

2013

Alcossebre: 08.IV: 8 ej. Última cita prenupcial (DES)

Desert de les Palmes: 07.X: Primera cita postnupcial de 1 ej. en paso (MTB)

Benicàssim: 09.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB)

Illes Columbretes: 11.IV: 2 ej. (LGB)

Yàtova: 06.IV: 12 ej. todavía presente en prados y herbazales (JAI)

Albufera de València: 10.X: 1 ej. en arrozales cosechados. Primer registro otoñal (BDJ,JGR)

Platja d'Aiguaoлива: 06.X: 2 ej. (FPV)

Anthus cervinus

Bisbita gorgirrojo - Titeta gola-roja - Red-throated Pipit

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 17.II: 2 ej. con plumaje nupcial alimentándose en campos recién fangueados. Cita prenupcial excepcionalmente temprana (VPA,FLL), se observan de nuevo el 18.II (VPA,FLL,AAC); 26.III: 1 ej. alimentándose entre ranúnculos junto con bisbitas alpinos (SEOV), se observa de nuevo el 27.III (AAC); 26.IV: 1 ej. sale volando de un arrozal cubierto de vegetación en la Calderería (BDJ,JGR); 28.IV: Se capturada 1 ej. para anillamiento (JMR,SEL); 23.IX: 1 ej. en la Ratlla. Apenas existen registros postnupciales de esta especie (BDJ)

Cap de Cullera: 02.V: 1 ej. en lo alto de la serra de les Raboses (MPB)

Altea: Citas de 1 ej. el 18 (TMF) y el 20.IV (TMF,JMF,TZL,WMY)

Alacant: 20.IV: 1 ej. (JMT,TMF,DFR,PVP)

El Fondo d'Elx: 13.XII: 1 ej. (AJR)

2013

Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 2 ej. (VET)

Albufera de València: 28.II: 1 ej. en campos de la Llonga. Primera cita prenupcial algo temprana (AAC,FGN); 08.IV: 2 ej. junto con bisbita pratense en campos de guisantes; 09.IV: 2 ej. en paso hacia el N sobre las dunas de la devesa; 24.IV: 3 ej. en zonas de cultivo de hortalizas y arrozal (BDJ); 26.IV: 6 ej. en campos del Borrónar (BDJ,AAC); 30.IV: 2 ej. en zonas de huerta (PMP); 30.IV: 1 ej. en campos de hortalizas; 01.V: 1 ej. (podría haber hasta 2) en zonas de transición de huerta y arrozales del Borrónar. Podría tratarse de las mismas aves observadas los últimos días del pasado mes de abril (BDJ). En el canyar del Plater, citas de 1 ej. el 04.V (BDJ) y de 2 ej. el 05.V (JMR)

Anthus spinoletta

Bisbita alpino - Titeta de muntanya - Water Pipit

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Requena: 15.IV: 1 ej. Última cita de la temporada; 06.X: 2 ej. Primera cita otoñal (JAI)

Monòver: 18.IV: 4 ej. recorriendo el río junto con otros bisbitas (VGC)

2013

Utiel: 12.I: 4 ej. censo invernal en la presa del Sebillar (JAI)

Requena: 10.IV: 2 ej. Última cita prenupcial con plumaje de verano (PRP); 27.X: 3 ej. Primera cita postnupcial (PRP)

Albufera de València: 27.X: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (GTR)

Motacilla flava**Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail**

Estatus: Nidificante escaso, migrante común, invernante raro. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: Máximo primaveral de 17 ej. el 01.V; Cita tardía de 1 ej. el 01.VI; Primera cita postnupcial de 4 ej. el 17.VIII (LGB)

Marjal de Moncofa: 11.IV: Bando destacado de 100 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 20.VI: Máximo estival de 26 ej. (JBC)

Marjal dels Moros: 08.IV: 1 m. de la ssp. *feldegg* (JRU)

Albufera de València: 12.I: 1 ej. en zonas ajardinadas de la devesa (EGO,PCA,BDJ), observada de nuevo el 20.I (BDJ); 18.I: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC) y 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 24.I: 2 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 11.II: 8 ej. de la ssp. *flava* y 1 ej. de la ssp. *thunbergi* en la marjal de Alfafar (AAC); 04.IV: 1 m. ad. de la ssp. *feldegg* anillado en el tancat de la Pipa (PVG,LSO,BFM,DBE,CAP,VDA); 26.IV: 100 ej. en el tancat de Milia. Se observan aves de las ssp. *flava*, *flavissima*, *iberiae* y *thunbergi* (CAV,AAC); 05.VI: 1 h. de la ssp. *flava*. Cita tardía (AAC); 02.VII: 1 m. en el tancat de Milia mostrando caracteres propios de la ssp. *feldegg* asociada a un pequeño bando de la ssp. *iberiae*. Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO (AAC); Nuevas citas del mismo ej. los días 05.VII (CAV,AAC), 10.VII, 16.VII (AAC) y 01.VIII (CAV,AAC); 05.VII: 1 ej. de la ssp. *cinereocapilla* en el tancat de Milia (AAC); 26.XI: 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 02.XII: 3 ej. en herbazales de la depuradora del Perelló (TRE,JMAB). En el tancat de Milia, citas tardías de 1 ej. el 13.XII (AAC); 2 m. y 1 h. el 19.XII (AAC,FGN) y de 1 h. de primer año capturada para anillamiento el 23.XII (GTR)

Requena: 15.IV: 21 ej. máximo numérico prenupcial (JAI); 06.X: 3 ej. Última cita postnupcial (JAI)

El Fondo d'Elx: 19.XII: 2 ej. (AJR)

2013

Illes Columbretes: 07.III: 1 ej. (LGB)

Titaguas: 28.IX: 50 ej. (RGG)

Requena: 09.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (PRP); 22.VIII: 1 ej. en paso en los estanques. Primera cita postnupcial (JAI)

Albufera de València: 19.I: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR); 30.I: 1 ej. en arrozales fangueados (JHZ,VLG,BDJ); 11.III: 7 ej. de la ssp. *iberiae* y 1 ej. de la ssp. *cinereocapilla* en el tancat de Milia (AAC,FGN); 12.III: 45 ej. bando destacado en arrozales del Saladar (PMP); 09.IV: 210 ej. importante flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de más de 60 aves en paso hacia el N sobre las dunas en apenas 30 minutos de observación (BDJ); 09.IV: 600 ej. tres grandes grupos en cultivos formados por diversas ssp. *lava*, *iberiae* y *flavissima* (PMP); 11.V: 160 ej. en varios bandos en el tancat de Milia. La mayoría de la ssp. *thunbergi* (AAC,FGN); 07.IX: 150 ej. en zonas de cultivo entre Sollana y el Romaní. Primeras concentraciones postnupciales notables (PMP); 27.XI: 2 ej. uno de ellos un m. ad. de la ssp. *flava* (PVG,SEO); 02.XII: 3 m. en el entorno de la depuradora del Perelló (PVG,TPR); 22.XII: 1 ej. en el tancat de Milia (GTR)

Marjal de Xeresa-Xeraco: 13.IV: 2 m. peleando por territorio (PLP)

El Fondo d'Elx: 15.I: Cita invernal de 1 ej. (AJR); 29.IV: 300 ej. máximo prenupcial (SAR); 13.X: 310 ej. máximo postnupcial (SAR); 27.X: 3 ej. Última cita otoñal (OAP)

Parecen en aumento las citas de ejemplares invernantes en las marjales costeras, especialmente en el entorno de la Albufera de Valencia, pero también en el Fondo, con 14 o 15 ej. distintos en enero y diciembre de 2012 y 7 ej. en enero y diciembre de 2013. Son destacables las dos citas de la ssp. oriental *feldegg* en 2012: 1 ej. anillado a principios de abril en l'Albufera (homologada por el CR-SEO en Copete et al. 2015) y otro citado en varias ocasiones durante los meses de julio y agosto de nuevo en l'Albufera. A este respecto cabe comentar que esta subespecie se ha expandido de forma muy marcada hacia el O de Europa, estando asentada como nidificante en Italia, y con un importante aumento de citas tanto en España como en países del entorno (Ferlini, 2016). Por último resulta relevante la cita de un m. estival de la ssp. *cinereocapilla* en l'Albufera en 2012. Esta ssp. ocupa las costas orientales del Adriático y zonas de la península Itálica y ha colonizado recientemente áreas al N de los Alpes y se ha expandido por grandes áreas costeras del Mediterráneo francés y por Cataluña y Mallorca (Bartolí, 1991; Garcias, 2008; Ferlini, 2015), produciendo poblaciones con rasgos intermedios en distintos puntos (Aymí & Roy, 2004). También se ha indicado que las poblaciones de Castellón y Valencia, hasta la marjal de Pego-Oliva albergaría casi exclusivamente ejemplares con rasgos intermedios (Hernández, 2008). Esta es la primera cita estival que publicamos de un ej. puro de *cinereocapilla* en la Comunidad Valenciana, aunque se desconoce si llegó a criar.

Motacilla citreola

Lavandera cetrina - Cueta citrina - Citrine Wagtail

Estatus: Migrante raro

2012

Albufera de València: 03.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Primer registro anual en una fecha y localidad que empieza a ser típica para la especie. Decimotercer registro para l'Albufera (BDJ,PMP); nuevas citas de este ej. los días 4 (BDJ), 6 (FLL,CAV,VPA) y 7 (GBA,BDJ); 18.IX: 1 juv. en el tancat de Milia (CAV,AAC) observado de nuevo el 19.IX (AAC); 24.IX: 1 juv. Podría tratarse del tercer registro de esta temporada (BDJ); probablemente el mismo ej. observado el 26.IX (BDJ,AAC,CAV)

2013

Albufera de València: 04.IX: 1 juv. en el tancat de la Pipa. Con este serían ya quince los registros obtenidos en l'Albufera desde que se citara por primera vez en 2005 (PVG,RGR); observado de nuevo el día 6 (PVG); 05.IX: 1 juv. en el tancat de Milia, observado de nuevo los días 16 y 17.IX (AAC,FGN); 19.IX: 1 juv. (diferente al observado dos días antes) en el tancat de Milia. Este ejemplar viene asociado con un bando de lavanderas boyeras, principalmente de la ssp. *thunbergi* y *flavissima* (AAC,AAR,JMT). Observado de nuevo el día 20 (AAC,FGN); 23.IX: 1 h. ad. en el tancat de Milia (AAC,FGN), observada de nuevo el 26 (AAC,FGN), el 28 (GTR,JGOM,UFU,VLO) y el 30, nueva cita del ad. y 1 juv. (quizás diferente) el 01.X. Por último, nueva cita de la h. ad. el 02.X (AAC,FGN)

De nuevo recibimos varias citas por año en la Albufera de Valencia 3 juveniles en 2012 y 3 juveniles y 1 h. adulta en 2013. Los 3 ej. de l'Albufera de 2012 han sido homologados por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Motacilla cinerea**Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012

Moncofa: 13.I: 4 ej. (JBC)

Albufera de València: 19.VII: 1 ad. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial algo temprana (CAV,AAC); 03.IX: 1 juv. en zonas de barbecho de la Palmella (BDJ)

2013

Alcossebre: 12.III: 1 ej. Última cita prenupcial (DES)

Benicàssim: 12.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 17.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Albufera de València: 30.IX: 1 ej. Primer registro otoñal (PMP)

Motacilla alba**Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail**

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 04.IV: última cita prenupcial de 2 ej. en paso activo al N; 24.X: 14 ej. Máximo postnupcial en transecto de 1 km de aves en paso activo. Últimas aves en paso activo el 30.X (MTB)

Borriana: 10.XI: 18 ej. migrando sobre el mar. Censo RAM (JBC,JLB,VAT)

Marjal d'Almenara: 12.II: 250 ej. menjant a un camp semiinundat (MBM)

Albufera de València: 31.I: Concentración destacada de 2.000 ej. en apenas dos campos de arroz en la bassa Rasa (MPB); 14.II: 1 m. de la ssp. *yarrellii* en arrozales recién fangueados del tancat de Caro (AAC) 10.III: 1 ej. aparentemente h. o de 1.^{er} ver. mostrando rasgos de la ssp. *yarrellii* (BDJ)

Cap de l'Horta: 21.II: 1 ad. de la ssp. *yarrellii* (JMT)

El Fondó de les Neus: 03.I: 1 ej. de la ssp. *yarrellii* (SCR)

2013

Quadre de Santiago: 24.XII: 54 ej. bando destacado junto a rebaño de ovejas (MTB)

Illes Columbretes: 30.III: 1 ej. (LGB)

Requena: 17.IX: 59 ej. concentración postnupcial (PRP)

Albufera de València: 01.III: 1 ej. de la ssp. *yarrellii* aparentemente h. o 1.^{er} ver. en zonas fangueadas de la Partideta. Primer registro invernal que coincide con el mes que registra un mayor número de citas de esta ssp. en l'Albufera (BDJ)

Cañada del Churro: 03.XI: 34 ej. concentración en campo de barbecho con estiércol reciente (RMB)

TROGLODYTIDAE**Troglodytes troglodytes****Chochín común - Caragolet - Northern Wren**

Estatus: Nidificante común, invernante moderado. Conservación: IE

2012

Benicàssim: Citas de 3 ej. en paso entre el 14 y el 22.X (MTB)

Illes Columbretes: 07.I: 1 ej. Cita invernal. Citas primaverales de 1 ej. los días 4, 5 y 12.III y el 28.IV (LGB)

Albufera de València: 30.X: 1 ej. en zonas de arbolado de ribera y huerta abandonada de las dunas de

Sant Llorenç (JHZ,BDJ); 09.XI: 1 ej. en el itinerario del bosque de ribera del Racó de l'Olla. Primera observación postnupcial (JID,MCH)

El Fondo d'Elx: Cita invernal de 1 ej. el 25.I (OAP)

2013

Quadre de Santiago: Citas de 1 ej. invernante los días 17 y 23.XII (MTB)

Albufera de València: 31.I: 1 ej. en la devesa. Muy escaso como invernante en l'Albufera (VLG)

PRUNELLIDAE

Prunella modularis

Acentor común - Rossarda - Dunnock

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante moderado. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: Cita invernal de 1 ej. los días 8 y 12.I; última cita prenupcial de 2 ej. el 29.III; Durante el paso postnupcial máximo de 9 ej. el 03.XI (LGB)

Clot de Galvany: 08.I: 1 ej. cita invernal (MAA)

2013

Ares del Maestrat: 05.VII: Grupo familiar compuesto por 2 juv. y 1 ad. (RPB,ALR)

Vilafranca: 29.IV: 1 ej. en la Foz (RPB); 29.IV: 1 ej. en el mas de la Carrasca (RPB,ALR)

Vinaròs: 27.X: 1 ej. observado durante el censo postnupcial de rapaces (ELL)

Illes Columbretes: Citas invernales de 1 ej. el 25 y el 28.I (LGB)

Buñol: 17.II: 2 ej. presencia invernal (JAI)

Yátova: 30.XI: 10 ej. en el entorno agroforestal de la aldea de la Paridera. Ave común en los setos (JAI)

Illa de Tabarca: 31.III: 1 ej. (PIC)

Sierra Martés: 07.XII: 7 ej. común en los matorrales de la umbría (JAI)

Salines de Santa Pola: 05.I: 1 ej. cita invernal (AJR)

Aunque su área de distribución estival abarca grandes áreas del interior de la provincia de Castellón y parte de la de Valencia, se presenta en densidades muy bajas, por lo que pasa muy desapercibido. Por lo tanto, resultan especialmente interesantes las citas de ejemplares estivales en Vilafranca y de una pareja nidificante en Ares del Maestre. La migración y la invernada pasan, igualmente bastante desapercibidas, aunque en invierno es común en zonas forestales y en umbrías como indican los datos de Yátova y la sierra Martés.

Prunella collaris

Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor

Estatus: Invernante escaso localizado. Conservación: IE

2012

Ares del Maestrat: 16.II: 7 ej. en la Belluga (RPB); 09.X: 2 ej. en la mola. Primera cita postnupcial (RPB,ALR)

Vilafranca: 07.II: 1 ej. en la font del Regatxal (RPB)

Penyagolosa: 19.XI: 5 ej. en el pico (VET)

Illes Columbretes: 12.III: 2 ej. (LGB)

Borriol: 10.XI: 3 ej. en el bco. de Atzavara. Se desplazan hacia la Botalaria, donde tienen su dormitorio (LPC)

- Alfondeguilla:** 29.II: 3 ej. en Castell de Castro (JGM)
Serra del Mondúber: 27.X: 1 ej. se para en una roca de la cresta de la sierra (ASL,JML); 24.IV: 2 ej. fecha tardía (AMG)
Tuéjar: 26.XII: 2 ej. en un pequeño cantil de cerca del río Turia (JAI)
Chera: 31.XII: 7 ej. grupo invernante en un roquedo de medianas dimensiones en laderas empinadas con arbustos dispersos del pico Ropé (JAI)
Sierra del Cid: 04.I: 3 ej. (AJR)
Alacant: 01.III: 4 ej. en el Cabeçó d'Or (AJR,MSA)
Biar: 13.I: 3 ej. en el castillo (JAG)
Cocentaina: 24.III: 4 ej. en Montcabrer (PCC)

2013

- Penyagolosa:** 21.XI: 1 ej. en el cantal de Miquelet (VET)
Borriol: 07.I: 12 ej. alimentándose en terreno rocoso en el bco. de Atzavara. Nuevas citas de 5 ej. el 14.II y de nuevo 5 ej. el 08.III; 28.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial. Citas de 2 ej. el 07.II y de 6 ej. el 22.XII: 6 ej. (LPC)
Morella: 24.I: 5 ej. en el Bosc
Embalse de Contreras: 24.XI: 1 ej. (RMB)
Sierra del Benicadell: 19.III: 3 ej. (PLP)
Sierra Martés: 07.XII: 7 ej. entre el pico Noño y el pico Martés (JAI)
Albalat dels Tarongers: 17.III: 1 ej. (GCH)
Alpuente: 24.I: 3 ej. en la cima del cerro Negro (1.400 m s.n.m.) (TPA)
Beniatjar: 25.I: 12 ad. (JBS)
Chera: 25.XI: 6 ej. en el pico Ropé (PRP)
Sot de Chera: 29.XI: 1 ej. en la sierra de Enmedio (PRP)
Utiel: 02.III: 2 ej. en el pico Negrete (JAI)
Yàtova: 30.XII: Varios ej. (TAL)
Alacant: 30.XII: 10 ej. en la serra del Castell de la Solana (JML); 01.V: 1 ej. en el Cabeçó d'Or (AJR)
Alcoi: 24.XI: 1 ej. en la serra dels Plans (BOR)
Callosa d'en Sarrià: 03.IV: 2 ej. en la serra de Bernia
Cocentaina: 16.II: 2 ej. en la Serra de Mariola (ROL)
Fageca: 13.I: 1 ej. en la serra Serrella (ROL)
Gaïanes: 05.I: 14 ej. en la sierra del Benicadell y 9 ej. el 20.III (ROL)

Continúa el buen seguimiento de esta especie, que como es habitual, está siempre asociada a picos rocosos y zonas escarpadas. Primera cita en estos dos años el 09.X en Ares, que es la más temprana publicada en los Anuarios hasta el momento, mientras que la última cita prenupcial, es del 01.V en el Cabeçó d'Or en Alicante, que aunque tardía, no supera el registro de Columbretes del 09.V.2007.

TURDIDAE

Cercotrichas galactotes

Alzacola rojizo - Cuaenlairat - Rufous Scrub-robin

Estatus: Estival nidificante escaso. Conservación: IE

2012

- Illes Columbretes:** 17.V: 1 ej. (LGB)

El Fondó de les Neus: 26.V: 1 ej.; 09.VI: 1 ej. cantando; 09.VII: 1 ej. cantando (SCR)

Salines de Santa Pola: 26.V: 1 par. (TZL,JMF)

Cap de Santa Pola: 06.VII: 1 ej. (TZL,AJR)

2013

Alacant: 15.VI: 1 ej. la sierra del Molar (JSR,TZL,JMF,TMF)

Continúan siendo muy escasas las citas recibidas de esta especie catalogada como *En Peligro* debido al reciente y acusado declive en su área de distribución en España (López-Iborra, 2003). Su área de nidificación en nuestra Comunidad está restringida a tres núcleos poblacionales de Alicante donde se estima que quedan unas 100 parejas (López-Iborra et al., 2015). Es destacable la cita de las Columbretes. Esta especie no se citaba en Castellón desde hace 18 años y supone la quinta cita para la provincia, cuatro de ellas en esta localidad, una de las cuales es la única cita para la Comunidad Valenciana de un ej. de la ssp. oriental *syriacus*.

Erithacus rubecula

Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin

Estatus: Nidificante común, migrante e invernante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 24.VII: 2 ej. permanecen en una zona ajardinada durante el verano sin llegar a criar; 04.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 27.X: 32 ej. en 1 km de transecto en campos abandonados de almendro y matorral. Máximo postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 09.IV: 3 ej. Última cita prenupcial (LGB)

Catarroja: 07.VI: 1 ej. cantando en zona ajardinada del casco urbano de Catarroja. Podría tratarse de un ave reproductora (BDJ)

Albufera de València: 13.IV: 1 ej. Cita prenupcial tardía (JID,MCH); 08.IV: 1 ej. Últimas citas prenupciales (BDJ); 01.VI: 1 ej. cantando. Apenas existen registros de la especie durante el periodo reproductor (PVG); 08.X: 2 ej. Primeras citas postnupciales en el Racó de l'Olla (JID)

El Verger: 04.VII: 1 ej. cantando a pocos centenares de metros de la costa (FAN)

2013

Benicarló: 29.VII: 1 ej. zona arbolada en la carretera costera (AGC)

Alcossebre: 07.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)

Benicàssim: 01.VII: 1 ej. permanece acantonado en un jardín umbrío todo el verano; 17.XI: 19 ej. en transecto de 1 km por cultivos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 06.IV: 2 ej. (LGB)

Albufera de València: 12.IV: 1 ej. Últimas citas prenupciales en el Racó de l'Olla (JID)

Gandía: 09.VIII: 1 ej. (DGS)

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 05.IV: 1 ej. Primera cita anual; 07.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 31.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 30.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Illes Columbretes: 03.II: Primera cita anual de 1 ej.; 06.V: última cita primaveral (LGB)

Marjal d'Almenara: 01.VIII: 1 ej. (JBC)

Albufera de València: 10.IV: 1 ej. cantando en zona de pinos y matorral. Primera cita prenupcial (JID,MCH)

Chiva: 08.III: 1 ej. (FBM)

Biar: 08.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (JAG)

2013

Benicàssim: 22.III: 1 ej. Primera cita anual; 10.IV: 7 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral. Máximo prenupcial; 21.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 11.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 09.XI: 1 ej. Última cita anual. Se trata de la cita más tardía en 8 años de seguimiento (MTB)

Illes Columbretes: 06.IV: 2 ej. Primera cita anual; 11.IV: 8 ej. máximo primaveral (LGB)

Marines: 10.II: 1 ej. cantando de noche. Primera cita primaveral muy temprana (MCC)

Albufera de València: 06.IV: 1 ej. en la devesa. Primera cita anual (GCH); 13.IV: 4 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)

Salines de Calp: 04.IV: 1 ej. Primera cita anual (FBE)

Recogemos dos citas excepcionalmente tempranas el 3 y el 10 de febrero (en 2012 en Columbretes y en 2013 en Marines). Lo habitual en esta especie es que las citas se comiencen a registrar a finales de marzo con llegadas generalizadas a principios de abril, por lo que éstas se adelantan mes y medio a sus fechas típicas. También publicamos una cita a principios de noviembre en Benicàssim, que aún siendo tardía, está menos alejada del patrón habitual.

Luscinia svecica

Ruiseñor pechiazul - Pit-blau - Bluethroat

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: 05.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (LGB)

Xilxes: 13.I: 4 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 19.I: 6 ej. censo de limícolas Almenara-La Llosa (JBC,SMS)

Requena: 01.IV: 1 ej. en unos praditos junto el cauce del río Magro (JAI)

Albufera de València: 09.IV: 1 h. última cita prenupcial; 30.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 06.IX: 5 ej. en el tancat de Milia. Arribada patente de aves (AAC)

Marjal de Pego-Oliva: 04.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última cita prenupcial (JSMG); 27.VIII: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Primera cita postnupcial (EPA)

2013

València: 06.XI: 1 ej. en una acequia de la huerta con algo de vegetación palustre cerca del casco urbano (JAI)

Albufera de València: Citas tardías de 1 h. el 10.IV (PVG) y de 1 ej. el 13.IV (GTR); 29.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial; 16.IX: 20 ej. en el tancat de Milia. Patente arribada de migrantes (AAC,FGN)

Phoenicurus ochruros**Colirrojo tizón - Cua-roja fumada - Black Redstart**

Estatus: Residente común, migrante e invernante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 30.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 10.XI: 33 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 08.I: 9 ej. ; 11.X: 6 ej.; 23.X: 66 ej. máximo anual; 10.III: 15 ej. (LGB)

Port de Borriana: 16.I: 6 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 19.I: 7 ej. observados durante el censo de limícolas (JBC,SMS)

Albufera de València: 15.X: 1 h. Primera cita postnupcial (JID); 23.X: 20 ej. llegada marcada de migrantes en zonas de huerta (JHZ,BMA,BDJ); 24.X: 46 ej. en el tancat de Milia. Notable arribada de migrantes (AAC)

El Fondó de les Neus: 05.IX: 1 ej. Primera cita de la migración otoñal (SCR)

2013

Alcossebre: 11.X: 2 ej. Primera cita postnupcial; 03.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (DES)

Benicàssim: 14.IV: 1 ej. Última cita prenupcial en zona de invernada. Es la citas más tardía de los últimos 7 años; 10.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 15.XI: 15 ej. en transecto de 1 km por cultivos abandonados de almendros y matorral (MTB)

Albufera de València: 08.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (AAC,FGN)

La temporada de paso de 2012 ha debido de ser una de las más importantes de los últimos años, con densidades muy altas en varias localidades entre finales de octubre y principios de noviembre.

Phoenicurus phoenicurus**Colirrojo real - Cua-roja real - Common Redstart**

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 20.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 15.X: 7 ej. máximo postnupcial en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral; 29.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Illes Columbretes: 05.III: 1 ej.; 22.V: 2 ej. (LGB)

Chelva: 08.IX: 12 ej. paso apreciable en mosaico agroforestal de 4 km² (JAI)

Albufera de València: 23.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 25.X: 1 m. en el tancat de Milia. Últimas citas de migrantes (AAC)

Illa de Tabarca: 23.III: 1 ej. Primer ejemplar anillado (AAR)

2013

Benicàssim: 29.IV: 9 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral. Máximo prenupcial; 20.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 21.IX: 6 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial poco destacado; 25.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Illes Columbretes: 17.III: 1 ej.; 14.V: 2 ej. (LGB)

Marjal dels Moros: 21.III: 2 ej. (CAZ); 27.III: 1 ej. en el cordón litoral (FLL)

El Saler: 21.X: 2 m. en arboleda de jardín urbano del Saler. Últimas citas de migrantes (AAC)

Albufera de València: 11.IV: 4 h. y 2 m. en el tancat de Milia. Importante arribada de aves (AAC,FGN); 29.IV: 13 ej. en la devesa (BDJ); 14.V: 1 h. capturada para anillamiento (PVG,CAP,VDA); 19.VIII: 1 juv. o h. en el itinerario del bosque de ribera del Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID,GGA); 24.X: 1 ej. (juv. o h.) Última cita postnupcial (PVG,SEO)

Requena: 31.III: 1 ej. (RMB)

Siete Aguas: 21.IX: 7 ej. paso fuerte en zona de mosaico agroforestal (JAI)

Campo Arcís: 22.XII: 1 ej. (RMB)

Saxicola rubetra

Tarabilla norteña - Bitxac rogenic - Whinchat

Estatus: Migrante común. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 1 ej. (VET)

Benicàssim: 22.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Desem. riu Millars: 23.IV: 2 m. (MBM)

Godella: 22.IV: 1 m. (GLL)

Albufera de València: 24.IV: 1 ej. en huertas cercanas a la torreta Ampla. Primera cita prenupcial (PMP); 21.VIII: 3 ej. observados tanto en el tancat de Milia. Primeras citas postnupciales (CAV,AAC)

Real de Gandía: 25.IV: 1 ej. (AMG)

Villena: 21.IV: 1 ej. (MRG); 21.IV: 1 h. (MRG,TPE)

Salines de Santa Pola: 14.IX: 9 ej. buen número de individuos en cultivos (OAP)

Illa de Tabarca: 19.III: 1 ej. (AAR)

2013

Alcossebre: 08.IV: 1 h. ej. Primera cita anual; 30.IV: 8 ej. Paso destacado (DES)

Benicàssim: 08.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 30.IV: 7 ej. máximo prenupcial en transecto de 1 km por cultivos abandonados de almendros y matorral. Alta densidad para el área asociada a tormentas de levante; 07.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Albufera de València: 28.IV: 15 ej. en un pequeño recorrido por la Ratlla. Marcada presencia de migrantes asociadas con la inestabilidad atmosférica (GCH); 29.V: 1 ej. h en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC,FGN); 05.VI: 1 ej. en el tancat de la Pipa, observación tardía (CAP,VDA); 19.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC,FGN); 12.IX: 20 ej. en huertas. Notable llegada de migrantes (PMP)

Requena: 05.X: 1 ej. (PRP)

Saxicola rubicola

Tarabilla europea - Cagamanecs - European Stonechat

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE

2012

Xert: 14.IX: 6 ej. (JBC,JLB)

Vilanova d'Alcolea: 15.VIII: 8 ej. (JBC)

Benicàssim: 14.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 31.X: 6 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 13.III: 5 ej. (LGB)

Moncofa: 22.XII: 12 ej. (JBC)

Xilxes: 17.XII: 6 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 03.II: 12 ej. (JBC)

Albufera de València: 27.IX: 1 m. Primera cita postnupcial de la especie, algo temprana (MCH,JID)

2013

Alcossebre: 15.III: 1 h. última cita prenupcial; 28.IX: 1 m. ej. Primera cita postnupcial (DES)

Benicàssim: 16.III: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB)

Oenanthe oenanthe**Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012**Ares del Maestrat:** 03.IV: 1 ej. primera cita anual (RPB)**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 22.IV: 6 ej. 4 de ellas juntas (VET)**Illes Columbretes:** 08.IV: 1 ej.; 11.V: 1 ej.; 16.X: 1 ej. (LGB)**Marjal de Moncofa:** 11.IV: 2 ej. (JBC)**Barracas:** 26.V: 14 ej. (JBC)**Albufera de València:** 10.IV: 14 ej. en arrozales. Primeros registros prenupciales (PMP); 17.V: 1 m. Cita prenupcial tardía (MCH,JID); 30.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC); 19.X: 1 m. inm. en las dunas (JID,IRU,GGA); Citas tardías en zona de huerta de 1 ej. el 23.X (BMA,BDJ) y el 26.X (AAC)**Villena:** 16.IV: 6 ej. paso intenso (MCR)**2013****Vinaròs:** 22.III: 2 ej. primeras observaciones; 09.IV: 4 m. y 2 h. en la escollera de la zona O (ELL)**Alcossebre:** 19.III: 2 ej. Primera cita anual; 03.VI: 1 m. ad. cita prenupcial tardía; 25.X: 1 ad. ultima cita anual (DES)**Illes Columbretes:** 19.III: 1 ej. (LGB)**Grau de Castelló:** 27.IV: 2 m. i 1 f. menjant als montons d'algues de vora platja (MBM)**Albufera de València:** 22.III: 1 ej. en dunas litorales. Primer registro prenupcial (EGO,BDJ); 29.VIII: 1 ej. en praderas del campo de golf. Primer registro postnupcial (BDJ)**Emb. de Bellús:** 12.X: 4 ej. (BOR,DMF)**Oenanthe hispanica****Collalba rubia - Còlbit ros - Black-eared Wheatear**

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012**Illes Columbretes:** 06.V: 5 ej. máximo primaveral; 17.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial(LGB)**Desem. riu Millars:** 04.IV: 1 ej. (GUM)**Albufera de València:** 03.IV: 1 m. en el tancat del Revisancho. Primera cita prenupcial (AGU,CAV,AAC); 26.IV: 7 ej. en caminos de la Bassa Rasa. Llegada destacada de migrantes (MPB)**Villena:** 02.IV: 1 m. (MRG)**2013****Alcossebre:** 19.III: 1 m. Primera cita anual (DES)**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 09.III: 1 m. (MBM)**Illes Columbretes:** 19.III: 10 ej. máximo anual; 15.V: última cita primaveral (LGB)**Marjal dels Moros:** 21.III: 1 ej. (CAZ)**Camporrobles:** 22.III: 1 ej. Primera cita anual (PRP)**Albufera de València:** 20.III: 1 m. en arrozales. Primer registro prenupcial (BDJ)**Gandía:** 27.III: 3 m. y 2 h. en la playa de l'Ahuir. Un m. de la raza *melanoleuca* (PLP)**Villena:** 23.III: 2 m. los primeros observados este año (MCR)

Curiosamente, tanto en la collalba gris como en la collalba rubia, se ha producido una entrada muy tardía en el año 2012, de tal manera que en 2013 las primeras citas generalizadas en ambas especies son de 15

días (para la collalba gris) a casi un mes (para la collalba rubia) mas tempranas que en 2012. Tan solo hemos recibido una cita postnupcial de collalba rubia en estos dos años, lo que es indicativo de su escasez como migrante postnupcial.

Oenanthe leucura

Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012

Xert: 14.IX: 2 ej. en el Turmell (JBC,JLB)

Tuéjar: 30.VI: 1 ej. en un cinto rocoso de la Olmedilla (JAI)

Villagordo del Cabriel: 22.I: 1 ej. en el embalse de Contreras (RMB)

Villena: 25.XII: 4 ej. en una pequeña cantera abandonada (MCR)

2013

Argelita: 26.VII: 2 ej. (JLB)

Embalse de Contreras: 24.XI: 1 ej. (RMB)

Hemos recibido un buen número de citas de ejemplares en sus zonas típicas de cría, especialmente de Alicante, donde la especie se encuentra bien distribuida (Vázquez, 2015). Destacamos aquí tan solo las citas de ejemplares en zonas de interior de las provincias de Castellón y Valencia donde la collalba negra es bastante escasa.

Monticola saxatilis

Roquero rojo - Merla roquera - Common Rock-thrush

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2013

Ares del Maestrat: 20.IX: 2 ej. Última cita anual (RPB,ALR)

Especie migradora de llegada tardía muy rara en la costa, por lo que no se reciben casi citas de fenología. Este año destacamos una cita tardía en una zona de cría del interior de Castellón.

Monticola solitarius

Roquero solitario - Merla blava - Blue Rock-thrush

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Valencia: 23.XI: 1 ej. en la estació del Nord; 30.XI: 1 ej. en el instituto Luis Vives (LAA)

Cullera: 30.X: 2 ej. en zonas urbanizadas del litoral. Primeros registros otoñales fuera de las localidades de cría (JHZ,BDJ)

2013

Alcossebre: 12.X: 1 m. primera cita postnupcial (DES)

Requena: 22.VI: 2 par. al menos con pollos ya volanderos en el mismo cantil calizo (JAI)

Albufera de València: 17.XII: 1 m. en zonas urbanizadas cerca de la playa (BDJ)

Cap de Cullera: 05.X: 2 ej. en el edificio del faro (MAL,LAA)

Villena: 08.X: 1 m. posado en una gárgola de la iglesia de Santiago (MCR)

Hemos recibido un buen número de citas de ejemplares en zonas de cría habitual de toda la geografía, tanto costeras como de interior. Destacamos solo aquellas que se han producido en entornos costeros donde la especie aparece casi exclusivamente como invernante. Las primeras citas de la especie se han producido a principios de octubre (05.X en el faro de Cullera).

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: 01.XI: 1 ej. (LGB)

El Toro: 29.XII: 10 ej. (JMA,FLL,JBF,RBB); 03.I: 2 ej. a 1.500 m s.n.m. Escaso en este invierno cálido (MGT)

Beneixama: 12.X: 5 ej. en la sierra de la Solana (JAG)

2013

Fredes: 01.XI: 1 m. juv. capturado para anillamiento. Especie invernante regular pero escasa (JAM)

El Toro: 09.III: 2 ej. (MGT); 06.XII: 8 ej. (MGT,FLL,VPA,AAC)

Sot de Chera: 20.XI: 1 ej. en la sierra de Enmedio (PRP)

Albufera de València: 16.III: 1 h. en zonas arboladas cerca de l'estany del Pujol. Apenas existe tres citas prenupciales previas, siendo la última de marzo de 2001 (SVI,SBNT); 30.X: 1 ej. una de las pocas conocidas en l'Albufera, coincidente con una fuerte llegada de zorzal común y colirrojo tizón (JID,DNA)

Beneixama: 07.XI: 2 ej. posados en un pino carrasco en la sierra de la Solana (MCR)

Curiosamente ambas citas extremas (en fechas típicas) para estos dos años corresponden a l'Albufera de Valencia (16.III y 30.X) donde la especie, al igual que otras muchas localidades costeras, es notablemente escasa. Estos años no tenemos citas de la sierra de Aitana, que suele dejar las máximas concentraciones de la Comunidad Valenciana, correspondiendo éstos a la sierra de El Toro.

Turdus merula

Mirlo común - Merla - Common Blackbird

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante moderado. Conservación: EC

2012

Benicarló: 26.II: 1 juv. volandero alimentado por su madre en el casco urbano (AGC)

Illes Columbretes: 12.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (LGB)

Turdus pilaris

Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare

Estatus: Invernante escaso. Conservación: EC

2012

Vilafranca: 15.II: 2 ej. (RPB)

El Toro: 03.I: 2 ej. a 1.500 m s.n.m. Escaso en este invierno cálido (MGT)

Albufera de València: 16.XI: 1 ej. en el arbolado del portet nou de Sollana (AAC)

Marjal de Pego-Oliva: 12.II: 1 ej. (JFL)

2013

El Toro: 08.III: 1 ej. (FLL,VPA,MGT)

Albufera de València: 11.I: 1 ej. en el barranco del Poyo junto a el tancat de la Pipa (PVG)

Dos años con observaciones muy escasas, incluida la sierra de El Toro, que como veíamos en anteriores anuarios, puede albergar poblaciones invernantes muy importantes, con censos que superaron los 100 ej. en 2010.

Turdus philomelos

Zorzal común - Tord - Song Thrush

Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

2012

Tirig: 07.XII: Gran cantidad de zorzales por el monte y en zonas de balsas artificiales, con estima de unos 120 ej. (JBC,JLB,JCS)

Vilanova d'Alcolea: Citas de unos 55 ej. los días 03.III y 21.XII en el área del aeropuerto (JBC,JLB)

Vilafranca: 07.VI: 1 ej. en la rambla de las Truchas (RPB)

Benicàssim: 10.IV: 2 ej. Última cita prenupcial; 09.X: Primera cita y máximo postnupcial discreto de 14 ej. en transecto de 1 km en cultivos abandonados de almendros y matorral (MTB)

Illes Columbretes: 05.X: 3 ej. Primera cita postnupcial; 23.X: 23 ej. máximo postnupcial (LGB)

Albufera de València: 11.II: 1 ej. no hay citas invernales, por lo que podría corresponderse con los primeros ej. en migración prenupcial (PVG,SEL); 26.IV: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita tardía (CAV,AAC); 26.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC); 28.XII: 1 ej. capturado para anillamiento. A pesar de tratarse de una cita plenamente invernal, el ave tiene carga de grasa, lo que indicaría comportamiento migratorio (SEOV)

Oliva: 07.VII: 4 ej. (FAN)

Cocentaina: 06.V: 1 ej. riu Serpis capturado para anillamiento. Ejemplar reproductor (MIA)

2013

Alcossebre: 06.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)

Benicàssim: 16.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 06.X: 2 ej. Primera cita postnupcial; 31.X: 51 ej. en transecto de 1 km en cultivos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 06.III: 25 ej. máximo prenupcial; 20.IV: 2 ej. Última cita prenupcial (LGB)

Benaguasil: 09.VI: 1 par. (PPA)

Albufera de València: 11.I: 2 ej. llegada de aves invernantes (PVG); 27.IV: 1 ej. en una arboleda cercana al mirador de caza del vedat de Silla (PMP); 10.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (AAC,FGN); 19.X: Hasta 100 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia. Importante incremento del paso de la especie (GTR)

Godolleta: 21.V: 1 ej. cantando en el barranco del Gallego, zona óptima para su posible nidificación (PAB)

Bocairent: 21.IX: 3 ej. en la Serra de Mariola (BOR)

El Fondo d'Elx: 13.II: 20 ej. (AJR)

Turdus iliacus

Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: EC

2012

El Toro: 02.I: 20 ej. (MGT)

Chelva: 31.XII: 3 ej. invernantes en viñedos de montaña (JAI)

Requena: 15.I: 3 ej. (RMB)

2013

El Toro: 09.III: 3 ej. (MGT)
 Embalse del Regajo: 08.XII: 6 ej. (MGT,FLL)
 Buñol: 17.II: 1 ej. presencia invernal (JAI)
 Bocairent: 10.XI: 2 ej. (BOR); 06.XII: 10 ej. (BOR,DMF)
 Emb. de Beniarrés: 15.XII: 6 ej. (BOR)
 El Pinós: 2 ej. (AJR)
 Albufera de Gaianes: 17.XI: 1 ej. (BOR)
 Campo Arcís: 17.XI: 8 ej. (RMB)

Turdus viscivorus**Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush**

Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Conservación: EC

2012

Montanejos: 10.III: 23 ej. en el embalse de Arenós (JBC)
 Barracas: 21.I: 42 ej., 22 de ellos en un grupo (JBC)
 Illes Columbretes: 26.II: 1 ej. presente también el 27; 01.XI: 1 ej. (LGB)

2013

Illes Columbretes: 28.II: 1 ej.; 06.III: 1 ej. (LGB)
 Albufera de València: 18.X: 1 ej. en el Racó de l'Olla comiendo en herbazales junto a vegetación de ribera (JID,MCH,IRU)

SYLVIIDAE

Cettia cetti**Cetia Ruiseñor - Rossinyol bord - Cetti's Warbler**

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 26.VII: Se escucha el canto de 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial en la reserva, donde la especie se ha ausentado durante el periodo reproductor (CAV,AAC)

2013

Peníscola: 19.V: 1 ej. cantando entre el carrizal; 30.VI: 1 h. capturada para anillamiento. Parece confirmarse la cría de la especie dado que ya se habían oído cantos el mes anterior (JAM)
 Alcossebre: 23.II: 1 ej. Última cita en invernada; 09.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
 Yàtova: 06.IV: 3 m. territoriales en un tramo de 3 km de río Mijares; 22.VI: 4 ej. en 3 km de soto del río Mijares; 14.IX: 12 ej. en 3 km lineales de soto del río Magro (JAI)

Cisticola juncidis**Cisticola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola**

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Marjal d'Almenara: 15.XII: 12 ej. máximo anual (JBC)
 Villena: 31.V: 2 ej. en una parcela de cereal con regadío (MCR)

2013

Quadre de Santiago: 21.VIII: 25 ej. máximo anual en transecto de 1.9 km; solo 7 ej. el 27.XII (MTB)

Siete Aguas: 21.IX: 1 ej. en un herbazal, podría estar en paso (JAI)

Locustella naevia**Buscarla pintoja - Boscarler pintat - Western Grasshopper-warbler**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 30.IV: 1 ej. única cita anual en campos abandonados de almendros (MTB)

Desem. riu Millars: 09.X: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)

València: 20.IV: 1 ej. muerto en la acera en el casco urbano (GLL)

Paterna: 18.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante (PVG)

Albufera de València: 23.III: 1 ej. cantando en carrizales de la punta de Llebeig (SEOV); 12.IV: 1 ej. cantando a primeras horas de la mañana en la devesa (BDJ); 01.V: 1 ej. capturado en una jornada de anillamiento en el tancat de Milia (GTR); 03.V: 1 ej. cantando a primera hora de la mañana en el carrizal (PVG); 18.IX: 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV)

Altea: 20.IV: 1 ej. cantando (TMF,JMF,TZL,WMY)

2013

Benicàssim: 17.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 19.V: 1 ej. Última cita prenupcial. Buen año para la especie con hasta 5 citas primaverales en campos abandonados de almendros y matorral (MTB)

Albufera de València: 15.IV: 1 ej. cantando en la devesa (JID); 15.IV: 1 ej. cantando en un carrizal (PVG); 19.IV: 2 ej. cantando en distintos puntos de el tancat de la Pipa (PVG); 28.IV: 2 ej. cantando en herbazales próximos al port de Catarroja (AAC,BDJ); 25.V: 1 ej. cantando a lo largo de toda la mañana en uno de los filtros del tancat de Milia. Cita prenupcial tardía (GTR)

Illa de Tabarca: 26.IV: 3 ej. anilladas entre el 24.IV y el 11.V (PIC)

Locustella luscinioides**Buscarla unicolor - Boscarler comú - Savi's Warbler**

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante escaso. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 22.III: 1 ej. cantando por la tarde. Primera observación prenupcial; 12.VI: 1 juv. capturado para anillamiento. Primera cita de un ave nacida la presente temporada; 11.X: 1 ej. recapturado, lleva presente al menos desde principios de septiembre. Últimas citas postnupciales (SEOV)

Marjal de Pego-Oliva: 08.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Primera cita prenupcial; 26.IX: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última cita postnupcial (JSMG)

Salines de Santa Pola: 18.VI: 1 ej. cantando (JPG)

2013

Marjal dels Moros: 19.III: 1 ej. (MBM)

Albufera de València: 09.III: 1 ej. cantando en la punta de Llebeig. Primera cita prenupcial (PVG); 12.III: 2 ej. cantando en carrizales de la punta de Llebeig (SEOV); 15.VI: 2 juv. capturados para anillamiento en la Torreta Ampla. Primeros registros de aves nacidas en el presente año (JMR,GTR); 28.IX: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)

Acrocephalus melanopogon**Carricérin real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: VUL

2012**Desem. riu Millars:** 09.X: 1 m. cantando (MBM,JCA)**Albufera de València:** 01.III: 3 m. cantando; 16.X: 8 m. cantando en el tancat de Milia (AAC)**Cullera:** 07.IV: 2 ej. en la vegetación palustre de una pequeña charca junto a las dunas de la playa del Brosquil (MAL,LAA)**El Fondo d'Elx:** 26.II: 1 ej. Primeras aves cantando (MLP)**2013****Albufera de València:** 25.I: 8 ej. en las orillas S de las lagunas del tancat de la Pipa, uno de ellos con canto nupcial. Aumento considerable probablemente asociados a migración prenupcial (PVG,CAP,VDA); 12.II: 6 m. cantando en el tancat de Milia; 14.II: 7 m. cantando en el tancat de l'Illa; 03.VII: 4 par. (3 de ellas grupos familiares) en el tancat de l'Illa (AAC,FGN); 10.VII: 1 m. cantando en uno de los filtros verdes del tancat de la Pipa, y 1 h. capturada para anillamiento mostrando placa incubatriz activa. Citas reproductoras tardías para la especie (SEOV); 21.VII: 1 h. mostrando placa incubatriz con máxima irrigación, capturada para anillamiento en el tancat de la Pipa. Nueva observación reproductora de la especie mucho más tarde de lo habitual. La observación coincide con varias hembras de carricero común en similar estado reproductor (SEO); 03.IX: 9 ej. en diferentes puntos de el tancat de Milia (AAC,FGN); 11.X: 6 ej. en el recorrido perimetral de l'ullal del tancat de la Pipa (PVG,SEO)**El Fondo d'Elx:** 06.VII: 5 ej. anillados entre el 06.VII y el 28.XII (GALA)***Acrocephalus paludicola*****Carricérin cejudo - Xitxarra d'aigua - Aquatic Warbler**

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.III: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)**Marjal de Pego-Oliva:** 28.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Anilla con remite *Museum Paris* (JSMG)**2013****Marjal d'Almenara:** 06.IV: 1 ej. capturado para anillamiento (JCA)**Albufera de València:** 21.IV: 1 ej. anillado en el canyar del Plater (JMR,GTR)**Marjal de Pego-Oliva:** 17.IX: 1 ej. capturado para anillamiento. Grupo GOU (LSO)***Acrocephalus schoenobaenus*****Carricérin común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler**

Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

2012**Benicàssim:** 17.III: 1 ej. Primera cita anual en campos abandonados de almendros. Nueva cita de 1 ej. el 05.V (MTB)**Albufera de València:** 14.III: 1 ej. cantando en l'ullal de Baldoví (JGR,BDJ); 15.V: 1 ej. capturado para anillamiento (SEOV); 04.VIII: 4 ej. capturados para anillamiento. Primeras citas postnupciales de la especie; 12.VIII: 7 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia, 5 son juv., 2 de éstos con anilla procedente de Bélgica (GTR) 17.X: 1 juv. capturado para anillamiento. Cita postnupcial tardía (CAP,VDA,PVG)

Marjal de Pego-Oliva: Citas extremas de ej. capturados en la Estación de Esfuerzo constante: 08.III; 18.V: (JSMG); 05.VIII (CMO) y 23.X (JSMG)

2013

Albufera de València: 23.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro prenupcial (GTR); 05.IV: 6 ej. cantando en el tancat de Milia; 18.IV: 5 ej. cantando en el tancat de l'Illa (AAC,FGN); 28.IV: 4 ej. en zonas de herbazal y carrizo próximas al port de Catarroja (AAC,BDJ); 06.VII: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro postnupcial y el más temprano de los últimos años (GTR); 26.VII: 4 ej. en apenas 20 m de enear y carrizo en el tancat de Milia. Patente arribada de migrantes (AAC,FGN); 03.VIII: 4 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia; 18.VIII: 14 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia. Importante llegada de migrantes (GTR); 21.VIII: 2 ej. alimentándose activamente en matas de bardana *Xanthium echinatum* en una de las motas de la Ratlla (BDJ); 01.X: 2 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 04.X: 1 ej. en el tancat de la Pipa (FLL,JMAG)

Emb. de Beniarrés: 22.IV: 1 ej. (BOR)

Albufera de Gaianes: 31.III: 1 ej. (BOR)

Requena: 30.VIII: Primera y única cita postnupcial de este escaso migrante en la comarca en la balsa El Pontón (PRP)

Acrocephalus agricola

Carricero agrícola - Boscarla dels arrosars - Paddyfield Warbler

Divagante de Europa oriental y Asia central

2013

Albufera de València: 03.V: 1 ej. en un área abierta con tarays y carrizo a orillas de una de las lagunas. La observación, realizada a corta distancia y con el ejemplar perchándose en lo alto de una rama de carrizo, lo que permite observar bien los rasgos propios de esta especie. No es relocalizado durante esa mañana ni en días posteriores (PVG)

Segunda cita para la Comunidad Valenciana, tras el ej. capturado para anillamiento en septiembre de 2007 en la marjal de Pego-Oliva (y que curiosamente, había sido anillado esa misma primavera en los estanys d'Ivars en Lleida). Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al., 2017)

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 28.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 31.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial en campos abandonados de naranjos; 08.XI: 1 ej. Última cita anual de 1 ej. en unas matas de lentisco (MTB)

Illes Columbretes: 27.IV: 3 ej. (LGB)

Godella: 08.IX: 4 ej. en zona de huerta (GLL)

Albufera de València: 02.III: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC); 10.III: 1 ej. en los filtros verdes del Malvinar (PVG); 23.VI: 2 juv. capturados para anillamiento en la R. N. del tancat de Milia. Primeras citas de aves nacidas este año en la reserva (GTR); 19.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera observación de un ave nacida durante la presente temporada de cría (RGR,PVG); 06.XI: 2 ej. en el tancat de Milia. Últimas citas postnupciales; 20.XI: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)

Requena: 06.X: 15 ej. en un tramo ribereño de 1.5 km (JAI)

Marjal de Pego-Oliva: 31.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Primera cita prenupcial; 08.XI: 8 ej. capturados para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última cita postnupcial (JSMG)

2013

Forcall: 07.VI: 1 par. en el río Bergantes (RPB,ALR,CCT,)

Illes Columbretes: 01.VI: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)

Benicàssim: 05.VI: 1 ej. Última cita prenupcial en un área de vegetación enmarañada con zarzas y acebuches (MTB)

Quadre de Santiago: 09.XI: 1 ej. Última cita anual. Dos citas anteriores también en noviembre (MTB)

Marjaleria de Castelló: 08.IV: 1 m. cantando en la partida Patos (XBC)

Desem. riu Millars: 11.XI: 1 ej. Última cita anual (JCA)

Marjal d'Almenara: 24.III: 2 ej. capturados para anillamiento, primera cita anual (GAU)

Albufera de València: 09.IV: 1 ej. cantando en la punta de Lebeig. Primera cita, considerablemente tardía. En otros humedales del litoral la especie ha sido observada desde hace al menos tres semanas (SEOV); 25.V: 44 ej. capturados para anillamiento en unas horas durante la mañana en el tancat de Milia. El estado físico de las aves parece apuntar que la mayoría de éstas podrían ser ejemplares todavía en migración; 01.VI: 2 juv. observados reclamando entre la vegetación en el tancat de Milia. Primeros registros de aves nacidas en la temporada en la reserva; 28.VII: 2 ej. con plumaje juvenil todavía en crecimiento capturados para anillamiento en el tancat de Milia. Cita reproductora tardía (GTR); 26.XI: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Cita postnupcial tardía (PVG,CMO,NAG,MMR)

Elx: 05.XI: 1 ej. en el río Vinalopó (OAP)

El Fondo d'Elx: 20.IV: 218 ej. anillados entre el 20.IV y el 02.XI (GALA); Citas tardías de 1 ej. los días 02 y 09.XI (OAP)

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal - Xitxarro - Great Reed-warbler

Estatus: Estival nidificante moderado localizado, migrante moderado. Conservación: IE

2012

Morella: 12.VI: 3 ej. en el riu Calders (RPB)

Desem. riu Millars: 09.X: 1 m. cantando (MBM,JCA)

Albufera de València: 23.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante de l'ullal de Baldoví. Primera cita prenupcial (MMV); 27.III: 1 m. cantando en el tancat de Milia. Primera cita anual (AAC); 30.VI: 2 juv. entre las enneas del tancat de Milia. Primeras citas de aves nacidas durante la presente temporada (GTR); 17.X: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (CAP,VDA,PVG)

Marjal de Pego-Oliva: 06.X: 2 ej. capturados para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última cita postnupcial (JSMG)

2013

Desem. riu Millars: 27.X: 2 ej. capturados para anillamiento, última cita anual (JCA)

Albalat dels Sorells: 25.IV: 1 ej. encontrado al mediodía en la carretera con anilla de Italia. Se libera en perfecto estado por la noche en la marjal de Rafalell i Vistabella (XGP)

Albufera de València: 28.III: 1 ej. cantando en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 09.IV: 3 ej. cantando en distintos puntos de el tancat de la Pipa. Primera cita anual (SEOV); 22.IV: 7 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. 2 habían sido anillados en 2011 y otro como juv. en 2012, todos en la propia reserva (VDA,CAP,PVG); 14.VII: 2 juv. capturados para anillamiento en el

tancat de Milia. Primeros registros de aves jóvenes en la presente temporada (GTR); 01.XI: 1 ej. capturado para anillamiento en l'ullal de Baldoví (PMP,GTR); 02.XI: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Nueva cita postnupcial tardía (GTR) 08.XI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Cita tardía (PVG,SEO)

Albufera de Gaianes: 12.V: 9 ej. (BOR)

El Fondo d'Elx: 02.XI: 1 ej. cita tardía (GALA)

Iduna opaca

Zarcero Bereber - Bosqueta pàl·lida - Western Olivaceous Warbler

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012

Cocentaina: 13.VI: 1 ej. capturado en el río Serpis (MIA)

2013

Desem. riu Millars: 10.VI: 1 ej. capturado para anillamiento (JCA)

Marjal dels Moros: 14.VIII: 1 ej. en unos álamos blancos y moreras (VBJ)

Albufera de València: 18.IX: 1 ej. observado en el tancat de Milia. Apenas existen citas previas de la especie en l'Albufera, la última en mayo de 2010 (AAC,FGN)

Altea: 05.V: 1 ej. en el río Algar (WMY,TMF,JMF)

Illa de Tabarca: 03.V: 1 ej. (PIC)

Hippolais icterina

Zarcero icterino - Bosqueta icterina - Icterine Warbler

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 16.V: única cita anual de 1 ej. cantando con imitaciones de golondrina y curruca zarcera (MTB)

Marjal de Pego-Oliva: 18.V: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante (JSMG)

Illa de Tabarca: 15.V: 2 ej. (PIC)

2013

Benicàssim: Capturas de 1 ej. los días 27 y 29.IV. Nueva cita de 1 ej. el 19.V (MTB)

Hippolais polyglotta

Zarcero políglota - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012

Benicàssim: Fechas extremas de migración prenupcial 14.IV y 27.V y en paso postnupcial 18.VII y 29.VIII (MTB)

Illes Columbretes: 17.VII: 1 ej. (LGB)

Albufera de València: 28.V: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC); 07.VII: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro de aves nacidas en la presente temporada (GTR)

2013

Benicàssim: Fechas extremas paso prenupcial 23.IV y 30.V; 31.VIII: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Albufera de València: 24.V: 1 ej. cantando y defendiendo territorio ante dos mosquiteros musicales en el tancat de la Pipa (PVG,APA); 21.VI: Grupo familiar compuesto por 2 ad. y al menos 3 juv. en zonas arboladas de álamo blanco cerca de la Heueta. Apenas existen registros de reproducción confirmada en el ámbito del P. N. de l'Albufera (BDJ,JGR)

Requena: 04.VII: 2 par. con cebas en el pico (RLO)

Yátova: 14.IX: 2 ej. cita de paso postnupcial (JAI)

Sylvia sarda

Curruca sarda - Busquereta sarda - Marmora's Warbler

Estatus: Visitante raro de Córcega y Cerdeña. Conservación: IE

2012

Illa de Tabarca: 03.V: 1 m. capturado para anillamiento. Cuarta cita para España y la más meridional registrada hasta la fecha. El ejemplar es un m. euring 5 (nacido en 2011), y en el momento de su captura tiene algo de grasa y buena condición física (códigos 1 y 2 respectivamente). Se separa bien de la curruca balear *Sylvia balearica* por longitud del ala. Campaña de Anillamiento de Paseriformes en la isla de Tabarca dentro del Proyecto Piccole Isole y organizada por SEO-Alicante (APO)

Sylvia undata

Curruca rabilarga - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 09.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 04.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 08.XI: 1 ej. Última cita postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: Presencia invernal de 1 ej. con citas el 04 y el 05.I; citas prenupciales de 1 ej. el 02 y el 03.III; única cita postnupcial de 1 ej. el 08.X (LGB)

Cap de Cullera: Primeros registros otoñales de varios ej. en diversos puntos elevados de la serra de les Raboses (MPB)

Illa de Tabarca: 21.III: 1 ej. capturado para anillamiento (AAR)

2013

Benicàssim: 11.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 29.I: 2 ej.; 11.III: 4 ej.; 30.III: 1 ej. (LGB)

Borriol: 28.V: 1 ad. cebando a un pollo volantón (LPC)

Albufera de València: 25.I: 5 ej. en un transecto por la devesa (JHZ)

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler

Estatus: Nidificante moderado, migrante escaso. Conservación: IE

2012

El Toro: 24.V: 2 par. (JMA,FLL)

Casas Altas: 29.IV: 2 ej. construyendo el nido (RMB)

Albufera de València: 05.X: 1 juv. capturado para anillamiento (MSM,RGR,PVG); 07.X: 1 ej. capturado para anillamiento (PVG,MSM,JGR,MGR)

2013

Benicàssim: 05.V: 1 ej. cantando. Última cita primaveral en campos abandonados de almendros y matorral. Buen año de citas primaverales con hasta 5 ej. detectados (MTB)

Castielfabib: 22.VI: 3 par. (RMB)

Albufera de València: 16.VIII: 1 ej. en ambiente de maquia del Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID,IRU); 04.IX: 1 ej. alimentándose entre tarays y vegetación herbácea en el tancat de la Pipa (SEOV)

Millares: 21.V: 4 ej. (3 m.) (PVG,MGR)

Sierra de Aitana: 02.VII: 1 ej. (TZL)

Sylvia cantillans**Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler**

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 07.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 29.VII: 1 juv. primera cita postnupcial; 17.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Tuéjar: 21.IV: 10 par. en apenas 2 km² (JAI)

Puerto de Valencia: 23.III: 1 m. observat en zona d'herbes i matolls (PGR)

Albufera de València: 23.III: 1 ej. (SEOV); 26.V: 1 ej. capturada para anillamiento el tancat de Milia. Cita prenupcial tardía (GTR)

Illa de Tabarca: 16.III: 1 m. (AAR)

Clot de Galvany: 14.X: 1 ej. (SCR)

2013

Benicarló: 24.III: 1 m. desorientado en el interior de un bar de la zona del puerto. Se captura, se comprueba su estado y se suelta en una zona ajardinada aledaña (ELL)

Alcossebre: 24.III: 1 m. ej. Primera cita primaveral (DES)

Benicàssim: Fechas extremas en migración prenupcial 20.III y 20.V; fechas extremas en paso postnupcial 25.VII y 16.X; 30.VIII: 41 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial

Illes Columbretes: 19.III: 3 ej.; 28.III: 17 ej. máximo primaveral (LGB)

Albufera de València: 21.III: 1 m. en el Racó de l'Olla en zona de carrizal y arbustos. Primera cita prenupcial (MCH,JID,GGA,IRU)

Buñol: 22.VI: Grupo familiar con 4 pollos volantes (JAI)

Platja d'Aiguaoлива: 06.X: 1 ej. (FPV)

Sylvia subalpina**Curruca subalpina - Busquereta de Moltoni - Moltoni's Warbler**

Estatus: Migrante raro.

2012

Benicàssim: 19.V: 1 m. cantando y buscando insectos en un almendro. Segunda cita de esta especie para la localidad (MTB)

Tras la reciente revisión de la taxonomía de *Sylvia cantillans*, la ssp. *moltonii* se sube a la categoría de especie, renombrándose como *Sylvia subalpina* (monoespecífica) (Crochet et al., 2015). Existe una cita previa de esta especie en la misma localidad el 16.IV.2007.

Sylvia melanocephala**Curruca cabecinegra - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler**

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante común. Conservación: IE

2012**Illes Columbretes:** 07.I: Presencia invernal de 1 ej. con varias citas a lo largo del mes de enero (LGB)**Vilafranca:** 12.IV: 1 ej. Primera cita primaveral (RPB)**Benicàssim:** 04.III: 1 juv. primero del año (MTB)**2013****Benicàssim:** 25.V: 2 juv. primeros del año; 27.X: 19 ej. en transecto de 1 km en cultivos abandonados de almendros y matorral. Máximo anual (MTB)**Illes Columbretes:** 27.I: Cita invernal de 2 ej. (LGB)**El Fondo d'Elx:** 27.XII: 10 ej. (FBE)***Sylvia hortensis*****Curruca mirlona - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler**

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012**Benicàssim:** 21.V: 1 ej. Única cita anual en campos abandonados de almendros y matorral (MTB)**Almedijar:** 13.V: 1 ej. en las huertas cercanas al pueblo (GLL)**El Toro:** 24.V: 1 par. (JMA,FLL)**Chelva:** 29.IV: 1 m. cantando en zona apropiada para la reproducción (AAC, CVV)**Albufera de València:** 09.V: 1 h. de 2.º año capturada para anillamiento (SEOV)**Serra de Mariola:** 27.V: 1 ej. (BOR)**Buñol:** 02.VI: 1 ej. (VBJ)**Orxeta:** 16.VI: Grupo familiar de 5 ej. (TZL,JMF)**Alacant:** 29.IV: 1 m. en la sierra de Fontcalent (JDL)**Monòver:** 21.IV: 1 ej. saltado entre matorrales y posándose en un olivo abandonado (VGC)**2013****Todolella:** 11.V: 1 ej. en el mas de Cabra (ALR,RPB)**Forcall:** 11.V: 1 ej. en la mola d'en Camaràs (ALR,RPB)**Catí:** 06.V: 1 ej. en Pedrafita (ALR)**Ares del Maestrat:** 08.VI: 1 ej. en el mas del Plà (RPB)**Benicàssim:** 20.IV: 1 ej. Primera cita anual; 08.V: 1 ej. Última cita primaveral. Buen año de paso, con hasta 7 ej. detectados en primavera (MTB)**Castielfabib:** 22.VI: 1 m. (RMB)**Relleu:** 08.VI: 1 ej. (LFS)

Publicamos en este anuario todas las citas recibidas de esta especie, que aunque está bien distribuida por zonas de interior, sus poblaciones son, en general, poco densas. La escasez de citas se justifica igualmente porque es muy escasa durante los pasos en la costa, donde se concentran casi todos los observadores. Es interesante la aportación de observaciones primaverales en distintas localidades de els Ports, que apuntan a que estaría bien distribuida por la comarca, aunque por las fechas, algunas de ellas aún podrían ser migrantes.

Sylvia communis**Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat**

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 08.IV: 1 ej. Primera cita anual; 06.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 05.VI: Cita tardía de 1 m. cantando en cultivos abandonados de almendros; 17.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Monòver: 04.IV: 1 ej. muy activo en matorrales medios bajos (VGC)

2013

Benicàssim: 20.III: 1 ej. Primera cita anual; 16.V: 1 ej. Última cita primaveral; 12.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 07.III: 1 ej. (LGB)

Mislata: 03.X: última cita postnupcial de 1 ej. en la pinada del hospital militar (PAB)

Albufera de València: 28.IV: 12 ej. en herbazales próximos al port de Catarroja. Llegada marcada de migrantes que coincide con la inestabilidad atmosférica (AAC,BDJ); 25.V: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Mília. Última cita prenupcial (GTR)

Bocairent: 09.X: 1 ej. (BOR)

Sylvia borin**Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler**

Estatus: Nidificante raro, migrante escaso. Conservación: IE

2012

Fredes: 23.VI: 1 h. capturada para anillamiento con placa incubatriz en el mas de Peraire (JAM)

Benicàssim: 26.IV: Primera cita anual de 1 ej. cantando; 18.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 26.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Albufera de València: 05.XI: 1 ej. en el itinerario del bosque de ribera. Cita otoñal tardía (JID)

Altea: 28.IV: 4 ej. capturados para anillamiento (TZL,EGM)

El Campello: 22.IV: 1 ej. (JMT)

2013

Vinaròs: 25.VIII: 1 ej. observada durante el censo postnupcial de rapaces. Primera cita postnupcial (ELL); 06.X: 1 ej. en la playa de Aiguaoliva (FPV)

Benicarló: 02.X: 1 ej. (JLA)

Benicàssim: 10.IV: 1 ej. Primera cita anual; 27.V: 1 ej. Última cita primaveral; 30.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

El Toro: 08.VI: 3 m. cantores en sotos del llano cerealista; 08.VI: 6 m. cantando en el mas de la Almarja (FLL,VPA,RBB,JBA,MGT)

Bocairent: 01.IX: 1 ej.; 13.X: 1 ej. (BOR)

El Fondo d'Elx: 05.X: 1 ej. capturada para anillamiento científico (GALA)

Las fechas extremas en estos años son ambas para 2013, con una cita bastante temprana en Benicàssim el 10.IV y un último registro en fechas habituales el 06.X en 2013 en la playa de Aiguaoliva (puede observarse con cierta regularidad hasta mediados de octubre). Lo más destacable son las altas densidades de machos cantando en el área de El Toro, ya que como nidificante, es una especie que suele aparecer de forma escasa y dispersa en la Comunidad Valenciana.

Sylvia atricapilla**Curruca capirotada - Busquereta de casquet - Blackcap**

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 01.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 25.IX: 1 h. primera cita postnupcial; 23.X: 18 ej. máximo postnupcial en 1 km de transecto en campos abandonados de almendros y matorral (MTB)

Illes Columbretes: 15.V: 1 ej. Última cita prenupcial (LGB)

Tuéjar: 30.VI: 10 par. en el soto del río Turia (JAI)

Daimús: 05.V: 1 m. cantando (AMG)

Gandía: 29.IV: 2 m. cantando (AMG)

Real de Gandía: 04.V: 1 m. cantando (AMG)

Guardamar de la Safor: 03.VI: 1 m. cantando (AMG)

Alacant: 27.IX: 1 ej. en el monte Benacantil (OAP)

2013

Vinaros: 07.IV: 20 ej. en la platja d'Aiguaoliva (FPV)

Alcossebre: 12.IV: 1 h. Última cita prenupcial (DES)

Prat de Cabanes-Torreblanca: 29.IV: 1 ej. en tamariu al costat de Torrenostrà (VET)

Benicàssim: 19.II: 14 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral. Máximo primaveral; 15.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 18.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 07.XI: 16 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral. Máximo otoñal (MTB)

València: 04.V: 1 ej. cantando en el cauce viejo del Turia (PAB,TPA,MCC)

Albufera de València: 15.V: 1 m. cantando en zonas de matorral de la devesa del Saler (BDJ); 24.V: 4 m. manteniendo territorio a lo largo del itinerario de la pinada del Racó de l'Olla. Desde que en 2008 se confirmó el primer caso de reproducción en la devesa la especie ha mostrado evidencias de cría de forma continuada todos los años (JID,MCH); 26.VI: 1 m. cantando en parque urbano de Sollana. Siguen proliferando las citas de esta especie en periodo de reproducción en el parque (AAC,FGN)

Yátova: 22.VI: 30 ej. en 3 km de bosque de ribera. Reproducción segura (JAI)

Cullera: 18.VI: 3 m. cantando en zonas densamente arboladas del Cabeçol. La especie se parece estar consolidando como reproductor en zonas forestales del entorno más inmediato a l'Albufera donde, hasta hace unos pocos años, se ausentaba completamente durante el periodo de nidificación (BDJ,JGR)

Villalonga: 11.V: 1 ej. cantos nupciales (SEOL)

Nuevas citas de machos defendiendo territorio en zonas costeras de Valencia, que ya se observaba en anteriores anuarios (2010 y 2011) por lo que parece que se consolida la expansión de la curruca capirotada en esta provincia.

Phylloscopus inornatus**Mosquitero bilistado - Mosquiter de doble ratlla - Yellow-browed Warbler**

Estatus: Divagante de Asia Central y Oriental

2013

Benicàssim: 15.X: 1 ej. en una zona ajardinada (MTB)

Esta especie ha dejado de considerarse una rareza desde el año 2012 para el conjunto de España tras la reciente publicación del último informe de rarezas de la SEO/BirdLife (Copete et al. 2015). En la Comunidad Valenciana viene citándose de forma casi ininterrumpida desde 2004. Todas las citas en Castellón y Valencia, sin citas en Alicante.

Phylloscopus bonelli**Mosquitero papialbo - Mosquiter pàl·lid - Western Bonelli's Warbler**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012**Illes Columbretes:** 27.VII: 1 ej. (LGB)**Benicàssim:** Fechas extremas de migración prenupcial 22.IV a 17.V; 31.VII: Primera cita postnupcial (MTB)**Tuéjar:** 15.IX: 5 ej. paso evidente en el bosque de ribera del río Turia (JAI)**Mislata:** 12.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (PAB)**Biar:** 09.IV: 1 ej. (JAG)**2013****Benicàssim:** 01.IV: 1 ej. Primera cita anual; 16.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB)**Albufera de València:** 07.IV: Primera cita anual de 1 ej. en el vedat de Silla (PMP); 11.V: 1 ej. en la Ratlla (AAC,BDJ)**Torrebaña:** 01.IV: 1 ej. (RMB)**Aigües:** 05.IV: 1 ej. (JDL)

Especie con un paso poco abundante (algo más común en primavera) y con un comportamiento bastante discreto, por lo que suele dejar pocos registros. Las fechas extremas se han producido el 01.IV en 2013 Benicàssim, y en un tardío 15.IX en 2012 en el río Turia a la altura de Tuéjar.

Phylloscopus sibilatrix**Mosquitero silbador - Mosquiter xiulaire - Wood Warbler**

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012**Albufera de València:** 03.IV: 1 ej. en los álamos del bosque de ribera (MCH,JID) observado de nuevo el 04.IV (VPA,JMAG,FLL)**2013****Prat de Cabanes-Torreblanca:** 28.IV: 14 ej. 10 en els tamarius al costat de Torrenostra i altres 4 en horts; 29.IV: 19 ej. 8 en els tamarius de Torrenostra, la resta dispersos per camps annexos a la marjal i la zona S del Prat. Probablement màxims històrics (VET)**Benicàssim:** 26.IV: 1 ej. Primera cita anual; 29.IV: 4 ej. máximo primaveral en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral; 05.V: 1 ej. Última cita primaveral. Este año se ha producido una irrupción de aves con un total de 14 citas primaverales. Máximo en 7 años (MTB)**Marjal dels Moros:** 29.IV: Varios ej. en el límite de la playa con la marjal (FFA); 01.V: 1 ej. (JFM)**Gátova:** 01.V: Varios ejemplares (VPA)**Godella:** 01.V: 1 ej. (GLL)**València:** 04.V: 1 ej. en zonas ajardinadas del casco urbano (AAC); 04.V: 2 ej. en puntos distintos del casco urbano (AAC,JPH)**Torrent:** 09.IV: 1 ej. (VPA)**Albufera de València:** 15.IV: 1 ej. en álamos blancos del itinerario del bosque de ribera del Racó de l'Olla. Primera cita prenupcial (JID); 19.IV: 2 ej. en un mismo álamo blanco en el Racó de l'Olla (MCH,JID,GGA,IRU); 26.IV: 2 ej. en zonas arboladas de álamo blanco en la ermita de les Palmeres (BDJ); 27.IV: 1 ej. en una arboleda cercana al vedat de Silla (PMP); 27.IV: 1 ej. en el Racó de l'Olla y 1 ej. en la muntanyeta dels Sants (GLL); 27.IV: 12 ej. observados en diferentes zonas arboladas entre las huertas de Catarroja y el Saladar. Importante llegada de migrantes (BDJ); 29.IV: 4 ej. en el arbolado del portet de

Sollana y 4 más en zonas arboladas de las huertas de Catarroja (AAC,FGN); 29.IV: 12 ej. en la Muntanyeta dels Sants (PVG); 29.IV: 4 ej. en zonas arboladas próximas al Palmar y al menos 10 aves dispersas en zonas arboladas y de huerta del Mareny de Sant Llorenç. Se trata de la mayor irrupción de esta especie registrada hasta la fecha para l'Albufera (EGO,BDJ); 30.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (SEOV); 01.V: 10 ej. en la Muntanyeta dels Sants y ullal de Baldoví (AAC); 03.V: 5 ej. en la muntanyeta dels Sants (PVG); 06.V: 2 ej. en l'ullal de Baldoví (MFN,PLP)

Cullera: 30.IV: 2 ej. capturados para anillamiento en el entorno de la ermita dels Sants de la Pedra. Se observan además varios ejemplares en la zona (MPB)

Requena: 28.IV: 3 ej. en chopos junto al río Magro. Probablemente primera cita para la comarca (PRP); 28.IV: 2 ej. (PRP)

Altea: 05.V: 1 ej. (WMY,TMF,JMF)

Excelente ejemplo de las fuertes diferencias interanuales que puede haber en esta especie. Mientras que tan solo recibimos una cita en 2012, el total de ejemplares observados en la primavera de 2013 supera los 130, con máximos históricos en varias localidades (Prat de Cabanes-Torreblanca, Benicàssim, Albufera de Valencia y Requena). Estas citas se asocian al temporal de levante ocurrido a finales de abril, en pleno apogeo del paso de la especie. Destaca igualmente la escasez de citas en la provincia de Alicante, que parece haber quedado al margen de esta irrupción.

Phylloscopus collybita

Mosquitero común - Mosquitero común - Common Chiffchaff

Estatus: Nidificante raro localizado. Migrante e invernante abundante. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 10.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 28.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 23.X: 18 ej. máximo postnupcial (LGB)

Marjal de Moncofa: 13.I: 80 ej. en una acequia (JBC)

Peñagolosa: 22.VII: 1 juv. capturado para anillamiento. Tras varias citas previas en primavera en los últimos años, se constata por primera vez la nidificación de la especie en el paraje (MTB,BSS,GAU)

Marjal d'Almenara: 03.II: 50 ej. máximo anual (JBC)

Chelva: 23.VI: 1 m. con canto típico en un paisaje de umbría con pino carrasco, olmo común, chopo negro y espino albar. Posible reproductor (JAI)

Albufera de València: 04.II: 70 ej. en un transecto de apenas 20 m de carrizal en el Fangar (VLG,MGI); 23.III: Se recaptura 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie *abietinus* en el tancat de la Pipa. Se trata de un ave invernante en la localidad, dado que ha sido recapturada en 3 ocasiones a lo largo del invierno (SEOV); capturas en el tancat de Milia de 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie nórdica *abietinus* el 29.X y el 10.XI (GTR)

Requena: 01.IV: 4 ej. Última cita de invernada en el cauce del río Magro; 06.X: 5 ej. Primera cita otoñal (JAI)

2013

Ares del Maestrat: 18.IV: 1 m. cantor (RPB,ALR)

Xert: 12.V: 1 ej. (RPB,ALR)

Alcossebre: 13.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)

Benicàssim: 16.III: 11 ej. máximo prenupcial en transecto de 1 km; 12.X: Primera cita postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 09.I: 1 ej.; 28.III: 48 ej. máximo primaveral; 12.V: 2 ej. Última cita tardía (LGB)

Marjalera de Castelló: 30.IV: 1 ej. en la partida Patos (XBC)

València: 04.V: 1 ej. dentro del casco urbano (JPH); 08.V: 1 ej. en una escollera interior del puerto de Valencia. Cita tardía (PVG,EGO,MMO)

Albufera de València: 04.V: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Cita primaveral tardía (GTR); 02.IX: 1 ej. un ave en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial bastante temprana (AAC,FGN); 06.X: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa que presenta considerable acumulación de grasa subcutánea (PVG,SEO); 06.XII: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. *tristis*, anillado en el tancat de Milia. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas. De ser aceptado se trataría de la cuarta observación para l'Albufera (PVG,SEO)

La identificación de los mosquiteros orientales (tipo *tristis/abietinus*) es compleja, hasta el punto que el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife tiene suspendida la homologación de los ejemplares de la ssp. *tristis* mientras se acuerdan una serie de criterios que permitan homologar sus citas con cierta seguridad.

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico - Mosquiter ibèric - Iberian Chiffchaff

Estatus: Migrante escaso

2012

Benicàssim: 08.V: 1 ej. cantando en campos abandonados de almendros. Quizás un segundo ej. también cantando (MTB)

Peñagolosa: 23.VIII: 1 ej. migrante capturado para anillamiento (MTB,BSS,GAU)

Albufera de València: 27.III: 1 ej. capturado para anillamiento mostrando rasgos característicos y emitiendo el reclamo típico de esta especie. Primera cita prenupcial (PVG,LSO,RGR,JBO); 29.V: Se escucha un ej. cantando en una alameda del Racó de l'Olla. Cita prenupcial algo tardía (JID); 05.IX: 1 ej. capturado para anillamiento en huertas colindantes a la marjal de Silla. Se escucha además el canto de la especie en repetidas ocasiones (PMP); 11.X: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (ALO,MMR,PVG)

Illa de Tabarca: 03.IV: 1 ej. (PIC); 22.IV: 1 ej. (PIC)

2013

Benicàssim: 08.IV: 3 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendro y matorral. Máximo en 7 años, se captura 1 ej. para anillamiento; 13.IV: 1 ej. (MTB)

Albufera de València: 12.III: 3 ej. cantando en carrizales próximos al motor de el tancat de la Pipa (PVG); 23.IV: 1 ej. un ave cantando en el tancat de Milia (AAC,FGN); 24.V: 1 ej. observado en la pinada del Racó de l'Olla, emite canto de forma intermitente; 29.V: 1 ej. observado mientras canta en un pino del Racó de l'Olla. Posiblemente un ejemplar distinto del observado en fechas anteriores (JID,MCH,IRU)

Xàbia: 18.III: 1 ej. cantando (MPB)

Illa de Tabarca: 01.IV: 11 ej. anillados entre el 01.IV y 01.V (PIC)

Al igual que ocurrió con el mosquitero silbador, 2013 parece haber sido un año muy bueno en zonas costeras de la CV, incluido un record de anillamientos primaverales en Tabarca.

Phylloscopus trochilus

Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler

Estatus: Migrante abundante. Conservación: IE

2012

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 2 ej. capturados para anillamiento, primera cita anual (JCA,GAU)

Benicàssim: Fechas extremas en paso primaveral 18.III y 16.V; fechas extremas en paso postnupcial 13.VIII y 16.X (MTB)

Illes Columbretes: Máximos primaverales de 34 ej. el 02.V y de 36 ej. el 06.V; 30.V: 2 ej. Última cita primaverales; 06.IX: 19 ej. máximo postnupcial; 16.X: 2 ej. Última cita anual (LGB)

Tuéjar: 15.IX: 12 ej. fuerte paso en el bosque de ribera del río Turia (JAI)

Albufera de València: 22.III: 1 ej. cantando en la senda del bosque de ribera. Primera cita del paso primaverales (JID,MCH,IRU); 23.III: 1 ej. cantando a primera hora de la mañana (SEOV); 22.V: 1 ej. en l'ullal de Baldoví. Última cita prenupcial (JBE,BDJ); 07.VIII: 1 ej. en un seto de olivos y zarzas. Primer registro postnupcial (BDJ); 17.X: 2 ej. capturados para anillamiento. Última cita postnupcial (SEOV)

Requena: 29.IX: 1 ej. Última cita del año (JAI)

2013

Vinaròs: 07.IV: 20 ej. en la playa de Aiguaoliva. Importante concentración primaverales (FPV)

Benicàssim: 29.IV: 24 ej. en transecto de 1 km en campos de almendro abandonados y matorral. Máximo anual; 26.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 21.IX: 5 ej. en transecto de 1 km Máximo postnupcial; 08.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

Illes Columbretes: 17.III: 4 ej.; 12.IV: 27 ej. máximo primaverales (LGB)

Desem. rio Mijares: 25.III: 1 ej. capturado para anillamiento, primera cita anual (JCA,GAU)

Marjal dels Moros: 14.VIII: 3 ej. (VBJ)

Mislata: 30.IV: 10 ej. en la huerta (PAB)

Albufera de València: 12.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita prenupcial (SEOV); 15.IV: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie *acredula* capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (SEOV); 30.IV: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie nórdica *acredula* capturado para anillamiento en la torreta Ampla (JMR); 22.V: 1 ej. capturado para anillamiento en la torreta Ampla (MPB,PMP,GTR); 23.V: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie *acredula* capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (SEOV); 23.V: 1 ej. un ave en el tancat de Milia, última cita prenupcial; 12.VI: 2 m. cantando insistentemente en el tancat de Milia. Cita excepcionalmente tardía (AAC,FGN); 22.VII: 1 ej. cantando en zonas arboladas cerca de El Palmar. Primer registro postnupcial (BDJ)

Requena: 20.VIII: 1 ej. en la balsa El Pontón, primera cita postnupcial (PRP)

Albufera de Gaianes: 10.III: 1 ej. (BOR)

Font Roja: 21.IX: 15 ej. capturados para anillamiento científico (PCC)

Regulus regulus

Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest

Estatus: Invernante escaso. Conservación: IE

2012

Vilanova d'Alcolea: 02.XI: 3 ej. en la font de Calaf (JBC,SMS)

Illes Columbretes: 03.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; citas postnupciales de 4 ej. el 24.XI, 3 ej. el 30.XI y citas de 1 ej. el 04.XII y de 2 ej. el 10.XII (LGB)

El Toro: 02.I: 1 h. en un pinar a 1.300 m s.n.m. (MGT)

Albufera de València: 16.XI: 3 ej. en el itinerario de bosque de ribera del Racó de l'Olla (MCH); 30.XI: 7 ej. en varios grupos en zonas arboladas del Racó de l'Olla (AAC)

Clot de Galvany: 14.XI: 2 ej. (AJR)

2013

Illes Columbretes: 28.III: 1 ej. única cita anual (LGB)

Albufera de València: Citas de 1 ej. en zonas arboladas de la devesa el 25.I y el 13.II (JHZ); 27.I: 2 ej. en zonas de pino del Racó de l'Olla (GCH)

Pantà d'Elx: 04.I: 1 ej. (OAP)

Clot de Galvany: 04.I: 2 ej. inusual en la zona (AJR)

Regulus ignicapilla**Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest**

Estatus: Residente e invernante común. Conservación: IE

2013**Alcossebre:** 21.XII: 1 ej. única cita anual (DES)**Illes Columbretes:** Citas prenupciales de 1 ej. el 19.III y el 03.IV (LGB)**Illa de Tabarca:** Citas de 1 ej. el 22.III y el 04.IV: 1 ej. (PIC)**MUSCICAPIDAE****Muscicapa striata****Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012**Benicàssim:** 23.IV: 1 ej. Primera cita anual; 07.VII: Primer juv. del año (MTB)**València:** 16.I: 1 ej. refugiándose de la lluvia bajo unos árboles (AAR)**Albufera de València:** 24.IV: 1 ej. Primer registro prenupcial (PMP); 25.IV: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 23.X: 1 ej. Últimas citas postnupciales (AAC)**Real de Gandía:** 25.IV: 2 ej. (AMG)**2013****Alcossebre:** 29.IX: 1 ej. última cita postnupcial (DES)**Benicàssim:** 18.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 09.V: 1 ej. mostrando caracteres de la ssp. *balearica*. Otro posible ej. de esta ssp. el 27.V aunque con fenotipo menos definido; 16.V: 8 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral. Máximo prenupcial; 01.VI: 1 ej. Última cita prenupcial; 13.VII: 1 juv. primero del año (MTB)**Illes Columbretes:** Fechas extremas en primavera de 2 ej. el 15.IV y de 5 ej. el 21.V (LGB)**Mislata:** 03.X: 1 ej. Última cita postnupcial de 1 ej. en la pinada del hospital militar (PAB)**Albufera de València:** 29.VIII: 1 ej. mostrando rasgos de la ssp. *balearica* en el tancat de Milia. Primer registro para l'Albufera de esta subespecie exclusiva de las islas Baleares (AAC,FGN)**Cullera:** 15.IV: 1 ej. en un pinar del Cabeçol. Primera cita prenupcial (MPB)

Sorprendente cita de un ejemplar invernante en València. Tan solo existen 4 citas invernales previas de la especie, la más reciente en diciembre del 2000 en el Clot de Galvany.

Ficedula parva**Papamoscas papirrojo - Papamosques menut - Red-breasted Flycatcher**

Estatus: Divagante del E de Europa

2012**Albufera de València:** 30.X: 1 h. o 1.^{er} inv., observado en zona de tarays de la playa del Dossel. Apenas se cuenta con un registro previo para en entorno de l'Albufera de un ej. observado en la devesa a principios de octubre de 1990. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO (JHZ,BDJ)**2013****Alacant:** 14.VIII: 1 m. ad. (MLP,BCH) sigue presente el 15.VIII (SCR)

Decimosegunda y decimotercera citas en la Comunidad Valenciana, se trata de la tercera para Valencia y la segunda para Alicante, todas ellas en el paso postnupcial. La de Alicante es la más temprana de la que tenemos constancia, mientras que la de la Albufera es la más tardía de todas las registradas.

Ficedula albicollis**Papamoscas acollarado - Papamosques de collar - Collared Flycatcher**

Estatus: Divagante del E de Europa

2013

València: 04.V: 1 m. en zonas ajardinadas de la av. Blasco Ibáñez (AAC)

Albufera de València: 01.V: 1 m., aparentemente ad., en la muntanyeta dels Sants. Primer registro para l'Albufera que coincide con una llegada marcada de divagantes en varias localidades del NE de la península Ibérica y de las islas Baleares. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO (AAC,BDJ); sigue presente por la tarde (GCH); 03.V: 1 m. observado en la devesa en zonas ajardinadas (EVB)

Pinet: 23.V: 1 m. en el surar (DGS)

Hasta la fecha se contaba tan solo con tres citas previas en la Comunidad Valenciana, una por provincia. La cita del 03.V está homologada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Ficedula hypoleuca**Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher**

Estatus: Migrante común. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 23.IV: 1 ej. Primera cita anual. Paso primaveral muy débil con apenas 9 citas; 02.V: última cita primaveral; 12.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 20.IX: 24 ej. en 1 km de censo en campos de almendros abandonados y matorral, máximo postnupcial; 18.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)

València: 12.X: 1 ej. Última cita postnupcial (PAB)

Albufera de València: 23.IV: 2 m. Primera observación prenupcial (JID,IRU); 22.X: 3 ej. Última cita postnupcial (JHZ)

Alborache: 15.IV: 1 ej. (VBJ)

Altea: 05.V: 1 ej. (TZL,EGM)

El Campello: 22.IV: 1 ej. (JMT)

2013

Ares del Maestrat: 06.VI: 1 se localiza el ala de un ej. en una caja nido para autillos y rastros de una puesta depredada (RPB,ALR,CCT)

Alcossebre: 30.IV: 21 ej. Máxima concentración prenupcial (DES)

Benicàssim: Fechas extremas paso prenupcial 19.IV a 21.V. máximo prenupcial el 29.IV con 16 ej. en transecto de 1 km en cultivos abandonados de almendro y matorral. Fechas extremas paso postnupcial 20.VIII a 17.X; máximo postnupcial el 12.IX con 13 ej. en transecto de 1 km en cultivos abandonados de almendro y matorral (MTB)

Illes Columbretes: 12.VI: 1 ej. Cita prenupcial muy tardía (LGB)

Castelló de la Plana: 24.V: 1 m. en el parque Ribalta (XBC)

Marjal dels Moros: 29.IV: Varias decenas de ej. en la marjal (VPA)

Mislata: 09.IV: 1 m. primera cita prenupcial de en la huerta de Mislata (PAB)

Albufera de València: 11.IV: 2 ej. en el itinerario de la pinada del Racó de l'Olla. Primera cita prenupcial

(MCH); 27.IV: Mínimo de 20 ej. en la muntanyeta dels Sants. Llegada marcada de migrantes (GLL); 28.IV: Llegada marcada de migrantes coincidiendo con la inestabilidad atmosférica. Varias decenas de aves en zonas de huerta de Catarroja, Silla y la muntanyeta dels Sants (AAC,BDJ); 29.V: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Cita primaveral tardía (MCH); 20.VIII: 1 juv. o h. en el itinerario del bosque de ribera del Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID); 22.X: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Última cita otoñal (BDJ)

Requena: 28.IV: 17 ej. Fuerte paso prenupcial, observaciones en un recorrido de 2 km por el río Magro y campos adyacentes (PRP)

Yátova: 06.IV: Primera cita anual de 2 ej. distintos en puntos diferentes (JAI)

Chera: 21.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP)

En estos años las citas extremas han quedado entre el 09.IV en Yátova y una muy tardía 12.VI en Columbretes (ambos en 2013), mientras que el paso postnupcial se ha enmarcado entre el 12.VIII en 2012 en Benicàssim y un tardío 22.X en el Racó de l'Olla en 2013. La cita más relevante es de todos modos, la de Ares, que indica que posiblemente una pareja nidificó en una caja nido, lo que sería la primera cita confirmada de cría, aunque indirecta, de esta especie para la Comunidad Valenciana.

TIMALIIDAE

Panurus biarmicus

Bigotudo - Serenet - Bearded Parrotbill

Estatus: Residente raro muy localizado, visitante raro. Conservación: VUL

2012

Albufera de València: 10.I: 1 ej. cantando en la Ratlla (PAB); 15.III: 1 ej. emitiendo el típico reclamo de vuelo en el carrizales de la punta de Llebeig (PVG); 24.III: 1 par. en los filtros verdes y una de las lagunas del tancat de la Pipa (CAP,VDA,LSO,BFM,VGA,PLA,PVG); 07.VI: 1 ej. en la orilla NE de la mata de l'Antina (PVG); 15.VI: 2 ej. en la mata del Fang (PVG,JME,BDJ,FPA); 19.VI: Se escucha el reclamo de 1 ej. (tal vez 2) en el entorno de los filtros verdes de el tancat de la Pipa; 03.VII: 2 ej. emitiendo el característico reclamo en vuelo y alimentándose de semillas de carrizo en el tancat de la Pipa (PVG)

El Fondo d'Elx: 25.II: 1 ej. capturado para anillamiento (GALA)

2013

Albufera de València: 08.I: 1 ej. cantando en la Ratlla (PAB); 19.III: 1 ej. en la el tancat de Milia. Se trataría de la primera observación de la especie en esta reserva (GTR); 24.XI: 1 par. en la Pipa (GCH)

AEGITHALIDAE

Aegithalos caudatus

Mito común - Senyoreta - Northern Long-tailed Tit

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Illes Columbretes: 30.V: 1 ej. (LGB)

Albufera de València: 27.XII: 2 ej. en un jardín urbano de Sueca. Resultan poco frecuentes las citas de esta especie fuera de su hábitat (MPB)

PARIDAE

Lophophanes cristatus**Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit**

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 20.VII: 1 ej. en el itinerario del bosque de ribera de del Racó de l'Olla. Primera cita de la especie desde 1987 en l'Albufera y muy posiblemente relacionada con los grandes incendios forestales del interior de la provincia en fechas previas (JID,MCH)

2013

Cullera: 21.VI: 1 ej. en zonas arboladas de pino y carrasca del Cabeçol. Dadas las fechas y el hábitat de observación, podría tratarse de un ejemplar reproductor. No se ha confirmado hasta la fecha la nidificación de esta especie en el P. N. de l'Albufera (BDJ,JGR)

Periparus ater**Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit**

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

2013

Albufera de València: 21.VI: 3 ej. en zonas arboladas de pino y carrasca del Cabeçol. Dadas las fechas y el hábitat de observación, parece tratarse de ejemplares reproductores. Hasta la fecha no se había confirmado la nidificación de esta especie en el P. N. de l'Albufera (BDJ,JGR)

Cyanistes caeruleus**Herrerillo común - Ferrerolet - Eurasian Blue Tit**

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2013

Albufera de València: 18.X: 1 juv. anillado en una chopera en zonas de huerta de la Canal. Apenas existe alguna referencia antigua de su presencia en la devesa, todas anteriores a 1950, y una cita aislada a principios de los años 90 (PMP,GTR)

Buñol: 17.II: 20 ej. muy común en el bosque de ribera del río Mijares en invierno (JAI)

Yàtova: 22.VI: 15 ej. buena densidad en el bosque de ribera del río Mijares. Ya hay pollos voladeros (JAI)

Parus major**Carbonero común - Totestiu - Great Tit**

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

Sin citas de interés.

SITTIDAE

Sitta europaea**Trepador azul - Pica-soques blau - Eurasian Nuthatch**

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Sin citas de interés.

TICHODROMADIDAE

Tichodroma muraria**Treparriscos - Pela-roques - Wallcreeper**

Estatus: Invernante y migrante raro. Conservación: IE

2012**Cortes de Pallás:** 22.XII: 1 ej. (MGE)**Cocentaina:** 23.XII: 1 ej. en el Montcabrer (VCS)**2013****Embalse de Ulldecona:** 31.III: 1 ej. en un pequeño cortado sobre el embalse (IMR)**Tavernes de la Vallidigna:** 08.IV: 2 ej., separados por unos 15 min., volando hacia el N sobrevolando una zona de naranjos lindando con las dunas de la playas (LAA)**Beniatjar:** 12.XI: 1 ej. en la sierra de Benicadell (ROL)**Chera:** 02.XII: 1 ej. paraje de la Herrada de Chera. El ave se desplaza por la pared vertical a pequeños saltitos, agitando a menudo las alas en movimientos espasmódicos (PRP)**Callosa d'en Sarrià:** 29.III: 1 ej. en la sierra de Bernia (LUB,MRC)

CERTHIIDAE

Certhia brachydactyla**Agateador europeo - Raspinell comú - Short-toed Treecreeper**

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Sin citas de interés.

REMIZIDAE

Remiz pendulinus**Pájaro moscón europeo - Teixidor - Eurasian Penduline-tit**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: SAH

2012**Desem. riu Millars:** 09.X: 6 ej. (MBM,JCA)**Albufera de València:** 01.IV: 2 ej. en el tancat de la Pipa (GLL); 08.IV: 5 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 26.VI: 1 ej. en el tancat de Milia, cita estival (CAV,AAC); 31.VII: Se escucha el reclamo de 1 ej. en el tancat de Milia (AAC)**2013****Alcossebre:** 08.III: 11 ej. Grupo migrante cerca de la laguna de Capycorp (DES)**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 08.IV: 1 ej. (IMR)**Albufera de València:** 12.III: 9 ej. (8 en un bando volando sobre la reserva) en el tancat de Milia (AAC,FGN); 18.VII: Se escucha 1 ej. reclamando en el ambiente de alameda del Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (MCH,JID); 19.VII: 1 ej. reclamando en los filtros verdes de el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial en la reserva (PVG)**Requena:** 11.XI: 1 ej. Primer registro invernal (PRP)**El Fondo d'Elx:** 27.I: 10 ej. (AAC,IBR)

ORIOLIDAE

Oriolus oriolus**Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012**Benicàssim:** 06.VII: 1 juv. Primero del año; 23.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)**Illes Columbretes:** 22.V: 1 ej. (LGB)**Olocau:** 12.IV: 1 ej. Primera cita primaveral; 13.IV: 1 ej. (TPA)**Albufera de València:** 17.IV: 1 m. cantando. Primera cita prenupcial (MCH,JID)**2013****Alcalá de Chivert:** 30.VI: Grupo familiar de 4 ej. (IMR)**Alcossebre:** 10.IX: 2 juv. Última cita anual (DES)**Benicàssim:** Fechas extremas migración primaveral 13.IV a 28.V; Fechas extremas migración postnupcial 25.VII a un tardío 01.X (MTB)**Marjal dels Moros:** 29.IV: 6 ej. (VPA)**Albufera de València:** 15.IV: 1 ej. en una arboleda cercana al mirador de caza del vedat de Silla. Primer registro primaveral (PMP); 13.VI: 1 ej. cantando en zonas arboladas del Racó de l'Olla. Cita tardía (MCH)**Aigües:** 05.IV: 1 h. (JDL)

LANIIDAE

Lanius collurio**Alcaudón dorsirrojo - Capsot d'esquena roja - Red-backed Shrike**

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012**Vilafranca:** 16.IX: 2 juv. Posiblemente un tercer ej. (RPB,ALR)**2013****Alcossebre:** 11.X: 1 juv. sedimentado hasta el día 20.X (DES)

Nueva cita de ejemplares juveniles en Vilafranca, tras un juv. siendo alimentado por un ad. publicado en el anuario de 2011. Sin embargo, los autores no consideran segura la nidificación en la provincia de Castellón debido a la proximidad con la provincia de Teruel (Prades et al. 2017).

Lanius meridionalis**Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike**

Estatus: Residente moderado.

2012**Vilanova d'Alcolea:** 11.I: 3 ej. (JBC,JLB)**Benicàssim:** 10.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)**Moncofa:** 22.XII: 2 ej. (JBC)**Marjal d'Almenara:** 08.X: 3 ej. (JBC,JLB); 15.XII: 5 ej. (JBC)**2013****Benicàssim:** 15.III: 1 ej. invernante en la zona. Última cita prenupcial (MTB)

Desem. riu Millars: 27.I: 1 ej. invernante; 22.XII: 1 ej. invernante (MBM)

Albufera de València: 26.VI: 1 juv. posado en un tendido aéreo en arrozales del Ravisanxo. Primer registro de un ave nacida esta temporada (BDJ)

Alacant: 04.IV: 1 ej. (JDL)

Lanius senator

Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 01.IV: 1 m. de la ssp. *badius*; 31.VII: 1 ad. primera cita postnupcial (MTB)

Tales: 06.IX: 1 ej. (JBC)

Albufera de València: 29.III: 1 ej. posado en las dunas de la devesa. Primera observación prenupcial (MCH); 26.IV: 30 ej. importante arribada de ej. en zona de huertas de Silla (PMP,CAV,AAC); 28.V: 1 ej. en el tancat de Milia, última cita prenupcial; 01.IX: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)

2013

Alcossebre: 09.III: 1 h. Primera cita anual (DES)

Benicàssim: 09.III: 1 m. primera cita anual; 24.VI: 1 juv. Primero del año; 03.IX: 1 ej. mostrando caracteres de la ssp. *badius*. Sería la primera cita postnupcial en la localidad. En primavera se cita casi anualmente (MTB)

Albufera de València: 04.IV: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. *badius* en una de las orillas de l'estany del Pujol. Solo existen 2 citas previas atribuidas a esta ssp. en l'Albufera; 13.IV: 17 ej. en zonas de huerta de la Torretea y el Saladar. Llegada marcada de migrantes (BDJ); 08.V: 1 ej. de la ssp. *badius* encontrado muerto, de varios días, en una escollera del puerto de Valencia (PVG,EGO,MMO)

CORVIDAE

Garrulus glandarius

Arrendajo euroasiático - Gaig - Eurasian Jay

Estatus: Residente moderado. Conservación: EP

2013

Borriol: 11.VI: 1 ad. acosando a un grupo familiar de collalba negra (LPC)

Pica pica

Urraca común - Garsa - Common Magpie

Estatus: Residente común. Conservación: EC

2012

Desem. riu Millars: 31.I: Dormidero de 339 ej. posados en las cañas al atardecer (JBC)

La Vall d'Uixó: 02.X: 28 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 22.XII: 27 ej. (JBC)

Albufera de València: 31.I: 47 ej. en zonas de huerta del Bony. Máxima concentración de aves registrada hasta la fecha en l'Albufera (EGO,BDJ); 21.XI: 46 ej. en zonas de transición entre arrozales y huerta y al menos 19 ej. en zonas de huerta periféricas de El Palmar (BDJ)

Cullera: 16.XII: 20 ej. en arrozales del Brosquil (JRA)

Requena: 15.I: 31 ej. bando invernal (RMB)

Cap de l'Horta: 07.III: 1 ej. esta especie ha empezado a aparecer hace poco (EGM)

Pantà d'Elx: 08.II: 30 ej. en dormitorio del carrizal; 01.XII: 30 ej. en dormitorio del carrizal (OAP)

Clot de Galvany: 28.III: 2 ej. nido en taray junto charca principal. Primera nidificación en el paraje (AJR)

2013

Quadre de Santiago: 23.XII: 23 ej. en transecto de 2 km. Máximo anual. Aumento considerable de ej. durante la invernada (MTB)

Albufera de València: 17.X: Grupos de 12 ej. en zonas de huerta entre la séquia del Racó de l'Olla y el Palmar, 7 ej. en huertas de Barraquetes y 7 sobrevolando la Malta (BDJ); 21.X: Bando de 23 ej. volando hacia el S sobre el Racó de l'Olla (JID,MCH)

Villena: 31.XII: 35 ej. (DMM)

Pantà d'Elx: 01.XI: 57 ej. dormitorio (OAP)

Elx: 02.X: 1 ej. muy rara en la ciudad, en jardín junto al cementerio viejo (OAP)

Clot de Galvany: 19.VI: 3 ej. 1 par. con 1 pollo volandero (AJR)

Consolidada en Castellón hace ya años, la población de urraca parece que sigue con su proceso expansivo en dirección sur, como muestran los datos de l'Albufera (donde aumenta en número de ej.) y con la aparición en distintas localidades costeras de Alicante, donde es aún rara, y donde ya ha empezado a reproducirse.

Pyrhcorax pyrrhcorax

Chova piquirroja - Gralla de bec roig - Red-billed Chough

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012

Vistabella: 18.VIII: 58 ej. en el Bovalar (JBC)

Cullera: 26.V: 2 ej. en los arrozales del Brosquill (MAL,LAA)

Llaurí: 08.III: Bando de unos 35 ej. que baja de la montaña al arrozal (JML)

2013

Titaguas: 09.I: 80 ej. alimentándose en campos de cultivo a las afueras de la población (TPA)

Requena: 30.X: 90 ej. Gran bando en típica agrupación otoñal por los campos de olivos y almendros alrededor del pueblo (PRP)

Cullera: 27.VI: 1 ej. volando a cierta altura sobre los arrozales de la bassa Rassa hacia el mar. Cita estival que se asociaría con los núcleos de reproducción más cercanos localizados en la serra de les Agulles (EGO,BDJ)

La Vall de la Gallinera: 27.VI: Bando de unos 110 ej. volando sobre la serra Foradada (JML)

Gaïanes: 12.III: 32 ej. (ROL)

Villena: 10.III: 1 par. Uno de los ej. transportaba material para el nido (DMM)

El Molón: 08.IX: 20 ej. (RMB)

Serra Grossa: 16.VII: Grupo de 28 ej. que hace uno de sus característicos corros en lo alto de una ladera del bnc. de Borrell (JML)

Serra d'Alfaro: 17.VII: Grupo de unos 45 ej. volando en lo alto de la sierra (JML)

Serra Foradada: 29.XI: Bando de unos 150 ej. haciendo uno de sus tradicionales corros en lo alto de la sierra (JML)

Corvus monedula**Grajilla occidental - Gralla - Eurasian Jackdaw**

Estatus: Residente e invernante moderado. Conservación: EC

2012

Albufera de València: 24.I: 56 ej. volando al S al atardecer (AAC); 10.II: 37 ej. en zonas fangueadas de la Caldereria (EGO,BDJ); 06.V: 1 ej. volando sobre el tancat de l'Establiment (MCH); 27.V: 4 ej. alimentándose en arrozales (MAL,LAA); 02.VIII: 30 ej. en un tendido eléctrico al S del casco urbano de Sueca. Cita postnupcial excepcionalmente temprana. La especie suele aparecer con frecuencia en este mismo lugar a mediados de invierno (MPB); 23.X: 12 ej. en zonas inundadas (JHZ,BDJ); 29.X: 70 ej. en dos grupos en zonas de arrozal (EGO); 14.XII: 95 ej. sobrevolando el arrozal (JML)

Xeraco: 26.II: 100 ej. posados en las terrazas y antenas al S de la población (JML)

Marjal de Pego-Oliva: 14.I: 80 ej. junto a unas 300 garcillas y gargetas, se echan a su tradicional dormitorio a última hora de la tarde (JML)

Pantà d'Elx: 02.XII: 500 ej. en dormitorio (OAP,RLM,JGS,LUR)

2013

Vinaròs: 19.VII: Grupo familiar de 4 ej. bebiendo en una charco del río Servol, cerca de la zona de nidificación. Vuelan al E (ELL)

Requena: 07.IV: 18 ej. en la colonia de cría (JAI); 23.VIII: 145 ej. agrupación postreproductora posadas sobre una grúa de construcción. Puede tratarse del total de la población residente en la localidad (PRP); 02.XI: 146 ej. dormitorio en el casco urbano (JAI)

Albufera de València: 09.I: 46 ej. en arrozales fangueados de l'Heretat (BDJ); 24.I: 70 ej. alimentándose en campos fangueados en las inmediaciones de la casa del Sastre (AAC,FGN)

Cullera: 05.I: Bando de 119 ej. alimentándose junto a gaviotas reidoras en los arrozales del Brosquill. Se trata de la mayor concentración de aves detectadas en la zona hasta la fecha (MAL,LAA); 05.IX: 8 ej. alimentándose en zona de pastoreo de bovino en els racons de l'estany (BDJ)

Xeraco: 27.VII: 15 ej. (VBJ)

Pantà d'Elx: 16.I: 828 ej. censo en dormitorio; 16.XII: 1.046 ej. en dormitorio (OAP)

El Fondo d'Elx: 27.XII: 50 ej. (FBE)

Marjal de Pego-Oliva: 12.I: Bando de unas 120 aves se echa al dormitorio a última hora del día junto a varios cientos de garcillas y gargetas (JML)

Corvus corone**Corneja negra - Cornella negra - Carrion Crow**

Estatus: Residente común

2012

Penyagolosa: 24.III: 28 ej. (JBC)

Pina de Montalgrao: 21.I: 18 ej. (JBC)

Barracas: 21.I: 14 ej. (JBC)

Requena: 14.VII: 1 ej. yace muerto bajo un apoyo eléctrico junta a un m. ad. de cernícalo vulgar cerca de la balsa de la Casa del Abogado. Se comunica a los agentes medioambientales y pocos meses después el apoyo es corregido (PRP)

Albufera de València: 24.I: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia. Las citas de esta especie en zonas costeras son muy escasas. Apenas existen tres observaciones previas en el entorno de l'Albufera: en marzo de 2001, entre noviembre de 2002 y febrero de 2003 y septiembre de 2003 (AAC)

Villena: 23.XII: 7 ej. se les ve por la zona durante varias semanas (MCR)

Bovalar de Vistabella: 18.VIII: 17 ej. (JBC)

2013

Pinet: 25.XI: 2 ej. (DGS)

Villena: 09.III: 10 ej. volando en la zona del estrecho Pipa (MCR); 01.VI: 62 ej. en un solo bando (AAC)

Corvus corax**Cuervo grande - Corb - Common Raven**

Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: ET

2012

Catí: 15.I: 67 ej. en grupo desplazándose al SE (JBC)

Vilanova d'Alcolea: 21.XII: 10 ej. (JBC)

Albufera de València: 13.IV: 1 ej. en una torre eléctrica. Apenas parece existir una cita previa de esta especie en el entorno de l'Albufera (sep. 2007) (MPB)

2013

San Rafael del Río: 10.III: Grupo de 18 ej. volando dirección S (AGC)

Alcossebre: 06.II: 4 ej. Raro en la localidad (DES)

Castelló de la Plana: 22.III: 1 ej. sobrevolando un solar de herbazal a las afueras de la ciudad (LPC)

Godella: 1 par. se reproduce en la cantera prácticamente todos los años (GLL)

Barx: 27.III: 2 ej. observados en varias ocasiones en los últimos meses. Muy escaso por la zona (PLP)

Villena: 16.II: 6 ej. (MCR)

Serra del Mondúber: 26.X: 1 par. Uno lleva una marca alar amarilla en el ala derecha. Observado por primera vez el 23.X. Probablemente se trata de uno de los ej. marcados por el Grup d'Anellament GACO en el vertedero de Oris (Barcelona) y trasladado posteriormente a Tortosa (ASL,JML)

Serra de les Cel·letes: 06.I: 7 ej. volando por la sierra (JML)

STURNIDAE

Sturnus vulgaris**Estornino pinto - Estornell - Common Starling**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante muy abundante. Conservación: EC

2012

Sant Mateu: 15.I: 3.000 ej. pasando en grupo por encima de las granjas (JBC)

Les Coves de Vinromà: 15.I: 2.000 ej. en grupo cerca de la población (JBC)

Vilanova d'Alcolea: 11.I: 2.000 ej. en distintos bandos (JBC,JLB)

Benicàssim: 14.III: 7 ej. Última cita prenupcial; 27.X: 1.500 ej. máximo anual (MTB)

Illes Columbretes: última cita prenupcial de 4 ej. el 13.III; primera cita postnupcial de 4 ej. el 03.X (LGB)

Marjal d'Almenara: 17.XII: 3.000 ej. se observan algunos estorninos negros (JBC)

Sueca: 31.VII: 30 ej. con varias aves juv. en huertas cerca de el Palmar. Primera cita postnupcial (CAV,AAC)

Pantà d'Elx: 02.XII: 150.000 ej. censo en dormidero (OAP,RLM,JGS,LUR)

2013

Benicàssim: 13.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 18.X: 2 ej. Primera cita postnupcial; 15.XI: 1.200 ej. máximo anual de un bando en movimiento hacia el N (MTB)

Villar del Arzobispo: 24.I: 2.000 ej. en campos de cultivo de secano junto (TPA)

l'Elia: 19.II: 1.000 ej. sobrevolando el casco urbano (TPA)

Albufera de València: 12.VIII: Bando de más de 200 ej. en el tancat de la Ratlla. Primera cita postnupcial (AAC,FGN)

Requena: 22.VIII: 7 juv. posible cría, o quizás paso temprano (JAI)

Carlet: 19.II: 1.500 ej. sobrevolando una zona de frutales (TPA)

Sturnus unicolor

Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling

Estatus: Residente abundante. Conservación: ET

2012

Albufera de València: 24.V: 33 ej. mayoría juv. en zonas arboladas próximas al Palmar. Primeros grupos postreproductores de la temporada (BDJ)

2013

Benicàssim: 26.VIII: 350 ej. Primera concentración postnupcial relevante. Aparentemente todos juv. (MTB)

Albufera de València: 17.VI: Bando destacado de más de 500 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN)

PASSERIDAE

Passer domesticus

Gorrión común - Teuladí - House Sparrow

Estatus: Residente abundante. Conservación: ET

2012

Illes Columbretes: 11.I: 2 ej. (LGB)

2013

Quadre de Santiago: 21.VIII: 270 ej. máximo postnupcial en transecto de 2 km (MTB)

Passer hispaniolensis

Gorrión moruno - Teuladí de passa - Spanish Sparrow

Visitante ocasional del interior de la península Ibérica

2012

Villena: 16.VI: 1 m. (MRG,TPE)

Passer montanus

Gorrión molinero - Teuladí torredà - Eurasian Tree Sparrow

Estatus: Residente nidificante moderado, invernante común. Conservación: ET

2012

Desem. riu Millars: 07.I: 20 ej. (MBM)

Borriana: 13.I: 36 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 08.II: 18 ej. (JBC)

Albufera de València: 12.XII: 120 ej. en zonas arboladas (BDJ)

El Fondo d'Elx: 08.III: 35 ej. (AJR)

2013

Benicàssim: 02.XII: 15 ej. Máximo anual (MTB)

Mislata: 22.XII: 80 ej. en zona de huerta (PAB)

Albufera de València: 09.III: 50 ej. grupo en el Borronar (GCH); 19.V: 2 ej. volantones junto con 2 ad. en el tancat de la Pipa (SEO)

Requena: 12.IX: 112 ej. concentración postreproductora. Acuden a alimentarse de las semillas de gramíneas que crecen en una zona de la balsa (PRP)

El Fondo d'Elx: 25.I: 60 ej. (AJR)

Hondo de Amorós: 18.I: 25 ej. (AJR)

Petronia petronia**Gorrión chillón - Pardal roquer - Common Rock-sparrow**

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012

Albufera de Gaianes: 26.VIII: 150 ej. (BOR)

Villena: 06.VII: 100 ej. dormitorio situado en unos pinos carrascos junto al embalse de San Diego (MCR)

2013

Vistabella del Maestrazgo: 14.VII: 15 ej. (JCN)

Alpuente: 24.I: 50 ej. en campos de cultivo de secano en las proximidades de Baldozar (TPA)

Emb. de Bellús: 12.X: 50 ej. (BOR,DMF)

Villena: 03.VII: 3 ej. acuden a beber al embalse de la Cañada de Almela (MCR)

Montifringilla nivalis**Gorrión alpino - Pardal d'ala blanca - White-winged Snowfinch**

Estatus: Invernante raro originario de los Pirineos, Cordillera Cantábrica y los Alpes. Conservación: IE.

2012

Borriol: 05.XI: 19 ej. en un bando cohesionado que se desplaza por una ladera con movimientos rápidos y giros bruscos. Paisaje con pendientes muy pronunciadas, afloramientos rocosos y canchales; vegetación arbustiva y subarbustiva y de cobertura inferior al 40%. El bando, después de ir y venir durante unos segundos se posa en un canchal (LPC)

Excepcional observación, tanto por la localidad como por la cantidad de aves implicadas. La cita de este año se ha producido en una localidad a pocos km de la costa, cuando lo habitual es que se produzcan en el interior (Peñagolosa o els Ports, aunque hay también citas en Columbretes y la sierra de Iрта). El bando de 19 ej. es el más grande del que se tiene constancia en la CV, seguido de un grupo de 10 ej. observados en Morella en 1985. Undécima cita para la CV, todas en Castellón.

Estrilda astrild**Estrilda común - Bec de corall senegalès - Common Waxbill**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET. Categoría: C1.

2012

Castelló de la Plana: 23.IV: 2 ej. (PGR)

Quart de Poblet: 08.IV: 10 ej. en vegetación palustre junto al río Turia (PAB)

Albufera de València: 17.IV: Se captura un bando de 7 ej. en la estación de anillamiento del tancat de la

Pipa. Dado el carácter exótico de la especie y ante la previsión de una posible implantación como reproductora en el Parque Natural, se decide no liberarlas y trasladarlas al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler (PVG)

Cullera: 25.II: 19 ej. posados en vegetación palustre en una charca junto a las dunas de la playa en El Brosquil (LAA)

2013

Castelló de la Plana: 06.II: 1 par. en la marjalería (XBC)

Albufera de València: 27.X: 1 par. aportando material para la construcción de un nido, observados durante toda la mañana en una zona de carrizo próxima a El Saler (COM)

Cullera: 07.XII: 14 ej. en zonas de huerta y zonas ajardinadas del litoral del Mareny de Sant Llorenç (BDJ)

Altea: 27.IV: 2 ej. capturados para su anillamiento científico, 1 de ellos con placa incubatriz (TZL,EGM,TMF)

FRINGILLIDAE

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

2012

La Jana: 15.I: 200 ej. en los olivares (JBC)

Vilanova d'Alcolea: 11.I: 165 ej. (JBC,JLB); 15.XI: 250 ej.; 21.XII: 850 ej. dispersos en zona de olivos (JBC)

Desert de les Palmes: 30.IX: 2 ej. Primera cita postnupcial de ej. en paso; 22.X: 3.300 ej. en 10 h. de observación entre el 22 y el 25.X. Paso medio de 330 aves·h⁻¹ (MTB)

Benicàssim: 11.IV: 1 última cita prenupcial de 1 ej. en paso hacia el N (MTB)

Illes Columbretes: 29.X: Concentración destacada de 40 ej. (LGB)

Tales: 08.I: 150 ej. entre olivares (JBC)

Xilxes: Concentraciones destacadas de 220 ej. el 13.I y de 250 ej. el 17.XII (JBC)

Marjal d'Almenara: 17.XII: 223 ej. (JBC)

Albufera de València: 10.X: 1 ej. en el Racó de l'Olla, primera cita postnupcial (JID,MCH); 17.XII: Grupo de unos 2.000 ej. en arrozales (AAC,EGO,BDJ)

2013

Vinaròs: 20.X: 15 ej. Primeros avistamientos de invernantes. Censo postnupcial de rapaces 2013 (en 3 h. de observación) (ELL)

Alcossebre: 21.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (DES)

Benicàssim: 08.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 19.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 06.IV: 3 ej. (LGB)

Desem. riu Millars: 06.II: 50 ej. (MBM)

Albufera de València: 09.IV: 3 ej. en paso hacia el N sobre las dunas (BDJ); 18.X: Grupo de 9 ej. en huertas de Silla. Primera cita postnupcial (PMP); 18.X: 1 h. sobrevolando el tancat de la Pipa en dirección a la laguna (PVG,SEO); 18.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (JID,MCH,IRU)

Bocairent: 23.II: 100 ej. (BOR)

Fringilla montifringilla**Pinzón real - Pinsà mec - Brambling**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012**Desert de les Palmes:** 27.X: única cita anual de 1 ej. en paso (MTB)**Illes Columbretes:** 05.XI: 2 ej. (LGB)**Albufera de València:** 26.X: 6 ej. (2 m. y 4 h.) integrados en un bando de unos 200 pinzones vulgares en el tancat de Milia (AAC); 26.X: 3 ej. junto a pinzones vulgares en arrozales (PMP); 30.X: 1 m. y 1 h. formando parte de un grupo de un centenar de pinzones vulgares (JHZ,BDJ); 06.XI: 7 ej. en compañía de pinzones vulgares en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants (BDJ); 06.XI: 7 ej. en un bando de pinzón vulgar en el tancat de Milia (AAC); 12.XI: 12 ej. entre pinzones vulgares en arrozales (JGR,BDJ); 16.XII: 45 ej. en la muntanyeta dels Sants (PPF,JMI); 17.XII: Más de 100 ej. formando parte de un gran grupo de pinzón vulgar en arrozales de la Socarrada (AAC,EGO,BDJ)**Cullera:** 14.XII: 4 ej. en arrozales (MPB)**Requena:** 09.XII: 3 ej. en un bando junto a 80 pinzones vulgares comiendo semillas en un campo baldío junto el cauce (JAI)**Altea:** 11.XI: 2 ej. capturados para su anillamiento científico (TZL,TMF)**Sierra de Aitana:** 14.I: 1 m. (BOR)**Emb. de Beniarrés:** 29.XII: 1 ej. (BOR)**Albufera de Gaianes:** 11.XI: 1 h. (BOR)**Salines de Santa Pola:** 25.XII: 2 ej. (OAP)**El Fondo d'Elx:** 30.XI: 8 ej. (AJR,OAP); 21.XII: 10 ej. en dos grandes bandos de pinzones (OAP)**Dolores:** 25.XII: 1 ej. en cultivos cercanos al pueblo (OAP)**2013****Alcossebre:** 11.I: 2 ej. Primera cita postnupcial; 08.II: 1 m. ej. Última cita invernal (DES)**Illes Columbretes:** 07.III: 1 ej. (LGB)**Sot de Chera:** 04.I: 2 ej. en campos de cultivo próximos a la población (MPA); 04.I: 2 ej. (MPO)**Albufera de València:** 04.I: 23 ej. formando parte de un grupo de pinzones vulgares en la Socarrada (BDJ); 14.I: 65 ej. en bando de 250 pinzones vulgares en la casa del Trompón (AAC); 19.I: 10 ej. en zonas arboladas de l'ullal de Baldoví (PLP); 20.I: 14 ej. en el Borronar y 1 ej. en l'Ale (GCH); 21.I: 50 ej. integrados en un gran bando de pinzones en un arrozal fangueado cercano al port de Silla (PMP); 22.I: 40 ej. integrados en un bando de pinzón vulgar en zonas de arrozal (AAC,PVG); 09.II: 2 ej. en zonas próximas al tancat de la Ratlla (GCH); 14.II: 8 ej. en un bando de unos 300 pinzones vulgares en arrozales de Massanassa (PVG); 17.II: 10 ej. junto con pinzón vulgar y gorrión común en el Borronar; 09.III: Continúa presente un grupo de 7 ej. en el Borronar (GCH); 27.XI: 1 h. integrada en un bando de pinzón vulgar en arrozales del Borronar. Primera observación postnupcial (PVG,SEO)**El Fondo d'Elx:** 03.I: 6 ej.; 13.II: 7 ej. (AJR)**Hondo de Amorós:** 18.I: 6 ej.; 07.II: 5 ej. (AJR)**Serinus serinus****Serín Verdecillo - Gafarró - European Serin**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

2012**Benicarló:** 04.II: Gran grupo de 242 ej. comiendo semillas de rabaniza en un olivar joven no labrado (ELL)**Desert de les Palmes:** 23.X: 23 ej. en paso hacia el S en pequeños grupos. Máximo postnupcial (MTB)**Benicàssim:** 02.III: Primeros 5 ej. en paso activo hacia el N; 24.III: 34 ej. bando destacado en paso hacia el

N. Máximo prenupcial; 17.IV: 4 ej. en paso activo hacia el N. Cita de paso tardía; 08.XII: 5 ej. aparentemente en paso hacia el S. Cita de paso tardío (MTB)

Moncofa: 13.I: 150 ej. en grupo (JBC)

Marjal d'Almenara: 08.III: 130 ej. en un gran grupo (JBC)

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 17.XII: 400 ej. en un bando mixto con jilgueros y pardillos (OAP)

2013

Benicàssim: 22.X: 9 ej. en paso hacia el S. Primeros ej. en paso activo. Máximos moderados de hasta 35 ej. en el último tercio de noviembre. Últimos migrantes el 19.XII con un bando de 18 ej. (MTB)

Albufera de València: 09.IV: 180 ej. Importante flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de más de 30 aves en paso hacia el N sobre las dunas (BDJ)

Serinus citrinella

Verderón serrano - Verderolet - Citril Finch

Estatus: Nidificante localizado, invernante escaso. Conservación: IE

2012

El Toro: 02.I: Bando de 13 ej. en un pinar a 1.500 m s.n.m. (MGT)

2013

Embalse de Loriguilla: 13.I: 20 ej. (TPA, MCC, MHS, RGG)

Utiel: 02.III: 2 ej. en los cipreses y pinares próximos a la cumbre nevada (JAI)

Requena: 27.II: 23 ej. en gran bando de fringílidos (más de 100 pardillos y algunos lúganos y verdecillos). Durante toda la mañana en un herbazal de un solar en el casco urbano. Podría relacionarse la notable arribada de esta especie con el temporal de nieve de estos días; 13.III: 21 ej. Vuelven a observarse el mismo descampado de hace quince días, esta vez junto a unos 20 pardillos y 5 lúganos; 24.III: 8 ej. Última observación anual, en el mismo lugar que los días 27.II y 13.III (PRP)

Pinet: 25.XI: 7 ej. (DGS)

Carduelis chloris

Verderón común - Verderol - European Greenfinch

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante común. Conservación: ET

2012

Benicàssim: 19.III: 6 ej. Única cita de ej. en paso activo hacia el N; 26.IV: Primer juv. del año; 14.X: 25 ej. en paso hacia el S. Máximo postnupcial; 02.XI: 5 ej. en paso hacia el S. Última cita de ej. en paso activo (MTB)

Borriana: 13.I: 42 ej. (JBC)

Marjal d'Almenara: 08.II: 24 ej. (JBC)

2013

Quadre de Santiago: 13.VIII: 45 ej. en un bando, en su mayoría juv.; 08.XII: Bando transeúnte destacado de 90 ej. alimentándose en una zona con vegetación rala (MTB)

Mislata: 30.IV: Oídos los 2 primeros pollos del año en la huerta (PAB)

Albufera de València: 09.IV: 120 ej. Marcado flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de más de 40 aves en paso hacia el N sobre las dunas (BDJ)

Carduelis carduelis**Jilguero Europeo - Cadenera - European Goldfinch**

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

2012**Xert:** 14.IX: Grupo destacado de 40 ej. (JBC,JLB)**Desem. riu Millars:** 26.IX: 100 ej. (MBM)**Marjal d'Almenara:** 19.I: 25 ej. durante el censo de limícolas marjal de Almenara - La Llosa (JBC,SMS); 17.XII: 27 ej. (JBC)**El Toro:** 03.I: 350 ej. gran bando a 1.400 m s.n.m. en este invierno cálido. Lo normal otros años es que fuera muy escaso a esta altura (MGT)**Mislata:** 27.IX: Primeras concentraciones postnupciales de la especie, con la observación de un grupo de unos 50 ej. en la huerta (PAB)**2013****Quadre de Santiago:** 20.VIII: 134 ej. en varios bandos, en su mayoría juv., en zona de vegetación baja. Máximo postnupcial (MTB)**Albufera de València:** 09.IV: 65 ej. importante flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de hasta 25 aves en paso hacia el N sobre las dunas de la devesa (BDJ)**Godolleta:** 19.IV: Oídos los primeros pollos del año en el barranco del Gallego (PAB)**Villena:** 04.II: 20 ej.; 31.XII: 25 ej. (DMM)**Carduelis spinus****Jilguero Lúgano - Lluer - Eurasian Siskin**

Estatus: Nidificante raro, migrante e invernante común

2012**Desert de les Palmes:** 11.X: Primer ej. en paso activo hacia el S; 11.X: 50 ej. en paso hacia el S en 2.5 h. de censo. Dos bandos de 20 y 21 ej. Máximo postnupcial (MTB)**Benicàssim:** 04.III: 1 ej. Última cita prenupcial. Invernada muy escasa, con pocas citas de ej. solitarios en campos abandonados de almendros; 27.X: 1 ej. Primera cita postnupcial. Invernada muy escasa en campos abandonados de almendros, con citas irregulares y máximo de 2 ej. a finales de diciembre (MTB)**Illes Columbretes:** 06.XI: 1 ej. (LGB)**Albufera de València:** 23.X: 2 ej. en el tancat de Milia, primera cita postnupcial (AAC)**Requena:** 28.X: 4 ej. Primera cita del año; 25.XI: 12 ej.; 31.XII: 10 ej. Grupo invernante en huertos y baldíos junto el cauce (JAI)**Clot de Galvany:** 09.XI: 50 ej. (AJR)**2013****Alcossebre:** 07.I: 2 ej. Única cita anual (DES)**Benicàssim:** 17.III: 1 ej. Última cita prenupcial. Muy escaso este invierno, con máximo de apenas 5 ej. a finales de febrero en campos de cultivo abandonados y de matorral. ¡Sin citas postnupciales! (MTB)**Albufera de València:** 05.III: 2 ej. alimentándose de semillas de *Sonchus* en el tancat de la Pipa (SEOV)**Emb. de Beniarrés:** 07.IV: 10 ej. (BOR)**Valencia:** 22.XI: 2 ej. en un espeso herbazal baldío a escasos metros de la ciudad en la huerta de Campanar (JAI)

Dos años con citas bastante escasas. Desde 2008 no se produce una irrupción importante de esta especie.

Carduelis cannabina**Pardillo común - Passerell - Common Linnet**

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

2012

Desert de les Palmes: 23.X: 60 ej. en paso activo en pequeños grupos (máximo de 18 ej.) en 2.5 h. de censo. Máximo postnupcial (MTB)

Benicàssim: 06.III: 7 ej. Primeros ej. en paso activo hacia el N; 10.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 03.X: 2 ej. Primera cita postnupcial de ej. en paso; 11.XI: 7 ej. Última cita postnupcial (MTB)

Illes Columbretes: 03.IV: 42 ej. (LGB)

La Vall d'Uixó: 08.X: 12 ej. en paso en 3.5 h. de censo (JGS)

Moncofa: 22.XII: 30 ej. (JBC)

Albufera de València: 14.XII: 80 ej. en arrozales de la Socarrada (BDJ)

El Fondo d'Elx: 03.XI: 200 ej. en un bando con verderones comunes y pinzones vulgares (OAP,RLM)

2013

Benicàssim: 13.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 13.X: 28 ej. en paso al S en grupos de entre 4 y 9 ej. en 1 h.; 10.XI: 1 ej. último ej. en paso activo hacia el S (MTB)

Illes Columbretes: 25.III: 13 ej.; 06.IV: 44 ej.; 15.IV: 14 ej.; 18.IV: 9 ej. (LGB)

Desem. riu Millars: 07.IV: 20 ej. (MBM)

Albufera de València: 30.III: Paso continuado de aves hacia el N a lo largo de la mañana en el frente litoral de la devesa, con varias decenas de aves en apenas una hora de observación (AAC,BDJ); 09.IV: 15 ej. en 30 min. de observación en paso activo hacia el N sobre las dunas (BDJ); 24.X: Pequeño bando de 5 ej. en vuelo hacia el S sobre el Racó de l'Olla, primera cita postnupcial (JID,MCH,IRU)

Montesa: 18.VIII: 25 ej. (SSM)

El Fondo d'Elx: 27.XII: 10 ej. (FBE)

Carduelis flammea**Pardillo sizerín - Passerell golanegre - Common Redpoll**

Visitante raro del N de Europa

2012

Altea: 11.XI: 6 ej. uno de ellos capturado para anillamiento (TZL,TMF)

Primera cita para la CV. De las 10 homologadas hasta el momento en España, es la más meridional, y la que implica a un mayor número de ejemplares.

Loxia curvirostra**Piquituerto común - Bec-tort - Red Crossbill**

Estatus: Nidificante común. Conservación: IE

2012

Pantà d'Elx: 05.IX: 1 ej. en un pino. Muy raro en el paraje (OAP)

Bucanetes githagineus**Camachuelo trompetero - Pinsà trompeter - Trumpeter Finch**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante raro. Conservación: VUL

2012

Fontanars dels Alforins: 08.V: 1 h. en el límite provincial entre Alicante y Valencia. Durante una hora se observa al ave que se alimenta y acicala tranquilamente en el suelo o sobre alguna piedra. No se observan más ejemplares (MRG)

Alacant: 15.VI: 18 par. Datos del proyecto del seguimiento de la reproducción del camachuelo trompetero en sudeste alicantino de la universidad de Alicante (GLI)

Villena: 08.V: 1 m. en el embalse de San Diego (MRG)

2013

Alacant: 15.VI: 20 par. Datos del proyecto de seguimiento de la reproducción del camachuelo trompetero en sudeste alicantino de la universidad de Alicante (GLI)

Coccothraustes coccothraustes**Picogordo común - Trencapinyols - Hawfinch**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Desert de les Palmes: 16.X: 1 ej. en paso. Única cita anual durante el censo de rapaces migratorias (MTB)

El Toro: Citas de 1 ej. el 20 y el 29.XII (JMA,FLL,JBF,RBB)

Requena: Citas de 1 juv. que visita un bebedero los días 05.VIII y 23.IX (RAA)

Albufera de València: 25.X: 1 ej. sobrevolando la muntanyeta dels Sants, aparentemente en paso hacia el S y reclamando continuamente junto con pinzones vulgares (JHZ,BDJ)

Emb. de Beniarrés: Citas de 3 ej. el 31.III y el 22.XII (BOR)

Hórtola: 19.II: 8 ej. (RMB)

Serra de Mariola: 23.XII: 2 ej. (BOR)

2013

Portell de Morella: 12.VI: Cita estival de 1 ej. (RPB)

Ares del Maestrat: 21.VI: Cita estival de 1 ej. (RPB)

Benicàssim: 16.III: 1 ej. Última cita invernal. Muy escaso este año con tan solo dos citas en área de almeces y cultivos abandonados (MTB)

Alborache: 23.III: 1 ej. Días después apareció un individuo muerto (VBJ)

Cortes de Pallás: 28.III: Al menos 3 ej. invernantes. Barranco con vegetación densa de olmos, chopos, nogales, almeces (PRP)

Bocairent: 23.XI: 1 ej.; 06.XII: 3 ej. (BOR,DMF)

Nuevas citas estivales de esta especie en els Ports. Desde la observación de 1 juv. muerto en las cercanías de Ares y de una pareja en época reproductora en Aín en 2007 (Bort & Bort, 2009), se han producido varios contactos estivales de esta especie, incluyendo la comprobación de la reproducción en varios puntos de las comarcas del NO de la provincia de Castellón (Prades, 2011).

EMBERIZIDAE

Plectrophenax nivalis**Escribano nival - Sit blanc - Snow Bunting**

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012

Albufera de València: 08.XI: 1 ej. con plumaje de h. integrado en un bando de pinzones vulgares en el tancat de Milia. Especie muy escasa en nuestro territorio, tratándose además de una cita relativamente temprana. Apenas existen dos citas previas en l'Albufera, relativamente recientes, de sendos m. inm. observados en los meses de diciembre de 1984 y 1988, en ambas ocasiones en dunas litorales de la Brava, cerca de l'estany del Pujol (AAC)

2013

Marjal dels Moros: 27.III: 1 ej. probablemente h. (AAC,FLL,RMB,XGP,DDO); 31.III: 1 m. en la restinga litoral en plumaje de invierno buscando alimento sobre vegetación rala. Muy confiado (SEV)

Especie que en los últimos tiempos parece haberse rarificado en la CV, mientras que se citó en 9 de los últimos 14 años del s. XX, con un total de 11 ej., en los primeros 14 años de este siglo solo se ha citado en 4 ocasiones (5 ej.).

Emberiza citrinella**Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer**

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012

Ares del Maestrat: 13.II: 1 ej. (RPB)

El Toro: 04.I: Bando de 6 ej. en un soto (MGT)

Bocairent: 26.II: 3 ej.; 04.III: 1 m. (BOR)

Sierra de Aitana: 14.I: 15 m.; 21.I: 6 m.; 03.III: 3 m. (BOR)

2013

Barracas: 12.III: 1 ej. (MGT)

Bocairent: 23.II: 3 ej. (BOR,DMF); 01.XII: 2 ej. (BOR)

Emberiza cirlus**Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting**

Estatus: Nidificante y residente común, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012

Benicàssim: 22.I: 6 ej. máximo anual. Un bando permanece en la zona durante el mes de enero; 15.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

2013

Benicàssim: 27.III: 2 ej. Última cita prenupcial de un bando invernal de hasta 7 ej. que permanece en una zona de cultivos abandonados; 15.XII: 8 ej. Primera cita invernal y máximo anual (MTB)

Albufera de València: 18.III: 1 m. en zonas de huerta cerca de Silla. Son muy escasas las observaciones en el entorno de l'Albufera (GCH)

Emberiza cia**Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting**

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012**Benicàssim:** 13.X: 1 ej. Única cita anual en campos abandonados de almendros (MTB)**Barracas:** 21.I: 13 ej. (JBC)**2013****Alcossebre:** 23.II: 2 ej. Última cita invernal (DES)**Benicàssim:** 05.III: Última cita de 1 ej. que permanece en la zona todo el invierno (MTB)**Sot de Chera:** 04.I: 50 ej. (MPO)**Emberiza hortulana****Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting**

Estatus: Nidificante poco abundante, migrante escaso. Conservación: IE

2012**Illes Columbretes:** 10.III: 1 ej. (LGB)**Barracas:** 24.V: 2 par. (JMA,FLL)**Relleu:** 15.IV: 1 ej. (LFS)**2013****Todolella:** 04.VII: 2 ej. (RPB)**Castellfort:** 15.VI: 1 ej. (RPB)**Ares del Maestrat:** 16.VI: 2 ej. (ALR,RPB)**Vilafranca:** 13.VI: 2 par. (ALR,RPB)**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 29.IV: 1 ej. en tamarius al costat de Torrenostra (VET)**Marjal dels Moros:** 30.IV: 1 ej. (CAZ,VDA)**Albufera de València:** 28.IV: 1 ej. en zona de herbazales próximos al port de Catarroja. Primer registro prenupcial (AAC,BDJ); 29.IV: 3 ej. en las inmediaciones del puerto de Catarroja (AAC,FGN); 29.IV: 3 ej. alimentándose junto a gorrion molinero en huertas cercanas a la torreta Ampla (PMP); 30.IV: 1 ej. alimentándose en vegetación ruderal en el tancat de la Pipa (SEOV)**Millares:** 21.V: 2 m. con fuerte comportamiento territorial (PVG,MGR)**Emberiza schoeniclus****Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante común. Conservación: VUL

2012**Illes Columbretes:** 01.XI: 3 ej.; 09.III: 1 ej. (LGB)**Desem. riu Millars:** 08.I: 20 ej. (MBM)**Tales:** 08.I: 2 ej. (JBC)**Xilxes:** 13.I: 32 ej. (JBC)**Marjal d'Almenara:** 19.I: 30 ej. durante el censo de limícolas (JBC,SMS); 15.XII: 36 ej. (JBC)**Requena:** 30.XII: 6 ej. Grupo invernante en los eneales del río y en los huertos colindantes (JAI)**Albufera de València:** 25.IV: 1 h. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)**Salines de Santa Pola:** 29.XII: 50 ej. (AJR)**El Fondo d'Elx:** 15.II: 107 ej. (AJR)**Valencia:** 19.II: 8 ej. en herbazales y huertos baldíos de la huerta de Campanar (JAI)

2013

Alcossebre: 15.III: 10 ej. Última cita invernal; 26.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)

Benicàssim: 25.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)

Villar del Arzobispo: 05.I: 2 ej. en un campo de viñas en una zona de secano (TPA)

Marjal dels Moros: 10.IV: 1 ej. (JPH)

Utiel: 06.XII: 12 ej. en un dormitorio (JAI)

Requena: 17.XI: Primera cita invernal de 1 ej. en enal del río (PRP)

Albufera de València: 10.IV: Cita algo tardía de 1 h. (AAC,FGN); 27.X: 1 ej. Primer registro postnupcial (GTR); 01.XI: 27 ej. capturados para anillamiento en l'ullal de Baldoví. Llegada patente de migrantes (PMP,GTR)

El Fondo d'Elx: 26.XII: 110 ej. concentración destacada (AJR)

Río Magro: 06.XII: 12 ej. en un dormitorio en el Vadillo, en el carrizal del río (JAI)

Emberiza calandra**Escribano Triguero - Cruixidell - Corn Bunting**

Estatus: Nidificante común, migrante moderado. Conservación: EP

2012

Vilanova d'Alcolea: 04.I: 33 ej. en varios grupos (JBC,JLB)

Benicàssim: 18.III: 6 ej. Primera cita de un bando en paso; 30.IV: 2 ej. Última cita primaveral de ej. migrantes (MTB)

Illes Columbretes: 25.V: 2 ej. (LGB)

Pina de Montlgrao: 21.I: Gran concentración de al menos 100 ej. posados y volando (JBC)

Barracas: 21.I: 22 ej. (JBC)

Albufera de València: 30.III: 1 ej. en el tancat de Milia. Primer registro prenupcial (CAV,AAC); 09.IV: 22 ej. volando dirección N sobre el tancat de Milia (AAC)

2013

Alcossebre: 27.I: 70 ej. Concentración invernal relevante (DES)

Illes Columbretes: 13.IV: 2 ej. (LGB)

LISTA SISTEMÁTICA

(II)

CATEGORÍAS D Y E

Dendrocygna bicolor**Suiriri bicolor - Ànec arbori bicolor - Fulvous Whistling Duck**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: D,E3.

2013

Albufera de València: 12.VI: 1 ej. se observa en varias ocasiones hasta el 6.VII (AAC, GTR). El ave se muestra esquiva, no porta anillas y presenta un plumaje en perfecto estado (AAC)

Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017)

Cygnus atratus**Cisne negro - Cigne negre - Black Swan**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E2.

2013

Desemb. riu Segura: 16.I: 1 ej. (AJR); 30.VII: 1 ej. presente también el 31.VII (AJR,OAP)

Cygnus olor**Cisne vulgar - Cigne mut - Mute Swan**

Estatus: Invernante raro, escapado de cautividad. Categoría: A,E2.

2012

El Fondo d'Elx: 04.V: 2 ej. (MLP)

2013

Altea: 21.XII: 1 ej. (FBE)

Aix galericulata**Pato mandarín - Ànec mandarí - Mandarin Duck**

Estatus: Escapado de cautividad. Categoría: C5,E2.

2013

Tavernes de la Vallidigna: 26.I.2013: 1 par. posiblemente los mismos ej. son observados en la playa del Brosquil de Cullera el 17.III (LAA)

Oxyura jamaicensis**Malvasía canela - Ànec de Jamaica - Ruddy Duck**

Estatus: Conservación: ET Categoría: C5,E2.

2012

Port de Gandía: 14.XI.2012: 1 ej. entre los barcos del club náutico (PLP)

2013

El Fondo d'Elx: 16.XII.2013: 1 m. ad. (JMT)

Ibis hadada**Bostrychia hagedash - Ibis hadadà - Hadada ibis****2012**

Albufera de València: 05.VI.2012: 1 ej. en vuelo sobre el frente litoral de la devesa (JID,MCH,IRU)

Parabuteo unicinctus**Gavilán mixto - Harris' Hawk**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

2012**Marjal d'Almenara:** 08.II: 1 ej. (JBC); 02.IV: 1 ej. (BFM,MMV)**Marjal de Sagunt:** 22.VII: 1 ad. El mismo ejemplar que lleva observándose varios años en esta zona. (AAC, CVV); 19.IX: 1 ej. en lagunas de las turberas (JBC, JGS); 15.XII: 1 ej.; 22.XII: 1 ej. (JBC)**2013****Marjal d'Almenara:** 04.III: 1 ej. volando y posado en chopo de siempre (JLB) ; 04.IV: 1 ej. con presa en garras (JLB)**Bétera:** 21.XII: 1 ej. posado en un árbol en zona de anillamiento., posteriormente sale volando, no lleva pihuelas (MPO, TPA)***Musophaga sp.*****Turaco sp.****2012****Albufera de València:** 18.VI: 1 ej. observado entrando una colonia de ardeidos en la replaza de Zacarés. Sin duda esta observación debe asociarse con un ave escapada de un núcleo zoológico o una colección particular o bien que haya sido objeto de un viaje asistido en barco (PVG, JME, EGO, FPA, BDJ)***Geopelia cuneata*****Tortolita diamante - Diamond Dove**

Estatus: E3, escapada o liberada de cautividad Categoría: E3.

2012**Sant Vicent del Raspeig:** 11.IV: 1 ej. (JDL)***Nymphicus hollandicus*****Cacatua ninfa - Cockatiel**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

2013**Borriana:** 03.VII: 2 ej. volando sobre la escollera curta al S (JBC)**La Pobla de Vallbona:** 12.III: 1 ej. volando junto a la autovía (TPA)***Platycercus elegans*****Rosella carmesí - Periquito de Pennat - Crimson Rosella**

Categoría: E3.

2013**València:** 11.I: 1 ej. (OIA)

Platycercus eximius**Rosella común - Eastern Rosella**

Categoría: E3.

2012

Llacunes de La Mata i Torrevieja: 21.XI: 1 ej. (HAH)

Aratinga erythrogenys **Aratinga de Guayaquil - Aratinga de màscara roja - Red-masked-Parakeet**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

2013

València: 07.V: 7 ad. posados en la fachada y tejados de la iglesia de los Santos Juanes y un bando de 13 ej. sobrevolando los alrededores (CFA)

Aratinga nenday**Aratinga ñanday - Aratinga nandai - Nanday Parakeet**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E2.

2012

Albufera de València: 24.III: 4 ej. descansando durante unos minutos en cañaverales del tancat de la Pipa, abandonan la localidad hacia el S, observados de nuevo el 28.IV (PVG)

Melopsittacus undulatus**Periquito común - Periquito - Budgerigar**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

2012

Albufera de València: 28.IV: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG)

2013

Marines: 03.II: 1 ej. presente al menos hasta el 4.II. (TPA,MCC)

Poicephalus senegalus**Lorito Senegalés - Lloro del Senegal - Senegal parrot**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E2.

2012

València: 14.IV: 1 par. (TPA,TPA,MCC)

Pycnonotus jocosus**Bulbul orfeo - Red-whiskered Bulbul**

Categoría: E1.

2012l'Elia: 01.I: 1 ej. (JAAA) ; 12.II: 2 ej. (VAL) ; 10.XI: 8 ej. (MAG)
Burjassot: 08.XI: 1 par. ad. (CAZ)**2013**

l'Elia: 01.I: 8 ej. (LAJ)

Paterna: 08.IV: 1 ej. (PSJ) ; 20.IV: 1 par. ad. (JBS)

Mislata: 24.III: 1 m. cantando; 19.IX: 1 juv. La especie ha nidificado en las instalaciones del hospital. (PAB)

Estrilda melpada **Estrilda Carinaranja - Bec de corall de galta taronja - Orange-checked Waxbill**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET. Categoría: E1.

2012

Desemb. riu Mijares: 04.X: 15 ej. (GUM)

Vila-real: 08.I: 15 ej. cerca de la ermita de la Mare de Déu de Gràcia (ACM)

Ploceus melanocephalus **Tejedor cabecinegro - Teixidor capnegre - Black-headed Weaver**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

2012

Albufera de València: 26.V: 2 ej. en los filtros del tancat de Milia (GTR); 05.VI: sigue presente por lo menos 1 m., que se observa cantando (CAV,AAC) ; 09.VI: 2 h. y 1 m. en el tancat de Milia. Varias observaciones más de 2 m., y posteriormente de 1 m. cantor hasta principios de agosto (GTR, CAV, AAC)

Oliva: 24.X: 1 ej. (GOL)

Ploceus cucullatus **Tejedor común - Teixidor social - Village Weaver**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E2.

2012

Oliva: 10.X: 2 ej. (GOL)

Euplectes afer **Obispo coronigualdo - Teixidor daurat - Yellow-crowned Bishop**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

2012

Albufera de València: 26.VI: 1 ej. en los filtros verdes del tancat de la Pipa (SEOV); 22.IX: 1 h o juv. junto con unos 200 gorriones comunes a las afueras de El Palmar (MCH); 04.X: 1 m. (JGR,RGR,PSA)

Requena: 28.X 1 m. ad. de la ssp. *afer* junto con 10 gorriones comunes en un eneal del río Magro. Primera cita conocida para la comarca de Requena-Utiel. Observado de nuevo el 09.XII (JAI)

Bibliografia

- Acadèmia Valenciana de la Llengua.** 2014. Denominació dels municipis valencians. <http://www.avl.gva.es/va/AVL/seccions-i-comissions/seccio-Onomastica/contingutOnomastica>. Consultado en junio de 2014. Díaz, M., Asensio, B., Tellería, J.L. 1996. Aves ibéricas I. No paseriformes. J.M. Reyero Editor. Madrid
- Alberdi, M.,** 2012. Seguimiento de las poblaciones de aves esteparias amenazadas en la Comunidad Valenciana, 2012. Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Vaersa. www.agroambient.gva.es (consultado en mayo de 2016).
- Aymí, R. & Roy, E.** 2004. Cueta groga *Motacilla flava*. En Estrada, J., Pedrochi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (Eds.). Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d'Ornitologia. Lynx Edicions. Barcelona
- Bartolí, X.** 1991. An intermediate population of italian and spanish yellow wagtails *Motacilla flava cinereocapilla* and *M. flava iberica* in northeastern Spain. *Ardeola* 38(2) 199-205. SEO, Madrid
- Bort, J., Bort, J.L. (Coord.)** 2009. Anuario Ornitológico de Castellón 2007, Vol. 5. <http://www.internatura.org/aocs>
- Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.** 2013. Direcció General del Medi Natural. Informes Técnico 10/2013. Aves Acuáticas Nidificantes en las Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana: 30 años de censos ininterumpidos (1984-2013). <http://www.citma.gva.es/web/biodiversidad/fauna>. Consultado en mayo de 2015.
- Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.** 2013b. Direcció General del Medi Natural. Informes Técnico 10/2013. Aves Acuáticas Invernantes en las Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana: 29 años de censos ininterumpidos (1984-2013). <http://www.citma.gva.es/web/biodiversidad/fauna>. Consultado en mayo de 2015.
- Copete, J. L., Lorenzo, J. A., Amengual, E., Bigas, D., Fernández, P., López-Velasco, D., Rodríguez, G. & García-Tarrasón, M.** 2015. Observaciones de aves raras en España, 2012 y 2013. *Ardeola* 62(2) pp. 453-508. SEO-BirdLife. Madrid
- Crochet P. A., Barthel P. H., Bauer H. G., van den Berg A. B., Bezzel E., Collinson J. M., Dubois, P. J., Fromholtz J., Helbig A. J., Jiguet F., Jirle E., Knox A. G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A. J., Päckert M., Parkin D. T., Pons J. M., Raty L., Roselaar C. S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P.** 2015. AERC TAC taxonomic recommendations: 2015 report. Available online at <http://www.aerc.eu/tac.html>. Published 15th July 2015.
- Crochet, P. A. & Joynt, G.** 2015. AERC list of Western Palearctic birds. July 2015 version. <http://www.aerc.eu/tac.html>
- de Juana, E. & García, E.** 2015. The birds of the iberian peninsula. Helm. Bloomsbury publishing. Londres
- del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. (Ed.)** 1992-2013. Handbook of the Birds of the World. Volumen 1-13. Lynx Edicions. Barcelona
- Ehrlich, P. R., D. S. Dobkin, D. Wheye, and S. L. Pimm.** 1994. The Birdwatcher's Handbook: A Guide to the Natural History of the Birds of Britain and Europe. Oxford University Press, Oxford UK
- Ferlini, F.** 2015. Evoluzione dell'areale riproduttivo della Cutrettola "italiana" *Motacilla flava cinereocapilla*. *Rivista Italiana di Ornitologia. Research in Ornithology*, 85(2): 3-18. Società Italiana di Scienze Naturali
- Ferlini, F.** 2016. Evolution of the breeding range of the black-headed yellow wagtail (*Motacilla flava feldegg*). *Rivista Italiana di Ornitologia. Research in Ornithology*, 86 (1): 3-38.
- Ferrer, X., Martínez-Vilalta, A. & Muntaner, J.** 1986. Història Natural dels Països Catalans. 12 Ocells. Enciclopedia Catalana. Barcelona
- Garcias, P.** 2008. Primera cita de cria de la subespecie cinereocapilla del xàtxero groc *Motacilla flava* a Mallorca. *Anuari Ornitològic de les Balears*. vol. 23. 2008. 27-35. Grup Ornitològic Balear.
- Gil-Velasco, M., Rouco, M., Ferrer, J., García-Tarrasón, M., García-Vargas, F. J., Gutiérrez, A., Hevia, R., López, F., López-Velasco, D., Ollé, A., Rodríguez, G., Sagardía, J. & Salazar, J. A.** 2017. Observaciones de aves raras en España, 2014. *Ardeola* 64 (1). pp. 161-235. SEO/BirdLife. Madrid
- González, R. & Pérez-Aranda, D.** 2011. La invernada de aves acuáticas en España, 1980-2009. Madrid. SEO/BirdLife
- Gutiérrez, R., de Juana, E., Lorenzo, J. A.** Lista de las Aves de España. Edición de 2012. Versión online 1.0: nombres castellano, científico e inglés. 2012. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). www.seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Lista_Aves_Espana_2012.pdf. Consultado en junio de 2015.
- López-Iborra, G.** 2003. Alzacola rojizo (*Cercotrichas galactotes*) en Martí, R. & Del Moral, J. C.

(Eds.). 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

López-Iborra, G., Pérez-Trincado, G. & Reig, A. 2015. Alzacola rojizo (*Cercotrichas galactotes*). En López, G., Bañuls, A., Zaragoza, A., Sala, J., Izquierdo, A., Martínez, J. E., Ramos, J., Bañuls, D., Arroyo, S., Sánchez, J. A., Campos, B. & Reig, A. (Eds.). Atlas de las aves nidificantes en la provincia de Alicante. Publicacions de la Universitat d'Alacant - SEO/Alicante. Alicante

Marco J. & Pérez-García JM. 2017. Águila moteada: nuevo invernante para la avifauna española. *Quercus* 372: 12-19

Miguel, B., & Font, J. V. 1990. El nom valencià dels ocells d'Europa. *Medi Natural*, 1, 103-112.

Prades, R. 2011. El picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*) ¿un nuevo nidificante para Castellón?. En Tirado, M. 2011. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. Vol. XII año 2009

Prades, R., Greño, J. L., Llopis, A. & Fabregat, C. 2016. Primers casos comprovats de nidificació d'escorxadador (*Lanius collurio*) al País Valencià. *Nemus* VI. 2016. Pàg. 177-180. Ateneu de Natura. Castelló

Rodríguez, A., McMinn, M. & Mayol, J. 2005. La pardela balear y la identificación de las paredelas de las costas ibéricas. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Sebastián-González, E., Alexander, K.L., Sánchez-Zapata, J.A. y Botella, F. 2015. Key factors controlling the metapopulation dynamics of the Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* in an artificial habitat network of irrigation ponds. *Ardeola* 62:151-161.

Vázquez, J. 2015. Collalba negra (*Oenanthe leucura*). En López, G., Bañuls, A., Zaragoza, A., Sala, J., Izquierdo, A., Martínez, J. E., Ramos, J., Bañuls, D., Arroyo, S., Sánchez, J. A., Campos, B. & Reig, A. (Eds.). Atlas de las aves nidificantes en la provincia de Alicante. Publicacions de la Universitat d'Alacant - SEO/Alicante. Alicante

SELECCIÓN DE FOTOS



Branta bernicla

Puerto de Castellón, enero 2012.

Foto: © Miquel Barberà.



Anas discors


Albufera de València, noviembre

2012. Foto: © Jose Ignacio Díez.



Somateria mollissima

Albufera de València, València,
noviembre 2012. Foto: © Antonio
Alcocer.



Melanitta fusca

Albufera de València, enero 2013.

Foto: © Victor París.



Mergus serrator

Cabo Huertas, Alicante, enero 2012.

Foto: © Miguel Ángel Andrés



Oxyura leucocephala

Tancat de Milia. Albufera de València,
julio 2012. Foto: © Antonio Alcocer.



Egretta garzetta x gularis

Tancat de Milia, Albufera de València,
marzo 2012. Foto: © Antonio
Alcocer.



Phoenicopterus minor

Racó de l'Olla, Albufera de Valencia,
febrero 2012. Foto: © Jose Ignacio
Díes



Circus macrourus

Marjal de Masamagrell, València,
diciembre 2013. Foto: © Jose María
Hernández.

chema



Aquila adalberti

Villena, Alicante, junio 2013. Foto: © Antonio Alcocer.



Calidris maritima

Puerto de Burriana, Castellón, diciembre 2012. Foto: © Jose Bort



Calidris falcinellus

Tancat de la Ratlla. Albufera de València, mayo 2013. Foto: © Toni Alcocer.



Tringa stagnatilis

El Fondo d'Elx, Alicante, agosto 2013.

Foto: © Sergio Arroyo



Tringa flavipes

Tancat de Milia, Albufera de Valencia, septiembre 2013. Foto: © Antonio Alcocer



Larus cirrocephalus

Racó de l'Olla, Albufera de València, junio 2013. Foto: © Jose Ignacio Díes.



Larus cachinnans

Puerto de Vinaroz, Castellón, abril 2014. Foto: © Enrique Luque.



Sterna bengalensis

Puerto de Vinaroz, Castellón, octubre 2012. Foto: © Enrique Luque



Motacilla flava ssp. feldegg

Marjales de Catarroja. Albufera de València, abril 2012 Foto: © Pablo Vera.



Motacilla citreola

Tancat de Milia, Albufera de València, septiembre 2012. Foto: © Antonio Alcocer.



Sylvia sarda

Isla de Tabarca, Alicante, septiembre 2013. Foto: © Alberto Plata



Ficedula albicollis

Muntanyeta dels Sants, Albufera de València, abril 2013. Foto: © Antonio Alcocer.



Carduelis flammea

Río Algar, Altea, Alicante, noviembre 2012. Foto: © Antonio Mulet.



Bucanetes githagineus

Embalse de San Diego, Villena, Alicante, mayo 2012. Foto: © Marta Romero



Plectrophenax nivalis

Marjal dels Moros, Valencia, marzo 2013. Foto: © Antonio Alcocer

ATRÍCULOS

LA FOCHA MORUNA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (1999-2014): LOGROS Y DIFICULTADES DEL PROYECTO DE REINTRODUCCIÓN

Covadonga Viedma Gil de Vergara

Servicio de Vida Silvestre. D. G. Medi Natural i d'Avaluació Ambiental. Generalitat Valenciana. Ciutat Administrativa 9 d'octubre Torre 1 c/ Castán Tobeñas, 77. 46018 Valencia. viedma_cov@gva.es

INTRODUCCIÓN

La Focha moruna (*Fulica cristata*) es, sin lugar a dudas, una de las aves acuáticas más amenazadas de extinción del continente europeo. Tanto es así, que en la última década las observaciones de ejemplares en libertad son muy excepcionales y todas ellas centradas en la península Ibérica, concretamente en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

La bibliografía antigua indica que en varias zonas húmedas valencianas fue abundante hasta mediados del s. XIX, considerándose como extinguida a principios del s. XX. Más recientemente, en la década de los 90, se tiene constancia únicamente de algún ejemplar observado en libertad, de dos aves cazadas y de una nidificación aislada comprobada en el Parque Natural de El Hondo de Elche (Alicante) en 1.993.

En el resto de España la tendencia poblacional de la especie ha sido también de un marcado descenso, estimándose entre 10 y 25 parejas en Doñana en 1.991, y ya considerada como prácticamente extinguida en estado silvestre en la actualidad.

La situación de la especie en Europa es tan crítica que, con seguridad, no más de una decena de ejemplares se mueven en libertad por Europa.

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la Generalitat Valenciana lleva trabajando desde 1998 (16 años) en el programa de reintroducción de la focha moruna en la Comunidad Valenciana. Desde 1999 a 2002 dicho programa se desarrolló en el marco de un proyecto LIFE-Naturaleza cofinanciado por la UE. Desde

la finalización del LIFE el proyecto ha continuado, hasta la fecha (2014), con la sola financiación de la Generalitat Valenciana.

RESULTADOS

Durante la ejecución del proyecto se han conseguido los siguientes objetivos:

- 1.- Formación de 25 parejas en cautividad (19 de ellas reproductoras) y liberación de 964 ejemplares en 15 años, superando la previsión del proyecto (Tabla 1).
- 2.- Monitorización de los ejemplares liberados y mayor conocimiento de la ecología de la especie.
- 3.- Manejo del hábitat en el marjal dels Moros, en el marjal de la Safor y en el P. N. de l'Albufera, aumentando su capacidad de acogida para la especie.



Figura 1: Focha moruna alimentando a un juv. Foto: Luis Santamaría

4.- Aumento del conocimiento sobre la especie, su situación, distribución y aumento de su conocimiento por parte del público en general y en particular de los cazadores de las zonas próximas a las reintroducciones.

5.- Seguimiento científico de la variabilidad genética de los ejemplares en cautividad y sus descendientes.

6.- Los resultados indican que la población cautiva posee un alto grado de variabilidad genética aunque se produce una pérdida sustantiva de esa variabilidad en una sola generación.

7.- Ante la evidencia del declive poblacional de la focha común y de la elevada mortandad de fochas morunas por la caza de la focha común (ya que en invierno forman bandos mixtos), la Generalitat Valenciana declaró una moratoria de la caza de la focha común en la Comunidad Valenciana en 2004-2005 (orden de 21 de junio de 2004) que se prolongó a las temporadas de caza siguientes: 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 para las provincias de Castellón y Valencia y para el término municipal de Pego en Alicante.

8.- Valoración de la efectividad de la moratoria cinegética para la focha común y sus implicaciones en la conservación de la focha moruna.

9.- Análisis de la probabilidad anual de supervivencia de los ejemplares liberados portando collares individualizados, empleando modelos de captura-recaptura. Como se aprecia en la Tabla 1, se ha ampliado la liberación de ejemplares a otras comunidades autónomas dentro del rango de su distribución histórica: Baleares y Cataluña.

10.- Formación de 5 parejas reproductoras en libertad (Tabla 2).

11.- Se han determinado las posibles causas de mortalidad de los ejemplares encontrados muertos. (Figura 2).

En el marco de tres convenios anuales de asistencia científica firmados entre la Conselleria con competencias en materia de Medio Ambiente y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC) desde 2004 a 2009, han emanado

una serie de conclusiones acerca de los resultados de dicho proyecto de reintroducción, tanto en forma de informes y memorias anuales no publicadas, como en forma de artículos científicos:

2004. Viedma, C.; Martínez-Abraín, A. & Oro, D. Valoración de la efectividad de una moratoria cinegética para la focha común (*Fulica atra*) en la Comunidad Valenciana: implicaciones para la conservación de la focha moruna (*Fulica cristata*). Informe del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.

Viedma, C.; Martínez-Abraín, A. & Oro, D. 2005. Informe sobre la efectividad de la moratoria para la focha común (*Fulica atra*) en la Comunidad Valenciana durante la temporada cinegética 2004-2005. Informe del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.

Viedma, C.; Martínez-Abraín, A. & Oro, D. 2005. Valoración de la efectividad de la moratoria cinegética para la focha común (*Fulica atra*) en la Comunidad Valenciana tras la temporada reproductora. Informe del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.

Bartolomé M.A. & Oro, D. 2006 Informe sobre la efectividad de la moratoria para la Focha común (*Fulica atra*) en la Comunidad Valenciana. Informe del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.

Valoración de la efectividad de la moratoria cinegética para la Focha común (*Fulica atra*) en la Comunidad Valenciana: su implicación en la conservación de la Focha cornuda (*Fulica cristata*). 2008. Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada. Servicio de Biodiversidad. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana.

Seguimiento de las poblaciones de Focha común (*Fulica atra*) y Focha cornuda (*Fulica cristata*) en distintos humedales de la Comunidad Valenciana. 2010. Equipo Seguimiento de Fauna Amenazada. Servicio de Biodiversidad. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana.

Informe sobre el efecto de la moratoria de caza en las Poblaciones de Focha cornuda (*Fulica cristata*) Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada. 2011. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad. Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Martínez-Abraín, A., Viedma, C., Bartolomé, M. A., Gómez, J. A. & Oro, D. 2007. Hunting sites as ecological traps for coots in southern Europe: implications for the conservation of a threatened species. *Endangered Species Research* 3: 69-76.

Tavecchia, G., Viedma, C., Martínez-Abraín, A., Bartolomé, M. A., Gómez, J. A. & Oro, D. 2009. Maximizing re-introduction success: Assessing the immediate cost of release in the threatened waterfowl. *Biological Conservation* 142: 3005-3012.

Martínez-Abraín, A., Regan, H., Viedma, C., Villuendas, E., Bartolomé, M. A., Gómez, J. A. & Oro, D. 2010. Demographic strategies to improve the success of reintroductions in relation to age and lifespan: the case of the threatened crested coot *Conservation Biology* 25: 726-735.

Martínez-Abraín, A., Viedma, C., Bartolomé, M. A., Gómez, J. A. & Jiménez, J. 2013. Assessing the effectiveness of a coot hunting moratorium on the target species and on a critically-endangered congeneric. *Biological Conservation* 165: 171-178

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones científicas (así como sugerencias aplicadas que se derivan de ellas) se listan a continuación:

1.- Existe un elevado coste inmediato tras la liberación que hace que la supervivencia local (por mortalidad o/y emigración permanente) sea muy baja. Los ejemplares recién liberados tienen una

supervivencia anual de solo un 14%. La supervivencia aumenta a un 20% si sobreviven el primer mes y pasa a un 66% para las que son capaces de aguantar más de un año en libertad.

2.- El mes de suelta más adecuado para conseguir que un ejemplar sobreviva y llegue a reproducirse es febrero-marzo.

3.- El elevado coste de liberación es probablemente debido a la dificultad de encontrar comida, tanto por su escasez (calidad de las zonas) como por la capacidad de las fochas de encontrarla debido al régimen de cautividad. Por tanto cabe: a) mejorar la calidad de las zonas, y b) cambiar el protocolo de sueltas "duras" (sin comida) por sueltas "blandas" (con aporte de comida suplementaria).

4.- La estrategia de liberar juveniles de focha moruna es más eficiente que liberar adultos. Liberar adultos o juveniles no varía el tamaño metapoblacional final, pero si tenemos en cuenta los costes económicos hay una mejor relación coste/beneficio liberando juveniles.

5.- Si no se disminuye el coste postliberación mejorando la calidad del hábitat de las zonas de




Figura 2: Causas de mortalidad de los ejemplares recuperados muertos (1999-2014).

reintroducción será difícil que la metapoblación se establezca de forma viable.

6.- Se ha verificado que numerosos ejemplares de focha moruna son abatidos durante las tiradas de focha común debido a la tendencia de ambas especies a formar bandos mixtos en invierno. La pérdida de ejemplares de focha moruna por caza es especialmente grave ya que es aditiva a la mortalidad debida a la liberación de aves criadas en cautividad.

7.- La moratoria de caza ha sido efectiva tanto para la focha común como para la moruna pero sólo durante la invernada, no mejorando la situación en la época reproductora.

8.- La caza de fochas comunes ha demostrado ser aditiva y no compensatoria debido al gran efecto de atracción ejercido por el cebado artificial con grano en los acotados de caza.

9.- Por tanto, habría que fomentar un nuevo modelo local de aprovechamiento cinegético de la focha común que no esté basado sólo en la atracción de bandos de fochas durante el invierno, sino que fomente la reproducción de las fochas en los acotados de caza.

10.- El fracaso de la moratoria para aumentar la supervivencia anual de las fochas morunas y el número de parejas reproductoras, ha sido probablemente debido a la práctica habitual al final de la temporada de caza (sobre todo en l'Albufera) de las denominadas *càbiles** cuyo efecto es equiparable al de la caza furtiva.

11.- Se debería recurrir a prácticas más efectivas que las moratorias de caza, como la creación de zonas de reserva, sin caza, y con hábitat de alta calidad para la cría, cuyos efectos son más fáciles de valorar que los de una moratoria.

Zona de liberación	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Desmb. Brc. Carraixet											4						
Estany de Nules												4					
P. N. l'Albufera		19	12	29	22	22	23	10			4	12	19	25	14	4	215
Marjal dels Moros	13	45	39	51	74	33	22	23	11	18	15	13	10		7		374
Antella (Río Júcar)											6	6					12
Embalse de Cofrentes												4					4
Albufera de Gaianes															10		10
Ullal Tavernes de Valldigna																1	1
P. N. El Hondo			21	24		15								8		6	74
Clot de Galvany				6													6
Marjal de Almenara					10			3	8	11		13	9	9			63
Marjal de la Safor						20	19	21	8	2		6	6	9			91
Delta del Llobregat					20												20
S'Albufera Mallorca						20	12	8	12		14			6	6	6	84
TOTAL	13	64	72	110	126	110	76	65	39	31	43	58	44	57	37	19	964

Tabla I: Liberación de ejemplares de focha moruna por zonas (1999-2014).

* Al finalizar las tiradas en los *vedats* se realizan las jornadas de *càbiles*, cinco días consecutivos de caza de lunes a viernes donde puede participar cualquier miembro de las sociedades de cazadores en su respectivo coto. Esta modalidad se extiende a todos los cotos que rodean el lago.

Zonas de cría	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
P. N. l'Albufera		1	4	4	3	5	3	3	3	3	3	2	2	2
Cauce Nuevo Río Turia								1						
Marjal dels Moros	5	5	1	11						1				
Marjal de Almenara							1	2	1	1	1	1	1	
Marjal de la Safor				5	5	2	3	2	2	1	2			
Marjal de la Ribera Sur del Xuquer														1
Marjal de Pego-Oliva						1	1	1						1
P. N. El Hondo														1
TOTAL	5	8	5	20	8	8	8	9	7	5	6	3	3	5

Tabla 2: N° de parejas nidificantes en libertad en la Comunidad Valenciana (2001-2014)

Zonas de Invernada	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Clot de Galvany	1												
P.N. de El Hondo						1						3	4
Barranco de Carraixet				2	1	2	1	1	2				
Cauce nuevo Río Turia					5	2	3	1					
Marjal de Almenara	4	5	1	2	1	2	6	5	4	1			
Marjal del Moro	8	1		9		2	6	5					
Marjal de Pego-Oliva				1	3	2	2	2					
Marjal Ribera S Xuquer													1
Marjal de la Safor				16	43	12	4	1	1	1			
P.N. L'Albufera	2	8	8	15	10	8	8	2	15	12	19	5	5
TOTAL	15	14	9	45	63	31	30	17	22	14	19	8	10

Tabla 3: N° de ejemplares en enero en humedales de la Comunidad Valenciana (2002-2014).

SEGUIMIENTO DE AVES RAPACES EN EL NOROESTE DE CASTELLÓ 2011-2013

Ramón Prades¹, Ana Llopis, Ángel de Paz, Martí Surroca, Alberto Seco, Sergi Marzà, Cesar Colomer, Félix López, Teresa de Chiclana, Jacinto Cerdà y Emmanuel Galindo.

¹ C/ Jaime Vives, nº 9 12165 Ares del Maestrat. llopraiprabad@gmail.com

RESUMEN

Se aportan datos sobre las aves rapaces presentes en una zona del noroeste de la provincia de Castelló, retomando una serie de artículos que se inició en el Anuario de 2003, hasta el correspondiente al 2010. Los datos son un resumen de la información obtenida en estos últimos tres años.

La zona en estudio comprende los términos de : Sorita, Palanques, Vilafranca, Villores, Todolella, Portell de Morella, Olocau del Rey, Morella, La Mata, Forcall, Catí, Castellfort, Cinctorres y Ares del Maestrat. En Total 1.105,45 Km² (no tratados todos con igual intensidad) más algunos datos de algunas parejas de especies concretas sitas en Herbers y Castell de Cabres.

En estos tres años, han sido 31 las especies de aves rapaces observadas en la zona (tres no vistas anteriormente). También en el seguimiento de las aves, la intensidad no ha sido igual para todas las especies, aunque es exhaustivo en algunas como: buitre leonado, alimoche, águila real y perdicera, resulta deficiente especialmente respecto a las nocturnas.

El seguimiento durante 16 años (1997-2013), de este grupo de aves, va permitiendo entender la dinámica de sus poblaciones en esta área.

RESULTADOS

RAPACES DIURNAS

Abejero europeo (*Pernis apivorus*)

Migrante

2011

Paso primaveral desde 02.V al 08.V, con cita destacada el 08.V de 149 ejemplares en el Marfullar de Morella.

Cita estival de 2 ejemplares en serra Brusca (Vilafranca) el 04.VIII

Paso postnupcial sin datos de interés.

2012

Paso primaveral entre el 03.V y 29.V, con el mayor número de abejeros detectado el 03.V con 73 ej. en Ares.

Paso otoñal entre el 23.VIII y el 08.IX, con máximos los días 28.VIII y 08.IX, ambos con 35 ej. entre Vilafranca y Ares.

2013

Paso primaveral observado desde el 02.V al 08.VI con máximos el 02.V de 130 ej. en la Roca de Morella y el 07.V con 101 ej. en la Belluga, Ares.

Cita estival el 03.VII, 1 ej. en Coder, Vilafranca.

Paso otoñal entre el 30.VIII y el 21.IX, con la mayor observación de ejemplares el 30.VIII de 75 abejeros en l'Avellà de Catí.

Elanio azul (*Elanus caeruleus*)

¿Divagante, posible nidificante?

La primera cita de esta ave rapaz para esta zona se dio el 26.VI.2011 en la Canà d'Ares, donde se vio un ejemplar portando ceba en vuelo dirección Benassal (comunicado por Fernando Ramia). El 28.VI se observa un posible ejemplar en la misma zona. A partir de esta fecha y después de varias visitas no se ve nada más.

Milano negro (*Milvus migrans*)

Estival y nidificante

Las primeras citas del paso prenupcial en estos tres años se han dado en la tercera semana de marzo: 16.III.2011; 14.III.2012 y 12.III.2013

El paso prenupcial se prolonga hasta mediados de abril (12.IV en 2011 y 09.IV en 2013).

Como citas importantes en paso se pueden aportar:

16.III.2011: 57 ejemplares en Cincorres; 10 ej. en Catí; 23 ej. en Ares y 136 ej. el 12.III.2013

Respecto al postnupcial, hay que destacar que los milanos nidificantes en esta zona la abandonan por regla general a finales de julio. Posteriormente se observan ejemplares en migración procedentes de localidades más septentrionales. En general es poco conspicuo, exceptuando un avistamiento de 93 ejemplares en tres grupos el 16.IX.2012 en Els Mollats de Vilafranca. Se han observado migrantes entre el 10 y el 16 de septiembre.

Población nidificante:

De las 15 parejas conocidas en 2010 se pasa a las 18 localizadas hasta 2011 (no se localizan nuevas parejas ni en 2012 ni en 2013).

En estos tres años se ha seguido la reproducción de diez nidadas con un éxito reproductor de 2 pollos/nido.

2011

6 reproducciones controladas: 2 pollos/ nido

2012

2 nidos controlados: 2.5 pollos/nido

2013

2 nidos controlados: 1.5 pollos/nido

Milano real (*Milvus milvus*)

Migrante,¿invernante?


2012

15.III: 1 ej. en Sorita; 22.V: 1 ej. en Catí; 29.X: 1 ej. en la mola d'Ares

2013

08.IV: 1 ej. en el mas de Roia, Ares; 27.X: 1 ej. en la mola d'Ares; 09.XII: 1 ej. en la Pobleta, Morella; 15.XII: 1-2 ej. en Morella (en varias ocasiones)

Sobre la posible presencia del milano real como invernante en esta zona se puede decir que hasta el invierno de 2013-14, a esta especie le adjudicábamos el estatus de migrantes, desde 2001 hasta 2013 solo se habían obtenido dos citas en plena invernada (1 ej. el 14.I.V en la Vespa, Morella y el 02.XII.IX de 1 ej. también, en el puerto de las Cabrillas del Portell). Es a partir del invierno de 2013 cuando empezamos a pensar en la posibilidad de que algunos ejemplares pasen el invierno por aquí. La localización de un dormidero en Peñarroya de Tastavins (Teruel) no conocido ante-



Observaciones de Milanos reales por meses. Años 2001 a 2013.

riormente, a menos de 2 Km de la provincia de Castelló por parte de uno de los autores de este artículo, (A. Seco) dentro de los trabajos de campo de III censo de milano real de SEO/BirdLife (B. Molina 2015) puede explicar la presencia invernal de milanos reales en els Ports. El número máximo de ejemplares de este dormitorio observado fue de 6.

Alimoche (*Neophron percnopterus*)

Estival y nidificante.

La única cita de interés sobre los pasos migratorios estos años, es la de un ejemplar temprano en Ares el 13.III.2012.

Población nidificante:

Continúan presentes, como nidificantes, las 6 parejas conocidas en 2010.

2011

Se controla la reproducción de la totalidad de parejas, volando en todos los casos 1 pollo.

2012

Solo se obtiene información sobre 5 parejas, de la restante, pese a estar presente en su territorio, no se puede localizar el nido. Vuelan 6 pollos en total, 1.2 pollos/nido.

2013

Al igual que en el año anterior no se localiza el nido de una de las parejas (la misma), otra de las parejas fracasa en la reproducción, en total vuelan 4 pollos, 0.8 pollos/nido.

Buitre leonado (*Gyps fulvus*)

Sedentario.

Población reproductora:

Año	Nº parejas rep.	Éxito rep.	Nº localidades
2011	62	0.69	10
2012	58	0.62	09
2013	47	0.61	10

Parámetros reproductivos del buitre leonado 2011-2013

Los municipios donde se ha reproducido el buitre leonado estos años en esta comarca han sido: Sorita, Portell, Morella, Castellfort y Catí.

Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)

Estival nidificante.

Las primeras citas en el paso prenupcial en 2011 se dieron ya en febrero (El 23.II, 1 ejemplar en Todo-lla. El 24.II, 1 ejemplar en Catí).

En 2012 el primer ejemplar se observó el 18.III en Ares, y en 2013 el 11.III también en Ares. Este último año se vieron los últimos ejemplares en este paso el 09.V con 4 ejemplares en vuelo al N.

En el paso postnupcial, los primeros ejemplares se han observado el 31.VIII.2012 en Ares, obteniéndose las últimas citas por años en las siguientes fechas: 05.X.2011; 05.X.2012 y 27.X.2013

Población reproductora:

De las 28 parejas conocidas en 2010 pasamos a las 41 actuales. En la monografía de SEO/BirdLife "Las rapaces forestales" (Palomino, D. y Valls, J. 2011) comentan: "Globalmente, Castellón acogió las densidades más destacadas de culebrera: promedió 0.9 territorios · km² en toda la provincia, llegando a 1 territorio · km² al considerar únicamente aquellas cuadrículas en las que se dató su presencia como nidificante potencial (más del 90 %), y superando localmente los 2 territorios · km²".

Las nuevas parejas se han localizado en las siguientes localidades:

2011

Morella: 3 parejas; Sorita: 1 pp.; Vilafranca: 2 pp.; Castellfort: 1 pp.

Se obtiene información sobre la reproducción segura de 15 parejas, se sigue en 5 parejas

2012

Morella: 3 pp.; Catí: 1 pp.; Cinctorres: 1 pp.

La información sobre reproducción afecta a 9 parejas, siguiendo 3 nidadas.

2013

Ares: 1 pp.

Datos seguros de cría de 9 parejas, se siguen 7 nidos.

Destacar que en las 15 nidadas seguidas en todos los casos llega a volar el pollo.

Aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*)

Migrante

2011

02.IV: 1ej. en la Roca, Morella

2012

17.IX: 1 macho en vuelo al SO en el port de Querol, Morella

2013

19.VIII: 1 ej. en la vega dels Llivis, Morella; 31.VIII: 1 ej. en la mola de Ares hacia el O; 21.IX: 1 ej. en la mola de Ares vuelo al S; 09.X: 1 ej. en la mola de Ares vuelo al S; 27.IX: 1 macho vuelo al S en Forcall

Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)

Invernante escaso

2011

21.I: 1 macho en el mas del Rei, Catí.; 05.II: 1 ej. macho en el pla de Catalina, Ares

2012

02.III: 1 macho en el bnc. dels Abres, Vilafranca.

2013

07.I: 1 macho en la Font, Catí.; 20.I: 1 macho en el pla de Catalina, Ares; 22.II: 1 macho en el mas Vell, Catí; 25.II: 1 macho en l'Empriu, Ares; 13.III: 1 macho en el Pilar, Catí; 30.XII 1 macho en Catí

Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)

Estival y nidificante.

Las primeras citas en primavera se han dado el 24.III.2011; el 03.IV.2012 y el 02.IV.2013; todas estas citas son de la colonia de Ares.

El postnupcial es poco evidente siendo el 10.VIII la fecha de la última observación de un ejemplar en las áreas de nidificación (Ares).

Población reproductora:

La especie se reproduce solamente en los municipios de Ares y Catí, en toda el área del estudio, por localidades los resultados del seguimiento son los siguientes:

La estimación total de parejas se mantiene bastante estable:

2010: 21 parejas

2011: 21-22 parejas

2012: 19 parejas

2013: 19 parejas

Gavilán (*Accipiter nisus*)

Sedentario.

Durante los pasos se observan ejemplares migrantes, aunque la población local parece sedentaria-nidificante.

Se han obtenido citas en el paso prenupcial en el año 2013 entre el 27.III y el 09.IV, siempre ejemplares en solitario.

Localidad	Año	Nº parejas estimadas	Nº parejas controladas	Éxito reproductor
Ares	2011	9-10	7	2.71
	2012	10	8	1.87
	2013	11	7	1.57
Catí	2011	12	7	2.40
	2012	9	7	2.28
	2013	8	6	3.83

Parámetros reproductivos del aguilucho cenizo 2011-2013

Respecto al postnupcial, en 2012 se observó entre el 26.VIII y el 29.X. En 2013 el paso se dio entre el 31.VIII y el 21.X, y como en el prenupcial siempre ejemplares en solitario o a lo sumo en parejas.

Población nidificante:

De las 33 parejas conocidas hasta 2010 pasamos a 39, las 6 nuevas se han localizado en:

Morella (2 pp), Sorita, Ares, Castellfort y Vilafranca.

Sobre la reproducción se han obtenido la siguiente información:

2011

Parejas con reproducción segura 4. Seguida en 3 casos, volando 1.33 pollos/nido.

2012

Se constata la cría de 5 parejas. En 2 casos en los que se sigue vuelan 2.5 pollos/nido.

2013

Solamente un caso de nidificación (que se sigue), volando 2 pollos.

Azor (*Accipiter gentilis*)

Sedentario nidificante

Población nidificante:

En 2010 cifrábamos la población en 36 parejas, para el 2013 son 42 las conocidas, estas nuevas 6 parejas se han localizado en: Morella (3 pp), Castellfort, Herbers y Todolella.

En 2011 se obtuvieron datos sobre reproducción segura de 11 parejas, siguiéndose en 5 casos volando una media de 2 pollos/nido.

En 2012 fueron 7 las parejas en las que se constató la cría, siguiéndola en tres nidos, volando 2 pollos/nido.

En 2013 las parejas en las que se verificó la cría fueron 5 y en las 4 en las que se siguió la reproducción, volaron 1.5 pollos/nido.

Busardo ratonero (*Buteo buteo*)

Sedentario (parte de su población) nidificante.

Sin datos relevantes sobre sus migraciones, solamente tenemos datos de un cierto interés del postnupcial en 2013, observándose ejemplares en solitario entre el 31.VIII y 10.IX en migración activa, observados en Ares.

Población reproductora:

En 2010 conocíamos 27 parejas, en 2013 son 32 las localizadas. Estas 5 parejas se localizan en Morella (2), Portell, Ares y La Mata.

Los datos obtenidos sobre la reproducción son los siguientes:

En 2011 fueron 7 las parejas sobre las que se confirmó la cría, controlándose 2 nidos y volando 1.5 pollos/nido.

En el 2012 se vieron evidencias de nidificación de 4 parejas, siguiéndose la reproducción en 2 parejas, de las que volaron 1.5 pollos/nido.

Y en 2013 también fueron 4 las parejas con evidencias de cría, y en el único nido controlado volaron 2 pollos.

Águila real (*Aquila chrysaetos*)

Sedentaria nidificante.

En la zona en estudio son 12 las parejas de águilas reales que mantienen territorios de cría, ahora bien, en algunos casos estos territorios están compartidos con otras comarcas vecinas o con la provincia de Teruel, lo que conlleva que no todos los años se pueda obtener toda la información que sería deseable, aparte de las dificultades que este seguimiento conlleva ya de por sí.

Población reproductora por años:

2011

Dos de las pp. están presentes pero no se obtienen datos de nidificación.

Una pp. saca al menos 1 pollo, pero no se localiza el nido.

Cuatro pp. fracasan en la reproducción.

Cinco pp. sacan adelante 6 pollos

2012

Tres pp. están presentes pero no se obtienen datos de cría.

Dos pp. no inician la reproducción (una posiblemente, al ser el macho un ejemplar juvenil)

Una pp. se reproduce, pero se ignora el desenlace.

Una pp. fracasa en la cría.

Cinco pp. sacan adelante 6 pollos.

2013

Dos pp. presentes en la zona pero no inician la cría

Una pp. se reproduce fuera de la zona en estudio (vuela 1 pollo)

Cinco pp. fracasan en la reproducción.

Cuatro pp. Sacan 4 pollos.

Estas parejas de reales están situadas en los siguientes términos municipales:

Ares; Castellfort-Morella; Vilafranca (2 pp. Una nidifica algunos años en la provincia de Teruel); Olocau del Rey; Morella 3 pp.; Sorita; Catí-Morella; Todolella-Forcall; Herbers (y provincia de Teruel).

	2011	2012	2013
Productividad	0.60	0.66	0.55
Éxito rep.	0.71	0.85	0.55
Tasa de vuelo	1.0	1.0	1.0

Parámetros reproductivos del águila real 2011-2013

Águila calzada (*Aquila pennata*)

Estival nidificante.

Poco conspicua en el paso prenupcial. Las primeras citas de interés para estos años se han dado en las siguientes fechas: 28.III.2011: 1 ej. en Ares. 22.III.2012: 1 ej. en Ares. 2013: no se detectan hasta el mes de abril.

Respecto al paso postnupcial, se produce ya a mediados de agosto, y las fechas extremas observadas son: 29.IX.2011: 3 ej. en Ares; 30.IX.2012: 1 ej. Ares. 21.IX.2013: 1 ej. en Ares.

Población reproductora:

De 41 parejas conocidas pasamos a 47. Estas 6 parejas más se localizan en 2011, con 2 pp. en Vilafranca y Sorita y las restantes en 2012 (en 2013 no se localiza ninguna nueva) 2 en Castellfort, 1 en Catí y 1 en Vilafranca.

Destacan, por negativos, los números de 2013, posiblemente a causa de la climatología de la primavera e inicio del verano, con abundantes lluvias y temperaturas bajas.

Águila azor perdicera (*Aquila fasciata*)

Sedentaria nidificante.

Una sola pareja en el área en estudio, concretamente en Sorita.

Población reproductora:

2011

23.II: Arreglando el nido.; 22.III: Incubando pero no en el nido en que se vieron los aportes y arreglos.; 29.IV: Se ve 1 pollo en el nido.; 30.VI: El pollo en vuelo, por los alrededores del nido.

2012

La pareja en el territorio, pero no crían.

2013

18.I: La pareja y un subadulto en el territorio; 15.II: Arreglo del nido; 25.II: 1 subadulto pasa en vuelo S a N sobre la zona del nido. La pareja reproductora, que esta en la zona, lo ignoran; 10.IV: 1 pollo en el nido; 27.V: El pollo posado en los alrededores del nido.

Año	2011	2012	2013
Nidos controlados	15	22	21
Pollos volados	16	24	9
Éxito rep.	1.06	1.09	0.42
Fracasan	2.0	4.0	11.0*
Tasa de Vuelo	1.14	1.33	1.0

* 2 nidadas por depredación de los pollos.

Parámetros reproductivos de la águila calzada 2011-2013

Águila pescadora (*Pandion haliaetus*)

Migrante

2013

09.IV: 1 ej. al N en la Nevera de Catí; 11.V; 1 ej. en Xiva de Morella; 27.IX: 1ej. al S en Forcall

Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)

¿Migrante?

Primera conocida en esta zona, un ejemplar recogido muerto en parque eólico de Vilafranca el 23.VII.

Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)

Sedentario nidificante.

Pocos datos en la migración primaveral, destacando la cita de 5 ejemplares juntos en vuelo al N el 11.III en Ares. En la postnupcial se observan ejemplares entre el 25.VIII y el 29.X de 2013. Como dato curioso citar los 13 ejemplares juntos que se observaron en la mola d'Ares cazando insectos el 06.IX.2011.

Población reproductora:

En 2010 la cifrábamos en 168 pp. Y para 2013 es de 184 pp. Ahora bien, estas cifras hay que matizarlas, ya que aunque se han localizado nuevos territorios, también se han eliminado otros por desaparecer las parejas. Sobre éxitos reproductores tenemos pocos datos, de un total de 10 nidadas controladas en tres años vuelan 1.8 pollos/nido. (No se ha dedicado gran atención a esta especie).

Cernícalo patirrojo (*Falco vespertinus*)

Migrante

2011

15.V: 1 ej. en la vega del Moll, Morella

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Invernante escaso

2011

21.I: 1 ej. en Forcall; 05.II: 1 ej. en Ares;

2012

28.II: 1 ej. en la Roca, Morella; 08.IX: 1 ej. en la Mola, Ares; 13.IX: 1 ej. en la Giroveta, Morella

2013

31.I: 1 ej. La Cañada, Vilafranca; 05.II: 2 ej. Catí

Alcotán (*Falco subbuteo*)

Estival y nidificante

Pocas citas durante las migraciones. En 2011, solamente una de 1 ejemplar el 20.IX en Ares. Para 2012, una en el prenupcial el 25.V y dos en el postnupcial (1 ej. el 31.VIII, y otro el 21.IX), todas en Ares. Ninguna cita en 2013.

Población reproductora:

De 24 parejas se pasa a 27, pero estos años se ha asistido a una rarefacción de la especie en esta comarca.

En 2011 se localizan 2 territorios nuevos (Ares y Sorita). Se comprueba la presencia de alcotanes en 9 territorios. De estos, se obtienen datos de nidificación segura en 3 de ellos. Siguiendo la reproducción en 2 casos, en los que vuelan 2.5 pollos/nido.

Al año siguiente, localizamos una pareja más en La Mata. Pero solamente se observan ejemplares en 4 territorios. En 2 de ellos se evidencia la cría, siguiendo un nido del que vuelan 3 pollos.

Notándose una menor presencia de alcotanes en general, se hizo el esfuerzo de prospectar 5 territorios más de los conocidos de forma más intensa, todas con resultado negativo (habían desaparecido de sus territorios).

El 2013 fue todavía peor. Durante todo el periodo que permanece el alcotán en la zona, solo se obtuvieron 2 citas, en Vilafranca y Sorita, (cerca de territorios con nidos, pero no se obtuvo ningún dato que pudiera evidenciar la cría) se revisaron 8 territorios más, todos con resultados negativos.

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Divagante

2011

14.VI: 1 ejemplar en el coll d'Ares.

2012

Sin citas

2013

02.V: 1 ejemplar en vuelo al N en la Roca de Morella.

03.V: 1 ejemplar en el bco. del Coll, Morella.

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

Sedentario nidificante.

Población reproductora:

Se continua con las 22 parejas conocidas desde 2010, no localizándose nuevas o no conocidas.

En 2011 se sigue la reproducción de 6 parejas, volando 1.83 pollos/nido.

En 2012 son 4 las parejas de las que se obtienen datos, con un resultado de 2.0 pollos/nido.

Y en 2013 fueron 4 las reproducciones controladas, volando 2.20 pollos/nido.

RAPACES NOCTURNAS

Lechuza común (*Tyto alba*)

Sedentaria nidificante.

Población reproductora.

Desde que iniciamos en 1997 el seguimiento de las aves rapaces en esta zona de la provincia, solamente hemos localizado 17 territorios de lechuza, y estos en su mayoría pensamos que han sido abandonados por la especie. De hecho en algunos cascos urbanos donde en los años 90 habían lechuzas hoy día están ocupados por los cárabos.

Las pocas citas obtenidas estos tres años son:

2011

10.V: 1 ej. en Morella. (territorio conocido).

22.VI: 1 ej. en la Vespa, Morella.

2012

01.V: 1 ej. la Pobleta, Vilafranca (territorio conocido).

2013

19.VII: 1 ej. en Vilafranca (territorio conocido).

Autillo europeo (*Otus scops*)

Estival y nidificante

Pocas citas de interés sobre la fenología migratoria del autillo, destacando una cita de 2013 de un ejemplar el 15.III en el Llosar de Vilafranca, posiblemente la más temprana obtenida en estos años por estos pagos.

Población reproductora:

Son 163 los territorios conocidos hasta 2013, ahora bien el número de los conocidos que se revisan estos años son muy pocos, por lo que esta cifra hay que tomarla como una aproximación a la realidad.

Hay que destacar que en el año 2012 y en colaboración con SEO/BirdLife dentro del programa MIGRES se instalaron 9 cajas nido para esta especie en unos pinares de Ares. La intención era poder capturar ejemplares para instalarles transmisores a fin de estudiar la migración, algo que al final no se pudo realizar. Las cajas se instalaron en un pinar de pino carrasco procedentes de repoblación (con una edad de unos 40 años). La parcela concreta, presenta una cobertura arbórea superior al 80%, sin sotobosque, la altura media de los pinos es de unos 15m. Estos pinares están enclavados entre cultivos de almendros y parcelas con matorral (coscoja y aliaga principalmente) y a una altura sobre el nivel del mar de 720 m. Las cajas se instalaron a una altura de entre 5 y 5.5 m, orientadas S-SE, distribuyéndose dentro de un área de 7.943 m² y con una distancia media entre cajas nido de 35 m.

Los primeros aportes se observan el 25.IV

El 07.VII son tres las cajas ocupadas, una con 4 huevos posiblemente ya esté abandonada, ya que hay 2 huevos picados. En las otras, una con pollos y otra con un adulto incubando.

El 03.VIII ya han volado los pollos de los nidos con un resultado de 3.5 pollos volados/nido

Como curiosidad comentar que la distancia entre los dos nidos en que volaron pollos es de 71 m.

En 2013 son tres las parejas que se instalan en esta zona, con los resultados de: una puesta depredada, y en las otras dos vuelan 2 y 4 pollos respectivamente.

Buho real (*Bubo bubo*)

Sedentario nidificante

Población reproductora:

Un territorio más conocido, con los que suman 16 en total.

En estos años se han conseguido datos seguros sobre reproducción en 5 casos, aunque hablar de éxito reproductor con los datos obtenidos sería muy aventurado. La reproducción se constata por escuchas de los cantos de los pollos.

Mochuelo europeo (*Athene noctua*)

Sedentario nidificante.

Población reproductora:

Los datos obtenidos son básicamente de distribución en el territorio, por lo que no se buscan datos de reproducción (más que nada por la dificultad que entraña el seguimiento de rapaces nocturnas)

De los 86 territorios conocidos en 2010, pasamos a 101 en 2013.

Cárabo común (*Strix aluco*)

Sedentario nidificante

Población reproductora:

De 141 territorios en 2010 pasamos a los 147 en 2013, habiéndose eliminado algunos a fin de evitar posibles duplicidades.

No se poseen datos seguros sobre la reproducción (nº de pollos volados, éxito reproductor, etc.), ahora bien, el periodo en que se ven pollos volantes estos tres años va del 10.V al 23.V (9 casos), aunque el 21.VI.2011 se ve a un adulto entrar con ceba al nido en el casco urbano de Cinctorres.

Buho chico (*Asio otus*)

Sedentario nidificante.

Población reproductora:

Los territorios conocidos hasta el año 2013 son 32, localizándose 3 no conocidos respecto al 2010 localizados en Morella, Castellfort y Vilafranca. Solamente tres datos de cría, constatados mediante

la escucha de cantos de pollos el 17.VII.2011 en Castellfort, el 29.VIII.2012 en Vilafranca y la observación de un joven del año el 01.X.XI en Morella.

Buho campestre (*Asio flammeus*)

¿Migrante?

Primeras citas para esta nocturna en la zona y lamentablemente de ejemplares abatidos por parques eólicos:

24.X.2012: 1 ej. en la Mola de Todolella; 23.XI.2012: 1 ej. en Arriello, Vilafranca; 11.XII.2012: 1 ej. en Torremiró, Morella.

Como mínimo es curioso que en los años que llevamos de seguimiento, no hayamos obtenido ninguna cita de esta ave, y que las tres citas sean del mismo año, las tres de choques con aerogeneradores y bastante separadas geográficamente.

BIBLIOGRAFIA

Molina, B. 2015 (Ed.) El milano real en España, III Censo Nacional. Población invernante y reproductora en 2014 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.

Palomino, D. & Valls, J. 2011. Las rapaces forestales en España. Población reproductora en 2009-2010 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.

Prades, R., de Paz, A., Llopis, A., Surroca, M., Seco, A., Colomer, C., & Marzà, S. 2010. Nuevos datos sobre las aves rapaces del nordeste de Castelló. En Tirado, M. & García, M. (eds.) 2014. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 2010. Pp 164-166. Internatura. Castellón.

Índice de órdenes, familias y especies

Accipiter gentilis	61	Aquila clanga	63	Carduelis citrinella	181
Accipiter nisus	62	Aquila fasciata	65	Carduelis flammea	183, 204
Accipitridae	54	Aquila pennata	64	Carduelis spinus	182
Acrocephalus agricola	155	Aratinga erythrogenys	191	Cecropis daurica	135
Acrocephalus arundinaceus	156	Aratinga nenday	191	Cercotrichas galactotes	143
Acrocephalus melanopogon	154	Ardea cinerea	48	Certhia brachydactyla	171
Acrocephalus paludicola	154	Ardea purpurea	48	Certhiidae	171
Acrocephalus schoenobaenus	154	Ardeidae	41	Cettia cetti	152
Acrocephalus scirpaceus	155	Ardeola ralloides	44	Charadriidae	81
Actitis hypoleucos	99	Arenaria interpres	100	Charadriiformes	77
Aegithalidae	169	Asio flammeus	124	Charadrius alexandrinus	83
Aegithalos caudatus	169	Asio otus	123	Charadrius dubius	81
Aegyptus monachus	57	Athene noctua	123	Charadrius hiaticula	82
Aix galericulata	189	Aythya ferina	25	Charadrius morinellus	84
Alauda arvensis	132	Aythya fuligula	26	Chersophilus duponti	131
Alaudidae	131	Aythya marila	27	Chlidonias hybrida	116
Alca torda	117	Aythya nyroca	26	Chlidonias leucopterus	117
Alcedinidae	127	Botaurus stellaris	41	Chlidonias niger	116
Alcedo atthis	127	Branta bernicla	16, 197	Chloris chloris	181
Alcidae	117	Branta leucopsis	15	Ciconia ciconia	50
Alectoris rufa	31	Bubo bubo	123	Ciconia nigra	49
Anas acuta	20	Bubulcus ibis	44	Ciconiidae	49
Anas carolinensis	19	Bucanetes githagineus	184, 204	Ciconiiformes	41
Anas clypeata	22	Burhinidae	80	Circaetus gallicus	58
Anas crecca	19	Burhinus oedinemus	80	Circus aeruginosus	58
Anas discors	22, 197	Buteo buteo	62	Circus cyaneus	60
Anas penelope	17	Buteo rufinus	63	Circus macrourus	61, 199
Anas platyrhynchos	20	Calandrella brachydactyla	131	Circus pygargus	61
Anas querquedula	21	Calandrella rufescens	132	Cisticola juncidis	152
Anas strepera	18	Calidris alba	87	Clamator glandarius	122
Anatidae	15	Calidris alpina	90	Coccothraustes coccothraustes	184
Anser anser	15	Calidris canutus	86	Columba livia	119
Anseriformes	15	Calidris falcinellus	91, 200	Columba oenas	119
Anthus campestris	137	Calidris ferruginea	89	Columba palumbus	120
Anthus cervinus	138	Calidris maritima	90, 200	Columbidae	119
Anthus pratensis	137	Calidris melanotos	89	Columbiformes	119
Anthus richardi	136	Calidris minuta	87	Coracias garrulus	128
Anthus spinoletta	138	Calidris pugnax	91	Coraciidae	128
Anthus trivialis	137	Calidris temminckii	88	Coraciiformes	127
Apodidae	125	Calonectris diomedea	36	Corvidae	173
Apodiformes	125	Caprimulgidae	124	Corvus corax	176
Apus apus	125	Caprimulgiformes	124	Corvus corone	175
Apus melba	126	Caprimulgus europaeus	124	Corvus monedula	175
Apus pallidus	126	Caprimulgus ruficollis	125	Coturnix coturnix	31
Aquila adalberti	66, 202	Carduelis cannabina	183	Cuculidae	121
Aquila chrysaetos	65	Carduelis carduelis	182	Cuculiformes	121

Cuculus canorus	122	Gavia stellata	32	Lullula arborea	132
Cyanistes caeruleus	170	Gaviidae	32	Luscinia megarhynchos	144
Cygnus atratus	189	Gaviiformes	32	Luscinia svecica	145
Cygnus olor	189	Gelochelidon nilotica	111	Lymnocyptes minimus	91
Delichon urbicum	135	Geopelia cuneata	190	Marmaronetta angustirostris	23
Dendrocopos major	130	Glareola pratincola	81	Melanitta fusca	28, 198
Dendrocygna bicolor	189	Glareolidae	81	Melanitta nigra	28
Egretta alba	47	Gruidae	71	Melanocorypha calandra	131
Egretta garzetta	46	Gruiformes	71	Melopsittacus undulatus	191
Egretta gularis	45	Grus grus	71	Mergus serrator	29, 198
Egretta gularis x garzetta	45, 199	Gypaetus barbatus	56	Meropidae	127
Elanus caeruleus	55	Gyps fulvus	57	Merops apiaster	127
Emberiza calandra	187	Haematopodidae	77	Milvus migrans	55
Emberiza cia	186	Haematopus ostralegus	77	Milvus milvus	56
Emberiza cirlus	185	Himantopus himantopus	78	Monticola saxatilis	149
Emberiza citrinella	185	Hippolais icterina	157	Monticola solitarius	149
Emberiza hortulana	186	Hippolais polyglotta	157	Montifringilla nivalis	178
Emberiza schoeniclus	186	Hirundinidae	133	Morus bassanus	39
Emberizidae	184	Hirundo rustica	134	Motacilla alba	141
Erethacus rubecula	144	Hydrobates pelagicus	38	Motacilla cinerea	141
Estrilda astrild	178	Hydrobatidae	38	Motacilla citreola	140, 203
Estrilda melpoda	192	Hydrocoloeus minutus	111	Motacilla flava	139, 202
Euplectes afer	192	Hydroprogne caspia	112	Motacillidae	136
Falco columbarius	68	Ibis hadada	189	Muscicapa striata	167
Falco eleonorae	69	Iduna opaca	157	Muscicapidae	167
Falco naumanni	67	Ixobrychus minutus	42	Musophaga sp.	190
Falconidae	67	Jynx torquilla	130	Myiopsitta monachus	121
Falconiformes	54	Laniidae	172	Nandayus nenday	194
Falco peregrinus	70	Lanius collurio	172	Neophron percnopterus	56
Falco subbuteo	69	Lanius meridionalis	172	Netta rufina	24
Falco tinnunculus	67	Lanius senator	173	Numenius arquata	95
Falco vespertinus	68	Laridae	103	Numenius phaeopus	94
Ficedula albicollis	168, 203	Larus argentatus	109	Nycticorax nycticorax	43
Ficedula hypoleuca	168	Larus audouinii	106	Nymphicus hollandicus	190
Ficedula parva	167	Larus cachinnans	109, 202	Oceanodroma monorhis	39
Fratercula arctica	118	Larus canus	107	Oenanthe hispanica	148
Fringilla coelebs	179	Larus cirrocephalus	105, 201	Oenanthe leucura	149
Fringilla montifringilla	180	Larus delawarensis	107	Oenanthe oenanthe	148
Fringillidae	179	Larus fuscus	108	Oriolidae	172
Fulica atra	75	Larus genei	105	Oriolus oriolus	172
Fulica cristata	76	Larus melanocephalus	103	Otididae	77
Galerida cristata	132	Larus michahellis	109	Otus scops	123
Galerida theklae	132	Larus ridibundus	104	Oxyura jamaicensis	189
Galliformes	31	Limosa lapponica	93	Oxyura leucocephala	29, 198
Gallinago gallinago	92	Limosa limosa	93	Pandion haliaetus	66
Gallinula chloropus	74	Locustella luscinioides	153	Pandionidae	66
Garrulus glandarius	173	Locustella naevia	153	Panurus biarmicus	169
Gavia arctica	32	Lophophanes cristatus	170	Parabuteo unicinctus	190
Gavia immer	33	Loxia curvirostra	183	Paridae	170

Parus major	170	Porzana porzana	73	Strigiformes	122
Paseriformes	131	Porzana pusilla	74	Strix aluco	123
Passer domesticus	177	Procellariidae	36	Sturnidae	176
Passer hispaniolensis	177	Procellariiformes	36	Sturnus unicolor	177
Passeridae	177	Prunella collaris	142	Sturnus vulgaris	176
Passer montanus	177	Prunella modularis	142	Sulidae	39
Pelecaniformes	39	Prunellidae	142	Sylvia atricapilla	162
Periparus ater	170	Psittacula krameri	121	Sylvia borin	161
Pernis apivorus	54	Pterocles alchata	119	Sylvia cantillans	159
Petronia petronia	178	Pterocles orientalis	118	Sylvia communis	161
Phalacrocoracidae	40	Pteroclididae	118	Sylvia conspicillata	158
Phalacrocorax aristotelis	41	Pterocliiformes	118	Sylvia hortensis	160
Phalacrocorax carbo	40	Ptyonoprogne rupestris	134	Sylvia melanocephala	160
Phalaropus fulicarius	101	Puffinus mauretanicus	37	Sylvia sarda	158, 203
Phalaropus lobatus	101	Puffinus yelkouan	36	Sylvia subalpina	159
Phasianidae	31	Pycnonotus jocosus	191	Sylvia undata	158
Phasianus colchicus	31	Pyrrhocorax pyrrhocorax	174	Sylviidae	152
Phoenicopteridae	53	Rallidae	72	Tachybaptus ruficollis	33
Phoenicopteriformes	53	Rallus aquaticus	72	Tadorna ferruginea	16
Phoenicopus minor	191, 199	Recurvirostra avosetta	79	Tadorna tadorna	16
Phoenicopus roseus	53	Recurvirostridae	78	Tetrax tetrax	77
Phoenicurus ochruros	146	Regulus ignicapilla	167	Threskiornithidae	51
Phoenicurus phoenicurus	146	Regulus regulus	166	Tichodromadidae	171
Phylloscopus bonelli	163	Remizidae	171	Tichodroma muraria	171
Phylloscopus collybita	164	Remiz pendulinus	171	Timaliidae	169
Phylloscopus ibericus	165	Riparia riparia	133	Tringa erythropus	95
Phylloscopus inornatus	162	Rissa tridactyla	110	Tringa flavipes	98, 201
Phylloscopus sibilatrix	163	Saxicola rubetra	147	Tringa glareola	99
Phylloscopus trochilus	165	Saxicola rubicola	147	Tringa nebularia	97
Pica pica	173	Scolopacidae	86	Tringa ochropus	98
Picidae	130	Scolopax rusticola	92	Tringa stagnatilis	97, 201
Piciformes	130	Serinus serinus	180	Tringa totanus	96
Picus viridis	130	Sitta europaea	170	Troglodytes troglodytes	141
Platalea leucorodia	52	Sittidae	170	Troglodytidae	141
Platycercus elegans	190	Somateria mollissima	27, 197	Turdidae	143
Platycercus eximius	191	Stercorariidae	101	Turdus iliacus	151
Plectrophenax nivalis	185, 204	Stercorarius longicaudus	102	Turdus merula	150
Plegadis falcinellus	51	Stercorarius parasiticus	101	Turdus philomelos	151
Ploceus cucullatus	192	Stercorarius pomarinus	101	Turdus pilaris	150
Ploceus melanocephalus	192	Stercorarius skua	102	Turdus torquatus	150
Pluvialis apricaria	84	Sterna bengalensis	113, 202	Turdus viscivorus	152
Pluvialis squatarola	85	Sterna elegans	114	Tyto alba	122
Podiceps cristatus	34	Sterna hirundo	115	Tytonidae	122
Podiceps nigricollis	35	Sterna sandvicensis	113	Upupa epops	129
Podicipedidae	33	Sternidae	111	Upupidae	129
Podicipediformes	33	Sternula albifrons	115	Vanellus vanellus	85
Pocephalus senegalus	191	Streptopelia decaocto	120		
Porphyrio porphyrio	75	Streptopelia turtur	121		
Porzana parva	73	Strigidae	123		

