





**ANUARIO ORNITOLÓGICO DE LA  
COMUNIDAD VALENCIANA 2016 - 2017  
VOL. XVII**

**Comité Editor:**

Miguel Tirado, Antonio Alcocer, Jana Marco, Pablo Vera, José Bort, Manuel García, Victor París, Enrique Luque & Bosco Díes.

**Dirección técnica:**

Juan Luis Bort

**Diseño gráfico y maquetación:**

Miguel Tirado

**Cita recomendada:** Tirado, M., Alcocer, A., Marco, J., Vera, P., Bort, J., García, M., París, V., Luque, E. & Díes, B. (Eds.) 2021. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. Vol. XVII. 2016-2017. Internatura. Castellón.

La publicación del presente libro ha sido posible gracias al soporte económico de las siguientes asociaciones sin ánimo de lucro:

Societat Valenciana d'Ornitologia. SVO.

Grup Au d'Ornitologia.

Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina. APNAL - Ecologistes en Acció Vinaròs.

Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires. GER - Ecologistes en Acció Vila-real.

Sociedad Española de Ornitología / Birdlife Internacional- Delegación SEO/BirdLife-Valencia.



© 2021 Internatura

ISSN 1885-6624

Dipòsit legal: CS-407-2005

Dirección de contacto:

Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana

Apdo. de correos 237

12500 Vinaròs

info\_aocv@internatura.org

La coordinación de la edición de este Anuario y la selección y edición de las citas se han gestionado y tratado desde Internatura mediante una aplicación web diseñada y desarrollada por Juan Luis Bort y Jose Bort ([internatura.org/aocv](http://internatura.org/aocv)).

Internatura autoriza la reproducción y difusión de los datos contenidos en esta publicación con fines didácticos y científicos siempre que se cite correctamente el origen de los mismos. Las fotografías son propiedad de los autores y no pueden ser utilizadas, copiadas, transmitidas o cedidas sin su expresa autorización.



**Portada:**

El águila pescadora (*Pandion haliaetus*) es una rapaz cuya dieta es casi exclusivamente piscívora (por encima del 99% de sus presas) (Bieregaard, 2020). En esta foto, capturada por Felip Redó, se muestra un hecho extraordinario de una pescadora que acaba de capturar un zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*). Este tipo de imágenes de rapaces con sus presas a cuestas son muy poco habituales, aunque en el caso del águila pescadora, no es raro observarla con peces que acarrea durante las migraciones para alimentarse de ellos cuando lo necesite.

Felip Redó Jornaler (1963-2018), nacido en Vinaròs (Castelló), fue un incansable fotógrafo de naturaleza que plasmó innumerables secuencias de la biodiversidad de las comarcas del Maestrat (Castelló) y Montsià (Tarragona). Miembro de APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs desde 2005, donde no sólo fue miembro de su junta directiva sino que, además, participó en numerosas acciones relacionadas con la conservación de la naturaleza. Fue un habitual observador de la avifauna del Baix Maestrat y colaborador en el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, con el acrónimo de FRJ. Nos dejó de forma repentina. Nadie lo esperaba pues seguía saliendo al campo a captar aquello que no veíamos. Su ilusión en aquellos momentos: la foto perfecta en plena naturaleza. Y vaya si nos dejó magníficas estampas. En su disco duro había cientos de capturas fotográficas de alto nivel y todo lo cedió para que continuáramos con la defensa del medio ambiente y la tan necesaria educación ambiental entre la ciudadanía. Nunca te olvidarán tus amigos y compañeros pajareros.

## Editorial

En el último Anuario, publicado en 2019, nos hacíamos eco de las importantes modificaciones en los sistemas de clasificación de las aves basados fundamentalmente en los estudios de ADN. Estos avances han tenido como consecuencia una reestructuración bastante importante a varios niveles en el sistema taxonómico a nivel mundial. Fruto de estos cambios, la Sociedad Española de Ornitología, publica en 2020 una nueva lista de aves que recoge algunos de estos avances. Los cambios más importantes afectan a los passeriformes, especialmente a la familia Sylviidae, que ahora se separa en 7 familias: Sylviidae (que mantiene solo a las especies del género *Sylvia*) Phylloscopidae, Acrocephalidae, Locustellidae, Cisticolidae, Regulidae y Scotocercidae. Por otro lado, la familia Turdidae se queda solo con los géneros *Turdus* y *Zootbera*, con el resto de los antiguos componentes, como *Erithacus*, *Luscinia*, *Saxiola*, *Oenanthe*, *Phoenicurus* y *Monticola*, integrados en la familia Muscicapidae. Otros cambios llamativos son la desaparición de la familia Sternidae, integrada ahora en Laridae o la aparición de la familia Oceanitidae para los géneros *Oceanites* o *Pelagodroma*, antes en Hydrobatidae. Además, se sustituyen algunos géneros de algunas especies, los cambios más amplios en este sentido se observan en el género *Anas*, que pierde varias especies que pasan a *Spatula* o *Mareca* y en el género *Carduelis*, que pierde varios miembros que pasan a los géneros *Linaria*, *Spinus* y *Acanthis*. Se pueden consultar todos los cambios en la publicación original (Rouco et al., 2019).

Durante 2016 y 2017 se han citado 3 especies nuevas para la Comunidad Valenciana: el zorzal rojigrís (*Turdus obscurus*), aunque lamentablemente se trate de un ejemplar cazado en Rosell en enero de 2016; el bisbita de Hodgson (*Anthus hodgsoni*) observado en Santa Pola en diciembre de 2017 y el negrón aliblanco siberiano (*Melanitta stejnegeri*), un macho adulto que permaneció 14 días en la playa de la Marina en Elche. Con estas adiciones y con la reciente incorporación del flamenco enano (*Phoeniconaias minor*) a la categoría A (Rouco et al. 2019), la lista de aves de la Comunidad Valenciana alcanza las 423 especies.

Además de este registro, recogemos una importante cantidad de citas de aves muy escasas, que suponen segundas, terceras o cuartas citas para la Comunidad Valenciana: segunda cita de chorlito dorado americano (*Pluvialis dominica*), con un ejemplar observado en el Fondo d'Elx entre noviembre de 2016 y enero de 2017; segunda cita de correlimos de Baird en l'Albufera, observado los días 14 y 15 de septiembre de 2016; tercera cita de avefría sociable (*Vanellus gregarius*) en el Fondo d'Elx entre octubre de 2016 y marzo de 2017; tercera, cuarta y quinta citas de agujeta escolopácea (*Limnodromus scolopaceus*) en 2016 y 2017 en l'Albufera y el Fondo d'Elx y tercera cita de gaviota guanaguanare (*Larus atricilla*) en el Campello en 2016. Por último, destacamos igualmente, la cuarta cita de escribano cabecinegro (*Emberiza leucephalos*), la primera fuera de las Columbretes, de una hembra observada en l'Albufera en junio de 2017.

## Organización del anuario

Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las aves observadas en el territorio de la Comunidad Valenciana durante los años 2016 y 2017. La lista taxonómica utilizada para este anuario se basa en la última lista de las Aves de España publicada por SEO/BirdLife recientemente (Rouco et al. 2019). Los nombres comunes, tanto en castellano como en inglés se basan igualmente en esta lista, mientras que los nombres en valenciano provienen de la obra *El nom valencià dels ocells d'Europa* (Miguel & Font, 1990). Para aquellos casos en los que algún nombre no se encuentre en estas listas, se utiliza el nombre publicado en Birds of the World del Cornell Laboratory of Ornithology (Billerman et al. 2020).

Las citas se presentan en dos grupos. En la lista sistemática (I) aparecen todas las especies comunes de las categorías A y C. En la lista sistemática (II) recogemos las citas recibidas de las especies con categorías D y E.

Para la denominación de las localidades y lugares en los que se producen las citas, hemos seguido el nombre oficial actualizado de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (2014). En aquellos casos en los que se utiliza la denominación bilingüe se ha optado por utilizar la forma valenciana. En las citas de cada especie, las localidades aparecen ordenadas de norte a sur, y dentro de cada localidad, las citas se ordenan por fecha.

Cuando dos citas o más que aparecen juntas son de un mismo observador, tan solo se informa el acrónimo en la última. Por otro lado, en este número seguimos la línea abierta en el volumen anterior, de restringir la publicación de un máximo de 3 observadores por cita. Esperamos que esta medida, tomada para facilitar la consulta, sea entendida positivamente por todos los colaboradores.

### ESTUDIOS COORDINADOS

A medida que la ornitología de campo va creciendo, cada vez son más los censos coordinados que se llevan a cabo en nuestro territorio y los trabajos de seguimiento organizados con metodología estandarizadas. Estos trabajos son liderados, bien por la propia Administración, o bien por organizaciones de ornitólogos y naturalistas. Este tipo de trabajos aportan una información de primer orden al cuerpo del Anuario, y en general, al conocimiento de nuestra ornitofauna, ya que normalmente, a través de una depurada metodología y de un seguimiento geográficamente bien planteado, adquieren el carácter de censo en sentido estricto. Algunos de estos seguimientos cuentan ya con una larga serie de años, lo que les confiere un valor adicional muy importante.

Los principales proyectos de seguimiento con los que contamos actualmente en la Comunidad Valenciana son los siguientes:

*Censo de aves acuáticas nidificantes.* Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. Este censo viene realizándose de forma ininterrumpida desde 1984 y es una de las fuentes de datos de mayor calidad sobre la ornitofauna en la Comunidad Valenciana. En este censo se prospeccionan exhaustivamente las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana en época de cría.

*Censo de aves acuáticas invernantes.* Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. El censo es el equivalente al de aves acuáticas nidificantes para la invernada y se lleva a cabo de un modo muy similar.

En los censos de estos dos años han participado más de 60 ornitólogos y 10 asociaciones privadas y organismos públicos. En los datos de estos censos que publicamos no están informados los censadores, como es habitual en el Anuario, ya que en muchas ocasiones resultaría excesivo, en la autoría de las citas se referencia exclusivamente a la Consellería de Infraestructures, Territori i Medio Ambient (CMA). En la página web de la Generalitat se pueden consultar algunos de estos informes en los que están recogidos todos los observadores y los resultados originales <http://www.citma.gva.es/web/biodiversidad/fauna>.

*Censo de aves marinas invernantes del litoral de la Comunidad Valenciana.* Este censo se lleva a cabo una vez al año durante el mes de enero. Tiene por objetivo hacer un conteo de las aves marinas desde un número de puntos de control a lo largo de toda la costa valenciana. Este censo se viene realizando desde el año 2002 de forma casi ininterrumpida. La coordinación es rotativa entre la Societat Valenciana de Ornitologia y distintos ornitólogos de Alicante.

*Censo invernal de aguilucho lagunero.* Censo coordinado por la SVO en la Albufera de Valencia, que cumple 16 años de seguimiento. Cuantifica la población invernal de la especie en uno de los mayores núcleos poblacionales de la península ibérica.

*Programas de anillamiento.* En la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 45 anilladores adscritos al Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife y a la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi del País Vasco. La labor de seguimiento de estos anilladores se lleva a cabo fundamentalmente en zonas húmedas, aunque también en otros ambientes. La labor de anillamiento se enmarcan en programas organizados coordinados (por ejemplo el programa PASER de anillamiento en primavera o proyecto *Piccole Isole*, de anillamiento en paso primaveral en pequeñas islas del Mediterráneo) o bien en proyectos gestionados por las Universidades valencianas o por asociaciones ornitológicas, en forma de Estaciones de Esfuerzo Constante (algunas de las cuales llevan casi 30 años de funcionamiento) o en forma de proyectos de seguimiento específicos de ciertas especies prioritarias. En algunos casos los anilladores ponen esta información a nuestra disposición y pasan a formar parte relevante en el Anuario.

*Programas de seguimiento SEO/BirdLife.* Dentro de los programas de ciencia ciudadana impulsados desde SEO/BirdLife, existen programas de seguimiento que aportan muchas horas de censo y observación de aves en todo tipo de ambientes y a lo largo del año, tratándose de una de las regiones con una mayor y mejor dedicación de ornitólogos que voluntariamente dedican su tiempo libre en mejorar el conocimiento del estado de conservación de las aves de la Comunidad Valenciana. Destacan entre ellos el programa SACRE, que desde 1998 aporta información acerca de las tendencias de aves comunes reproductoras en nuestro territorio, y para el que de hecho se realizan análisis concretos gracias a la buena cobertura de ornitólogos participantes. Otros programas de seguimiento de interés por aportar información ornitológica son el programa SACIN, que pone el foco en las aves comunes invernantes, el programa NOCTUA, que se centra en aves nocturnas, y el programa Aves y Clima, dedicado al estudio de la fenología de aves.

## **CONSERVACIÓN Y CATALOGACIÓN**

A nivel nacional, las especies con un estado de conservación deficiente están recogidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas publicado en la ley 42/2007 desarrollado en el Real Decreto 139/2011 con el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo de Español de Especies Amenazadas. En este Catálogo se establece el listado de especies declaradas En Peligro de Extinción y Vulnerables. De acuerdo con este catálogo, y para las especies con poblaciones en nuestro territorio y con el estado de conocimiento actual, la Comunidad Valenciana actualiza los estados de conservación de las especies de fauna en la Orden 6/2013 en el que se mantienen estos grados de protección y se aumentan para aquellas especies que se consideran y sustituye los anexos I y II del Decreto 32/2004. En esta Orden

indican las 3 categorías de clasificación, las comentadas En Peligro de Extinción y Vulnerables, y las especies Protegidas.

En el cuerpo de las citas indicamos aquellas que especies están catalogadas en una de las 2 primeras categorías:

PE: En peligro de extinción: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando.

VUL: Vulnerables: Aquellas especies que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

### **CATEGORÍA**

Las aves incluidas en la “Lista de las Aves de España” se clasifican en distintas categorías atendiendo al origen de sus poblaciones. Actualmente se utilizan las categorías A, B, C, D y E. Estas categorías fueron desarrolladas por la British Ornithologists’ Union (BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife en España, además de los Anuarios Ornitológicos y en la Lista de las Aves de España.

La mayoría de las aves de un área corresponden a la Categoría A, por lo que tan solo lo indicamos en aquellas especies que no pertenecen a esta categoría.

Los códigos utilizados para definir la categoría de una especie son los siguientes:

Categoría A: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez desde el 1 enero de 1950.

Categoría B: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez hasta el 31 de diciembre de 1949, pero no han sido citadas posteriormente.

Categoría C: Especies que, habiendo sido introducidas por el hombre, de manera deliberada o accidental, han establecido poblaciones reproductoras del grupo introducido, que se mantienen por ellas mismas sin tener que realizar posteriores introducciones. Las subcategorías C1 a C5 que se usaban anteriormente para dar más información sobre el origen de estas poblaciones, se suprimen en la última edición de la lista de las aves de España (Rouco et al. 2019)

Categoría D: Especies que deberían aparecer con categorías A o B pero hay dudas razonables de que jamás se hayan observado en estado natural.

Categoría E: Especies que, habiendo sido introducidas o reintroducidas por el hombre deliberada o accidentalmente en la región, no han establecido poblaciones reproductoras que se mantengan por ellas mismas. Con las siguientes subcategorías:

E1: Especies de las que se ha comprobado la reproducción de forma regular, con poblaciones próximas a establecerse.

E2: Especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular u ocasional, pero no hay indicios de que se encuentren en proceso de establecimiento.

E3: Especies observadas solamente de forma ocasional, sin haberse constatado su reproducción.

**RANGO**

Para todas aquellas especies escasas o raras, se indica el rango de aparición. Este rango se indica con un par de números: el primero indica el número de citas recogidas y el segundo el número de ejemplares implicados. Tras esta información, se indican, entre paréntesis, los meses de aparición. Por ejemplo para el escribano nival 18/17 (oct-mar): indica 18 citas con un total de 17 ejemplares observados entre los meses de octubre y marzo. Para el conteo del rango, algunas de las citas de estas especies escasas, han quedado registradas, como, por ejemplo: “presencia continuada entre el 15 de junio y finales de julio”, en cuyo caso, esta observación ha quedado contabilizada como dos citas. Para el caso de aves raras o escasas marcadas con geolocalizadores que dejan registros en la Comunidad Valenciana, éstos registros no quedan contabilizados en el rango de la especie, aunque sí que lo publicamos siempre que podemos acceder a esta información.

Desde que se publicara el primer volumen del Anuario de la Comunidad Valenciana en 1988, ha habido una serie de años en los que no se editó (1995 a 1997 y de 2003 a 2008), aunque para esta última serie de años, si se cuenta con Anuarios para la Provincia de Castellón. Esta ausencia de datos ha provocado que haya un buen número de citas de interés que están dispersas en páginas web o que están en recopilaciones privadas o aún en las libretas de campo. Esta situación puede alterar la imagen de la presencia de algunas especies. El comité editor está haciendo un esfuerzo por recuperarlas y las vamos incorporando a los rangos a medida que vamos accediendo a ellas, por lo tanto, los rangos que indicamos, pueden estar incompletos para algunas especies.

**ABREVIATURAS UTILIZADAS**

ad.: adulto.

bco.: barranco.

bnc.: barranc.

CR-SEO: Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife.

CRF: centro de recuperación de fauna.

CV: Comunitat Valenciana.

desem.: desembocadura.

EDAR: estación depuradora de aguas residuales.

Emb.: Embassament / Embalse.

MC: morfo claro.

MO: morfo oscuro.

h.: hembra.

indet.: indeterminado (sexo o edad).

inm.: inmaduro.

juv.: juvenil

m.: macho

par.: pareja

pull.: pollo

RAM: red de observación de aves y mamíferos marinos

sp.: especie

ssp.: subespecie

subad.: subadulto

## Listado de colaboradores

AAC	Antonio Alcocer Cordellat	CMA	Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
AAD	Ana Abad	CMO	Carlos Mompó Zornoza
AAE	A. Alemany	CNO	Carlos Nos
AAR	Alex Alamán Requena	CRE	Conrado Requena
AAS	A. Andersson	CRL	Carmen Liberos
ABG	Ángel Berege	CSN	Carlos Saez
ABM	Abraham Mas Garcia	CSW	C. Sweeney
ABU	A. Bueno	CTA	C. Talabante
ACB	Arturo Cabos Blanquer	CVA	C. Vadillo
ACO	Álex Colorado	DAF	Dani Ferrández
ADQ	Adolfo Quiles	DCL	Diego Clemente
AFU	Antonio Fuentes	DCR	D. Cruz
AGC	Agustín Gasulla Carbó	DDD	Dani Díaz-Diethelm
AGF	Alfonso González Flor	DES	Des Norden
AGO	A. Gómez	DFE	Deborah Fandos Fernandez
AJR	Antonio Jacobo Ramos	DGA	D.García
ALF	Alfonso Barba	DGS	Daniel Guijarro Sendra
ALR	Ana Llopis Raimundo	DMF	Daniel Musitu Ferrer
ALV	Alvar Seguí	DMO	D. Mons
AMG	Alberto Martín Gil	DSU	David Santamarí Urbano
ANL	Antonio Llópez Moreno	DWA	D. Warrington
ANZ	Antonio Zamora López	EAAN	Anders Andersson
APL	A. Peral	EAAT	Arcadi Atxa
APN	APNAL-EA	EACO	Adri Colino
ASI	Agustín Signoli	EAJA	Andrew Jarwick
ASL	Agustín Salazar	EALM	Alicia Montesinos
ASM	Antonio Sáez Moñino	EAMA	Abraham Mas
ASS	Ángel Sallent Sánchez	EAOR	Aitor Ormaetxea
ASZ	Ana Sanz Aguilar	EAPC	Antonio Pérez-Crespo Payá
ATR	A. Tormos	EARS	Antonio Rodríguez-Sinovas
AVA	Ana Valentín	EARU	Arturo Rubio
AVDH	Ana Van Der Hofstadt	EASS	Antonio Sansano Sánchez
AVN	A. Villanueva	EATX	Ander Txokarro
BCH	Barry Chambers	EAVA	Anna Valentin
BDJ	Bosco Dies Jambrino	EAVP	Antonio Varona Peña
BGA	Bruno García	EBCT	Brodie Cass Talbott
BGC	Berto Gil Climent	EBDO	Bart Donato
BLO	B. López	EBP	Edgar Bernat Ponce
BMA	B. Martínez	EBNM	BirdNet Murcia
BOR	Jorge Boronat Cortés	EBST	Brian Stone
BSS	Bruno Sanchís Sánchez	EBZ	Elena Baonza
CAG	Carolina García Ruiz	ECAM	Carmen Álvarez Montalbán
CAM	Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV	EDAS	Deidre Asbjorn
CDR	Centro de Recuperación de Fauna "La Granja" del Saler	EDBA	Dominique Bayne
CFA	Carlos Fabregat Lluca	EDDU	Daniel Dumas
CFR	C. Freixeras	EDV	E. del Val
CGE	Carlos Gutiérrez Expósito	EDW	Edward Walker
CGR	Clara García Ripollés	EEAP	Eduardo Angulo Pinedo
CGU	C. Gutiérrez	EEAR	Esteban Argerich
CIZ	Carlos Izquierdo	EEGA	Eusebio García
		EEIV	Edwin Ivonne

EERA	Erik Rask	EWBO	Wannes Bos
EFAD	Félix Arribas Del Álamo	EWME	Willian Menq
EFAL	Fernando Alonso	FAN	Francisco Atienzar
EFCA	Francisco Cabrera	FAZ	F. Aznar
EFMA	Fina Marí	FBO	F. Botella
EFRO	Francisco Robledano	FGL	Francisco García López
EGCS	Gabino Cortés Sánchez	FGR	F. Gran
EGDE	Gonzalo Deán	FJG	F. J. García
EGM	Elías Gomis	FLL	Fran Lloris
EGO	Evarist Gómez	FRB	Fernando Ramia
EGSP	Gonzalo Sanchez Preciado	FRJ	Felip Redó Jornaler
EIGU	Itziar Gutiérrez Uranga	FTD	Fina Trinidad Debón
EJCP	Jesus Carrion Piquer	GAU	Grup Au d'Ornitologia
EJCZ	Jorge Crespo Pérez	GCH	Gregorio Chaguaceda Tomás
EJDR	Jose del Rey Garcia	GDU	Georges Duriaux
EJFO	Jannick Forquignon	GGE	G. Gerritsen
EJGA	José Gómez Aparicio	GGO	Gorka Gorospe
EJGU	Jose Guerra	GGG	Guillermo Gallego Sánchez
EJGV	Juan González Valdivieso	GLF	Gabriel Llorens
EJL	Eduardo Jordan Lamel	GLI	Germán López Iborra
EJLG	Jorge Leonor González	GMG	Guille Mayor Guijarro
EJLM	Jose Leiva Morillas	GOW	Greta Owen
EJMA	Jorge Martinez Alonso	GTR	Grupo GOTUR
EJMO	Juan Monrós	HCO	Helen Commandeur
EJMP	José María Pérez- Crespo Payá	HGA	Héctor Gadea
EJNA	Jose Navarro	IAG	Irene Arnaldos Giner
EJPR	Javier Prieta	IBR	Isabel Bischoping Rosagaray
EJRR	Jesús Ruiz Rodrigo	ICS	Itzy Colodro Sainz
EJTH	John Thompson	IMO	I. Moya
EKA0	Knut Arne	IMR	Isabel Martín Rubusch
EKVV	Kevin Vande Vusse	IPE	I. Pérez
ELCA	Luis Carretero	IRU	Iván Ruiz
ELCO	Luís Correia	IAE	Jose Antonio Esteban
ELL	Enrique Luque López	JAF	Jose Antonio Casañ Ferrer
ELSO	Lluis Sogorb	JAG	José Manuel Aragoneses García
EMAX	Mats Axelsson	JAGA	J. A. García
EMCU	Martha Cutler	JAGO	J. A. Gómez
EMMG	Miguel M. G.	JAI	Javier Armero Iranzo
EMRR	Manuel Robledo Rodríguez	JALO	J. A. López
EMSE	Marcos Sevilla	JAZ	J. Aznar
ENAG	Nati Aguilera	JBC	Josep Bort Cubero
EORE	Óscar Reche	JBL	J. Blasco
EOTH	Olle Thyrestam	JBN	Javi Barón
EPBB	Pedro Bustamante Bustamante	JBS	Juan Bautista Sorlí Guerola
EPBU	Paul Buckley	JCA	Joan Castany Alvaro
EPGM	Pedro García Martínez	JCAR	J. Carrión
EPS	E. Pascual	JCH	José Carlos Hernández
ERCA	Rui Caratão	JCM	Juan Carlos Monzó
ERO	Emilio Rosillo	JCMO	Jacinto Cerdá Moles
ERPI	Roberto Pinar	JCO	Javi Cots
ERWR	Robert Wright	JCRE	J. Crespo
ESA	Eli Sáez Antón	JCS	Juan V. Capella Sancho
ESAR	Sébastien Arriubergé	JDL	Jose Domingo López Manchón
ESBE	Simon Best	JEG	Jesús Gisbert Miralles
ESWR	Sue Wright	JFL	Francisco Jose Llacer
EUG	Eusebio García	JFN	J. Fernández

JFR	Joan Ferré	LLO	Lola López
JGA	Juan García Pertegaz	LMR	L. Moreno
JGAC	J. García	LPC	Luis Pereda Cruz
JGG	Francisco Javier García-Gans	LPP	Leopoldo Pérez Pérez
JGOM	J. Gómez	LUR	Lourdes Urios
JGS	José Antonio Gómez Sanchez	MAA	Miguel Angel Andrés
JHE	J. Hernández	MACA	Miguel Ángel Camacho
JID	José Ignacio Dies Jambrino	MAG	Miguel Ángel Gómez Serrano
JJF	J. Jiménez	MAJ	M. Andújar
JJG	Juan José García Ayllón	MAL	Mateo Aleixos Grau
JJU	J. J. Such	MASA	Maite Santos
JLA	Jose Luis Añó Chavarría	MAT	M. Antón
JLB	Juan Luis Bort Cubero	MAZ	Miguel Ángel Azorín
JLC	Jose Luis Copete	MBM	Miquel Barberá Manrique
JLE	Jose Luis Terrasa	MBT	Manolo Beltran
JLEC	Jose Luis Echeverrías	MCH	Miguel Chardí
JLJ	Juan Luis Morales Jiménez	MCR	Manuel Carrascosa Pérez
JLO	Julio Llorens Bejarano	MCS	M. C. Sanz
JLS	J. L. Sobrino	MFO	M. Förschler
JMA	Jose Miguel Aguilar Serrano	MFS	Marcos Ferrández Sempere
JMD	Jesus Moro Deordal	MGC	M. García
JME	J. M. Benavent	MGR	Mario Giménez Ripoll
JMG	Julio Merayo García	MGT	Manolo García Tarrasón
JMH	Jose María Hernández	MGZ	Marc Gálvez
JMI	Jordi Miralles Garcia	MIA	Michelangelo Morganti
JML	Juan Carlos Monzó López	MIB	Marta Ibañez Agulleiro
JMP	Josep Morera Piera	MIM	Miguel Ángel Martín
JMPU	Julián Martínez Puchades	MLA	Matthieu Lassalle
JMR	J. Martínez	MLG	Martín López García
JMT	Jana Marco Tresserras	MLP	Malcolm Palmer
JNE	J. Neto	MLX	M. Aleixandre
JOB	Joan Balfagón	MMV	Marcial Marín
JOC	José Antonio Cañizares Mata	MNG	Mario Navarro Gomis
JOP	Jose Portillo	MNY	Mika Nylund
JPE	J. Pérez	MPA	Mª Carmen Pla Almenar
JPG	Juan Manuel Pérez-García	MPB	Miguel Piera Bisbal
JPH	Josep Puentes Higuera	MPO	Manu Polo
JPR	J. Peris	MRG	Marta Romero Gil
JRO	Jose Ramon Rodes Martínez	MSL	Manolo Salas
JSG	Juan Sagardía	MTB	Miguel Tirado Bernat
JSMG	Juan S. Monrós González	NAG	Neus Avilés García
JSR	Jose Santamaria Reos	NGA	Nicholas Gatward
JSW	J. Sweeney	NGO	Noel González
JTM	J. Tomás	NLM	Nerea Llopis
JTN	J. Luís Terrasa Nebot	OAP	Oscar Aldeguer Peral
JUI	Juan I. Deán	ODB	Óscar del Baño Pla
JVE	J. Ventura	OLL	Óscar Llama
JVM	J. V. Muñoz	PAB	Pedro A. del Baño Moreno
LAA	Luis Aleixos Alapont	PAG	Pau Gómez
LAM	Luis Albero	PAS	Pablo Santonja
LCL	L. Clement	PBU	Patry Busquets
LDE	Líber Domínguez Espí	PCC	Pep Cantó Corchado
LDG	Laura Diaz Galera	PFP	Pau Ferrer Poblete
LFS	Luis Fidel Sarmiento	PGR	Pepe Greño
LGB	Lucía Gimeno Berga	PIC	Piccole Issole
LGR	Loreto García Román	PLC	P. Alcántara

PLL	Pascual López López	SCR	Stephan Cramer
PLN	Pablo de la Nava	SGA	Suna García
PLP	Pau Lucio	SGM	Sandra Gómez Martínez
PLT	Pepe Lucas	SMO	Sergio Moya
PML	Paco Martín Lorenzo	SMS	Sergi Marzà Sebastià
PMO	Pascual Monferrer Aguilera	SNH	Susana Noguera Hernández
PMON	Paco Montoya	SRC	Sara Rodríguez
PMP	Pedro Marín Prado	SSO	Simeón Solaz
PPA	Pep Portolés Alamà	STH	Steve Thorpe
PPP	Pablo Perales Pacheco	SVO	Societat Valenciana d'Ornitologia
PRP	Pablo Ruiz Pallardó	TFE	Toni Ferrero
PRU	P. Ruiz	TGR	Tomás García Rubio
PSH	Paul Sharp	TJP	Tjasa Prsin
PVG	Pablo Vera García	TMF	Toni Mulet Ferrer
RBA	Ramón Ballester	TPA	Toni Polo Aparisi
RBB	Roque Belenguer Barrionuevo	TPE	Toni Pérez
RBL	R. Belzunce	TPM	Tony Peral Martínez
RCB	Rosario Cantó Bort	TZL	Toni Zaragoza Llenes
RFA	R. Faben	USE	Urmás Sellis
RGG	Raúl García Gregorio	VBJ	Virgilio Beltrán Jordá
RHW	Richard Howard	VCS	Vero Cortés
RLM	Rubén Limiñana Morcillo	VET	Vicent Esteller Turlo
RMB	Rafa Muñoz	VFE	Vicent Ferri
RMO	R. Molins	VFT	Vicente Francisco Tamarit
RMQ	Rafa Marquina	VGA	Víctor Gallego Albiach
RNA	R. Naranjo	VHG	Vicente Hernández Gil
RNU	R. Nussbaumer	VIM	Vicente Moreno
ROL	Rubén Oliver Tomás	VLG	Vicente Llorens
RPB	Ramón Prades i Bataller	VMA	V. Martínez
RPL	R. Plant	VPA	Victor París Huerta
RPM	Rubén Piculo Mateo	VSA	Vicent Selles Alamo
RTV	Robert Tovey	VVA	V. Valle
SAD	Samuel Aunió Díaz	XAA	Xavi Anduix
SAR	Sergio Arroyo	XBC	Xavier Barreda Carbó
SBO	Santiago Bordonado	XGP	Ximo Galarza i Planes
SCEA	Servicio de Control y Educación Ambiental. Clot de Galvany.	YAM	Yanina Maggiotto

## Agradecimientos

A la Consellería de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, y especialmente a Juan Jiménez, Director del servicio de Biodiversidad y a Miguel Ángel Monsalve del equipo de seguimiento de fauna de VAERSA, por la cesión de los datos de los censos de aves nidificantes e invernantes en las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.



# LISTA SISTEMÁTICA

(I)

CATEGORÍAS A Y C

## ANSERIFORMES

## ANATIDAE

***Branta canadensis*****Barnacla canadiense grande - Oca del Canadá - Canada Goose**

Estatus: Originaria de América del Norte. Divagante de núcleos de población asilvestrados del N de Europa. Criterio: todas las citas recibidas. Categoría: C, E3.

**2016**

**Salinas de Santa Pola:** 01.II: 2 ej. (AJR,SAR).

Tras la exitosa introducción de esta especie en numerosos puntos en el siglo pasado, su población actual en Europa alcanza las 80.000 parejas (Keller, 2020). Las poblaciones del N de Europa realizan migraciones que las llevan a alcanzar ocasionalmente el área mediterránea.

***Anser anser*****Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A, E3.

**2016**

**Albufera de València:** 01.VI: 1 ej. volando sin dificultad y receloso en el vedat de Sueca, por lo que parece ser que podría tratarse de un ave silvestre. Cita muy tardía (AAC); observado de nuevo el 06.VI en arrozales de Cullera (BDJ); 09.XI: 3 ej. en el vedat de Silla. Primera cita postnupcial (PMP); 02.XII: 8 ej. en vedats de Sueca (JLE); 10.XII: 6 ej. sobrevolando el Racó de l'Olla y posteriormente en l'estany del Pujol (JTN,JLE); 19.XII: 5 ej. en el Racó de l'Olla (MCH).

**Benidorm:** 17.IV: 1 ej. volando dirección N (JMT).

**El Fondo d'Elx:** 27.II: 6 ej. (EPMG); 25.XI: 7 ej. (JLEC); 09.XII: 3 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**València:** 14.XI: 25 ej. volando en formación sobre los jardines del río Turia (EBCT).

**Albufera de València:** 29.V: 1 ad. sestando. Presente también el 1.VI (MCH,JID,IRU); 23.XI: 2 ej. (JLE).

**Salinas de Santa Pola:** 12.XII: 2 ej. (OAP).

Destacada observación de 25 ej. en vuelo sobre Valencia. Resultan también relevantes las observaciones plenamente estivales de la Albufera de València en 2006 y 2007. Las citas de ejemplares invernantes, muy escasas, se han obtenido entre principios de noviembre y finales de febrero.

***Anser fabalis*****Ánsar campestre - Oca salvatge - Bean Goose**

Estatus: Migrante e invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 11/10 (dic-abr).

**2017**

**Embalse de M<sup>a</sup> Cristina:** 15.I: 2 ej. (PGR,JMI,MJB); observados de nuevo el 28.I (JMI), el 29.I (RMB) y el 11.II (JMI).

Primera cita de ánsar campestre para la provincia de Castellón. La especie no se observaba en la CV desde hace 20 años, con un ej. observado en varias ocasiones en el Hondo en diciembre de 1997.

***Cygnus atratus*****Cisne negro - Cigne negre - Black Swan**

Estatus: Originario Australia. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: C.

**2017**

**Desem. riu Millars:** 17.XII: 1 ej. (JMI).

**Playa de l'Albufereta:** 24.VI: 1 ej. (EOL).

**El Fondo d'Elx:** citas de 1 ej. los días 24.III (ASS); 05.IV (EFAD); 15.IV (ELCA) y 23.IX observado volando en el embalse de Poniente (EAVP).

**Santa Pola:** 25.VI: 1 ej. observado en el mar (MYPSMO).

**Salinas de Santa Pola:** 23.VI: 1 ej. (AJR).

### **Tadorna tadorna**

### **Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck**

Estatus: Migrante e invernante moderado, nidificante escaso localizado. Criterio: Censos destacados, máximos mensuales y citas de interés.

#### **2016**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 1 ej. (JBC).

**Albufera de València:** Máximo invernal de 295 ej.; 08.II: 180 ej. en el Racó de l'Olla (GGO). Citas destacadas en marjales de Catarroja de 69 ej. el 16.III en campos fangueados (AAC); 76 ej. en arrozales apenas encharcados el 18.III (BDJ) y máximo de 102 ej. el 20.III (AAC); 07.IV: 44 ej. en el tancat de Milia (JJF,BDJ); 9 par. nidificantes (CMA); 02.XII: aproximadamente 200 ej. en el vedat de Sueca (JLE).

**Embalse de Escalona:** 16.I: 8 ej. (PAB,GGs).

**Salinas de Calpe:** 9 par. nidificantes (CMA).

**Salinas de Santa Pola:** 5 par. nidificantes (CMA). Censos mensuales destacados de 444 ej. el 22.I (AJR); 400 ej. el 18.III (AJR,SAR); 156 ej. el 06.V; 344 ej. el 24.XI (AJR) y 511 ej. el 20.XII (SAR).

**Hondo de Amoros:** 29.II: 83 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** Máximo invernal de 860 ej. (CMA).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** Máximo invernal de 106 ej. (CMA). Máximos destacados de 287 ej. el 21.III y de 177 ej. el 10.VI (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 15.III: 11 par. (AJR).

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.IV: 2 ej. Primera cita anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 17.IV: 13 ej. (AAC); 5 par. nidificantes (CMA); 27.X: 41 ej. en el tancat de Milia (HGA); 05.XII: 1.250 ej. en el censo de anátidas. Máximo histórico en l'Albufera (AAC,JID,BDJ).

**Requena:** 04.VI: 4 ej. (RMB).

**El Saladar de Agua Amarga:** 21.IV: 12 ej. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 7 par. en el censo de nidificantes (CMA); 22.III: 404 ej. (SAR); 10.IV: 184 ej.; 03.XI: 309 ej. (AJR,SAR); 12.XII: máximo invernal de 591 ej. (SAR).

**Catral:** 05.IV: 8 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 3 par. nidificantes (CMA); censos destacados de 90 ej. el 04.X y de 178 ej. el 30.X (SAR); censo de invernantes de 906 ej. (CMA).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 09.V: 176 ej. (SAR); censo de nidificantes de 12 par.; censo de invernantes de 141 ej. (CMA).

La población invernante de tarro blanco se concentra, como es habitual, en los humedales del S de Alicante, superando los 1.500 ej. La población nidificante, por otro lado, se mantiene entorno a las 40 parejas, también concentradas en los humedales suralicantinos.

### **Tadorna ferruginea**

### **Tarro canelo - Ànec canyellat - Ruddy Shelduck**

Estatus: Visitante del N de África, escapado de cautividad. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 25/80 (feb-nov). Categoría: A, E3.

#### **2016**

**El Fondo d'Elx:** 27.II: 1 ej. (EPGM); 26.V: 1 ej. (EKVV).

**2017**

**Embalse de Amadoiro:** 11.III: 3 ej. que llevan 3 años en el pantano, posiblemente un escape; 26.V: 2 ej. (JLJ).

**Benifallim:** 13.V: 1 ej. en el parque de la zona N (JEG).

**Albufera de València:** 21.VI: 1 ad. (JID,MCH), observado el día 22 en el tancat de Milia (BDJ,GGO,EPS).

**El Fondo d'Elx:** 27.VI: 2 ej. junto al centro de interpretación (EAVP); 28.VII: 10 ej. (AJR,ERO).

El origen de los tarros canelos observados en la Comunidad Valenciana, al igual que ocurre en otras muchas áreas, es muy dudosa, mientras que se acepta que una parte de estas aves podrían provenir de ejemplares dispersivos desde poblaciones salvajes en el N de África, especialmente aquellas que ocurren durante el verano -y que serían una respuesta a la escasez de agua en sus zonas de origen (Carboneras & Kirwan, 2020a)- otras son indudablemente escapes o aves asilvestradas que incluso llegan a criar, como ocurre en varios países de Europa, aunque este extremo no se ha registrado en la Comunidad Valenciana.

***Aix galericulata*****Pato mandarín - Ànec mandarí - Mandarin Duck**

Estatus: del E de Asia. Naturalizado. Escapado de cautividad. Categoría: C, E2.

**2016**

**Cocentaina:** 01.XI: 1 m. volando (EACO).

***Spatula querquedula*****Cerceta carretona - Roncadell - Garganey**

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Criterio: Citas invernales y estivales, fechas extremas, censos destacados, citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 28.VIII: 8 ej. Primera cita postnupcial; 29.VIII: 12 ej. Máximo postnupcial (MTB).

**Albufera de València:** 25.I: 5 ej. en el Racó de l'Olla. Máxima concentración invernal. Presentes también el 01.II (JID,MCH,IRU); 27.II: 11 ej. (EPS); 05.V: 1 par. en una de las lagunas del tancat de la Pipa (DMO); 10.VI: 1 h. en la misma zona en la que nidificó en 2015 (PVG); 17.VII: 2 ej. h. /juv. Primer registro postnupcial (PMP) 10.VIII: 5 ej. (AVA); 16.VIII: 9 ej. (BDJ).

**El Pinet:** 20.IX: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 29.VIII: 8 ej. (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.II: 2 ej. Primera cita prenupcial (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 12.I: 1 ej. (JID,MCH); 10.III: 3 ej. Primera observación prenupcial (JID,MCH); 13.III: 39 ej. (sólo 5 h.) en el tancat de Milia (JJE,ATR); 22.VII: 1 h. y 5 pull. de 4-5 semanas en el tancat de la Pipa (AVA); 15.XI: 1 ej. (JID), continúa presente el 25.XI (JLE) y el 4.XII (JID,MCH,GGA).

**Marjal de Xeresa-Xeraco:** 2 par. Censo de aves nidificantes de la CV (CMA).

**El Saladar de Agua Amarga:** 19.III: 24 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 15.III: 42 ej. (SAR,EDW); 18.III: 26 ej. (AJR,SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 07.VI: 1 m. (SAR).

Destacan los eventos de nidificación en la Albufera y en la marjal de Xeresa-Xeraco de esta anátida con registros de aves nidificantes muy escasos en la CV.

***Spatula clypeata*****Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler**

Estatus: Invernante común, migrante moderado. Criterio: Citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.

**2016**

**Albufera de València:** 09.III: 260 ej. en zonas inundadas de Catarroja (AAC); 23.III: 112 ej. (78 m.) (BDJ);

13.IV: 6 ej. (MFO,EDV); 02.VI: 2 m. y 1 h. en la Mata del Fang (MCH,JID,JVM); 23.IV: 1 par. (PMP,JMR); 27.VII: 3 ej. tipo h./juv. Primeros registros postnupciales (BDJ).

**Embalse de Bellús:** 21.II: 92 ej. (BOR).

**El Fondo d'Elx:** 29.I: 633 ej. (SAR); 18.II: 10.300 ej. concentración destacada no vista en años (JMT, MFS); 29.II: 2.500 ej. (AJR,SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 08.X: 22 ej. Máximo anual (MTB, JAF).

**Marjal dels Moros:** 04.V: 1 m. ad. (RMB); 1 par. Censo de aves nidificantes de la CV (CMA).

**Albufera de València:** 21.V: 2 m.y 1 h. (BDJ); 10.VII: 4 ej. Primera cita postnupcial (YAM,GGO).

**Requena:** 02.IX: 13 ej. Máximo anual (RMB).

**Embalse de Bellús:** 04.VI: 1 m; 06.VIII: 1 m. (BOR).

**Clot de Galvany:** 26.XII: 127 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 20.II: 790 ej. (SAR); 04.III: 500 ej. (JBN,MNG); 13.III: 1.178 ej. (SAR).

Localidad	2016	2017
	Invernantes	Invernantes
Marjal dels Moros	280	1.304
Marjal de Rafalell y Vistabella	38	-
Albufera de Valencia	3.441	4.828
Embalse de Bellús	79	24
Clot de Galvany	53	58
Salinas de Santa Pola	49	145
El Fondo	7.233	6.160
Embalse d'Elx	19	20

*Censos de pato cuchara invernante en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que invernaron al menos 20 ej. Se ha detectado en un total de 16 de 44 humedales censados para un total de 11.257 ej. en 2016 y en 13 de 45 humedales con un total de 12.666 ej. en 2017). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

## Mareca strepera

## Ánade friso - Ascle - Gadwall

Estatus: Nidificante escaso localizado. Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas estivales, censos destacados, citas de interés.

## 2016

**Marjal dels Moros:** 64 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 18.IV: 30 ej. Se observan cortejos (RMB). 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Albufera de València:** 82 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 11.III: 88 ej. Cifra prenupcial destacada (JID); 21.IV: 4 par. haciendo cortejos en el tancat de la Pipa; 16.VI: 1 h. seguida de 3 pull (AVA).

**Marjal de Xeresa-Xeraco:** 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**El Fondo d'Elx:** 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Salinas de Santa Pola:** 30.IV: 3 ej.; 10.V: 2 m. (AJR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 12.II: 8 ej. Máximo anual en balsas de Torreblanca (MTB, JAF).

**Marjal dels Moros:** 20.III: 23 ej. (GGO, YAM); 02.IV: 20 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 82 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 23.III: 24 par. y 7 m. en el tancat de la Pipa y la punta de Llebeig; 21.V: 22 ej. (BDJ); 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Marjal de Xeresa-Xeraco:** 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Catral:** 05.IV: 2 ej. (SAR).

**Lagunas de Lo Monte:** 24.IV: 3 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Mareca penelope****Silbón europeo - Piuló - Eurasian Wigeon**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: máximos mensuales, censos destacados, citas estivales, fechas extremas.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.XI: 3 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 27.II: 3 ej. en el tancat de la Pipa (EPS); 01.III: 14 ej. en la punta de Llebeig (PVG,MGR,LMR); 07.III: 3 par. en marjales de Catarroja (AAC); 07.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (MCH,GGA).

**Requena:** 06.III: 1 m. Se trata de la segunda cita conocida para la localidad (JAI,RMB).

**Embalse Beniarrés:** 04.XII: 4 ej. (BOR).

**Salinas de Santa Pola:** 11.I: 49 ej. Máximo del segundo tramo invernal (AJR,SAR); 23.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 01.X: 3 ej. Primera cita postnupcial; 01.XII: 39 ej. (AJR); 20.XII: bando destacado de 203 ej. (SAR); 21.XII: 138 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.I: máximo invernal de 16 ej. (JMT,OAP,MFS); 18.II: 3 ej. (JMT,MFS); 03.III: 2 ej. (JMT,FBO); 25.XI: 50 ej. (JMT,OAP,MFS).

**EDAR de Santa Pola:** 11.I: 10 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 25.III: 3 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 11.II: 45 ej. en la mata del Fang (JOB); 21.XII: 127 ej. en el la laguna (AAC); 03.XII: 5 ej. en la Devesa (JAZ).

**Embalse de la Pedrera:** 13 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).

**Salinas de Santa Pola:** 205 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 02.II: 37 ej. (AJR); 22.III: 32 ej. (SAR); 12.IV: 4 ej.; 28.X: 14 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 30.IX: 5 ej. (PLP).

**Anas platyrhynchos****Ánade azulón - Coll-verd - Mallard**

Estatus: Residente e invernante común. Criterio: Censos de cría e invernada, citas de interés. Categoría: A, E2.

Localidad	2016		2017	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	13	122	12	34
Marjal de Almenara-Sagunto	72	12	8	28
Marjal dels Moros	72	426	38	224
Albufera de Valencia	1.582	13.783	3.441	9.105
Marjal de Xeresa-Xeraco	100	12	100	14
Marjal de Pego-Oliva	70	143	45	220
Clot de Galvany	6	55	7	50
Salinas de Santa Pola	50	65	2	15
El Fondo	171	216	67	129
Embalse de la Pedrera	4	32	2	155

*Censos de ánade azulón en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 20 parejas o invernaron 100 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 21 de 30 humedales para un total de 2.221 par. en 2016 y en 24 de 31 humedales con un total de 3.817 par. en 2017). Como invernante se ha detectado en un total de 30 de 44 humedales censados para un total de 15.411 ej. en 2016 y en 37 de 45 humedales con un total de 10.506 ej. en 2015). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

**Anas acuta****Ánade rabudo - Cua de jonc - Northern Pintail**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 1.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 184 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 13.IV: 2 m. en el tancat

de la Pipa (MFO,EDV); 25.V: cita tardía de 1 m. en el tancat de la Pipa (AVA); 9.IX: 1 juv. en la mata del Fang. Primera cita postnupcial (JID,MCH); 24.X: 15 ej. (JOB).

**Embalse Beniarriés:** 06.XII: 2 ej. (BOR).

**El Fondo d'Elx:** 14.I: 100 ej. Máximo invernal (JMT,OAP,MFS); 18.II: 38 ej. (JMT,MFS).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 6.V: 1 ej. Última cita primaveral; 1.X: 3 ej. Primera cita posnupcial (MTB, JAF).

**Albufera de València:** 41 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 11.IV: 1 m. en el tancat de la Pipa (AVA,VLG,BDJ); 29.IX: primera cita postnupcial de 9 ej. en la mata del Fang (MCH,JID,GGA); 06.XII: 512 ej. en la marjal de Cullera (BDJ).

**El Fondo d'Elx:** 30.XII: máximo invernal de 100 ej. (EJGU,MGZ).

La cifra de 41 ánades rabudos invernantes en l'Albufera en 2017 es la más baja desde el año 2000, que ha llegado a superar el millar de ejemplares en algún año. Las cifras son igualmente modestas en el Hondo. En total, tan solo se ha detectado como invernante en estos dos humedales, desapareciendo de otras localidades en las que resultaba más o menos habitual como la marjal de Pego-Oliva o la dels Moros.

## Anas crecca

## Cerceta común - Sarset - Common Teal

Estatus: Invernante y migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas, citas de interés.

## 2016

**Desem. río Mijares.** 10.I: máximo invernal de 70 ej. (MBM).

**Albufera de València:** 25.IV: 2 h. en la orilla N de la laguna. Cita tardía (AAC,EGO); 22.VII: 2 ej. Primer registro postnupcial (BDJ,JFF); 22.IX: 45 ej. en el tancat de Milia (BDJ).

**Embalse de Bellús:** 21.II: máximo anual de 19 ej.; 18.VI: cita estival de 1 ej. (BOR).

**Pantano de Elche:** 28.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (OAP).

**Clot de Galvany:** 13.III: 60 ej. (JMT,AVDH); 26.VII: 1 ej. Primera observación postnupcial (AJR).

## 2017

**Desem. río Mijares:** 15.V: 1 m. Última cita primaveral (MBM).

**Albufera de València:** 5.VII: primera cita posnupcial de 1 ej. en marjales de Sollana (JOB,HGA).

**Clot de Galvany:** 02.I: máximo invernal de 187 ej.; 01.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial temprana; 26.XII: máximo destacado de 165 ej. (AJR).

Localidad	2016	2017
	Ejemplares invernantes	Ejemplares invernantes
Desem. río Mijares	21	120
Marjal dels Moros	350	1.353
Albufera de Valencia	2.188	1.844
Clot de Galvany	54	169
Salinas de Santa Pola	0	42
El Fondo	802	150

*Censos de cerceta común invernante en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que invernaron al menos 50 ej. Se ha detectado en un total de 11 de 44 humedales censados para un total de 3.462 ej. en 2016 y en 16 de 45 humedales con un total de 3.785 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

## Marmaronetta angustirostris

## Cerceta pardilla - Rosseta - Marbled Teal

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Reintroducido. Criterio: datos de nidificación, censos destacados en localidades de cría y citas de interés. Conservación: PE. Categoría: A, E3.

## 2016

**Marjal dels Moros:** 07.IV: 1 ej. (RMB). No nidifica (CMA).

**Marjal de Rafalell y Vistabella:** 24.V: 1 ej. (MAG).

**Albufera de València:** 13.V: 1 par. Ambos anillados del programa de reintroducción de la especie (JVM, BLO,MGC); 25.V: 1 m. sin anilla metálica (JID,MCH,IRU); 01.VIII: 1 h. y 8 pull. crecidos pero aún incapaces para el vuelo en arrozales aclarados cercanos a l'Albufera (MAJ); 04.X: 2 ej. (JVM).

**Pantano de Elche:** 10.VII: 9 ej. (OAP).

**Salinas de Santa Pola:** 07.VII: 4 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 23.III: 22 ej. procedentes de *hacking* (AJR); 07.IV: 30 ej., 26 anillados procedentes del programa reintroducción y 4 sin anillas (JMT); 15 par. nidificantes (CMA); 23.XII: 1 ej. (JMG,OAP,MFS).

**Lagunas de Lo Monte:** 11.VI: 4 ej. (PPP).

**EDAR de Santa Pola:** 20.IX: 3 ej. (SAR).

## 2017

**Albufera de València:** 11.I: 1 ej. (MCH,JID); 20.III: nueva observación de 1 ej. en el Racó de l'Olla. Seguramente se trate del mismo ejemplar observado de forma intermitente durante el invierno. Hoy han sido liberados en la reserva 5 ej. en el marco de un programa de conservación de la especie desarrollado por la Generalitat Valenciana. Estas aves liberadas ahora llevan anillas de PVC de color amarillo con dos dígitos que permitirán su reconocimiento (MCH,GGA,BLO,JID); 10.VII: 4 ad. mudando las plumas de vuelo (JID,MCH); 26.VII: al menos 5 ad. en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 06.VIII: 3 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 07.VIII: 1 ad. y 1 pull. de 6 semanas de edad (MCH,JID); 07.VIII: 6 ej. en el tancat de la Pipa (BDJ); 30.X: 3 ej. (MCH,JID,GGA).

**El Fondo d'Elx:** 3 par. nidificantes (CMA); 19.II: 12 ej. marcados, del programa de reintroducción (YAM); 18.IX: 10 ej. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 1 par. nidificante (CMA).

La población reproductora de cerceta pardilla alcanza mínimos históricos en 2017 con tan solo 5 parejas.

## Netta rufina

## Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard

Estatus: Residente y nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Sant Jordi:** máximo anual de 100 ej. el 31.III en la balsa de riegí IRYDA; 26.IV: 14 par. (ELL).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 02.X: 112 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 01.III: 243 ej. Grupo prenupcial destacado en la punta de Llebeig (PVG,MGR, LMR).

**EDAR de Santa Pola:** censos destacados de 510 ej. el 27.II y de 557 ej. el 08.III (AJR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 12.III: 158 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 21.III: máximo anual de 178 ej. (JLB).

**Marjal dels Moros:** 04.V: concentración destacada de 80 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 18.XI: concentración de 1.540 ej. en la mata del Fang (GGO).

Localidad	2016		2017	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Balsa de Sant Jordi	-	18	-	41
Marjal dels Moros	29	180	12	120
Albufera de Valencia	37	5.669	24	1.705
Salinas de Santa Pola	21	6	18	3
El Fondo	331	190	70	138

*Censos de pato colorado en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 5 parejas o invernaron al menos 20 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 10 de 30 humedales para un total de 431 par. en 2016 y en 10 de 31 humedales con un total de 138 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 8 de 44 humedales censados para un total de 6.148 ej. en 2016 y en 10 de 45 humedales con un total de 2.139 ej. en 2017. Datos del Servei de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

**EDAR Santa Pola:** concentraciones destacadas de 295 ej. el 27.II; 199 ej. el 15.III y de 110 ej. el 14.IV (SAR).  
**Salinas de Santa Pola:** concentración destacada de 134 ej. el 30.III (SAR).

### **Aythya ferina**

### **Porrón europeo - Boix - Common Pochard**

Estatus: Migrante e invernante común, nidificante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.VIII: 15 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Sumacàrcer:** 16.I: 17 ej. (PAB,GGS).

**Charca de Balsares:** censos destacados de 93 ej el 22.II y de 18 ej. el 08.III (AJR).

**Charca de la Manzanilla:** 25.IV: 4 par. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 14.XII: 1 h. con placa nasal verde con inscripción (=4) (JMT,OAP).

**El Fondo d'Elx:** censos destacados de 542 ej. el 08.II; 1.380 ej. el 15.II y de 46 ej. el 16.V (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** máximo anual de 60 ej. el 20.IX (SAR).

Localidad	2016		2017	
	Par. nidif.	Ej. inver.	Par. nidif.	Ej. inver.
Marjal de Almenara-Sagunto	12	1	0	0
Marjal dels Moros	6	6	10	0
Albufera de Valencia	14	35	20	273
Clot de Galvany	4	2	7	8
Salinas de Santa Pola	33	0	28	8
El Fondo	536	2.282	133	1.062
EDAR Pilar de la Horadada	5	27	11	3

*Censos de porrón común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 5 parejas o invernaron al menos 20 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 9 de 30 humedales con un total de 612 par. en 2016, y en 8 de 31 humedales con un total de 214 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en 9 de 44 humedales censados con un total de 2.364 ej. en 2016 y en 6 de 45 humedales con un total de 1.369 ej. en 2017. Datos del Seroici de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 18.X: 16 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Segorbe:** 14.II: 11 ej. en la laguna del Gabacho (JMA).

**El Fondo d'Elx:** 08.II: máximo anual de 1.757 ej. (AJR).

**Desem. del río Segura:** 03.XI: máximo anual de 30 ej. (AJR,SAR).

**EDAR Santa Pola:** máximo anual de 117 ej. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** máximo anual de 109 ej. (SAR).

### **Aythya nyroca**

### **Porrón pardo - Roget - Ferruginous Duck**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

#### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.IX: 2 ej. Única cita anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 27.I: 1 h. en la mata del Fang (MCH,JID,GGA); 21.II: 2 ej. (1 pos. m.) (EPS); 02.III: 1 m. en la mata del Fang (JID); 01.III: 1 m. y 2 h. en la punta de Llebeig (PVG,MGR,LMR); 07.V: 1 m. en el tancat de la Pipa. Presente también el día 11 (AVA); 24.XI: máximo anual de 7 ej. en la mata del Fang (JOB); 22.XII: 1 m. asociado a un pequeño grupo de porrones comunes en campos inundados cercanos al tancat de Milia (AAC).

**Pantano de Elche:** 04.I: 1 h. observada de manera continuada hasta el 12.IV (OAP,SAR); 20.XII: 1 m.; 28.XII: 1 par. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 2 ej. observados el 22.II, el 29.II (AJR,SAR), el 03.XII (MIM,CRL) y el 30.XII (OAP); 09.XII: 1 h. (AJR,SAR); 10.XII: 1 ej. diferente al visto anteriormente (AJR); 11.XII: máximo anual de 2 h. y 1 m. (PCC,JEG); 13.XII: 1 h. ad. (JMT,OAP).

**Orihuela:** 24.II: 1 h. en Torremendo (PPP,TGR,CSN).

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 19.III: 2 ej. (JCA,PMO); citas de 1 ej. el 14.VII, el 04.VIII, el 21.VIII (1 h.)

(MTB,JAF) y el 25.IX (1 m.) (PGR); 08.X: 2 ej. (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 05.I: 3 ej. (YAM); 23.I: 2 m. sesteando en la mata del Fang. Presencia regular durante la invernada de ej. aislados (MCH,JID,GGA); 22.II: 2 m. (MCH,JID); 08.III: 1 ej. (MNY); 05.IV: 1 m. realizando pautas de cortejo con h. de porrón europeo (JID); 18.IX: 1 ej. (h. o inm.) en la mata del Fang Primera cita postnupcial (MCH,JID,GGA). Este ej. seguramente fue cazado a orillas del canal de la Junça a mediados de octubre (JID,MCH); 05.X: 1 ej. (JOB); 23.XI: 3 ej. en el vedat de Silla (AAC); 10.XI: 1 m. en la mata del Fang; 05.XII: 1 m. y 1 h. (MCH,JID,GGA).

**Pantano de Elche:** observaciones continuadas entre el 06.I (1 h.) y el 06.IV (1 h.), con máximos de 3 ej. (1 m. y 2 h.) del 29 al 31.I; única cita postnupcial de 2 m. el 26.XII (OAP).

**Clot de Galvany:** 30.XII: 1 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 1 h. el 27 y el 28.III (AJR).

**El Fondo d'Elx:** observaciones continuadas entre el 04.II (1 h.) (JMT,ACO) y el 06.V (BOR,DMF), con máximo de 3 ej. el 08.II (AJR). Citas postnupciales de 1 ej. el 30.IX (PLP), el 20.X (JPG) y el 20.XI (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 1 m. el 24 y el 28.XII (OAP).

### ***Aythya nyroca x ferina***

**Hibrido porrón pardo x común**

#### **2016**

**Albufera de València:** 05.II: 1 m. (MCH,JID).

**Pantano de Elche:** 21.IX: 1 ej. (OAP).

**Elx:** 08.III: 1 ej.; 10.III: 1 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 08.III: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 11.XII: 5 ej. (PCC,JEG,VFE); 13.XII: 2 m. (JMT,OAP).

#### **2017**

**Albufera de València:** 12.I: 1 m. en la Mata del Fang (MCH,JID); 21.III: 1 m., posiblemente el mismo, es observado el 3.IV, el 27.IV, el 29.V y el 5.VI (JID,MCH,GGA).

**Clot de Galvany:** 30.XII: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 08.II: 4 ej.; 15.II: 1 ej. (AJR).

**EDAR de Santa Pola:** 24.XII: 1 ej. presente también el 28.XII.17 (OAP).

### ***Aythya fuligula***

**Porrón moñudo - Morell capellut - Tufted Duck**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Albufera de València:** 24.II: 1 m. inm. en el Racó de l'Olla. Primera cita anual en temporada en la que ha resultado muy escaso (MCH,JID,IRU); 08.IX: 1 m. en la mata del Fang. Primer registro postnupcial excepcionalmente temprano (RNU); 10.XII: 3 ej. en l'estany del Pujol (GGO).

**Requena:** 04.XII: 5 ej. Primera cita para la comarca (RMB); 11.XII: 1 m. y 1 h. ad. en plumaje invernal (JAI).

**Xàbia:** 13.XI: 1 juv. en el cabo de San Antonio (PLP).

**El Fondo d'Elx:** máximos mensuales de 11 h. y 1 m. el 20.I (SAR) y de 24 ej. el 29.II (AJR,SAR); última cita prenupcial de 4 ej. el 10.III (PCC); 02.XI: 3 ej. Primera cita postnupcial (SAR); máximo en diciembre de 20 ej. el 09.XII (AJR,SAR).

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.XII: 1 m. Única cita anual (MTB,JAF).

**Marjal dels Moros:** 1 m. observado el 19 y el 23.III (AAD).

**Albufera de València:** 03.XI: 1 m. juv. en la mata del Fang. Primera cita postnupcial (MCH,JID,GGA); 23.XI: 7 ej. (2 m.) en el vedat de Silla (AAC).

El Fondo d'Elx: máximos mensuales de 53 ej. el 08.II (AJR) y de 22 ej. el 10.III. Sin citas postnupciales.  
EDAR de Santa Pola: 27.II: 1 ej. (SAR); 24.XII: 1 ej. (OAP).

**Melanitta fusca****Negrón especulado - Morell de mar fosc - Velvet Scoter**

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 53/71 (nov-mar).

**2016**

La Vila Joiosa: 06.XII: 1 h. en el embalse de la EDAR (EGM,MAA,TZL).

Santa Pola: 08.XII: 1 ej. observado desde la playa de la Marina (AFU).

**2017**

Albufera de València: 30.I: 2 ej. en la Devesa del Saler, aumentando a 3 ej. el 15.II (YAM).

Santa Pola: 02.I: 1 h. en la playa de la Marina (AJR).

Desemb. río Segura: 14.I: 1 h.; 03.II: 1 ej. (AJR).

Guardamar del Segura: 08.III: 1 ej. observado desde el faro. Posiblemente el mismo observado en la desm. del Segura (RHW,AFU).

**Melanitta stejnegeri****Negrón siberiano - Ànec fosc siberià - Stejneger's Scoter**

Estatus: Divagante de Norteamérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 17/1 (dic).

**2016**

Santa Pola: 06.XII: 1 m. ad. en la playa de la Marina (JMT,OAP). Observado de forma ininterrumpida entre la playa de la Marina y la playa del Pinet, con último registro el 22.XII (LFS).

Especie estrechamente emparentada con el negrón especulado (*M. fusca*) y con el negrón aliblanco (*M. deglandi*) del que ha sido recientemente separado (Brown & Fredickson, 2020). Primera cita para la Comunidad Valenciana y segunda para España. Se puede leer un resumen completo de la observación en: <https://ahsa.org.es/avifauna/negrón-aliblanco-siberiano-melanitta-deglandi-stejnegeri-la-playa-la-marina-resumen-descubrimiento>.

**Melanitta nigra****Negrón común - Morell de mar negre - Black Scoter**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados.

**2016**

Peñíscola: 05.XI: 8 ej. Primera cita postnupcial (JLA,ELL,BGC).

Alcossebre: 29.XI: 4 ej. Única cita anual (DES).

Marjal dels Moros: 29.XII: 3 ej. (YAM).

Desemb. del Carraixet: 22.XII: 59 ej. (RMB).

Albufera de València: 03.I: 12 ej. frente a la Malladeta (YAM); 20.II: 12 ej. en la playa de la Garrofera. Última cita prenupcial (PLL,CGR); 27.XII: 14 ej. en el litoral de la Devesa (BDJ).

Cabo de Cullera: 11.XII: 9 ej. (JMT).

Santa Pola: 20.II: 15 ej. en la playa de la Marina (OAP); conteos destacados en la playa del Pinet de 20 ej. el 09.XII (JMT,GMG,OAP); 45 ej. el 15.XII y de 25 ej. el 31.XII (AJR).

Desemb. río Segura: máximo en enero de 13 ej. el día 31 (JMT,OAP,AJR); última cita prenupcial de 9 ej. el 12.II (AJR); 20 ej. el 06.XII (JMT,OAP).

**2017**

Puerto de Peñíscola: 14.I: máximo anual de 8 ej. el 14.I (ELL,BGC).

Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.III: 2 ej. Única cita anual (MTB,JAF).

Burriana: 04.II: 11 ej. volando al S (MIB,JLB,JBC).

**Albufera de València:** máximos destacados de 41 ej. el 31.I (YAM) y de 45 ej. el 19.II (VPA).  
**Xeraco:** 09.XII: 2 ej. (h. o juv.) (AAC).  
**Santa Pola:** 04.I: 21 ej. en la playa del Pinet (AJR); 08.III: 27 ej. en la playa de la Marina (SAR).  
**Desemb. río Segura:** 14.I: 26 ej. (CAM); 03.II: 24 ej. (AJR).  
**Guardamar del Segura:** 08.III: 25 ej. (RHW,AFU).

### ***Clangula hyemalis***

### **Pato havelda - Ànec glacial - Long-Tailde Duck**

Estatus: Divagante del N de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 28/11 (nov-abr; jul).

#### **2016**

**Albufera de València:** 21.XII: 2 ej. (h./inm.) en el racó de l'Olla (MCH,AAC), cuatro nuevas citas hasta el día 30.XII (JOB).

#### **2017**

**Albufera de València:** 02.I: observados los 2 ej. detectados a finales de 2016 (YAM,GGO,VBJ) de forma regular en el Racó de l'Olla y en la Mata del Fang hasta el 21.III (GGO); 28.III: observación de sólo 1 de los ej. hasta el 7.IV (JID,MCH,BLO).

La especie no se citaba en la Comunidad Valenciana desde hace 25 años. La última correspondió a un ejemplar observado en el mes de julio en Vinaroz.

### ***Bucephala clangula***

### **Porrón osculado - Retoret - Common Goldeneye**

Estatus: Invernante raro del N de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 18/7 (dic-abr).

#### **2017**

**Marjal dels Moros:** 09.IV: 1 h. (AAD,FLL,BGA). Observada diariamente hasta el 14.IV (EJLG,GGO,YAM).

Primera cita para el mes de abril de esta rara anátida del N de Europa y tan solo segunda cita para el s. XXI, tras la observación de una h. en el Fondo d'Elx en febrero de 2009.

### ***Mergus serrator***

### **Serreta mediana - Bec de serra mitjà - Red-breasted Merganser**

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2016**

**Vinaròs:** 17.XII: 2 ej. (APN).

**Alboraya:** 10.I: 2 ej. (h. o juv.) en la desem. del Carraixet (AAC). Presentes hasta el 28.II (ESBE,VBJ).

**Salinas de Santa Pola:** 18.XI: 1 ej. (AJR).

#### **2017**

**Vinaròs:** 13.XI: 1 h. en la desem. del riu Servol. Permanece en la zona hasta el 24.XI (MBT).

**Alcossebre:** 05.XII: 1 ad. (DES).

**Marjal dels Moros:** 12.IV: 5 m. y 1 h. (AAD,JPH). Solo 1 h. los días 13 (EJNA,JOB) y 14.IV (YAM,GGO,EJLG).

**Altea:** 06.I: 1 ej. (GMG).

### ***Oxyura leucocephala***

### **Malvasía cabeciblanca - Ànec capblanc - White-headed Duck**

Estatus: Invernante escaso, nidificante raro. Criterio: máximos mensuales en zonas de cría y citas de interés. Conservación: PE.

#### **2016**

**Marjal dels Moros:** 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Albufera de València:** 01.IV: 1 h. ad. (JLS,MAZ).

**Clot de Galvany:** 24.V: 1 h. con 5 pull. y 2 m. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 1.307 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 04.III: 6 pull. Cita de cría muy temprana (AJR); 66 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Lagunas de Lo Monte:** 05.II: 12 ej. (AJR,SAR); 11.VI: 7 ej. (PPP).

**Embalse de Elche:** Presencia continuada a lo largo del año con máximo de 10 ej. (incl. 1 h. con 5 pull.) el 23.VII (OAP); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Charca de Balsares:** 15.III: 3 m.; 21.V: 2 m.; 04.VI: 2 m. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**EDAR de Santa Pola:** 11.VIII: 12 ej. (OAP); 18.X: 13 ej. (SAR).

**EDAR Pilar de la Horadada:** 3 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.VIII: 1 ej. (h. o juv.) buceando y arreglándose el plumaje, nueva cita de 1 ej. (h. o juv.) el 01.X. Muy rara en la localidad (MTB,JAF).

**Marjal dels Moros:** Presencia continuada a lo largo del año con máximo de 16 ej. los días 20.VIII (AAC) y 05.IX (RMB); 4 par. nidificantes. Censo de aves nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA).

**Albufera de València:** 14.II: 1 m. ad. (MCH,JID,GGA); 28.III: 1 par. en la punta de Llebeig (BDJ); 09.IX: 3 ej. (h. o juv.) en l'estany del Pujol, observados de forma regular hasta el 22.IX (JOB); 25.IX: 4 ej. en l'estany del Pujol. Máximo hasta la fecha en l'Albufera (JOB,EPS).

**Pantano de Elche:** 06.I: 5 ej.; 07.II: 5 ej. (OAP); 12.IX: 4 ej. (SAR); 21.XI: 4 ej. (OAP).

**Clot de Galvany:** 3 par. nidificantes. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 12.XI: 12 ej. (AJR); 24.XII: 25 ej. (OAP); 30.XII: 31 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** censos destacados: 14.II: 438 ej.; 29.III: 141 ej. (SAR); 44 par. nidificantes. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**Salinas de Santa Pola:** 2 par. nidificantes. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

**EDAR Pilar de la Horadada:** 2 par. nidificantes. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

El Clot de Galvany y el Fondo d'Elx siguen siendo las únicas localidades en las que nidifica de forma regular, aunque desde 2009 lo hace también en el EDAR de Pilar de la Horadada. Este bienio ha nidificado también en las Salinas de Santa Pola y en la marjal dels Moros.

## GALLIFORMES

### PHASIANIDAE

#### ***Alectoris rufa***

#### **Perdiz roja - Perdiu comuna - Red-legged Partridge**

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés. Categoría: A, E1.

## 2017

**Castellón de la Plana:** 16.XI: 6 ej. Máximo anual en campos de naranjos en 2,5 km de censo (MTB).

**Villena:** 19.VIII: 25 ej. (EJDR).

**El Fondo d'Elx:** 07.IX: 45 ej. (AJR).

#### ***Coturnix coturnix***

#### **Codorniz común - Guatlla - Common Quail**

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Categoría: A, E2.

## 2016

**Alcossebre:** 06.IV: 1 ej. Única cita anual (DES).

**Quadro de Santiago:** 24.I: 1 ej. se levanta a corta distancia con vuelo explosivo y se posa a 70 m en zona de saladar (MTB).

**Albufera de València:** 29.IX: 1 ej. en la Torreta Ampla (PMP).

El Fondo d'Elx: 07.I: 2 ej., uno de ellos depredado por un carnívoro y el otro atropellado en la carretera (JMT,OAP,IAG).

## 2017

**Albufera de València:** 22.III: se escucha 1 ej. cantando en zonas vegetadas del canyar del Plater. Primer registro primaveral (PMP); 22.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Última cita anual (PLP,CSW,JSW).

Escasez general de citas, destacando las aves invernales en el Quadro de Santiago y el Fondo d'Elx. Estas aves pueden proceder, tanto de poblaciones silvestres, como de sueltas cinegéticas o de escapes.

## GAVIIFORMES

### GAVIIDAE

#### ***Gavia stellata***

#### **Colimbo chico - Agullat petit - Redthroated Diver**

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 27/19 (nov-ene).

## 2016

**Elx:** 03.I: 1 ej. en la playa del Rebollo (AJR).

**Santa Pola:** 22.I: 1 ej. en la playa de la Marina (AJR).

**Desemb. río Segura:** 09.I: 1 ej. (AJR).

Tres nuevas citas de este escaso colimbo en la CV, que posiblemente hacen referencia a un mismo ej. que permaneció en el S de Alicante durante el mes de enero. No recibíamos citas de colimbos chicos desde el año 2013.

#### ***Gavia immer***

#### **Colimbo grande - Agullat gros - Great Northern Diver**

Estatus: Invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 60/52 (nov-mar).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.II: 1 ej. Se arregla el plumaje durante un rato y finalmente sale volando mar adentro (MTB, JAF).

**Santa Pola:** 1 ej. observado desde la playa de la Marina los días 14, 30 y 31.XII (AJR).

Por primera vez desde 1995 (y por segunda ocasión desde que se publican anuarios) en 2016 no se ha observado ningún colimbo grande invernante en la CV, a pesar de que se trata del colimbo más común en aguas valencianas. Por otro lado, 2017 ha sido un año con muy pocas observaciones ya que tan solo se han citado 2 ej. El colimbo del Prat de Cabanes-Torreblanca, supone tan solo la sexta cita para la provincia, donde no se citaba desde 2010. Por otro lado, aunque es algo más escaso, tampoco hemos recogido citas de colimbo ártico (*Gavia arctica*) en este bienio.

## PROCELLARIIFORMES

### HYDROBATIDAE

#### ***Hydrobates pelagicus***

#### **Paño europeo - Escateret - European Storm-petrel**

Estatus: Nidificante moderado localizado. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: VUL.

## 2016

**Albufera de València:** 05.IX: 1 ej. observado a escasa distancia de la costa y desplazándose hacia el N frente a la gola del Pujol (RNU).

**Cabo de Cullera:** 23.V: 1 ej. observado en dos ocasiones siguiendo a arrastreros a 1 km de la costa (VPA); 04.VI: 1 ej. en vuelo sin rumbo fijo (LAA); 13.VI: 1 ej. avistado a la puesta de sol a escasos 500 m de la costa (VPA).

**Desemb. río Segura:** 22.IV: 8 ej. (AJR).

## 2017

**Peñíscola:** 01.VII: 1 ej. observado durante la jornada RAM (ELL,JLA,PML).

**Castellón de la Plana:** 21.X: 2 ej. en el trayecto a Columbretes (JMT).

**Sagunt:** 01.VII: 1 ej. (RPM).

**Cabo de Cullera:** 03.V: 1 ej. Primer registro anual; 12.V: 1 ej. observado en repetidas ocasiones; 14.V: 1 ej. observado al atardecer (VPA).

**La Nucia:** 29.IV: 1 ej. (EJGV).

**Altea:** 03.VII: 1 ej. (EJGV).

**Benidorm:** 07.V: 1 ej. (EJGV).

## PROCELLARIIDAE

### ***Calonectris diomedea***

### **Pardela cenicienta - Baldriga cenrosa - Cory's Shearwater**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

Conservación: PE.

## 2016

**Peñíscola:** 06.VIII: 2 ej. Jornada RAM (APN).

**Islas Columbretes:** 29.IV: 1 ej. (RPM).

**Cabo de Cullera:** 07.V: 9 ej. volando el S (MAL,JLO,LAA); 04.VI: 35 ej. desplazándose hacia el S. Algunos forman una balsa de pesca junto a pardelas baleares y charranes patinegros (LAA); 02.VII: 8 ej. (LAA,-JLO); 01.X: 39 ej. mayoritariamente en vuelo hacia el S (MAL,JLE,JLO); 05.XI: 120 ej. al atardecer (GGO).

**Gandía:** 14.XI: 1 ej. (PLP).

**Cabo Cervera:** 07.X: 4 ej.; 04.XI: 179 ej. (AJR,SAR).

## 2017

**Peñíscola:** 03.VI: 2 ej. Jornada RAM (ELL); 01.VII: 1 ej. (ELL,JLA,PML).

**Islas Columbretes:** 11.III: se oyen los primeros individuos durante la noche; 11.IV: 600 ej. en varias balsas rodeando Illa Grossa (LGB).

**Castellón de la Plana:** 21.X: 1 ej. en el trayecto a Columbretes (JMT).

**Marjal dels Moros:** 13.V: 25 ej. (GCH).

**Cabo de Cullera:** 12.V: 4 ej. Primer registro anual; 24.V: 74 ej. observados al atardecer (VPA).

**Xàbia:** 12.IV: 10 ej. (ELCA).

**Benidorm:** 10.IX: 11 ej. (EJPR).

**Cabo Huertas:** 13.XI: 16 ej. (EGM).

**Cabo Cervera:** 28.X: 426 ej. (AJR,SAR).

Destacan los datos de Columbretes con la llegada de los primeros individuos a principio de marzo y el flujo de salida de la población de las colonias reproductoras hacia el S desde Torreveija en los últimos días de octubre.

### ***Puffinus yelkouan***

### **Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater**

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

## 2016

**Meliana:** 05.I: 1 ej. entre pardelas baleares (AAC).

**Cabo de Cullera:** 15.I: 2 ej. mar adentro; 22.II: 1 ej. observado a cierta distancia de la costa en compañía de pardela balear; 13.XII: 1 ej. Primer registro invernal (VPA).

**La Vila Joiosa:** 09.I: 1 ej. Censo de Aves Marinas CV (PAS).

## 2017

**La Llosa:** 09.XII: 2 ej. Mínimo observado entre pardelas baleares (VBJ).

**Marjal dels Moros:** 01.I: 6 ej. (GGO).

**Cabo de Cullera:** 25.I: 2 ej. (VPA); 06.II: 3 ej. entre pardelas baleares al atardecer (VPA,JALO); 14.II: 3 ej. al atardecer (VPA).

**Santa Pola:** 04.III: 1 ej. (JMT,PCC,JEG); 04.III: 6 ej. (JUI).

**Desemb. río Segura:** 31.XII: 1 ej. (AJR).

## *Puffinus mauretanicus*

## Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater

Estatus: Invernante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: PE.

## 2016

**Peñíscola:** 09.I: 222 ej. Censo RAM (ELL,DFE,FRJ); 05.XII: 582 ej. Jornada RAM (ELL,BGC).

**Alcossebre:** 23.I: 150 ej.; 03.XII: 70 ej. Primera cita invernal (DES).

**Burriana:** 22.I: 700 ej. detrás de los barcos al entrar al puerto; 16.II: 300 ej. detrás de los barcos de pesca al atardecer; 09.III: 63 ej. detrás de los barcos de pesca al entrar al puerto (JBC).

**Alboraya:** 07.I: 15 ej. en una balsa de pesca junto a alcas y charranes patinegros (RMB).

**Cabo de Cullera:** 27.XII: 630 ej. en tres grupos desplazándose hacia el N en 30 min de observación (BDJ).

**La Vila Joiosa:** 29.I: 1.000 ej. (AJR).

**Cabo Huertas:** 31.XII: 1.398 ej. (JMT).

**Santa Pola:** 24.I: 400 ej. (JMT,OAP).

**Puerto de Santa Pola:** 02.II: 300 ej. (JMT,OAP); 30.XII: 2.000 ej. (AJR).

## 2017

**Peñíscola:** datos destacados en censos de la RAM 14.I: 1.245 ej. (ELL,BGC); 04.III: 125 ej. (ELL,JLA,FRJ); 01.IV: 21 ej. (ELL,JLA,PML); 03.VI: 5 ej. (ELL); 01.VII: 5 ej. (ELL,JLA,PML); 07.X: 1 ej. (DFE,JLA,FRJ); 02.XII: 600 ej. (DFE,JLA).

**Alcossebre:** 06.I: 630 ej.; 21.XI: 120 ej. Primera cita en invernada; 25.XI: 8.000 ej. (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 13.V: 4 ej.; 08.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 30.XII: 552 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Islas Columbretes:** 18.II: 600 ej. observados desde Illa Grossa (LGB).

**Burriana:** 14.I: 368 ej. (JLB).

**Marjal dels Moros:** 10.XII: 53 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 08.XII: un bando de 2.500 ej. y otro de 800 en dirección S (VBJ).

**Cabo de Cullera:** 14.I: apenas 43 aves frente al Cabo de Cullera. Parece confirmarse la escasa presencia invernal frente al litoral de la Albufera (MAL,VPA,JLO); 25.I: 50 ej. Las cifras registradas este invierno están resultando excepcionalmente bajas (VPA); 06.II: 650 ej. al atardecer, coincidiendo con la entrada de arrastreros al puerto. Una de las cifras más elevadas del presente invierno (VPA,JALO); 24.V: 12 ej. (VPA); 04.VII: 1 ej.; 28.XI: 25 ej. (VPA).

**La Vila Joiosa:** 14.I: 305 ej. (CAM).

**Cabo Huertas:** 14.I: 843 ej. (CAM).

**Cabo Cervera:** 11.II: 443 ej.; 28.X: 3 ej. (AJR,SAR).

Destacan los 8.000 individuos de Alcossebre, en contraste con la escasez de invernada en aguas más meridionales.

## PODICIPEDIFORMES

## PODICIPEDIDAE

***Tachybaptus ruficollis*****Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe**

Estatus: Migrante y nidificante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 19.I: 118 ej. (JBC).

**Marjales de Alfajar y Valencia:** 14.II: 94 ej. en zonas con niveles altos del tancat de Càbiles (ASI).

**EDAR de Santa Pola:** 04.X: 93 ej. (SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 21.XII: 76 ej. Máximo anual en balsas de Torreblanca (MTB,JAF).

**Requena:** 14.X: 55 ej.; 03.XII: 44 ej. Cifras muy altas para la localidad (JAI).

**El Fondo d'Elx:** 13.X: 60 ej. (AJR).

**EDAR de Santa Pola:** 28.VII: 92 ej. (SAR).

Localidad	2016		2017	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	81	47	59	55
Marjal de Almenara-Sagunto	13	45	13	33
Marjal dels Moros	53	19	15	15
Embalse de Benabéger	-	0	-	76
Albufera de Valencia	26	45	31	46
Marjal de Xeresa-Xeraco	20	10	25	35
Clot de Galvany	4	17	12	24
Salinas de Santa Pola	46	144	27	80
El Fondo	242	273	89	192
EDAR Santa Pola	-	23	-	37

*Censos de zampullín chico en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 15 parejas o invernaron al menos 20 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 16 de 30 humedales para un total de 520 par. en 2016 y en 18 de 31 humedales con un total de 326 par. en 2017). Como invernante se ha detectado en un total de 22 de 44 humedales censados para un total de 708 ej. en 2016 y en 27 de 45 humedales con un total de 664 ej. en 2017). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

***Podiceps cristatus*****Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe**

Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Sant Jordi:** 18.II: 17 ej. en la balsa IRYDA (ELL, DFF).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 20.VIII: 18 ej. Máximo anual en lagunas de Torreblanca (MTB).

**Embalse de Loriguilla:** 16.I: 140 ej. (TPA).

**Embalse de Bellús:** 21.II: 120 ej. (BOR).

**Salinas de Santa Pola:** 05.X: 268 ej. (AJR); 17.X: 316 ej. Posiblemente la cita más alta registrada en el lugar (SAR); 28.X: 270 ej. (AJR).

**2017**

**Embalse de Benagéber:** 14.I: 81 ej. (ACB, RCB).

**Embalse de Bellús:** 01.VII: 24 ej. (BOR).

**Embalse Beniarrés:** 12.III: 53 ej.; 16.XII: 185 ej. (BOR).

**Salinas de Santa Pola:** censos mensuales destacados: 22.III: 129 ej. (SAR); 06.IV: 102 ej.; 27.VI: 135 ej.; 12.VII: 143 ej.; 10.VIII: 166 ej. (AJR); 15.IX: 281 ej. (AJR, SAR); 06.X: 192 ej. (AJR); 13.XI: 122 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 26.IX: 22 ej. (SAR); 05.X: 26 ej. (AJR).

**Podiceps nigricollis****Zampullín cuellinegro - Cabussó coll-negre - Black-necked Grebe**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 12.IX: 2 ej. Primera cita postnupcial. Última cita anual de 1 ej. el 26.XI (MTB).

**Albufera de València:** 11.V: 1 ad. con plumaje reproductor en el tancat de la Pipa (AVA); 13.VI: 1 ad. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU); 28.XII: 17 ej. en l'estany del Pujol (JLE).

**Salinas de Santa Pola:** 10.XI: 124 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 17.II: 845 ej.; 16.V: 193 ej.; 01.VI: 288 ej. (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 12.IX: 3.206 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 18.X: 95 ej. (SAR).

**2017**

Localidad	2016		2017	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Balsa de Sant Jordi	0	15	0	12
Prat de Cabanes-Torreblanca	9	2	6	6
Marjal de Almenara-Sagunto	8	1	8	1
Embalse de Loriguilla	0	82	0	101
Embalse de Benabéger	0	120	0	0
Albufera de Valencia	18	25	26	9
Embalse de Beniarrés	0	95	0	53
Embalse de Bellús	0	87	0	23
Salinas de Santa Pola	5	30	3	170
El Fondo	63	0	29	18
Embalse de la Pedrera	9	21	5	6

*Censos de somormujo lavanco en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se detectaron al menos 5 parejas nidificantes o en las que invernaron al menos 10 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 7 de 30 humedales para un total de 113 par. en 2016 y en 12 de 31 humedales con un total de 106 par. en 2017). Como invernante se ha detectado en un total de 12 de 44 humedales censados para un total de 486 ej. en 2016 y en 12 de 45 humedales con un total de 405 ej. en 2017). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

**Albufera de València:** 03.V: 1 ad. con plumaje nupcial en el tancat de la Pipa (PVG); 31.V: 1 ej. iniciando la muda postnupcial (EGO,PVG); 23.VII: 1 ad. Primer registro postnupcial (EPS).

**Requena:** 21.V: 1 ej. (RMB).

**Salinas de Santa Pola:** 23.X: 217 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 29.III: 400 ej. (SAR); 04.V: 158 ej. (JPG); 27.VII: 42 ej. (SAR,AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 31.VII: 4.523 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 15.III: 55 ej. (SAR).

**PHOENICOPTERIFORMES****PHOENICOPTERIDAE****Phoenicopus roseus****Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo**

Estatus: Nidificante ocasional muy localizado, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 22.X: máximo anual de 54 ej. (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.III: 80 ej. en la marjal de Quartell (SMS).

**Marjal dels Moros:** máximos anuales de 106 ej. el 29.II y de 89 ej. el 10.IV (RMB).

**Albufera de València:** 20.I: 1.932 ej. repartidos en diferentes grupos en el entorno de la laguna (JID,YAM);

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Albufera de Valencia	0	5	0	78
Salinas de Santa Pola	3	103	5	64
El Fondo	21	2.101	20	275
El Hondo de Amorós	0	36	0	38
EDAR Santa Pola	0	35	0	67

*Censos de zampullín cuellinegro en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 5 parejas o invernaron al menos 10 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 3 de 30 humedales para un total de 27 par. en 2016 y en 5 de 31 humedales con un total de 33 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 8 de 44 humedales censados para un total de 2.296 ej. en 2016 y en 8 de 45 humedales con un total de 454 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

01.II: 2.130 ej. (BDJ); 08.III: 920 ej. en arrozales inundados de Catarroja (BDJ); 19.V: 470 ej. en la desemb. de la gola del Pujol (JID,MCH,IRU). Aumento progresivo tras la inundación de los arrozales a principios de mayo; máximos estivales en el tancat de Milia de 93 ej. el 22.VII y de 73 ej. el 23.VIII (BDJ,JFF); 13.VIII: 143 ej. en el Racó de l'Olla (BDJ); 24.VIII: 15 ej. (13 juv.) en el Racó de l'Olla (AAD). Primeros juv.; 09.XI: grupo de unos 1.000 ej. (PMP). Primeras concentraciones destacadas tras mínimos de septiembre y octubre; 28.XII: 1.400 ej. en arrozales inundados de Alfafar (BDJ,BMA).

**Cullera:** 03.XII: 1.117 ej. hacia el S frente al cabo, aunque una parte regresa al N. Movimientos posiblemente relacionados con la jornada de caza de l'Albufera (MAL,JLE,VBJ).

**Salinas de Santa Pola:** 25.II: máximo anual de 3.000 ej. (AJR,SAR); 15 par. nidificantes (CMA).

**Lagunas de la Mata-Torreveija:** máximos destacados de 242 ej. el 04.VII y de 230 ej. el 22.VIII (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 16.V: máximo anual de 347 ej. (SAR).

## 2017

**Peñíscola:** 03.VI: 25 ej. jornada RAM (ELL).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.III: 3 ej. Primera cita anual; 03.IX: 26 ej. Máximo anual en varios bandos en paso al N (MTB,JAF).

**Marjal dels Moros:** 19.IX: 36 ej. 1 ad. con anilla PVC amarilla cod. negro [XSJB] (RMB).

**Albufera de València:** 4.246 ej. en el censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 23.II: 850 ej. en marjales de la Llonga (HGA). Notable descenso, acompasado al descenso de áreas inundadas en el marjal y posiblemente como respuesta a las molestias continuadas que sufren; 17.III: 380 ej. en arrozales apenas encharcados y fangueados de Catarroja (VBJ); 17.VII: 74 ej. en Milia (BDJ); 21.VIII: 132 ej. en el Racó de l'Olla (MCH); 01.IX: 134 ej. en Milia (BDJ); 31.X: 200 ej. en vuelo hacia el S sobre la Devesa (GGO); 01.XI: 800 ej. en zonas inundadas del marjal de Silla (VBJ); 23.XI: 5.300 ej. repartidos entre el vedat Nou y Vell de Sueca (AAC,JLE). Máximo histórico en l'Albufera.

**Saladar de Agua Amarga:** 20.III: 45 ej. (AJR).

**Clot de Galvany:** 15.VII: 55 ej. (PMON).

**Salinas de Santa Pola:** 14 par. nidificantes (CMA); 29.V: 2.950 ej.; 16.VI: 3.443 ej.; 12.XII: 3.343 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 30.IX: 200 ej. (SNH); 27.X: 150 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 28.VII: 32 ej. (SAR).

Máximo histórico de invernada en la CV, con 4.246 ej. en enero de 2017 en l'Albufera de València. Posteriormente a este conteo, se registra un nuevo máximo histórico con 5.300 ej. en la misma localidad en el mes de diciembre. Los registros de las salinas de Santa Pola, son, igualmente, muy elevados.

## Phoeniconaias minor

## Flamenco enano - Flamenc menut - Lesser Flamingo

Estatus: Migrante raro. Escapado de cautividad. Categoría: A, E3, D. Rango: 24/9 (feb-nov).

## 2017

**Albufera de València:** 05.V: 1 ej. integrado en un pequeño bando de flamenco común en el tancat de Milia a primera hora del día (ATR). Tercera cita para l'Albufera de València tras las realizadas en la reserva del

Racó de l'Olla, referidas a 2 ej. juntos entre finales de junio y principios de julio de 2008 y 1 ej. en febrero de 2012 (BDJ). Cita pendiente de homologación por el comité de rarezas de SEO/BirdLife. Observado de nuevo por la tarde comiendo en el Racó de l'Olla (MCH,GGA,JID).

**Salinas de Santa Pola:** 08.III: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 01.IV: 1 ej. (AJR); observado en múltiples ocasiones hasta última cita el 14.V (ASS).

Las citas de flamenco enano en España proceden de aves escapadas de colecciones privadas, pero también de un número creciente de aves que parecen tener un origen natural desde sus poblaciones africanas, habiendo criado con éxito en España en 2007, 2011 y 2013 (del Hoyo et al. 2020), por lo que ha sido incluida en la categoría A (Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez desde el 1 enero de 1950) en el último listado de las aves de España (Rouco et al. 2019). Las citas de 2017 hacen referencia, presumiblemente, a un mismo ejemplar que se dejó ver en los mayores humedales de la CV entre los meses de marzo y mayo.

## CICONIIFORMES

### CICONIIDAE

#### ***Ciconia nigra***

#### **Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork**

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Castellfort:** 07.IV: 2 ej. en la rambla Cellumbres (RPB,ALR,JCMO).

**Benicàssim:** 12.V: 1 ej. en paso hacia el N en el Quadro de Santiago (MTB); 13.V: 1 ad. en migración en el Desierto de las Palmas (IBR).

**Albufera de València:** 17.I: 9 ej. Máximo invernal en marjales de Sueca (JMH); 06.II: 9 ej. en arrozales del Malvinar (VBJ), observadas de nuevo el 11.II (AAC); 13.X: 5 ej. en arrozales de Sueca (EGO); 11.VIII: 5 ej. (aparentemente 1 ad. y 4 juv.) en el tancat de la Pipa. Primer registro postnupcial temprano (AVA), aumentando a 7 ej. el 18.VIII (PVG); 01.IX: 1 ad. hacia el S sobre el Racó de l'Olla (MCH); 10.XII: 5 ej. en arrozales de Sueca, aparentemente los observados a mediados de octubre (JLE).

**Marjal de Pego-Oliva:** 14.I: 2 juv. (FAN); 30.VIII: 1 ej. (CMO); 02.IX: 1 ej. (EBDO).

**El Fondo d'Elx:** 26.II: 1 ej. (PLP).

#### **2017**

**Zorita del Maestrazgo:** 28.V: 1 ad. (RPB).

**Ares del Maestre:** 03.IX: 1 ej. (RPB,ALR).

**Camporrobles:** 02.IX: 3 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 09.I: 4 ej. (3 ad.) cerca de la muntanyeta dels Sants (JLE); 11.I: 6 ej. en arrozales de la Costera (PMP); 23.II: siguen presentes 7 ej. en zonas altas del Malvinar de Sueca (HGA); 31.X: 4 ej. en marjales de la partida de Campanar (JME); 25.XI: 4 ej. (al menos 2 juv.) en arrozales próximos a la muntanyeta dels Sants (JOB); 11.XII: 5 ej. en arrozales de la Socarrada (YAM).

**Marjal de Pego-Oliva:** 25.III: 3 ej. (EJMO).

**Xixona:** 23.X: 1 ej. (XAA).

**El Fondo d'Elx:** 20.X: 1 ej. (SBO); 29.X: 1 ej. en la laguna del centro de interpretación (EGCS).

Destacamos la invernada moderada en la Albufera de València que se viene repitiendo en los últimos años y que en 2016 se ha extendido a la marjal de Pego-Oliva. Fuera de estos eventos, continúa siendo una especie escasa que deja un goteo de ejemplares, fundamentalmente en el paso prenupcial.

**Ciconia ciconia****Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork**

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 12.III: 42 ej. en paso al N (DES).

**Villafranca del Cid:** 06.IX: 105 ej. (RPB).

**Benicàssim:** 16.V: 3 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Castellón de la Plana:** 27.II: 2 ej. volando al N (PGR,SGM).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 27.II: 2 ej. (JOB).

**Marjal dels Moros:** 26.II: 2 ej. (SRC,PGR); 15.V: 1 ej. (JPE).

**Albufera de València:** 15.II: 1 ej. en arrozales del Malvinar. Primer registro anual (DMO); 20.II: 1 ej. en arrozales fangueados del Rabisanxo (ASI); 15.V: 1 ej. tomando altura y sobrevolando la Devesa para desplazarse después hacia el N (ASI); 21.V: 2 ej. en el tancat de Milia. Cita prenupcial tardía (PMP).

**El Fondo d'Elx:** 18.I: 1 ej. (SAR); 12.X: 1 ej. (JDL).

**2017**

**Morella:** 26.VIII: 9 ej. en dormidero en casas y postes eléctricos junto a la ciudad (MAG).

**Algar de Palancia:** 14.III: 20 ej. (JMA).

**Albufera de València:** 30.I: 1 ej. sobrevolando la Devesa. Primer registro anual temprano (LAM); 12.III: 1 ej. en el tancat dels Germanells (BDJ); 11.V: 6 ej. cerca de la Palmella (JME); 30.VI: cita estival de 1 ej. en arrozales del tancat de Burriel, observado de nuevo el 01.VII (VVA); 11.IX: 20 ej. al atardecer en el entorno de Silla, al parecer pasan la noche posadas en postes de iluminación urbana próximas a la población (MAJ); 20.IX: 10 ej. en arrozales de la Verola (HGA); 12.X: 1 ej. en el Racó de l'Olla (JID,BLO); 07.III: 1 ej. en el tancat de Milia (JFF); 08.V: sigue presente 1 ej. en el tancat de Milia (YAM).

**Gandía:** 02.XII: 1 ej. recogido en mal estado físico (FAN).

**El Fondo d'Elx:** 05.X: 5 ej. (AJR).

**THRESKIORNITHIDAE****Plegadis falcinellus****Morito común - Picaport - Glossy Ibis**

Estatus: Nidificante localizado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 10.XII: 240 ej. en paso al N. Máximo anual (MTB).

**Benavites:** 09.III: 650 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 16.XI: 2.700 ej. (JGAC); 13.X: 2.380 ej. en zonas inundadas del tancat de Baldoví (BDJ).

**Marjal de Pego-Oliva:** 14.III: 400 ej. (PSH).

**Salinas de Santa Pola:** 29.X: 195 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 05.IV: 350 ej. (JMT,MFS); 08.VIII: 400 ej. (SAR); 18.X: 520 ej. (SAR); 21.X: 561 ej. (AJR).

**2017**

**Peñíscola:** 02.XII: 194 ej. Máximo anual en censo RAM (DFEJLA).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 165 ej. Máximo

*Censos de morito nidificante en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificó o invernó. Como nidificante se han detectado 702 par. en 2016 y 765 par. en 2017. En invernada el total fue 5.740 ej. en 2016 y de 4.951 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Marjal de Almenara-Sagunto	42	1.800	0	418
Marjal dels Moros	84	0	24	0
Albufera de Valencia	217	3.773	442	4.140
Marjal de Xeresa-Xeraco	20	0	15	0
Marjal de Pego-Oliva	13	1	58	156
Salinas de Santa Pola	15	0	0	3
El Fondo	266	162	226	234
El Hondo de Amorós	45	0	0	0

anual; 21.X: 140 ej. en paso hacia el N (MTB,JAF).

**Burriana:** 07.X: 143 ej. en el censo RAM. Máximo anual (MIA,JLB,JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 668 ej. (JBC,JLB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 30.XI: 400 ej. Máximo anual (PLP).

**El Fondo d'Elx:** 10.VII: 700 ej. Máximo anual (ESAR).

**Saladar de Agua Amarga:** 19.III: 200 ej. Máximo anual (AJR).

### ***Threskiornis aethiopicus***

### **Ibis sagrado - Ibis sagrat africà - African Sacred Ibis**

Estatus: Originaria de África. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: C.

#### **2017**

**Albufera de València:** 03.X: 1 inm. sobrevolando el Racó de l'Olla. Segunda observación en l'Albufera tras la cita de un ej. en la playa de Pinedo en el mes de agosto (MCH,JID,BLO). Observado de nuevo los días 05.X en arrozales de Sueca junto a moritos comunes (JLE); el 15.X: junto con garcetas y garzas reales (ELCA); el 16.X (EJNA); el 19.X: alimentándose en arrozales de Alfafar (RBL); el 25.X y el 13.XII (AVA). Observación de 2 ej. juntos el 24.XI en arrozales del vedat de Sueca (EPS).

**Marjal de Pego-Oliva:** 04.VII: 1 ej. (HGA).

### ***Platalea leucorodia***

### **Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Albufera de València:** 26.II: 16 ej. (VPA); 04.III: 12 ej. (ASI); 13.IV: 7 ej. en el tancat de la Pipa (YAM); 03.V: 3 ej. (AAC); 07.V: 5 ej. (AVA); 10.VI: 1 subad. (PVG); 27.VII: 1 juv. Primera cita postnupcial (MCH,GGA); 12.X: 48 ej. en vuelo (JOB).

**Requena:** 08.V: 1 ad. Presencia asociada a las lluvias (JAI).

**Clot de Galvany:** 03.IX: 70 ej. en el entorno de la depuradora (SCEA).

**Salinas de Santa Pola:** 17.I: 31 ej. (AJR); 12.IV: 1 ej. Última observación prenupcial; 06.VI: 4 ej. (AJR); 22.IX: 155 ej. (SAR); 01.X: 123 ej. (AJR); 17.X: 127 ej. (SAR); 05.XI: 64 ej. (AJR); 19.XI: 63 ej. (JMT,IAG,AAR); 11.XII: 45 ej. (PCC,JEG).

#### **2017**

**Albufera de València:** 03.VI: 1 ej. (AVA); 07.VI: 2 ad. (JID), observados hasta el 17.VI (JID,MCH,VBJ); 20.IX: 71 ej. entrando del mar hacia la laguna. Uno de los mayores grupos registrados en l'Albufera (DCR); 22.IX: 32 ej. (EPS), aumentando hasta 46 el 1.X (JJF); 01.X: 16 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 08.X: 55 ej. en migración (AAC,MGC).

**Salinas de Santa Pola:** 24.I: 19 ej. (PLP); 25.II: 27 ej.; 02.III: 28 ej.; 08.IX: 79 ej.; 22.IX: 84 ej.; 07.X: 40 ej.; 26.X: 38 ej. (AJR); 13.XI: 83 ej. (SAR); 30.XI: 44 ej.; 09.XII: 52 ej.; 24.XII: 31 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 06.V: 1 ej. en la reserva (BOR,DMF); 21.IX: 37 ej.; 02.X: 96 ej.; 06.X: 86 ej. (SAR); 14.X: 86 ej. descansando al mediodía (EMMG); 20.X: 89 ej. (AJR,SAR); 22.XII: 5 ej. (OAP).

## **ARDEIDAE**

### ***Botaurus stellaris***

### **Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

#### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.XII: 1 ej. en una zona de vegetación palustre parcialmente inundada (MTB).

**Albufera de València:** 07.I: 2 ej. Presentes desde mediados de noviembre del año pasado (AAC); 16.II:

1 ej. observado en vuelo y luego cantando (ASI). Observado también los días 19.II (AAC) y 4.III (YAM); 08.IV: 1 ej. sale volando de una acequia en les Terres Noves (EGO,JGAC); 05.XI: 1 ej. en la mata del Fang (JAGA); 10.XI: 1 ej. en el tancat de la Pipa (MLA), observado también el 13.XI (DWA) y el 16.XI (MLA); 19.XI: 2 ej. Observados también el 15.XII y 22.XII (AVA); 01.XII: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (YAM); 19.XI: 2 ej. (EAVA); 12.IV: 1 ej. (MFO,EDV); 12.XI: 1 ej. (PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 11.III: 1 ej. (HGA,NGO), presente también el 12.III (ICS,FAN).

## 2017

**Marjal dels Moros:** 31.III: 1 ej. cantando (AAC); 30.IV: 1 ej. (EJNA).

**Albufera de València:** 25.I: 1 ej. en un canal en el entorno del tancat de Zacarés (JME,EGO). Citas en el tancat de la Pipa de 1 ej. el 23.I (AVA), el 12.II (JCO), 1 ej. cantando el 12.IV (YAM,GGO,MRG). Primera observación postnupcial el 14.VII. Cita invernal de 1 ej. el 02.XI (AVA), observado posteriormente en varias ocasiones hasta el 26.XII (AVA). 1 ej. en Sollana el 11.X (ATR); 14.X: 1 ej. en el tancat de Camot (ATR); 18.XII: 1 ej. en Sollana (PMP).

Las citas de avetoro se concentran, como es habitual, en los meses invernales. En este bienio, las fechas extremas han quedado entre el 2.XI y el 30.IV (aparte de una cita postnupcial temprana de mediados de julio en l'Albufera).

## *Ixobrychus minutus*

## Avetorillo común - Gomet - Little Bittern

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Castellón de la Plana:** 12.XII: 1 ej. en la desem. del río Seco (MTB).

**Pantano de Elche:** 21.I: 2 ej.; 01.XII: 4 ej. (OAP).

**Clot de Galvany:** 11.I: 2 ej. (AJR,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 25.XI: 15 ej. (JMT,OAP,MFS); 23.XII: 15 ej. (JMT,JMG,OAP).

**Desemb. río Segura:** 31.I: 3 ej. (AJR).

## 2017

**Marjal dels Moros:** 03.XII: 1 ej. (XGP).

**Albufera de València:** 05.XII: 1 ej. Presente también el 21.XII (AAC).

**Marjal de Pego-Oliva:** 20.I: 1 ej. (PLP).

**Pantano de Elche:** 06.I: 5 ej.; 26.XII: 5 ej. (OAP).

Localidad	2016		2017	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Marjal de Peñíscola	0	1	0	0
Prat de Cabanes-Torreblanca	16	1	7	1
Desembocadura río Mijares	0	0	0	2
Marjal dels Moros	14	0	10	0
Desembocadura del Carraixet	0	1	0	0
Albufera de Valencia	50	6	59	7
Marjal de Xeresa-Xeraco	20	0	20	0
Marjal de Pego-Oliva	0	2	0	0
Desemb. río Algar	0	0	0	1
Salinas de Santa Pola	24	0	13	5
El Fondo	82	4	62	5

*Censos de avetorillo en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 10 parejas y todas en las que se detectó como invernante. Como nidificante se ha detectado en un total de 16 de 31 humedales para un total de 233 par. en 2014 y en 15 de 29 humedales con un total de 201 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en 7 de 44 humedales con un total de 17 ej. en 2016 y en 8 de 45 humedales en 2017 con un total de 23 ej. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

**Salinas de Santa Pola:** 03.II: 1 ej. (AJR).

**Desemb. río Segura:** 03.II: 4 ej.; 07.XII: 2 ej. (AJR).

El avetorillo ha pasado de ser un invernante regular, pero muy escaso, presente casi exclusivamente en los humedales del S de Alicante a finales del siglo pasado, a ser un invernante extendido en muchos humedales de la CV y que puede llegar a congregarse poblaciones invernantes de alguna importancia, como se ve por las citas del Hondo y de la Albufera, por lo que cambia su estatus de invernante raro a escaso. Las poblaciones nidificantes, por otro lado, parecen mantenerse estables, aunque el registro de 2007, con apenas 200 parejas, es de los más bajos de los últimos 20 años.

## **Nycticorax nycticorax**

## **Martinete común - Martinet - Black-crowned Night-heron**

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.IX: 41 ej. Última cita y máximo anual (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 04.V: 2 ad. (MBM).

**Pantano de Elche:** 26.VII: 16 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 09.II: 12 ej. (JMT,OAP,TGR); 13.IX: 93 ej. (AJR,PCC).

**Embalse de La Pedrera:** 18.VI: 5 ej. (AJR).

### **2017**

**Albufera de València:** 13.II: 603 ej. saliendo del dormitorio al atardecer (YAM).

*Censos de martinete común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificó o invernó. Como nidificante se ha detectado en un total de 7 de 30 humedales para un total de 175 par. en 2016 y en 6 de 31 humedales con un total de 175 par. en 2017. Como invernante se ha detectado tan solo en 1 humedal. Datos del Servei de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

Localidad	2016		2017	
	Par. nidif.	Ej. inv.	Par. nidif.	Ej. inv.
Marjalería de Castellón	8	0	8	0
Marjal de Almenara-Sagunto	27	0	0	0
Marjal dels Moros	3	0	6	0
Albufera de Valencia	49	781	44	418
Marjal de Xeresa-Xeraco	25	0	25	0
Marjal de Pego-Oliva	27	0	25	0
El Fondo	36	0	20	0

## **Ardeola ralloides**

## **Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron**

Estatus: Nidificante escaso, migrante escaso e invernante raro. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

### **2016**

**Vinaròs:** 24.IV: 5 ej. en la roca de la Gavina (DFF).

**Quadro de Santiago:** 12.V: 8 ej. Máximo anual (MTB).

**Betxi:** 09.VIII: 3 ej. en balsa de riego (JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (MTB); 09.XII: 1 ej. (JLB).

**Desemb. barranc del Carraixet:** 15.II: 2 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 03.II: 3 ej. en zonas fangueadas del Malvinar (JLE); 07.II: 2 ej. (ASI).

**Alacant:** 06.III: 1 ej. en el parque inundable la Marjal (GLI).

*Censos de garcilla cangrejera nidificante en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificó o se detectó en invernada. Como nidificante se han localizado 703 parejas en 2016 y 365 parejas en 2017. Los invernantes han ascendido a 9 ej. en 2016 y a 3 en 2017. Datos del Servei de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

Localidad	2016		2017	
	Par. nidif.	Ej. inv.	Par. nidif.	Ej. inv.
Marjalería de Castellón	4	0	14	0
Marjal de Almenara-Sagunto	10	1	0	0
Marjal dels Moros	10	0	3	0
Desem. del Carraixet	0	3	0	1
Albufera de Valencia	434	2	203	2
Marjal de Xeresa-Xeraco	15	3	35	0
Marjal de Pego-Oliva	23	0	28	0
Salinas de Santa Pola	13	0	9	0
El Fondo	194	0	73	0

El Fondo d'Elx: 28.X: 2 ej. (JMT,PPP,MFS); 23.XII: 1 ej. (JMT,JMG,OAP).

## 2017

Olocau: 20.II: 1 ej. (RMB).

Requena: 31.VII: 1 ej. con plumaje nupcial (JAI).

Marjal de Pego-Oliva: 08.XI: 1 ej. (PLP).

El Fondo d'Elx: 01.XII: 1 ej. (AJR,SAR); 15.XII: 2 ej. (OAP).

## Bubulcus ibis

## Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Marjalera de Castellón	11	-	23	-
Marjal de Almenara-Sagunto	66	240	0	57
Marjal dels Moros	35	23	12	35
Albufera de Valencia	1.083	1.151	1.113	872
Marjal de Xeresa-Xeraco	30	25	25	85
Marjal de Pego-Oliva	16	20	27	11
Salinas de Santa Pola	70	2	0	0
El Fondo	700	0	650	346
El Hondo de Amorós	150	0	0	0
Embalse de Elche	0	2.160	0	1.651
Embalse de la Pedrera	12	0	0	0

Censos de garcilla bueyera en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificó o invernaron al menos 200 ej. Como nidificante se ha detectado 2.173 parejas en 2016 y 1.850 en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 14 de 44 humedales censados para un total de 3.850 ej. en 2016 y en 12 de 45 humedales con un total de 3.135 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.

## Ardea cinerea

## Garza real - Agró blau - Grey Heron

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Marjal de Almenara-Sagunto	0	159	0	116
Marjal dels Moros	105	70	96	14
Albufera de Valencia	278	1.324	442	1.520
Marjal de Xeresa-Xeraco	5	5	10	9
Marjal de Pego-Oliva	8	85	5	51
Embalse de Beniarriés	23	15	28	9
El Fondo	52	13	53	62
Sainas de Santa Pola	3	92	6	66

Censos de garza real en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 10 parejas o invernaron al menos 20 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 11 de 30 humedales para un total de 489 par. en 2016 y en 11 de 31 humedales con un total de 663 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 31 de 44 humedales censados para un total de 1.881 ej. en 2016 y en 28 de 45 humedales con un total de 1.928 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.

## Ardea purpurea

## Garza imperial - Agró roig - Purple Heron

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

## 2016

Albufera de València: 18.III: 1 ej. Primer registro prenupcial (ASI); 03.XI: 1 inm. en arrozales cerca del portet de Sollana. Cita tardía (YAM).

## 2017

Requena: 28.VIII: 1 juv. escasa en la comarca (JAI).

**Albufera de València:** 19.III: 1 ej. Primer registro prenupcial (LAA).

**Villena:** 12.IX: 1 ej. (JCH).

	2016	2017
Localidad	Parejas nidificantes	Parejas nidificantes
Marjal de Almenara-Sagunto	6	6
Marjal dels Moros	3	9
Albufera de Valencia	76	37
Marjal de Xeresa-Xeraco	25	30
Marjal de Pego-Oliva	50	24
El Fondo	9	17

*Censos de garza imperial nidificante en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 5 par. Se ha detectado en un total de 11 de 30 humedales censados para un total de 489 par. en 2016 y en 10 de 31 humedales con un total de 663 par. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

## **Ardea alba**

## **Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas estivales, censos destacados y citas de interés.

### **2016**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 16.II: 6 ej. (JLB).

**Albufera de València:** 201 ej. en el censo de aves acuáticas invernantes (CMA); 20.I: 94 ej. en varios campos inundados de la Llonga (AAC); 22.II: 127 ej. en zonas todavía inundadas y en proceso de fangueo (YAM); 03.III: 157 ej. en las últimas zonas inundadas de l'Albufera (BDJ); 11.V: 2 ad. Posteriormente se confirma la nidificación de esta pareja en la punta de Llebeig (AVA); 14.VIII: 28 ej. Aumento destacado tras los mínimos estivales (BDJ).

**Alacant:** 30.IX: 1 ej. en el parque la Marjal. Primera cita para el paraje (JMT,VCS).

**Salinas de Santa Pola:** 30.I: 15 ej. Máximo invernal; 06.IV: 2 ad.; 06.VI: 1 ej.; 11.X: 35 ej. Máximo anual (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 05.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (JMT,MFS); 30.VIII: 2 ej. Primera cita postnupcial (JPG).

### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.IV: 17 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**La Llosa:** 10.III: 11 ej. (AAC).

**Marjal dels Moros:** 16.VI: 1 ej.; 30.VI: 2 ej. (JPH).

**Albufera de València:** 201 ej. en el censo de aves acuáticas invernantes (CMA); 08.III: 193 ej. en campos inundados de Silla y Catarroja (AAC); 16.III: 73 ej. (AVA); 03.V: 4 ej., uno mostrando caracteres nupciales (PVG); 21.V: 3 inm.; 11.VII: 4 ej. (BDJ); 01.VII: 1 ad. en plumaje nupcial (PVG).

**Requena:** 30.IV: 1 ej. Especie muy escasa en el interior (RMB).

**Salinas de Santa Pola:** 1 par. nidificante (CMA).

**El Fondo d'Elx:** 1 par. nidificante (CMA).

Nuevos eventos de cría en l'Albufera en 2016 y en Santa Pola y el Fondo en 2017. Por otro lado, continúa la progresión ascendente de la invernada en l'Albufera, superándose por primera vez los 200 ej. desde que comenzara a detectarse la invernada a principios del s. XXI.

## **Egretta gularis x garzetta**

## **Garceta dimorfa x garceta común**

Estatus: Visitante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 167/49 (ene-dic).

### **2016**

**La Llosa:** 24.III: 1 ej. (SRC,PGR).

**Albufera de València:** 04.I: 1 ej. en La Foia. Se trata del mismo ej. observado desde hace tiempo en esta zona, y observada a lo largo del año (4.I, 27.I, 30.III, 15.IV, 16.IV, 23.IV, 4.V, 22.VI, 25.V, 19.IX, 23.X y 22.XII) en la Ratlla, arrozales de Sollana y Sueca (AAC); 18.I: 1 ej. Podría tratarse de un ej. diferente a los observados hasta la fecha. Observada del final de la invernada (27.I, 3.II, 8.II, 11.II, 19.II y 3.III) en arrozales de

Alfajar, Sollana y Sueca (BDJ); 05.VI: 1 ej. en arrozales del tancat del Pomero. Se trata de un nuevo ej. no observado hasta la fecha (ASI); 27.VI: 1 ej. en uno de los núcleos coloniales de garzas. Se trata de un ej. diferente (EGO,MRG,TPE).

**Salinas de Santa Pola:** 07.VII: 1 ej. (SAR).

## 2017

**Albufera de València:** 13.I: 1 ej. en arrozales de la Foia próximos a la Ratlla (DMO). El mismo ejemplar, también presente en años anteriores, se observa posteriormente en la misma zona el 26.I (PMP), 28.II (PVG), 3.III (FJG), y 17.III (BDJ); 24.II: 1 ej. observado de nuevo el 8.III (AAC) y el 18.III (YAM) en arrozales de Silla (PFP,MCH,JID); 25.VII: 2 pull. con rastros de negro/gris plomo en las plumas de las alas, en la colonia de ardeidas (GGO,YAM,JID,PVG); 31.X: 1 ej. (EPS).

Siguen presentes estos híbridos en l'Albufera de València, en 2017 con indicios de cría en la colonia de ardéidas. La cita de la Llosa es solo la segunda para la provincia de Castellón.

## Egretta garzetta

## Garceta común - Garseta blanca - Little Egret

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

Localidad	2016		2017	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Marjalera de Castellón	46	-	33	-
Marjal de Almenara-Sagunto	77	443	0	161
Marjal dels Moros	53	2	15	2
Albufera de Valencia	909	3.282	1.149	5.244
Marjal de Xeresa-Xeraco	30	15	30	35
Marjal de Pego-Oliva	51	662	48	58
Embalse de Beniarrés	14		13	
Salinas de Santa Pola	10	18	0	10
El Fondo	55	33	139	41

*Censos de garceta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificó o invernaron al menos 30 ej. Como nidificante se han detectado 1.245 par. en 2016 y 1.427 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 17 de 44 humedales censados para un total de 4.499 ej. en 2016 y en 20 de 45 humedales con un total de 5.578 ej. en 2017. Datos del Servici de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

## PELECANIFORMES

### SULIDAE

## Morus bassanus

## Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Citas estivales, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Peñíscola:** 09.I: 53 ej. censo RAM (ELL,DFF,FRJ); 05.VI: 3 ej. (ELL,FRJ); 06.VIII: 1 subad. (APN); 05.XI: 37 ej. en la jornada RAM (JLA,ELL,BGC); 05.XII: 28 ej. (14 ad.) en la jornada RAM (ELL,BGC).

**Castellón de la Plana:** 11.III: 14 ej. frente a la desem. del riu Sec. Máximo anual (MTB).

**Puerto de Sagunto:** 26.XII: 20 ej. (JPE).

**Cabo de Cullera:** 06.II: 45 ej. (42 ad.) en paso hacia el S (MAL,VBJ,LAA); 05.III: 33 ej. (31 ad.) en vuelo hacia el S (MAL,JLO,VPA); 02.VII: 5 ej. de 2º año desplazándose hacia el S (LAA,JLO).

**Xàbia:** 09.I: 10 ej. en el cabo de la Nao (CAM).

**La Vila Joiosa:** 12.I: 77 ej. Concentración destacada (JMT,OAP).

**Cabo Huertas:** 09.I: 33 ej. (CAM).

**Cabo Cervera:** 22.II: 12 ej. (SAR); 04.XI: 30 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Peñíscola:** 04.II: 70 jornada RAM (ELL,JLA); 03.VI: 1 subad. (ELL).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.III: 27 ej. Máximo anual; 18.VI: presencia de al menos 1 ej. de 2º año y 1 ej. de 3º año en los meses de junio y julio (MTB,JAF).

**Burriana:** 14.I: 48 ej. en la jornada RAM (JLB); 04.II: 738 ej. (21 juv., 19 subad. y 698 ad.) en paso hacia el S durante 3 h. de censo (MIB,JLB,JBC).

**Albufera de València:** 14.I: 49 ej. en la gola del Pujol (RMB).

**Cabo de Cullera:** 14.I: 58 ej. (46 ad.) (MAL,VPA,JLO); 24.V: 3 ej. (VPA).

**Cabo Huertas:** 14.I: 22 ej. (CAM).

**Desemb. río Segura:** 04.I: 18 ej.; 15.I: 31 ej.; 31.XII: 42 ej. (AJR).

**Cabo Cervera:** 18.III: 60 ej. (AJR,SAR).

Destaca la formidable cita de 738 individuos observados desde Burriana en paso a S a principios de febrero, correspondiente a individuos que se dirigen a salir por el estrecho de Gibraltar.

**PHALACROCORACIDAE*****Phalacrocorax aristotelis*****Cormorán moñudo - Corba marina emplomallada - European Shag**

Estatus: Nidificante raro localizado, invernante y migrante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Peñíscola:** 11.II: 12 ej. (ELL); 02.VII: 2 ej. jornada RAM (DFF,FRJ,PML); 03.IX: 9 ej. jornada RAM (ELL,PML,EJL).

**Grau de Castelló:** 20.I: 24 ej. (PGR).

**Penyal d'Ifach:** 25.VII: 8 ej. (VBJ).

**Benidorm:** 09.I: 15 ej. (CAM).

**La Vila Joiosa:** 09.I: 49 ej. (CAM).

**Cabo Huertas:** 04.I: 8 ej. (AJR).

**Isla de Tabarca:** 17.IX: 15 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 18.X: 9 ej. (SAR).

**Puerto de Santa Pola:** 19.XII: 3 ej. (OAP).

**2017**

**Peñíscola:** 14.V: 44 ej. posados bajo Torre Badúm. Al menos 3 juv. (DFF); 03.VII: 16 ej. (ELL); 01.VII: 36 ej. jornada RAM (ELL,JLA,PML); 02.IX: 13 ej. (DEF,JLA,PML).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.XII: 9 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Dénia:** 15.VII: 23 ej. (AJR).

**Cabo de Santa Pola:** 29.XI: 20 ej. (AJR).

**Isla de Tabarca:** 08.VII: 37 ej. (EPBB); 17.IX: 30 ej. (SAR).

***Phalacrocorax carbo*****Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant**

Estatus: Migrante e invernante abundante. Criterio: Citas estivales, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Peñíscola:** 08.IV: 133 ej. en jornada RAM (APN).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.XI: 121 ej. Máximo anual (MTB).

**Castellón de la Plana:** 05.III: 51 ej. en la jornada RAM (PGR, SRC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 08.III: 156 ej. (RMB).

**Embalse de Bellús:** 21.II: 92 ej. (BOR).

**Embalse Beniarrés:** 16.I: 152 ej. (BOR).

**Salinas de Santa Pola:** 01.II: 250 ej. (AJR,SAR); 05.XI: 70 ej. (AJR).

**Desemb. río Segura:** 27.II: 90 ej. (AJR).

## 2017

**Peñíscola:** 01.IV: 166 ej. jornada RAM (ELL,JLA,PML).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.XI: 119 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 237 ej. (JBC,JLB).

**Puerto de Valencia:** 21.VI: 110 ej. posados en una escollera dentro del puerto (GGO).

**Embalse de Bellús:** 14.I: 77 ej. (BOR,DMF).

**Embalse Beniarrés:** 14.I: 82 ej.; 16.XII: 237 ej. (BOR).

**Alacant:** 04.I: 60 ej.; 05.I: 153 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 07.I: 213 ej. (AJR); 25.II: 130 ej. (JBN,NLM); 07.XII: 135 ej. (AJR); 12.XII: 185 ej. (SAR).

**Desemb. río Segura:** 03.II: 235 ej.; 10.III: 200 ej. (AJR).

Localidad	2016	2017
	Ejemplares invernantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	61	64
Embalse de M <sup>a</sup> Cristina	14	72
Marjal de Almenara-Sagunto	92	237
Marjal dels Moros	605	1.360
Albufera de Valencia	812	772
Embalse de Beniarrés	152	82
Embalse de Bellús	81	77
Marjal de Pego-Oliva	52	35
Salinas de Santa Pola	292	540
El Fondo	69	47
Desemb. río Segura	77	121

*Censos de cormorán grande invernante en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que invernaron al menos 50 ej. Se ha detectado en un total de 35 de 44 humedales censados para un total de 2.608 ej. en 2016 y en 34 de 45 humedales con un total de 3.745 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

## ACCIPITRIFORMES

### PANDIONIDAE

#### ***Pandion haliaetus***

#### **Águila pescadora - Águila pescadora - Osprey**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales y estivales, censos destacados, fechas extremas y citas de interés. Conservación: PE.

## 2016

**Vinaròs:** 04.IX: 1 ej. Primero de la campaña de migración postnupcial de rapaces (ELL,DFP).

**Alcossebre:** 26.III: 1 ad. Primera cita primaveral (DES).

**Desemb. río Mijares:** 18.VII: 1 ej. volando y posada en torre eléctrica en cauce del río (JBC).

**Estivella:** 11.IX: máximo de 5 ej. en paso en la campaña de migración postnupcial (PAB,ODP,MPA).

**Marjal dels Moros:** 21.I: 1 ej. (EEGA).

**Albufera de València:** 13.I: 1 ad. realizando lances de pesca en el tancat de Malta (AAC,VBJ); 05.II: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (DMO); 16.III: 3 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC); 31.VIII: 2 ej. alimentándose en el entorno del tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial (AVA); 11.IX: 3 ej. en las orillas S y O de l'Albufera (BDJ); 12.IX: 2 ej. (1 juv.) sobrevolando el tancat de Milia (BDJ).

**Camporrobles:** máximo anual de 2 ej. los días 04 y el 11.IX (RMB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 18.I: cita invernal de 1 ej. (RTV).

**Embalse Beniarrés:** 10.VIII: 1 ej. (PCC).

**Salinas de Santa Pola:** máximos mensuales: 07.I: 1 ej. (JMT,OAP); 08.II: 2 ej. (AJR,SAR); 27.V: 1 ej.; 07.VI: 1 ej. (SAR); 22.IX: 3 ej.; 22.X: 4 ej.; 18.XI: 2 ej.; 31.XII: 2 ej. (AJR).

**Santa Pola:** 09.XII: 1 ej. (JMT,GMG,OAP).

**El Fondo d'Elx:** máximos mensuales: 14.I: de 2 ej. (JMT,OAP,MFS); 08.III: 2 ej. (AJR); 11.IV: 3 ej. (SAR); 30.VIII: 2 ej. (JPG); 14.IX: 5 ej. (SAR); 01.X: 5 ej. (RBA); 25.XI: 3 ej. (JMT,OAP,MFS); 11.XII: 9 ej. (PCC,JEG).

## 2017

**Morella:** 25.VI: 1 ej. (RPB).

**Burriana:** 05.VIII: 1 ej. desplazándose al N (JBC).

**La Llosa:** 06.XI: 1 ej. (AAC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 22.III: 3 ej. en la marjal, 2 e ellas alimentándose y una en paso al S (JBC).

**Marjal dels Moros:** 17.XII: 1 ej. sobrevolando el área (JPH).

**Albufera de València:** 09.I: 1 ej. en el entorno del tancat de la Pipa (RMB,PLC,SSO); 21.II: 1 ej. sobrevolando la laguna (JID,MCH,RFA); 28.V: 1 ej. sobrevolando l'Illa (PMP); 27.VIII: 1 ej. en el entorno de la Ratlla (VBJ); 04.IX: 2 ej. (1 ad. y 1 juv.) sobrevolando el tancat de Milia y 1 ej. en arrozales de Sueca (VLG,BDJ); 17.X: 2 ej. hacia el S a corta distancia el uno del otro (JID); 04.XII: 1 ej. en el tancat de la Pipa (AAE).

**Pantano de Elche:** 01.IV: 2 ej. (OAP).

**Salinas de Santa Pola:** máximos mensuales: 02.I: 3 ej. (AJR); 28.III: 1 ej. (SAR); 25.IV: 1 ej.; 28.IX: 3 ej.; 30.XI: 3 ej.; 15.XII: 4 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 11.II: 4 ej. (EJFO); 12.IV: 2 ej. (AJR); 06.IX: 2 ej. (PLP); 30.XII: 1 ej. (JBN).

## ACCIPITRIDAE

### *Elanus caeruleus*

### Elanio común - Esparver d'espatlles negres - Common Black-shouldered Kite

Estatus: Nidificante raro ocasional, migrante e invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 88/56 (jun-abr).

## 2016

**Els Ibarsos:** 01.I: 1 ad. posado en un cable de tendido de la luz junto a una corneja (FRB).

**Marjal dels Moros:** 25.III: 2 ej. (VET); 26.III: 1 ad. y 3 juv. (AAC); 07.IV: 1 ej. defendiendo territorio frente a un águila calzada; 11.IV: 1 ej. (RMB); 12.IV: 4 ej. (JOB); 23.X: 1 ej. (JPE).

**El Fondo d'Elx:** observaciones de 1 ej. los días 03.I (JMT); 09.I (NGA); 09.II: (JMT,OAP,TGR); 14.III: (JMT, OAP) y 03.IV (SCR).

**Hondo de Amoros:** 07.IV: 1 ej. (SAR).

## 2017

**Albufera de València:** 14.IX: 1 ej. observado en zonas de transición de huerta y arrozales en Sollana (PVG, JSMG,JNE). Primer registro para l'Albufera.

**El Fondo d'Elx:** 02.X: 1 ej.; 16.X: 2 ej. (SAR); 20.X: 2 ej. (AJR,SAR).




Fig. 1 Número de citas acumuladas por meses en la CV




Fig. 2 Número de citas acumuladas por década en la CV

El elanio se ha ido haciendo más y más común a lo largo de los años en la Comunidad Valenciana desde la primera cita conocida de un ej. cazado en Rafelbunyol en 1970 (Dies & Dies en Clavell 2002) (Fig. 2). Desde entonces han tenido lugar 3 episodios de cría, incluido éste que recogemos aquí en la marjal dels Moros. Su fenología en la CV, como vemos en la Fig. 2, viene marcada por su presencia en prácticamente cualquier mes del año, con mayor concentración en los meses de otoño e invierno, cuando expande su rango de presencia en la península Ibérica, en un patrón que es prácticamente idéntico al observado en otras zonas en las que no es un nidificante habitual (de Juana & García, 2015).

### ***Neophron percnopterus***

### **Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas y citas de interés. Conservación: PE.

#### **2017**

**Torre Endoménech:** 25.III: 1 ad. (JBC,JLB).

**Torrechiva:** 26.III: 1 par. (MIB).

**Elx:** 12.XI: 3 ad. y 2 inm. (SGA).

Cita muy tardía en Alicante, nada menos que de 5 ej. Se trata de la segunda cita para el mes de noviembre en la CV tras la observación de 1 ej. en las salinas de Santa Pola en 2010.

### ***Pernis apivorus***

### **Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard**

Estatus: Migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Quadro de Santiago:** 06.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Lucena del Cid:** 02.X: 15 ej. en paso (EORE).

**Nules:** 17.XI: 1 ej. cicleando (LPC).

**La Vall d'Uixó:** 31.VIII: primera cita postnupcial de 12 ej. (JBC).

**Barracas:** 04.IX: 100 ej. Máximo postnupcial en paso de la campaña de migración postnupcial (FLL,EUG).

**València:** 13.V: 178 ej. migrando sobre el casco urbano hacia el N (AAC).

**Albufera de València:** 07.IV: 1 ej. en paso hacia el N sobre la Devesa. Primer registro prenupcial (YAM);

13.V: 283 ej. en migración activa hacia el N en 3 h. Fuerte paso asociado con el viento del NO (YAM); 29.V: 29 ej. en paso hacia el N. Observación tardía coincidiendo con el fuerte viento del O (YAM,VBJ).

**Sinarcas:** 28.VIII: 13 ej. en paso activo (PMON).

**Camporrobles:** máximos destacados de 192 ej. el 01.IX; 510 ej. el 04.IX y 201 ej. el 11.IX (RMB).

**Elx:** 17.V: 55 ej. en migración sobrevolando la ciudad (PPP).

#### **2017**

**Ares del Maestre:** 03.IX: 71 ej. (VBJ).

**Peñíscola:** 02.IX: 79 ej. observados en la jornada RAM (DFE,JLA,PML).

**Vilanova d'Alcolea:** 04.X: 3 ej. migrando al S (JBC).

**Desert de Les Palmes:** 02.IX: 615 ej. en paso hacia el S en 3 h. de censo. En su mayoría llegando desde la costa, probablemente desviados de sus rutas habituales por las fuertes tormentas del día anterior (MTB).

**La Vall d'Uixó:** máximos en la campaña de migración postnupcial de 147 ej. el 02.IX y de 33 ej. el 26.IX (JBC).

**Barracas:** 03.IX: máximo postnupcial de 129 ej. en la campaña de migración postnupcial (FLL,EUG).

**Albufera de València:** 30.IV: 1 ej. en paso sobre la Devesa. Primer registro primaveral (YAM).

**Camporrobles:** máximos postnupciales destacados de 41 ej. el 24.VIII y de 454 ej. el 02.IX (RMB).

**Requena:** 01.V: 153 ej. paso hacia el N en 1,25 h. (JAI); 02.IX: 357 ej. en paso durante 3 h. Máximo postnupcial, y máximo de los últimos 5 años (PRP,NAG); 09.IX: 142 ej. en paso activo en 3 h. (PRP,JAI).

Destaca la cita muy tardía de Nules de 2016 a mediados de noviembre. Apenas hay observaciones de abejero más allá de mediados de octubre.

***Gyps rueppelli*****Buitre moteado - Voltor de Rupell - Rüppell's Griffon**

Estatus: visitante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 15/9 (mar, ago-nov).

**2017**

**Alcoi**: : ¿10.X?: se marca 1 ej. con emisor GPS, anillas y marcas alares (EGM). Otro distinto a éste es visto y fotografiado unos días atrás (PLP). 13.X: 1 ej. distinto (EGM). Total mínimo de 3 ej.

**Sierra de Mariola**: 10.VIII: 1 juv. (XAA); 06.IX: 1 ej. (ALV).

Nuevas citas de este raro buitre africano, catalogado en peligro crítico de extinción y estrechamente emparentado con el buitre leonado. Esta especie se viene observando en la península Ibérica desde 1992. Esta llegada de aves desde África, probablemente tiene su origen en ejemplares que se asocian a los bandos de buitre leonado que vuelven de África tras la invernada (Kemp et al. 2020). Todas las citas en la CV se producen en el muladar de Canyet en Alcoi, salvo dos ej. observados en els Ports en 2009 y 2010 (Prades et al. 2018). Con estos, son ya 9 los ejemplares distintos detectados, algunos de ellos no publicados previamente en anuarios (citas de 2008 a 2010).

***Gyps fulvus*****Buitre leonado - Voltor comú - Eurasian Griffon**

Estatus: Residente y migrante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Castellón**: 526 par. nidificantes (CMA).

**Vilanova d'Alcolea**: censos destacados en el entorno del aeropuerto de 18 ej. el 30.III (JLB); 80 ej. ciclendo juntos el 11.IV (VET); 73 ej. el 01.VII y 57 ej. 01.VIII (JBC).

**Villahermosa del Río**: 29.I: 300 ej. en los alrededores del comedero (JBC,JLB).

**Valencia**: 44 par. nidificantes (CMA).

**Camporrobles**: 14.X: 45 ej. Máximo en campaña de migración de rapaces (RMB).

**Alicante**: 25 par. nidificantes (CMA).

**Pantano de Elche**: 05.XI: 115 ej. (TPM); 06.XI: 94 ej. aves en paso (OAP).

**2017**

**Castellón**: 502 par. nidificantes (CMA).

**Benlloch**: 29.VII: 3 ej. muertos debajo de torres eléctricas (JBC); 29.VI: 42 ej. concentración en el entorno del aeropuerto (MTB); 21.VIII: 15 ej. volando sobre la parte S del aeropuerto (JBC,JLB).

**Valencia**: 46 par. nidificantes (CMA).

**Tuéjar**: 04.IV: 60 ej. (YAM).

**Camporrobles**: 24.VIII: 50 ej. (RMB).

**Alicante**: 22 par. nidificantes (CMA).

**Elx**: 12.XI: 58 ej. (SGA).

***Aegypius monachus*****Buitre negro - Voltor negro - Eurasian Black Vulture**

Estatus: Visitante raro procedente del interior de la península Ibérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 40/33 (sep-jun). Categoría: A, E3.

**2016**

**El Toro**: 14.VI: 1 juv. acosado por un ratonero en el límite entre Abejuela (Teruel) y El Toro (MGT).

**Alpuente**: 05.VI: 1 ej. volando bajo con buitres leonados y un águila real inmadura (EJCP).

**2017**

**Tuéjar**: 13.IX: 1 juv. encontrado desnutrido por un vigilante de Unidad de Prevención (TPA).

**Chelva**: 24.XI: 1 ej. observado desde el casco urbano volando en dirección a Tuéjar (RGG).

**Font Roja**: 28.VI: 1 ej. (PAG).

**Sierra de Mariola**: 29.VI: 1 ej. (XAA).

***Circaetus gallicus******Culebrera europea - Àguila serpera - Short-toed Snake-eagle***

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Sant Mateu:** 19.III: 13 ej. entre Salsadella y Sant Mateu, sedimentadas y en dirección NE (JBC).

**La Vall d'Uixó:** 17.IX: 7 ej. en 3 h. de censo (JBC,JLB).

**Barracas:** 28.VIII: primeros 6 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (FLL,EUG); 26.IX: máximo de 23 ej. en paso (EUG).

**Albufera de València:** 20.III: 11 ej. en migración hacia el N sobre la Devesa en apenas 15 min (ASI).

**Camporrobles:** 04.IX: 9 ej.; 29.IX: 14 ej. Máximo en migración desde el Cardete (RMB).

**Requena:** 25.IX: 14 ej. en paso activo durante 3 h. Máximo postnupcial (PRP,JA,JGA).

**Alcoi:** 06.XI: 1 ej. (EACO).

**Sierra de Mariola:** 01.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (PAS).

**2017**

**Alcalá de Chivert:** 11.II: 1 ej. posado en una torre eléctrica. Cita temprana (JBC); 12.III: 4 ej. ciclando y volando en dirección NE por encima de la sierra prelitoral (IMR).

**Xodos:** 03.III: 4 ej. volando por la llima Bernat (SMS).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 06.XI: 1 ej. posado y volando al SO. Migrante tardío (JBC); 19.XI: 1 ej. (MASA).

**Barracas:** 27.VIII: primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (FLL,EUG).

**Vall de Almonacid:** 19.II: 1 ej. Primera cita anual (PLL,CGR).

**Albufera de València:** 17.VII: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Ratlla. Primer registro postnupcial temprano (PMP); 04.XI: 2 ej. sobrevolando la muntanyeta dels Sants. Cita tardía (MPB).

**Camporrobles:** máximos en campaña de migración de 5 ej. el 02.IX; 9 ej. el 28.IX y 4 ej. el 13.X (RMB).

**Requena:** 01.X: 21 ej. en paso activo durante 3 h. Máximo en los 5 años de campaña de migración postnupcial en la localidad (PRP,JAI).

**Chiva:** 05.III: 1 ej. (ANL).

**Bocairent:** 07.III: 2 ej. (PAS); 12.III: 5 ej. vuelan juntos individuos residentes y en migración (BOR,DMF).

**Sierra Aitana:** 08.III: 1 ej. (JSR).

**Alcoi:** 11.III: 1 par. cópula (BOR).

***Clanga pomarina******Águila pomerana - Àguila pומרània - Lesser Spotted Eagle***

Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 18/6 (oct-dic-mar).

**2016**

**El Fondo d'Elx:** 03.XII: 1 juv. (JMT,AAR,RBB).

**2017**

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. (JMT,IAG,AJR); 6 citas más hasta última observación el 23.III (SAR).

***Clanga clanga******Águila moteada - Àguila cridanera - Greater Spotted Eagle***

Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa; Criterio: Máximos y fechas extremas. Rango: 242/17 (sep-abr).

**2016**

**Santa Pola:** 08.XII: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 02.I: 3 ej. (Tönn, 1 ej. de 2<sup>o</sup> inv. y 1 ad.) (OAP,TGR); 18.III: última cita prenupcial de 1 ej. de 2<sup>o</sup> inv (JMT,OAP); 29.X: 1 ej. (STH); 29.X: 1 ej. (Tönn) (USE); 23.XII: 2 ad. y 1 ej. de 3<sup>er</sup> año. Hasta el momento contamos con 4 moteadas: Tonn, 1 Adulto sin marcar, 1 Adulto con anilla de PVC, 1 ej. de 3<sup>er</sup> año. Más 1 pomerana juvenil y 1 posible híbrido *clanga x pomarina* observado el 24.XI (NGA) (JMT,JMG,OAP).

**2017**

**Albufera de València:** 04.I: 1 juv. observado en arrozales de las zonas altas de Alfafar, posado y acosado continuamente por aguilucho lagunero (JJU). Observado de nuevo los días 06.I (BGA); 13.I (JJU,MAJ,-VPA); 14.I (RMB,LAM,ASZ); 26.I (MCH,JID,GGA); 08.II (PMP) y 04.III (AAC,JOB).

**Salinas de Santa Pola:** 25.II: 1 ej. (AJR); 03.XI: 1 inm. de último año (AJR,SAR); 24.XII: 1 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 25.I: 1 nuevo ad. no detectado hasta el momento con anilla en pata derecha (JMT, OAP); 12.III: última cita prenupcial de 1 ej. (Tönn) (LLO,ALF); 23.XI: 3 ej. (OAP,SAR,MFS).

Además de las citas publicadas, que recogen las fechas extremas y los máximos, se reciben 23 citas más en 2016 y 5 en 2017. Dada la gran cantidad de citas recibidas, cambiamos el criterio y publicamos solo las fechas extremas y los máximos. En total, llevamos recibidas más de 240 citas correspondientes a un mínimo de 17 ejemplares diferentes, posiblemente más, aunque resulta muy difícil calcular el total de aves observadas, sobre todo en el entorno del Hondo, donde parece haber una recurrencia invernal bastante marcada.

***Hieraetus pennatus*****Aguila calzada - Àguila calçada - Booted Eagle**

Estatus: Nidificante y migrante moderado e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, máximos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vinaròs:** 09.X: 7 ej. Máximo registro de la campaña de migración postnupcial (ELL,JLA,FRJ).

**Vilanova d'Alcolea:** 01.VII: 5 ej. (1 MO) (JBC).

**Desemb. río Mijares:** 23.I: 2 ej. de MO (MBM).

**Burriana:** 15.III: 1 ej. migrando al N atacada por cernícalo vulgar (JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 09.XII: 1 ej. (JLB).

**Albufera de València:** 28.III: 4 ej. sobrevolando la Devesa (BDJ); 24.VIII: 2 ej. sobrevolando el racó de l'Olla (AAD); 01.X: 10 ej. (7 MO) en arrozales de Sueca (JLE); 12.X: 6 ej. aparentemente en paso hacia el S (MAJ); 26.X: grupo de 11 ej. (2 MO) cicleando y tomando altura sobre los arrozales de Sollana (YAM); 03.XI: 6 ej. en el racó de l'Olla (YAM); 19.XI: 6 ej. cicleando sobre el tancat de Naia (AVA).

**Cullera:** 18.IX: 5 ej. (3 aparentemente en paso hacia el S), observadas desde el castillo (VBJ,ASL,FGR); 02.X: 9 ej. observados desde la sierra de Cullera (VBJ); 26.XI: 5 ej. en el entorno del Cabegol (EPS).

**Marjal de Pego-Oliva:** 07.XII: 1 ej. (PLP).

**Villena:** fechas extremas de ej. en paso en la campaña de migración postnupcial de rapaces el 04.IX y el 30.X (JCH).

**Salinas de Santa Pola:** 02.I: 4 ej.; 24.XI: 10 ej.; 08.XII: 3 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 18.II: 10 ej. (JMT,MFS); 03.III: 4 ej.; 14.X: 5 ej.; 05.XI: 7 ej. (AJR); 26.XI: 14 ej. dirección O, tomando ascendentes a lo largo del día (EAVP); 06.XII: 8 ej. (PPP,CRE); 31.XII: 3 ej. (MCR).

**EDAR de Santa Pola:** 31.I: 3 ej. (JMT,OAP).

**2017**

**Vinaròs:** 18.X: Máximo registro de 8 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (JLA,FRJ).

**Villanueva de Alcolea:** 29.VI: concentración de 7 ej. en el entorno del aeropuerto de Castellón (MTB).

**Desert de les Palmes:** 30.IX: 15 ej. Máximo postnupcial en 3 h. de seguimiento. 2 ej. hacia el N; 07.X: 7 ej. en paso. 1 hacia el N (MTB).

**Borriol:** 03.XI: 3 ej. sobre los cañares del río Borriol. Son molestadas por un cernícalo (LPC).

**La Vall d'Uixó:** 28.IX: 78 ej. en 3 hora. 67 de ellas muy altas y en vuelo hacia el N (JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 4 ej. (2 de MO) (JBC,JLB); 07.XII: 2 ej. (JLB).

**Estivella:** 21.X: Última cita de 1 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (TPE,MACA,MASA).

**Albufera de València:** 03.II: 16 ej. en el tramo S de la Devesa (YAM); 16.III: 4 ej. sobrevolando la Pipa (AVA); 20.IX: 3 ej. en arrozales de Alfafar (YAM); 08.X: 19 ej. sobrevolando arrozales de Sueca (AAC,MGC,

BDJ); 27.X: 8 ej. cicleando en zonas de huerta de la Punta (JLE); 01.XII: 14 ej. (2 MO) en la Devesa (JLE); 01.XII: 4 ej. en el entorno de Pinedo y la Punta (JLE); 27.XII: 2 ej. (JGG).

**Cullera:** 15.X: 21 ej. migrando (7 ej. al S; 6 ej. al N y 8 ej. sedimentados) (VBJ).

**Marjal de Pego-Oliva:** 12.I: 12 ej. (PLP).

**Salinas de Santa Pola:** 07.I: 2 ej.; 28.IX: 7 ej.; 08.XI: 7 ej. (AJR); 14.XII: 6 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 2 ej.; (AJR); 27.VII: 2 ej. (AJR,SAR); 01.XI: 10 ej.; 07.XII: 9 ej. (AJR).

**Desemb. río Segura:** 03.XI: 2 ej. (AJR,SAR).

### ***Aquila adalberti***

### **Águila imperial ibérica - Àguila imperial - Spanish Imperial Eagle**

Estatus: Visitante raro del interior del la península ibérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 8/7 (feb, jun, sep-nov).

#### **2016**

**Requena:** 10.IX: 1 juv., por su gran tamaño debe tratarse de una h. Pasa sobre el Montote en vuelo dirección SO; 02.X: 1 h. juv. Podría tratarse del mismo ejemplar de semanas atrás (PRP, JAI).

**Sierra de Mariola:** 26.XI: 1 juv. junto a los buitres del proyecto Canyet (EBP,XAA).

#### **2017**

**Aras de los Olmos:** 12.X: 1 juv. (VBJ).

Primeras citas recientes de águila imperial ibérica para la provincia de Valencia y ampliación del rango de aparición al mes de noviembre.

### ***Aquila chrysaetos***

### **Águila real - Àguila reial - Golden Eagle**

Estatus: Residente escaso. Criterio: Citas de interés.

#### **2016**

**Vilanova d'Alcolea:** 07.XI: 5 ej. 3 lejos al N y 2 en la parte S (inm.) (VET); 28.XI: 1 juv. muerto por electrocución bajo torre eléctrica (CMA).

**Alacant:** 10.I: 1 par. Probable nidificación en antiguo nido de águila perdicera (JDL).

#### **2017**

**Comarca Baix Maestrat:** 29.VI: nido con 1 pollo bastante crecido (JBC, JLB).

**Vilanova d'Alcolea:** 16.I: 3 ej. (1 inm. y 2 ad.) (VET).

**El Fondo d'Elx:** 08.I: 1 ad. (OAP); 11.IX: 1 juv. (SAR).

Destacan las concentraciones en el entorno del aeropuerto de Castellón y la cita de cría tardía en 2017.

### ***Aquila fasciata***

### **Águila perdicera - Àguila de panxa blanca - Bonelli's Eagle**

Estatus: Residente escaso. Criterio: Citas de interés. Conservación: VUL.

#### **2016**

**Castellón:** 16 territorios ocupados y 14 par. nidificantes (CMA).

**Alcora:** 22.IX: 2 ad. realizando picados sobre 1 juv. (LPP).

**Vilanova d'Alcolea:** 06.VIII: 4 juv. intentando alimentarse. No observa ninguna anillada (JBC); 19.XI: 1 inm. atacado por un cuervo. Vuela junto a 4 ratoneros (JBC, JLB, MIA).

**Valencia:** 35 territorios ocupados y 24 par. nidificantes (CMA).

**Albufera de València:** 12.II: 1 inm. posado en un camino interior del tancat de la Pipa (AVA). Apenas existen registros de la especie en l'Albufera.

**Requena:** 08.X: 1 ej. de 3<sup>er</sup> año sobre el Montote. Debe de tratarse de un ej. dispersivo (PRP, JAI).

**Alicante:** 23 territorios ocupados y 23 par. nidificantes (CMA).

**Salinas de Santa Pola:** 10.XI: 1 inm. (AJR).

**Santa Pola:** 08.XII: 1 juv. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 08.III: 1 inm. (SAR); 11.XI: 1 subad.; 11.XI: 1 juv. (AJR); 18.XI: 1 inm.; 18.XI: 1 subad. (JMT, OAP); 19.XI: 1 juv. (JMT,IAG,AAR); 21.XII: 2 juv. (AJR,SAR).

## 2017

**Castellón:** 19 territorios ocupados y 17 par. nidificantes (CMA); asentamiento de 3 nuevas perdiceras marcadas con anilla de lectura a distancia por parte del equipo de Biología de la Conservación de la Universitat de Barcelona. Nuevo asentamiento en forma de individuos territoriales a añadir a los detectados en 2011, 2012, 2013 y 2015 (PLL).

**La Vall d'Uixó:** 15.X: 1 h. juv. cicleando, intenta dar caza sin éxito a un zorro, este esquiva el ataque. El águila se posa a escasos metros siendo acosada por multitud de urracas (PMO).

**Serra:** 12.IV: 3 ej. (EWME).

**Valencia:** 34 territorios ocupados y 23 par. nidificantes (CMA).

**Camporrobles:** 28.IX: 1 ad. alejado de territorios conocidos (RMB).

**Cheste:** 28.I: 1 subad. en una pinada entre cultivos, se ha observado también 1 ej. de 1<sup>er</sup> año; 12.II: 1 subad. (ANL).

**Cullera:** 28.I: 1 inm. cicleando y tomando altura sobre la sierra (VBJ).

**Alicante:** 23 territorios ocupados y 22 par. nidificantes (CMA).

**El Pinós:** 02.IX: 3 ej. (AJR,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 05.I: 1 inm. (AJR); 10.I: 1 juv. (OAP); 04.II: 1 juv. (AJR); 04.II: 1 juv. (OAP,TGR); 07.X: 1 juv.; 28.X: 2 ej. (AJR).

**Sierra de Escalona:** 29.XII: 3 ej. (PPP).

Esta especie es prácticamente la única rapaz que sigue en descenso en la Comunidad Valenciana, esto se relaciona con la alta mortalidad que afecta a la especie. Durante los años 2016 y 2017, se han contabilizado un total de 29 águilas muertas (Cs=10 ej. ; V= 8 ej., A= 11 ej.), afectando gravemente a las parejas adultas territoriales. En el estudio de monitorización con GPS, realizado por López (2017), se desprende que de las 24 aves marcadas en la S<sup>o</sup> d'Espada, murieron: 1 por colisión en cable eléctrico, 2 por electrocución, 2 por ahogamiento en balsa de riego, 1 por disparo, 1 por enfermedad y 1 por desaparición, dando una tasa de mortalidad adulta anual entre 44-60%, tasa de la más alta de España y Francia, que es de media un 10% (del Moral & Molina, 2018). Esta mortalidad explicaría la pérdida continua de territorios, que se amortigua parcialmente por la rápida reposición por ej. inmaduros o subadultos, que si bien consiguen mantener el territorio, tiene una afectación negativa en el éxito reproductor.

## ***Accipiter nisus***

## **Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk**

Estatus: Nidificante e invernante moderado, migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Vinaròs:** 04.IX: 1 ej. Primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (ELL, DFF); 07.XII: 1 ej. en el caso urbano acosado por estorninos (DFF).

**Desert de Les Palmes:** 27.VIII: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Barracas:** 28.VIII: 1 ej. Primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (FLL, EUG).

**Estivella:** 04.IX: primera cita de 6 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (SAD, JFR); 11.IX: máximo postnupcial de 13 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (PAB, ODP, MPA).

**Albufera de València:** 26.III: 2 ej. en paso hacia el N (ASI); 21.IV: 2 ej. en migración activa (AAC).

**Camporrobles:** 29.IX: 12 ej. (RMB).

**Cabo de Cullera:** 02.IV: 1 ej. un ave en aparente migración activa hacia el N (MAL, JLO, LAA).

## 2017

**Vinaròs:** 06.IX: 2 ej. Primeros ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (JLA, SAÑ,

FRJ); 25.X: última cita de 1 ej. en paso (JLA,FRJ,JMD).

**Desert de Les Palmes:** 30.IX: 18 ej. en 3 h. de censo. Máximo postnupcial (MTB).

**Barracas:** 27.VIII: 1 ej. Primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (FLL,EUG).

**Estivella:** 26.VIII: 3 ej. Primeros ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (PAB, DCL,MASA); 01.X: máximo postnupcial de 16 ej. de la campaña de migración de rapaces (AAR,DCL).

**Albufera de València:** 25.XI: 2 ej. en arrozales de Alfafar (EPS); 21.XII: 2 ej. en diferentes puntos de las marjales de Sueca (AAC); 26.XII: 2 ej. en el Racó de l'Olla (MCH).

**Picassent:** 01.IV: cita prenupcial de 1 ej. en paso hacia el N (PAB,ODB,MPA).

**Camporrobles:** 28.IX: 6 ej. (RMB).

**Requena:** 01.X: 4 ej. en paso activo durante 3 h. Máximo postnupcial (PRP,JAI).

**Villena:** 03.IX: primeros 2 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (JCH).

**Pantano de Elche:** 17.I: 2 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 02.I: 2 ej. (OAP,TGR).

**Sierra de Escalona:** 29.XII: 5 ej. (PPP).

### ***Accipiter gentilis***

### **Azor común - Astor - Northern Goshawk**

Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante raro. Criterio: Citas de migración e invernada y citas de interés.

#### **2016**

**Catarroja:** 16.IX: 1 ej. sobrevolando la Pipa. Primer registro anual (AVA,MRG).

**Marjal de Pego-Oliva:** 29.IX: 1 ej. (PLP).

#### **2017**

**Marjal dels Moros:** 30.XI: 1 ej. devorando un calamón frente al observatorio de la playa (AAC).

**Albufera de València:** 04.I: 1 ej. posado en una torre eléctrica (PVG); 30.XII: 1 ej. (EAAN).

### ***Circus aeruginosus***

### **Aguilucho lagunero occidental - Arpallot de marjal - Western Marsh-harrier**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: PE.

#### **2016**

**Vinaròs:** 27.VIII: 1 h. ad. Primer ej. en paso (JLA,SAÑ); 10.IX: 31 ej. Máximo postnupcial (JLA,FRJ,PML).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 5 par. nidificantes (CMA).

**Quadro de Santiago:** 17.III: 28 ej. en paso hacia el N; 04.V: 1 h. ad. Última cita primaveral (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 16.II: 7 ej.; 09.XII: 9 ej. (h. y juv.) (JLB).

**Estivella:** 28.VIII: 1 m. Primer ej. en paso hacia el S de la campaña de migración postnupcial de rapaces (AAR,JFR); 11.IX: 16 ej. Máximo registro postnupcial (PAB,ODP,MPA); 29.X: 1 h. ad. Último registro postnupcial (TPE,MACA,MASA).

**Marjal dels moros:** 16.I: 8 ej. censo invernal en dormitorio (XGP,JMH).

**Albufera de València:** 13.I: 470 ej. XVII censo invernal en dormitorio. Segunda cifra más elevada obtenida desde el inicio de este censo. L'Albufera, junto al Delta de l'Ebre, son los humedales más importantes del litoral mediterráneo español para la invernada de la especie (SVO); 1 par. nidificante (CMA).

**Requena:** 08.X: 7 ej. en paso activo durante 3 h. Máximo postnupcial (PRP,JAI).

**Cullera:** 11.IX: 24 ej. (5 m. ad.) en paso hacia el S (VBJ); 18.IX: 15 ej. (1 m.) en paso hacia el S (VBJ,ASL,FGR).

**Marjal de Xeresa-Xeraco:** 17.I: 11 ej. censo invernal en dormitorio (JML).

**Marjal de Pego-Oliva:** 16.I: 15 ej. censo invernal en dormitorio (JML,ASL,LDE).

**Villena:** 04.IX: 2 ej. Primeros en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (JCH); 11.IX: 8 ej. Máximo registro postnupcial (JCH,MLG).

**Embalse de Embarcaderos:** 1 par. nidificante (CMA).

**Salinas de Santa Pola:** 02.I: 14 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 20.I: 120 ej. censo en dormitorio (JMT,OAP,MFS); 12.VIII: 2 juv. (JMT,PCC,JEG); 05.XI: 100 ej. (EGM).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 3 par. nidificantes (CMA); 28.I: 13 ej. (h. y juv.) Máximo invernal; 16.XII: 14 ej. en dormitorio (MTB, JAF).

**Desert de Les Palmes:** 02.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial en campaña de migración de rapaces (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 07.XII: 8 ej. (JLB).

**Estivella:** 26.VIII: 1 ej. Primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (PAB,DCL,-MASA); 03.IX: 13 ej. Máximo registro postnupcial (YAM,MAJ,EPS).

**Marjal dels moros:** 2 par. nidificantes (CMA); 14.I: 9 ej. censo invernal en dormitorio (XGP).

**Albufera de València:** 1 par. nidificante (CMA); 09.I: 362 ej. a la entrada de dormitorios localizados a lo largo de todo el perímetro de la laguna de l'Albufera. Se trata de una cifra bastante inferior a la obtenida en los dos últimos años (con 462 ej. en 2015 y 458 ej. en 2016) y similar a la registrada en 2014 (SVO).

**Marjal de Xeresa-Xeraco:** 1 par. nidificante (CMA).

**Marjal de Pego-Oliva:** 1 par. nidificante (CMA); 14.I: 16 ej. censo invernal en dormitorio (JML).

**Embalse de Bellús:** 01.VII: 1 ej. (BOR).

**Embalse de Embarcaderos:** 2 par. nidificantes (CMA).

**Villena:** 03.IX: 1 ej. Primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (JCH).

**Clot de Galvany:** 08.XII: 6 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 06.V: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 01.II: 129 ej. censo anual en dormitorio (JMT,OAP,MFS); 17.VIII: 2 ej. (SAR).

Siguen los buenos números en invernada y en época de cría, detectándose la nidificación hasta en 6 parejas, con un total de 10 parejas, igualando los máximos de 2014.

## **Circus cyaneus**

## **Aguilucho pálido - Arpellot pàl·lid - Hen Harrier**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

## 2016

**Alcossebre:** 18.III: 1 m. ad. Única cita anual (DES).

**Segorbe:** 12.II: 1 m. ad. en dirección S sobre la sierra Calderona en un día de viento muy fuerte (PLL).

**Albufera de València:** 05.II: 1 inm. en arrozales de la Llonga (DMO); 03.IX: 1 h. posada en campos en barbecho cerca del Borronar. Primer registro postnupcial temprano (EPS); 26.XI: 1 ej. (h o juv.) en arrozales de la Llonga (JMH).

**Alcoi:** 22.V: 1 ej. (EACO).

**Villena:** 15.XI: 1 m. ad. (MCR).

**Elx:** 12.XI: 1 ej. (NGA).

**Salinas de Santa Pola:** citas de 1 h. los días 23.I y 10.XI (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.III: 2 ej. (m. y h.) (JMT,OAP); 06.X: 1 juv. (SAR); 12.XI: 1 m. ad. (JBN).

## 2017

**Laguna de Sant Mateu:** 21.I: 1 h. con colores muy claros en cabeza y dorso. Posible ej. leucístico (ELL,DFE).

**Ares del Mestre:** 10.III: 1 m. ad. (RPB).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 28.I: 1 h. (MTB,JAF).

**Islas Columbretes:** 09.IV: 1 h. (LGB).

**Caudiel:** 18.I: 1 m. (JMA).

**Serra:** 13.XI: 1 m. (JMA).

**Albufera de València:** 02.I: 1 ej. en arrozales de Sueca (AAS); 04.I: 1 m. ad. en arrozales de Cullera (PMP);

04.II: 1 ej. aparentemente juv. en arrozales del Peirat (MAL,LAA); 24.VIII: 1 juv. en el Borrónar. Primer registro postnupcial temprano (EPS); 07.IX: 1 juv. en arrozales del Recatí (MCH); 03.XII: 1 ej. en arrozales del Malvinar (RNA); 03.XII: 1 m. en vuelo de caza en los arrozales del Peirat (MAL,LAA).

**Chera:** 18.XII: 1 m. en el paraje de la Herrada de Chera (PRP).

**Chiva:** 05.III: 2 h. (juv. y ad.) (ANL).

**Ayora:** 02.III: 1 m. ad. (JBS).

**Marjal de Pego-Oliva:** 09.III: 1 m. (PLP).

**Finestrat:** 29.XII: 1 ej. (EDBA).

**Salinas de Santa Pola:** citas de 1 h. los días 07.I y 20.XI (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 02.I: 2 ej. (m. y h.) (OAP,TGR); 04.III: 1 ej. (PCC,JEG); 11.XI: 2 ej. (JMT).

Destacan las fechas extremas de l'Albufera en 2017 de finales de julio y la tardía de 2016 en Alcoi del 22.V

### **Circus macrourus**

### **Aguilucho papialbo - Arpella pàl·lida russa - Pallid Harrier**

Estatus: Migrante raro procedente del E y el extremo NO de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 50/17 (sep-mar).

#### **2016**

**Albufera de València:** 06.XII: 1 juv. en arrozales de la llonga (PFP), observado de nuevo el 08.XII (JMH, XGP), el 10.XII (AGO,JPR,JTM) y el 22.XII (AAC).

**Sierra Aitana:** 13.III: 1 ej. (PCC).

**Embalse Beniarrés:** 06.I: 1 juv. (PCC).

**Salinas de Santa Pola:** 26.XII: 1 juv., posiblemente el mismo observado en el Hondo (OAP),

**El Fondo d'Elx:** 02.I: 1 juv. (OAP,TGR), observado de nuevo el 17.I (NGA) y el 05.III (HCO); 12.XI: 1 juv. (JMT,OAP,PCC), observado de nuevo los días 06.XII (PPP,CRE), 23.XII (JMT,OAP) y 29.XII (OAP); 17.XII: 1 h. híbrida *macrourus x pygargus* (identificación confirmada por Dick Forsman) (JOP,JSG).

#### **2017**

**Albufera de València:** 13.I: 1 juv. cazando en arrozales de Massanassa. Dada la distancia de esta observación y algunos rasgos del plumaje observados (secundarias mucho más claras), podría tratarse de un ejemplar diferente al observado el pasado mes de diciembre (MAJ,VPA); 15.I: 1 juv. ya observado en diciembre de 2016 (ANZ).

**El Fondo d'Elx:** citas del juv. de diciembre de 2016 los días 02.I (OAP,TGR); 01.II (YAM) y 02.III (GOW).

**La Marina:** 10.I: 1 ej. sobrevolando el jardín de casa (NGA).

Máximo histórico en 2016 con hasta 5 ej. distintos. La especie se viene citando casi anualmente desde 2009, tras los primeros registros históricos en 2005 en los marjales de Almenara y Chilches.

### **Circus pygargus**

### **Aguilucho cenizo - Arpellot cendrós - Montagu's Harrier**

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

#### **2016**

**Censo anual:** censo anual Comunidad Valenciana: Interior Castellón 143-149 par.; Prat de Cabanes-Torreblanca 4-5 par.; lagunas de La Mata-Torrevieja 9 par. Total CV: 156-163 par. (CMA).

**Alcossebre:** 19.III: 2 h. ad. Primera cita anual (DES).

**Quadro de Santiago:** 21.IV: última cita primaveral de 1 par. (MTB).

**Barracas:** 08.X: 1 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (FLL).

**Albufera de València:** 23.VIII: 1 ej. (h. o juv.) en arrozales de Alfafar. Primer registro postnupcial (ASI).

**Marjal de Xeresa-Xeraco:** 17.VIII: 1 juv. en dirección S (VBJ).

**2017**

- Vinaròs:** 09.IX: primeros 2 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (ELL,DFE,PML).  
**Marjal dels Moros:** 10.III: 1 ej. (DGA).  
**Requena:** 20.VIII: 1 h. ad. en paso activo durante 3 h. Único registro postnupcial (PRP, JAI).  
**Albufera de València:** 30.VIII: 1 h. en paso. Primer registro postnupcial (MCH, JVM).  
**Marjal de Pego-Oliva:** 07.IX: 1 ej. de 1<sup>er</sup> año melánico (PLP).  
**Salinas de Santa Pola:** 30.III: 1 m. (AJR).  
**El Fondo d'Elx:** 09.XI: 1 juv. (SAR).  
**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 18.III: 2 m. (ASM).  
**San Miguel de Salinas:** 18.III: 1 m. Primera cita prenupcial (LGR).

***Milvus milvus*****Milano real - Milà reial - Red Kite**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

- Morella:** 28.I: 1 ej. planeando enfrente de la ciudad (JBC); 01.XII: 1 ej., varias citas hasta el 14.XII (RPB, ALR, JCMO); 26.XII: 1 ej. caza y se mueve junto al casco urbano de Morella (FRB).  
**Villafranca del Cid:** 12.XII: 1 ej. (RPB, ALR, JCMO).  
**Vilanova d'Alcolea:** 25.II: 1 ej. volando sobre la pista en dirección al NO, atacado por cuervos (JLB, JBC); 05.IX: 1 ej. (SMS); 12.IX: 1 ej.; 25.XII: 1 ej. posado (VET).  
**Benlloch:** 03.XII: 1 ej. volando hacia el interior (AMG).  
**Benicàssim:** 08.X: 1 ej. (CNO).  
**Burriana:** 25.II: 1 ej. (JBC, JLB).  
**Utiel:** 17.II: 1 ej. sobrevolando la autovía (PRP); 13.III: 1 ej. (JOB).  
**Albufera de València:** 05.XI: 1 ej. en la partida de Alfassar (OLL, JFN, JALO).  
**Villena:** 23.X: 1 ej. volando sobre la plaza del pueblo (MCR); 30.X: 1 ej. (JCH).  
**El Fondo d'Elx:** 02.I: 1 ej. (OAP, TGR); 14.X: 1 ej. (JSR).

**2017**

- Forcall:** 14.VII: 1 ej. Existe otra cita de 1 ad. en la comarca sin fecha conocida. Son las primeras citas estivales de esta especie en la zona (RPB, JCMO).  
**Morella:** 14.II: 1 ej. Varias citas más en la zona hasta el 28.II (RPB, JCMO).  
**Ares del Maestre:** 12.VII: 1 subad. (RPB, JCMO); 30.IX: 1 ad. (RPB, ALR).  
**Rosell:** 19.II: 1 ej. volando al NO (JBC).  
**Alcossebre:** 13.IV: 1 ad. Única cita anual (DES).  
**Torre Endoménech:** 04.X: 1 ej. volando al S (JBC).  
**Vilanova d'Alcolea:** 16.I: 1 ej. (VET); 21.VII: 3 juv. junto a 1 milano negro haciéndose pasadas (MTB); 27.VII: 1 ej. volando junto a un milano negro (JBC); 04.X: 2 ej. volando al S (JBC); 30.XI: 2 ej. entre el aeropuerto y las granjas de cerdos de Benlloch (JBC); 16.XII: 6 ej. en el tramo Vall d'Alba -Benlloch-Aeropuerto (JBC, JLB).  
**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.IV: 1 ej. (MTB, JAF).  
**Benlloch:** 29.IX: 4 ej. (JBC); 07.XI: 2 ad. volando por la zona (SMS).  
**Vall d'Alba:** 16.XII: 1 ej. volando sobre la carretera (JBC, JLB).  
**Cabanes:** 30.XI: 3 ej. volando juntos sobre la autovía, dirigiéndose hacia el O (JBC).  
**Desert de Les Palmes:** 29.X: 1 ej. (MTB).  
**La Vall d'Uixó:** 26.IX: 8 ej. en 3 h.; 05.X: 2 ej. migrando al S (JBC).  
**Chilches:** 27.XII: 1 ej. volando bajo hacia en SO (JBC, JLB).  
**Barracas:** 21.X: última cita de 1 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (JMA).  
**Burjassot:** 05.XII: 1 ej. (JBL).

**Albufera de València:** 25.IX: 1 ej. en paso (RBB); 01.X: 1 ej. en arrozales de Cullera (LAA).

**Vallada:** 14.XII: 1 ej. (AAC).

**Villena:** 29.XII: 11 ej. en dormitorio (JMG).

**Albatera:** 28.I: 1 ej. (PMON).

**Sinarcas:** 29.XII: 2 ej. uno con el plumaje muy dañado, posiblemente por disparo (JMG).

Las citas de milano real se concentran fundamentalmente en el tercio N de la CV. Destacables las citas de 2017 del mes de julio en Castellón y el paso de 8 ej. en un mismo día en Vall d'Uixó.

## ***Milvus migrans***

## **Milano negro - Milà negre - Black Kite**

Estatus: Migrante común, nidificante raro muy localizado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

### **2016**

**San Rafael del Río:** 04.V: 10 ej. a baja altura por una zona de olivar (ELL).

**Sant Mateu:** 11.VIII: 29 ej. grupo cicleando (APN).

**Alcossebre:** 17.III: 1 ad. Primer a cita anual; 01.IV: 7 ad. en migración al N (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 28.III: 1 ej. aparentemente en migración (VET); 26.IV: 10 ej. volando hacia el N (SMS); 01.VII: 6 ej.; 01.VIII: 12 ej. (JBC).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.V: 7 ej. (EARU).

**Albufera de València:** 13.V: 2 ej. en paso hacia el N sobre la Devesa (YAM).

**Camporrobles:** 04.IX: 7 ej.; 11.IX: 5 ej. (RMB).

**Requena:** 27.III: 1 ej. (JAI); 17.IX: 13 ej. en migración activa en 3 h. Máximo postnupcial (PRP,JAI).

**Villena:** 06.V: 1 ej. volando sobre la planta de residuos urbanos (MCR).

**La Marina:** 16.II: 1 ej. (NGA).

**Sierra de Mariola:** 11.V: 2 ej. (EBP).

### **2017**

**Alcossebre:** 27.III: 1 ej. Primera cita anual (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 29.VI: presencia estival de 1 ej. durante los meses de junio y julio (MTB).

**Barracas:** 03.IX: 11 ej. Máximo en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (FLL,EUG).

**Albufera de València:** 06.III: 1 ej. en marjales del Saladar. Primera cita anual (RPL); 05.IV: 1 ej. a baja altura hacia el S (JID,MCH); 11.V: 1 ej. en paso hacia el N (YAM,MAJ,GGO) 20.VII: 2 ej. volando juntos hacia el N (PVG,YAM,AVA).

**Camporrobles:** 02.IX: 8 ej. (RMB).

**Requena:** 02.IX: 40 ej. en paso activo durante 3 h. Máximo de los últimos 5 años (PRP,NAG).

**Alcoi:** 26.VIII: 2 ej. en el muladar (BOR).

**Crevillent:** 05.XI: 1 ej. (EOTH).

**Torreveja:** 05.XI: 1 ej. (EOTH).

## ***Buteo rufinus***

## **Busardo moro - Aligot rogenic - Long-legged Buzzard**

Estatus: Divagante del N de África y el E de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 8/8 (mar, sep-nov).

### **2016**

**Villafranca del Cid:** 11.VI: 1 ej. llegando desde Teruel, vuela por la zona y vuelve hacia Teruel (RPB, ALR,CFA); observado de nuevo y fotografiado el 02.VII (RPB,ALR,PGR,JCMO). Determinado tentativamente como *B. rufinus rufinus* por su mayor tamaño, especialmente por la longitud de las alas. Cita no tramitada al CR-SEO.

Al tratarse de una identificación tentativa y no estar tramitada al CR-SEO no se contabiliza en el rango.

**Buteo buteo****Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzard**

Estatus: Residente y migrante escaso, invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vinaròs:** 04.IX: Primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (ELL, DFF); 30.X: Última cita postnupcial de 1 ej. en paso (JLA, FRJ, PML).

**Vilanova d'Alcolea:** 01.II: 11 ej. la mayoría en la zona S; 28.III: 5 ej. (VET); 19.XI: 4 ej. volando junto uniéndose a un águila perdicera subadulta y un cuervo (JBC, JLB, MIA); 13.XII: 4 ej. (JBC).

**Cabanes:** 23.XII: 3 ej. (JBC, JLB).

**Desemb. río Mijares:** 12.XII: 2 ej. (JBC).

**Burriana:** 22.I: 3 ej. (JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 09.XII: 3 ej. (JLB).

**Albufera de València:** 25.I: 6 ej. juntos al atardecer en zonas arboladas (ASI); 16.II: 11 ej. cicleando sobre el Rabisanxo y posteriormente tomando rumbo N, seguramente en migración activa (AAC); 23.XII: 8 ej. dispersos en arrozales entre Cullera y Corbera (BDJ).

**Elx:** 28.I: 4 ej. (SAR).

**Santa Pola:** 08.XII: 4 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.III: 3 ej. (AJR, SAR); 06.XII: 5 ej. (PPP, CRE).

**Lagunas de Lo Monte:** 24.II: 3 ej. (PPP, TGR, CSN).

**2017**

**Vinaròs:** 25.X: Última cita de 2 ej. en paso (JLA, FRJ, JMD).

**Alcossebre:** 25.III: 1 ad. última cita prenupcial (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 10.I: 5 ej. (JLB); 29.VII: 5 ej. (JLB, JBC); 15.XI: 10 ej. (VET).

**Desert de Les Palmes:** 22.X: 9 ej. Máximo anual en 3 h. de censo (MTB).

**Quadro de Santiago:** 25.III: 1 ad. Última cita prenupcial (MTB).

**Grau de Castelló:** 16.XII: 3 ej. (SRC).

**Desemb. río Mijares:** 03.XII: 4 ej. (MBM).

**Moncofa:** 26.I: 3 ej. (JBC, JLB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 4 ej. (JBC, JLB); 13.X: 3 ej. (JLB).

**Estivella:** 01.X: máximo registro postnupcial de 7 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (AAR, DCL).

**Albufera de València:** 21.II: 5 ej. posados a lo largo de la catenaria ferroviaria entre Sollana y Sueca (JLE); 29.X: 7 ej. en arrozales de la Llonga y la Socarrada (BDJ); 17.XI: 10 ej. en marjales de Sueca y Sollana; 06.XII: 8 ej. cicleando juntos y emitiendo continuas vocalizaciones a la entrada de la población del Saler (AAC).

**Requena:** 14.X: 2 ej. en paso activo durante 3 h. de observación. Único registro postnupcial (PRP, JAI).

**Marjal de Pego-Oliva:** 09.III: 5 ej. (PLP).

**Salinas de Santa Pola:** 25.II: 3 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 13.I: 3 ej.; 25.II: 4 ej.; 30.IV: 1 ej. (AJR); 26.IX: 4 ej. (SAR); 01.XI: 3 ej. (AJR).

**GRUIFORMES****OTIDAE****Otis tarda****Avutarda común - Avutarda - Great Bustard**

Estatus: Nidificante raro muy localizado. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Ayora:** 04.XI: 22 ej. alimentándose en un campo; observados 20 ej. de nuevo el 05.XI (GGO).

***Tetrax tetrax*****Sisón común - Sisó - Little Bustard**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de invernantes, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

El Fondo d'Elx: 20.VII: 4 ej. (AJR); 08.VIII: 2 ej. (SAR); 14.IX: 1 ej. (AJR); 29.X: 1 ej. (STH).

**2017**

Caudete de las Fuentes: 30.V: 1 ej. volando sobre la A3 (VBJ).

Villena: 25.II: 3 m. juntos en la zona de Cañada de Almela; 30.IV: 1 m. (BOR,DMF).

El Pinet: 30.XII: 3 ej. (MNG).

El Fondo d'Elx: 25.VIII: 5 ej. (AJR,SAR); 22.IX: 6 ej.; 06.X: 7 ej. (AJR); 17.XII: 3 ej. (OAP).

**RALLIDAE*****Rallus aquaticus*****Rascón europeo - Rascló - Water Rail**

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Conservación: EP.

**2016**

La Mata de Morella: 26.V: 1 par. Localidad cría en el interior (RPB).

Villafranca del Cid: 23.IV: 2 ej. Localidad nidificación en el interior (RPB).

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.VIII: 11 ej. Máximo anual en transecto de 1,2 km (MTB).

Quadro de Santiago: 16.IV: 1 juv. Primer juv. del año. Varias parejas nidificantes en el humedal (MTB).

Albufera de València: 22.XII: 16 ej. en el tancat de la Pipa (AVA).

**2017**

Prat de Cabanes-Torreblanca: 18.II: 9 ej. Máximo prenupcial en censo de 1,2 km; 01.XI: 6 ej. Máximo post-nupcial en censo de 1,2 km (MTB,JAF).

Quadro de Santiago: 04.V: 1 juv. Primer juvenil del año (MTB).

Marjal dels Moros: 21.X: 9 ej. (GCH).

Albufera de València: máximos en el tancat de la Pipa de 8 ej. el 22.XI y de 11 ej. el 21.XII (AVA).

Requena: 06.VIII: 2 par. (RMB).

Albufera de Gaianes: 14.V: 3 ej. (BOR).

***Crex crex*****Guión de codornices - Guatlla maresa - Corn Crake**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas la citas recibidas. Rango: 12/13 (sep-nov).

**2016**

Catarroja: 29.IX: 1 juv. recogido de madrugada en el interior de un patio del casco urbano de Valencia. Es liberado en perfecto estado en el tancat de la Pipa (CDR).

Alcoi: 27.XI: 1 ej. mort per tir d'escopeta a la serra dels Plans (PCC).

Nuevas citas de este escaso rálido, de nuevo, las citas corresponden a ej. recogidos o muertos por caza. De los 13 ejemplares citados en la CV, tan solo 1 corresponde a un ave observada viva en el medio natural.

***Porzana parva*****Polluela bastarda - Picardó - Little Crake**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

Quadro de Santiago: 03.IV: 1 h. Única cita anual (MTB).

**2017**

Prat de Cabanes-Torreblanca: 09.II: 1 ej. Primera cita anual; 18.II: 1 m. cantando (MTB,JAF).

Quadro de Santiago: 14.III: 1 h.; 23.III: 1 m. sale volando en una zona con carrizo; 25.III: 1 ej.; 29.III: 1 m.

reclama y sale corriendo por una zona parcialmente inundada; 08.IV: 1 ej.; 22.V: 1 ej. que permanece en una zona parcialmente inundada hasta mediados de junio (13.VI) (MTB).

**Clot de la Mare de Deu:** 29.IV: 1 ej. (JMI).

**Marjal dels Moros:** 19.III: 2 ej. (GGO); 31.III: 3 m. vistos juntos en la misma zona (AAC); 31.III: 4 ej. (JOB); 05.IV: 2 ej. (1 m. y 1 h.) (AAC); 06.IV: 1 ej.; 12.IV: 1 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 23.III: 1 h. en la Pipa. Primer registro prenupcial, observada de nuevo el 02.IV (BDJ); 29.III: 1 m. en el Racó de l'Olla picando en la orilla del agua sobre enea (JID,MCH).

### **Porzana pusilla**

### **Polluela chica - Picardonet - Baillon's Crake**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 39/33 (dic-sep).

#### **2016**

**Quadro de Santiago:** 22.IV: 1 m. en un pequeño herbazal inundado (MTB).

**Albufera de València:** 01.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 14.IV: 1 ej. (JSMG,DGS).

**El Fondo d'Elx:** 26.III: 1 ej. oído. Comentan que se vió otro ej. en la misma zonas dos días antes (NGA).

#### **2017**

**Marjal dels Moros:** 27.III: 1 ej.; 05.IV: 1 ej. diferente al observado el 27.III (AAC); 07.IV: 1 ej. diferente a los observados anteriormente. Presente hasta el 10.IV (AAC,ABG,AAD); 10.IV: 2 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 11.IV: 1 ej. reclamando al atardecer en uno de los filtros verdes del tancat de la Pipa (PVG); 21.VI: 1 ej. cantando en el tancat de la Pipa. Uno de los escasos registros realizados en el periodo reproductor (AVA,PVG,YAM).

**El Pinet:** 05.IV: 1 ej. (SAR).

### **Porzana porzana**

### **Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crake**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 09.X: 1 ej. expulsado por un rascón, única cita postnupcial (MTB).

**Quadro de Santiago:** 09.III: 1 ej. Primera cita anual; 02.IV: 6 ej. Máximo primaveral en censo de 2,5 km; 26.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Marjal dels Moros:** 07.IX: 1 ej. (RNU).

**Clot de Galvany:** 10.III: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 03.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (JMT,FBO).

#### **2017**

**Quadro de Santiago:** 12.III: 1 ej. Primera cita anual; 26.IV: 1 ej. Última cita primaveral. Total de 23 citas en el área esta primavera (MTB).

**Marjal dels Moros:** 31.III: 7 ej. en diferentes punto de la marjal (AAC); 31.III: 8 ej. (JOB); 05.IV: 8 ej. en diferentes puntos de la marjal (AAC).

**Albufera de València:** 04.III: 1 ej. un ave en el barranco del Poio. Primera cita anual (AAC); 21.III: 2 ej. (posiblemente hasta 3) en la el tancat de Milia (AAC); 25.IV: 1 ej. en el tancat de la Pipa (AAC,ABU).

**El Fondo d'Elx:** 25.II: 1 ej. (EJNA,SMO).

### **Porphyrio porphyrio**

### **Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen**

Estatus: Nidificante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Quadro de Santiago:** 10.III: 1 ej. Primera cita para la localidad (MTB).

**Alboraya:** 25.III: 23 ad., uno de ellos con 2 pull. (RMB).

**Albufera de València:** 24.IX: 94 ej. en l'Illa, algunos alimentándose en arrozales recién cosechados (BDJ).

**El Pinet:** 04.II: 2 ad. y 2 pull. de una semana. Cita de reproducción temprana (SAR).

**Clot de Galvany:** 10.XI: 31 ej. (SCEA).

## 2017

**Peñíscola:** 04.III: 1 ad. alimentándose junto al carrizal (BGC).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 21.XII: 6 ej. Máximo anual en balsas de Torreblanca (MTB,JAF).

**La Llosa:** 05.XII: 50 ej. (MASA).

*Censos de calamón común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 15 parejas o invernaron al menos 25 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 16 de 30 humedales para un total de 260 par. en 2016 y en 18 de 31 humedales con un total de 186 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 14 de 44 humedales censados para un total de 255 ej. en 2016 y en 14 de 45 humedales con un total de 300 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Prat de Cabanes-Torreblanca	19	29	17	41
Marjal de Almenara-Sagunto	34	42	14	26
Marjal dels Moros	23	13	8	7
Albufera de Valencia	39	67	60	95
Marjal de Xeresa-Xeraco	25	20	25	25
Marjal de Pego-Oliva	4	7	5	25
Salinas de Santa Pola	24	5	1	11
El Fondo	75	37	33	34

## Gallinula chloropus

## Gallineta común - Polla d'aigua - Moorhen

Estatus: Residente nidificante común, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Desem. río Seco:** 20.I: 49 ej. Máximo anual en la desembocadura (MTB).

**Desem. del Carraixet:** 14.XI: 123 ex. censats al llit del bnc. en transecte de 3 km x 55 m d'ample (densitat de 7,45 ex./Ha) (RMB).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 19.III: 35 ej. Máximo anual en recorrido de 1,2 km en zona de contacto de la marjal con cultivos (MTB,JAF).

**Desem. río Seco:** 01.I: 39 ej. Máximo invernal (MTB).

**Desem. del Carraixet:** 20.II: 132 ej. censats al llit del barranc en transecte de 3 km x 55 m d'ample (8 ex./Ha). Construcció de nius (RMB); 07.III: 136 ex. (8,24 ex./Ha) màxima densitat; 24.XI: 128 ex. (7,75 ex./Ha) (RMB).

**Albufera de València:** 11.I: 25 ej. a la sequia de l'Horta de Carpesa (RMB).

**Embalse Beniarriés:** 14.V: 14 ej. (BOR).

**Albufera de Gaianes:** 29.IV: 20 ej. (BOR).

*Censos de gallineta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 15 parejas o invernaron al menos 100 ej. Datos orientativos, algunas poblaciones importantes como las de la Albufera de València no han sido cuantificadas. - No cuantificado. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Prat de Cabanes-Torreblanca	-	77	-	97
Desem. del río Mijares	11	119	13	64
Marjal de Almenara-Sagunto	75	110	24	-
Marjal de Xeresa-Xeraco	200-300	250	300	250
Marjal de Pego-Oliva	15	134	37	183
Salinas de Santa Pola	160	257	85	196
El Fondo	328	449	177	372

## Fulica cristata

## Focha moruna - Fotja banyuda - Red-knobbed Coot

Estatus: Residente y nidificante raro muy localizado. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE. Categoría: A, E3.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.X: 1 ej. Única cita anual, no se conocen citas anteriores en la localidad (MTB).

**Albufera de València:** 2 par. nidificantes (CMA); 30.III: 1 ej. sin collar, junto con fochas comunes en el canal del Port de Catarroja; 21.IV: 1 ej. marcado con collar de lectura a distancia en el tancat de la Pipa.

**El Pinet:** 04.II: 1 ej. marcada con collar y liberada en la zona en febrero de 2015; 20.V: 1 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 2 par. nidificantes (CMA); 27.II: 4 ej. (EIGU); 13.III: tras un periodo de ausencia, 2 ej. con collar de lectura a distancia (JMT,AVDH); 07.IV: 2 ej. con anillas de PVC (JMT); 21.V: 4 ej. (EASS); 22.VII: 2 ej. (AJR); 11.VIII: 4 ej. (PCC); 11.VIII: 4 ej. (PCC,JEG); 01.IX: 4 ej. (DSU); 25.XI: 1 ej. con collar de PVC (JMT,OAP); 07.XII: 4 ej., uno de ellos sin collar (PAS); 09.XII: 4 ej., 3 anillados (EIGU).

## 2017

**Albufera de València:** 1 par. nidificante (CMA); 14.III: 2 ej. (uno de ellos con collar de lectura) en la Pipa (AVA); 11.IV: continúa presente 1 par. en el tancat de la Pipa (AVA,VLG,BDJ).

**El Fondo d'Elx:** 3 par. nidificantes (CMA); 01.I: 5 ej. junto al centro de información, 4 anilladas y 1 sin anillar (BOR); 12.II: 5 ej. marcados con collares blancos (JDL); 11.V: 2 ad. con collar (24R y 2J3) y 4 pull. (AJR); 17.VIII: 10 ej. (EGM); 30.IX: 8 ad. 2 juv. pequeños en la balsa junto al centro de interpretación (ERWR); 28.XI: 8 ej. 5 sin collar (OAP).

La focha moruna sigue en un estado extremadamente delicado en la CV, con apenas 4 par. nidificantes, tras los intentos de reintroducción con cría en cautividad que han tenido un éxito moderado.

## Fulica atra

## Focha común - Fotja - Common Coot

Estatus: Nidificante localizado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados, citas de interés.

## 2016

**Sant Jordi:** 16.I: 22 ej. en la balsa de riego (ELL,DFE,FRJ).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 02.X: 507 ej. Máximo anual; 10.XII: 411 ej. Máximo invernal (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 13.II: 13 ej. amb nius a les basses (MBM).

**Desem. del Carraixet:** 15.II: 74 ej. Máximo anual; 22.XII: 127 ex. censats al llit del barranc en transecte de 3 km llarg per 55 m d'ample, (7,69 ex./Ha) (RMB).

**Sumacàrcer:** 16.I: 132 ej. XVI censo de aves acuáticas en embalses de la CV (SVO,PAB,GGS).

**Clot de Galvany:** 13.III: 1 ad. con 3 pull. recién nacidos (JMT,AVDH).

**Salinas de Santa Pola:** 17.X: 304 ej. (SAR).

**Embalse de La Pedrera:** 17.I: 89 ej. XVI censo de aves acuáticas en embalses de la CV (SVO,PPP).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 08.X: 436 ej. Máximo anual en balsas de Torreblanca (MTB,JAF).

**Nules:** 26.I: 15 ej. (JBC,JLB).

**Desem. del Carraixet:** 24.XI: 117 ej. en transecto de 3 km (7,1 ex./Ha) (RMB).

**Sumacàrcer:** 29.I: 82 ej. XVII XVI censo de aves acuáticas en embalses de la CV(SVO,PAB).

**Albufera de València:** 04.XI: 90 ej. en el tancat de l'Illa (AAC).

**Albufera de Gaianes:** 22.X: 112 ej. (BOR).

**Pantano de Elche:** 26.II: 35 ej. (JPG).

**Desemb. río Segura:** 20.III: 3 primeros pollos de la zona (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 15.VII: 300 ej. (PMON).

**EDAR de Santa Pola:** 15.III: 47 ej.; 28.VII: 203 ej. (SAR).

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Prat de Cabanes-Torreblanca	19	388	29	492
Marjal de Almenara-Sagunto	31	230	23	25
Marjal dels Moros	55	119	18	71
Desem. del Carraixet	3	83	22	81
Albufera de Valencia	38	622	34	43
Marjal de Xeresa-Xeraco	35	65	30	35
Clot de Galvany	19	13	35	24
El Fondo	103	1.737	120	573
Sainas de Santa Pola	57	818	41	661
Embalse d'Elx	19	136	11	104

*Censos de focha común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 20 parejas o invernaron al menos 100 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 18 de 30 humedales para un total de 445 par. en 2016 y en 22 de 31 humedales con un total de 420 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 28 de 44 humedales censados para un total de 4.575 ej. en 2016 y en 28 de 45 humedales con un total de 2.417 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

## GRUIDAE

**Grus grus****Grulla común - Grua - Common Crane**

Estatus: Migrante moderado e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vinaròs:** 15.II: 26 ej. volando al N (ELL,AGC); 30.X: 22 ej. en paso (JLA,FRJ,PML).

**Alcossebre:** 16.III: 16 ej. volando al N (DES).

**Albufera de València:** 10.I: 64 ej. alimentándose en arrozales del Cebollar. Marcada presencia de ejemplares que podría asociarse con los fuertes vientos del oeste de los últimos días (ASL,JCM); 11.I: 25 ej. volando hacia el S. Posiblemente se trate de parte del bando observado el día anterior en los arrozales del Cebollar (LAA); 24.XI: 51 ej. alimentándose en el vedat Nou de Sueca; 30.XI: 82 ej. volando rumbo S sobre la Socarrada (AAC).

**Salinas de Santa Pola:** 08.X: 14 ej. (AJR).

**La Marina:** 17.I: 23 ej. dirección NO (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 12.I: 50 ej. (SAR); 02.II: 39 ej. (JMT,OAP); 13.III: 15 ej. dirección N (JMT,AVDH); 06.X: 8 ej. Primeras de la temporada (JMT,GLI); 30.XI: 168 ej. (JMT,OAP); 02.XII: 36 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Torreblanca:** 10.III: 24 ej. volando en formación dirección NE (IMR).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.X: 23 ej. (MTB,JAf).

**Sueras:** 12.XI: 20 ej. en paso (JAE).

**La Llosa:** 30.XII: 1 ej. (MASA).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 29.I: 3 ej. alimentándose en cultivo de arroz inundado (JLB,JBC).

**Aras de los Olmos:** 15.XI: 85 ej. en migración (PAB).

**Sagunt:** 10.III: 30 ej. en vuelo hacia el N (PAB).

**Marjal dels Moros:** 15.XI: 30 ej. en paso (AAD).

**Llíria:** 12.XI: 49 ej. en paso activo (PPA).

**Albufera de València:** 09.III: 28 ej. en vuelo hacia el N. Primera cita anual (IRU); 12.XI: 160 ej. distribuidos en cuatro grupos (ASL,JCM); 09.XII: 50 ej. en arrozales de la Socarrada (GCH).

**l'Alcúdia:** 02.XII: 25 ej. (JBL).

**Ontinyent:** 15.XI: 31 ej. (TFE).

**Fontanars dels Alforins:** 12.XI: 35 ej. en paso activo (TFE).

**Marjal de Pego-Oliva:** 09.III: 19 ej. (PLP).

**Sant Vicent del Raspeig:** 09.III: 31 ej. volando a baja altura en dirección N (JDL).

**El Pinet:** 30.XII: 1 ej. (EAMA).

**Salinas de Santa Pola:** 17.XI: 21 ej. (AJR,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 10.I: 35 ej.; 01.II: 39 ej. (OAP); 08.III: 27 ej. (SAR); 18.XI: 55 ej. (JMT); 08.XII: 63 ej. (SAR).

**Hondo de Amoros:** 27.XII: 40 ej. (AJR).

## CHARADRIIFORMES

## BURHINIDAE

**Burhinus oedicnemus****Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew**

Estatus: Residente escaso localizado, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Sant Mateu:** 23.I: 19 ej. (ELL,PML,JLA).

**Alcossebre:** 31.I: 5 ad. Primera cita de invernada; 24.VI: 2 ad. y 1 juv. en la rambla de San Miguel. Primera

cita de reproducción para la zona (DES).

**Quadro de Santiago:** 23.II: 8 ej. Primera cita prenupcial; 15.III: 18 ej. Máximo anual en pastizales; 24.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 04.XII: cita invernal de 3 ej. (MTB).

**Nules:** 05.I: 3 ej. posados en el suelo y volando. Son molestados por perros de caza (JBC,MIA).

**Requena:** 27.III: 1 ej. reclamando en viñedos (JAI).

**Albufera de València:** 01.IX: 1 ej. en campo baldío de la marjal de Sollana (EPS). Primer registro en septiembre en l'Albufera.

**Embalse de Bellús:** 17.I: 8 ej.; 21.II: 6 ej. (BOR).

**El Pinet:** 20.IX: 24 ej. (AJR); 20.XII: 45 ej. bando en vuelo (NGA).

**El Saladar de Agua Amarga:** 03.V: 2 ej.; 11.X: 94 ej. (SAR).

**Clot de Galvany:** 16.II: 13 ej.; 20.X: 30 ej.; 09.XII: 30 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 11.VI: 2 ej.; 05.X: 20 ej. (AJR); 26.XI: 141 ej. Máximo anual (OAP); 16.XII: 100 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 07.VI: 4 ej. (AJR); 30.X: 45 ej. (JMT,OAP); 21.XII: 40 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 03.II: 33 ej. (AJR,SAR).

## 2017

**Alcossebre:** 24.XII: 7 ad. Cita invernal (DES).

**Quadro de Santiago:** 26.IV: cita tardía de 1 ej. (MTB).

**Castellón de la Plana:** 29.X: 4 ej. en campos de naranjos (MTB).

**Requena:** 19.IV: 1 ej. en viñedos; 31.VII: 1 ej. cantando desde el entorno del río Magro (JAI).

**Albufera de València:** 29.I: 1 ej. en campo de frutales cerca de arrozales (MAL,LAA).

**Embalse de Bellús:** 28.V: 2 ej. (BOR).

**Alacant:** 05.IV: 1 ej. (JBN); 16.IV: 1 ej. (JDL).

**El Pinet:** 07.IX: 8 ej. (AJR).

**El Fondet de la Senieta:** 18.II: 20 ej. (AJR).

**El Saladar de Agua Amarga:** 23.V: 1 ej.; 07.IX: 30 ej.; 10.XI: 150 ej. Máximo anual (AJR).

**Clot de Galvany:** 26.V: 2 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 28.VII: 14 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 23.I: 30 ej. (OAP); 04.III: 50 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 09.V: 4 ej.; 22.XI: 150 ej. Máximo anual (SAR).

**Cabo Cervera:** 10.XII: 23 ej. (AJR).

## HAEMATOPODIDAE

### *Haematopus ostralegus*

### Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

## 2016

**Grau de Castelló:** 24.II: cita invernal de 1 ej. (PGR).

**Albufera de València:** 24.II: cita invernal de 1 ej. en arrozal de Sueca (EGO,JGAC,BLO); 22.IV: 1 ej. sobrevolando la Devesa (TPE); 13.VII: 2 ej. en la playa de la Malladeta. Primer registro postnupcial (MAJ); 11.IX: 1 ej. (VBJ) presente hasta el 08.X (JOB,YAM,AA).

**Gandía:** 21.XII: 1 ad. (PLP).

**El Pinet:** 20.IV: 2 ej. (SAR); 03.VI: cita estival de 1 ej. (AJR,SAR); 10.VIII: 3 ej. Máximo anual (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 22.IV: 3 ej. Máximo anual; 22.IX: 1 ej. Presente hasta el 22.X (AJR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.II: 1 m. Única cita anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 28.II: 1 ej. (YAM); 9.IV: 1 ej. en la playa de la Malladeta (GCH,JAZ); 11.IV: 1 ej. en el Racó de l'Olla (MCH,JID,BD); 14.VII: 1 ad. en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial. Presente

hasta el 19.VII (MCH,JID,GGA); 04.VIII: 1 ej. en l'estany del Pujol. Presente hasta el 23.VIII (YAM). (EPS); 16.VIII: 6 ej. en la playa de la Malladeta (YAM).

**Cabo de Cullera:** 01.IV: 1 ej. sobre el mar rumbo N (VPA).

**El Campello:** 12.X: 1 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 30.III: 1 ej.; 05.X: 2 ej. (AJR); 03.XI: 1 ej. (AJR,SAR); 30.XI: 2 ej. Cita invernal (AJR).

**Desemb. río Segura:** 22.IX: 2 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 12.V: 1 ej. Última cita prenupcial (AJR,SAR).

## RECURVIROSTRIDAE

### *Himantopus himantopus*

### Cigüeñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt

Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### 2016

**Alcossebre:** 03.IV: 20 ej. en paso hacia el N (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 19.VIII: 24 ej. Máximo anual; 16.IX: 7 ej. Última cita anual (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 20.III: 9 ej. Primera cita anual (MBM).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 30.I: cita invernal de 17 ej. (MBM).

**Albufera de València:** 31.III: 349 ej. en el tancat de la Pipa (AVA); 28.X: 310 ej. (GGO).

**Requena:** 14.V: 19 ej. Máximo anual (RMB).

**Villena:** 21.V: 13 ad. en balsa de riego (AAC).

**Salinas de Santa Pola:** 20.I: 52 ej.; 26.VIII: 53 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 03.XI: 123 ej. (SAR).

**Hondo de Amoros:** 29.II: 35 ej.; 24.V: 19 ej. (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 11.III: 40 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 09.IX: 32 ej. (SAR).

#### 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.IV: 74 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Marjal dels Moros:** 24.II: 2 ej. Cita invernal (RPM,JS-MG).

**Albufera de València:** 30.XI: 640 ej. en el Racó de l'Olla. Máximo anual (GGO).

**Requena:** 19.IV: 33 ej. Paso fuerte; 07.V: 32 ej. (JAI); 05.VIII: 19 ad. y 8 pull. 3 par. reproductoras (RMB).

**El Fondet de la Senieta:** 27.I: 23 ej. Cita invernal (AJR).

**El Saladar de Agua Amarga:** 18.III: 121 ej.; 06.IV: 115 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 28.III: 238 ej. (SAR); 26.VII: 197 ej. (SAR,AJR); 09.XII: 103 ej. Cita invernal (AJR).

**Catral:** 24.II: 40 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 06.II: 42 ej. (SAR).

**Desemb. río Segura:** 05.II: 5 ej. (AJR); 14.IX: 167 ej. (SAR).

**Fondet de la Senieta:** 24.I: 7 ej. Cita invernal (JDL).

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Prat de Cabanes-Torreblanca	12	0	15	0
Marjal de Almenara-Sagunto	75	31	8	0
Marjal dels Moros	24	0	16	9
Albufera de València	517	516	1.069	524
Marjal de Xeresa-Xeraco	10	0	25	0
Marjal de Pego-Oliva	26	0	164	0
Salinas de Calpe	28	0	28	0
Salinas de Santa Pola	83	179	75	150
EDAR Santa Pola	-	17	37	16
El Fondo	73	80	140	38
Lagunas de la Mata Torrevieja	74	6	163	25

*Censos de cigüeñuela común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 15 parejas y las localidades en las que invernarón al menos 10 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 16 de 30 humedales para un total de 936 par. en 2015 y en 20 de 31 humedales con un total de 1.779 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 10 de 44 humedales censados para un total de 847 ej. en 2016 y en 11 de 45 humedales con un total de 773 ej. en 2015. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

**Recurvirostra avosetta****Avoceta común - Alena - Pied Avocet**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 22 ej. en un bando (JBC).

**Albufera de València:** 23.III: 347 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU); 03.XII: 22 ej. en Milia (JMR,MP-B,PMP).

**El Pinet:** 31.I: 62 ej. (JMT,OAP).

**Salinas de Santa Pola:** 31.I: 2.974 ej. Máximo anual y máximo histórico (JMT, OAP); 17.X: 778 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 07.IV: 500 ej. (SAR); 08.VIII: 2.000 ej. (SAR); 08.IX: 1.340 ej. (SAR).

**Hondo de Amoros:** 08.III: 80 ej.; 24.V: 10 ej. (SAR).

**2017**

**Albufera de València:** 04.VII: 280 ej. en el Racó de l'Olla (JID, MCH).

**El Pinet:** 25.II: 66 ej. Cita invernal (JBN,NLM).

**El Saladar de Agua Amarga:** 20.III: 12 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 22.III: 536 ej. (SAR); 26.VII: 772 ej. Máximo anual (SAR, AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.X: 250 ej. (EMMG); 30.XII: 50 ej. (EJGU).

*Censos de avoceta en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se detectó como nidificante o invernante. Como nidificante se ha detectado en un total de 6 de 30 humedales para un total de 424 par. en 2015 y en 5 de 31 humedales con un total de 329 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 4 de 44 humedales censados para un total de 1.113 ej. en 2016 y en 3 de 45 humedales con un total de 773 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Marjal dels Moros	2	0	0	0
Albufera de València	101	18	63	33
El Hondo de Amoros	0	0	10	0
Salinas de Santa Pola	183	1.095	80	899
El Fondo	52	0	98	35
Lagunas de la Mata Torrevieja	74	0	78	18
Embalse de Elche	1	0	0	0

**CHARADRIIDAE****Vanellus vanellus****Avefría europea - Merita - Northern Lapwing**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante común. Criterio: Máximos en invernada, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 1 par. nidificante (CMA).

**Quadro de Santiago:** 29.I: 35 ej. Máximo anual; 09.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Desem. río Seco:** 24.XII: 28 ej. Máximo anual en prados junto a la desembocadura (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 23.I: 50 ej. (MBM).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 30.I: 250 ej. (MBM); 24.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial (JBC).

**Marjal dels Moros:** 06.II: 50 ej. (MBM).

**Albufera de València:** 01.V: 1 ej. en la Ratlla. Cita tardía (BDJ); 03.V: 1 ej. en el tancat de Milia. Presente hasta el 10.VI (AAC); 20.VIII: 1 ej. en la Pipa (BDJ); 28.XII: 900 ej. en marjales de Sueca (JLE).

**Embalse de Bellús:** 21.II: 24 ej. (BOR).

**El Fondo d'Elx:** 16.I: 1.000 ej. (SAR); 18.II: 400 ej. (SAR); 08.VIII: 6 ej. Primera observación postnupcial (SAR); 29.XI: 1.023 ej. Máximo anual (SAR,EBP,DMF); 14.XII: 500 ej. (GGO).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 1 par. nidificante (CMA); 07.I: 38 ej. Máximo invernal en turberas de Torreblanca; 10.VI: 2 ej. Cita estival (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 29.I: 45 ej. Máximo anual (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 03.XII: 40 ej. (MBM).

**La Llosa:** 08.II: 800 ej. (GGO).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 218 ej. (JBC).

**Marjal dels Moros:** 16.I: 75 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 29.VI: 1 ej. Cita estival (VBJ); 29.X: 460 ej. en arrozales de l'Alter del Malvinar (BDJ).

**Embalse de Bellús:** 14.I: 100 ej. (BOR,DMF).

**Salinas de Santa Pola:** 23.I: 50 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 30.X: 68 ej.; 20.XI: 426 ej. (SAR); 19.XII: 240 ej. (AJR,SAR).

**Hondo de Amoros:** 23.XII: 200 ej. (AJR).

Tras unos años en los que se detectó la nidificación en la marjal de Almenara-Sagunto, tan solo se mantiene como nidificante en el Prat de Cabanes-Torreblanca, donde nidifica de forma ininterrumpida desde finales del s. XX. Por lo que respecta a la invernada, como es típico, la especie muestra fuertes variaciones interanuales.

Localidad	2016	2017
	Ejemplares invernantes	Ejemplares invernantes
Desem. riu Millars	37	0
Marjal de Almenara	470	117
Marjal dels Moros	15	86
Albufera de Valencia	782	4.145
Embalse de Bellús	18	100
Marjal de Pego-Oliva	102	3
El Fondo d'Elx	763	1.047

*Censos de Avefría europea invernante en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades con al menos 20 ej. invernantes. Se ha detectado en un total de 12 de 44 humedales censados para un total de 2.214 ej. en 2016 y en 9 de 45 humedales con un total de 5.526 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.*

### ***Vanellus gregarius***

### **Avefría sociable - Fredeluga gregària - Sociable Lapwing**

Estatus: Divagante de Asia central. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 9/2 (oct-mar).

#### **2016**

**El Fondo d'Elx:** 05.I: 1 ej. en Vistabella (PPP), presente hasta el 05.III (HCO); 26.X: 1 ej. en campos de Vistabella (BCH), presente hasta el 31.XII (AJR). Probablemente se trata del mismo ej. observado el invierno anterior. Cita homologada por el CR de SEO/BirdLife.

#### **2017**

**El Fondo d'Elx:** el ej. que llega el 26.X permanece en la zona hasta el 11.II (EJFO).

El ej. que llegara en noviembre de 2015 permanece en la zona hasta principios de marzo de 2016, y de nuevo aparece en el Hondo en la siguiente invernada.

### ***Pluvialis apricaria***

### **Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover**

Estatus: Invernante moderado. Criterio: Máximos en invernada, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

**Desem. río Seco:** 24.XII: 60 ej. Máximo invernal (MTB).

**Albufera de València:** 07.I: 640 ej. en la marjal de Sueca. Máximo anual (AAC); 06.X: 1 ej. en la marjal de Silla. Primera cita postnupcial (PMP).

**El Pinet:** 07.II: 78 ej. (BOR); 01.XII: 100 ej. (NGA).

**El Fondet de la Senieta:** 15.II: 80 ej. (AJR).

**Clot de Galvany:** 05.I: 25 ej. (AJR,SCEA).  
**Salinas de Santa Pola:** 07.I: 254 ej. (JMT,OAP).  
**El Fondo d'Elx:** 06.XII: 150 ej. (PPP,CRE); 14.XII: 100 ej. (GGO).

## 2017

**Islas Columbretes:** 13.II: 2 juv. (LGB).  
**Desem. río Seco:** 08.I: 71 ej. Máximo anual en zona habitual de invernada (MTB).  
**Marjal de Nules:** 19.I: 14 ej. (MIB).  
**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 07.XII: 42 ej. (JLB).  
**Albufera de València:** 11.I: 220 ej. en la Correjola (AAC); 03.II: 920 ej. en tres grandes grupos en arrozales fangueados de la Malva (VLG,BDJ); 19.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (PMP).  
**El Fondet de la Senieta:** 27.I: 422 ej.; 03.II: 295 ej.; 27.XII: 55 ej. (AJR).  
**El Saladar de Agua Amarga:** 02.I: 243 ej.; 24.XII: 200 ej. (AJR).  
**Clot de Galvany:** 27.I: 442 ej. (AJR,SCEA).  
**El Fondo d'Elx:** 23.I: 559 ej. (OAP); 16.III: 2 ej. Última cita prenupcial (JMT,AAR); 16.XII: 398 ej. (AJR).  
**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.XI: 44 ej. (SAR).

### *Pluvialis dominica*

### **Chorlito dorado americano - Fusell petit - American Golden Plover**

Estatus: Divagante de N América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 4/2 (sep-ene).

## 2016

**El Fondo d'Elx:** 27.XI: 1 ej. (ALF) presente hasta el 6.XII (JMT,OAP,AJR). Cita homologada por el CR-SEO.

## 2017

**El Fondo d'Elx:** 22.I: última cita del ej. invernante (SAR).

Segunda cita para la CV, tras el ej. observado en 2001 en l'Albufera.

### *Pluvialis squatarola*

### **Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: máximos en invernada, fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 12.XI: 2 ej. Máximo anual en la playa (MTB).  
**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 02.VIII: 1 ej. (AAC).  
**Marjal dels Moros:** 17.X: 1 ej. (RMB); 03.XI: 1 ej. (RMB).  
**Albufera de València:** 09.III: 4 ej. en la marjal de Catarroja (AAC); 02.V: 5 ad. con plumaje nupcial en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 15.V: 2 ej. en la marjal de Sueca. Última cita prenupcial (BDJ); 13.VIII: 2 ej. en la R.N. de Milia. Primera cita postnupcial (PMP); 22.IX: 1 ej. en l'estany del Pujol. Primera cita de un juv. (YAM); 10.XII: 49 ej. en la playa de la Malladeta (BDJ); 22.XII: 83 ej. en arrozales de Sueca. Máximo anual (VPA,YAM).  
**El Pinet:** 01.XII: 30 ej. (NGA).  
**Salinas de Santa Pola:** 22.I: 13 ej. (AJR).  
**El Fondo d'Elx:** 01.X: 18 ej.; 01.XII: 18 ej. (AJR,SAR).  
**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 03.II: 18 ej. (AJR,SAR).  
**Cabo Cervera:** 18.X: 2 ej. (SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 28.I: 1 ej. Cita invernal. Varias citas más hasta finales de abril (MTB,JAF).  
**Marjal del Moro:** 05.IX: 1 h. ad. con plumaje estival (RMB).  
**Albufera de València:** 04.I: 26 ej. en campos fangueados de la marjal de Sueca (AAC); 29.I: 81 ej. en la

playa de la Malladeta. Máximo anual (VPA,LAM); 04.IV: 9 ej. en la marjal de Silla (PMP); 05.VI: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Cita estival (MCH,JID); 07.VII: 1 ej. en la el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (BDJ).

**Cabo Huertas:** 31.I: 1 ej. (JMT,MAA).

**El Pinet:** 16.VI: 17 ej. concentración estival (SAR).

**El Saladar de Agua Amarga:** 07.I: 1 ej. (AJR); 20.III: 1 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 08.I: 3 ej. (JEG); 14.II: 26 ej. (AJR,SAR); 28.III: 43 ej.; 04.IV: 32 ej.; 04.VI: 8 ej. Cita estival; 20.IX: 8 ej. (SAR); 03.XI: 11 ej. (AJR,SAR); 18.XII: 5 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 20.I: 12 ej. (AJR); 20.X: 8 ej. (AJR,SAR); 28.X: 5 ej. (VM,JCP,JOC); 22.XI: 1 ej. (EDDU).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.XI: 4 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 05.II: 2 ej. (AJR); 02.X: 2 ej. (SAR).

## **Charadrius hiaticula**

## **Chorlito grande - Corriol gros - Great Ringed Plover**

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Marjal dels Moros:** 25.IV: 4 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 04.I: 132 ej. Máximo anual (AAC); 23.IV: 43 ej. en Milia (PMP,JMR); 28.IV: 26 ej. en la Ratlla (BDJ); 03.V: 110 ej. en el Racó de l'Olla (JID); 25.V: 5 ej. en el Racó de l'Olla. Última cita prenupcial (JID,MCH); 12.VII: 3 ej. en l'estany del Pujol. Primera cita postnupcial (EPS); 14.VIII: 11 ej. en la Pipa (BDJ); 07.IX: 75 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 08.X: 27 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 10.XII: 67 ej. en la marjal de Sueca (BDJ).

**Embalse de Bellús:** 03.I: 2 ej. (EACO).

**Marjal de Pego-Oliva:** 08.IX: 20 ej. (PLP).

**El Pinet:** 31.I: 3 ej. (JMT,OAP).

**El Saladar de Agua Amarga:** 22.IV: 3 ej. (AJR); 26.IV: 3 ej. (SAR); 20.X: 5 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 17.X: 18 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 09.I: 8 ej. (EBZ); 06.V: 20 ej. (AJR); 12.IX: 201 ej. (JBN); 13.IX: 201 ej. (AJR,PCC); 02.XII: 13 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.VIII: 17 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 22.II: 12 ej. (SAR).

### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.V: 26 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 11.I: 16 ej. en la marjal de Sueca. Cita invernal (AAC); 18.IV: 32 ej. en marjales de Sollana (BDJ); 30.VI: 2 ej. en Milia. Primer registro postnupcial (EPS); 22.VIII: 8 ej. en l'estany del Pujol (JOB); 04.IX: 19 ej. en l'estany del Pujol (DMF); 19.IX: 29 ej. en marjales de Sollana (JOB,BDJ); 27.X: 16 ej. en la playa de la Malladeta (YAM).

**Requena:** 29.IV: 1 ej. en charco formado por las lluvias (PRP); 01.V: 3 ej.; 28.VIII: 1 juv. (JAI); 02.IX: 1 ej. (RMB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 28.II: 6 ej. (PLP).

**El Saladar de Agua Amarga:** 25.IV: 40 ej.; 04.V: 20 ej.; 31.V: 1 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 27.III: 17 ej. (SAR); 06.V: 80 ej.; 11.V: 145 ej. Máximo anual (AJR); 04.VI: 10 ej. Cita estival; 24.X: 18 ej. (SAR); 30.XI: 23 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 20 ej. (EAAN); 20.I: 19 ej. (AJR); 05.IX: 50 ej. (JBN); 08.IX: 143 ej. (AJR,SAR); 12.IX: 29 ej. (AJR); 30.XII: 1 ej. Cita invernal (MGZ).

**Desemb. río Segura:** 22.IX: 6 ej. (SAR); 31.XII: 1 ej. Cita invernal (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 27.IV: 15 ej.; 22.XI: 5 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 17.II: 11 ej. Cita invernal (AJR); 20.X: 9 ej. (AJR,SAR).

**Charadrius dubius****Chorlitejo chico - Corriolet - Little Ringed Plover**

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Embalse de M<sup>a</sup> Cristina:** 17.I: 2 ej. Cita invernante (PGR,JMI).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 22.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 26.II: 3 ej. Primera cita anual; 19.III: 18 ej. Máximo anual (MTB).

**Castellón de la Plana:** 24.I: 1 ej. Cita invernante (PGR).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 30.I: 4 ej. Cita invernante (MBM); 24.VII: 168 ej. (JBC).

**Albufera de València:** 16.I: 4 ej. en Milia. Cita invernante (PMP); 01.V: 28 ej. en la Ratlla (BDJ); 20.III: 311 ej. en marjal de Catarroja. Máximo anual y máximo número de ej. registrado en la Albufera hasta la fecha (AAC); 14.VIII: 74 ej. en la Pipa (BDJ); 27.VIII: 145 ej. en Milia (BDJ); 10.XII: 29 ej. Cita invernante (BDJ).

**Requena:** 21.II: 1 ej. Primera cita anual (RMB); 27.III: 26 ej. (JAI); 04.VI: min. 2 par. con nido y huevos (JAI).

**Cullera:** 06.IX: 32 ej. en l'estany (BDJ).

**Embalse de Bellús:** 17.I: 2 ej. Cita invernante (BOR).

**Clot de Galvany:** 14.XII: 1 ej. Cita invernante (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 18.I: 5 ej. Cita invernante (SAR); 14.VIII: 51 ej. (OAP); 24.XI: 11 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.VIII: 16 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 20.IX: 20 ej. (SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.III: 43 ej. Máximo primaveral (MTB,JAF).

**Marjal dels Moros:** 05.VIII: 20 ej. (MBM).

**Albufera de València:** 07.I: 5 ej. en marjales de Valencia. Cita invernante (VBJ); 22.I: 13 ej. en marjales de Sueca. Cita invernante (BDJ); 15.III: 56 ej. en marjales de Catarroja y Silla (AAC,BDJ,PMP); 10.VII: 28 ej. en arrozales de Algemesí (BDJ); 23.VII: 93 ej. en Milia. Presentes hasta el 16.VIII (BDJ); 21.VIII: 20 ej. en el Racó de l'Olla (MCH); 31.VIII: 64 ej. en campos de cultivo de Silla (PMP) 01.IX: 16 ej. en campos en barbecho del Palmar (BDJ); 17.IX: 48 ej. en marjales de Sollana (BDJ).

**Requena:** 17.III: 1 ej. Primera cita del año; 16.IV: 20 ej. (JAI); 05.VIII: 15 ej. (RMB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 12.I: 3 ej. Cita invernante (PLP); 04.VII: 10 ej. (HGA).

**El Saladar de Agua Amarga:** 10.III: 14 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 23.III: 41 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 28.I: 10 ej. Cita invernante (AJR); 10.IX: 175 ej. Máximo anual (EGM); 12.IX: 65 ej. (AJR); 08.XII: 1 ej. Cita invernante (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 14.IV: 10 ej.; 28.VII: 42 ej.; 29.IX: 16 ej. (SAR).

Localidad	2016	2017
	Parejas nidificantes	Parejas nidificantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	5	6
Marjal de Almenara	11	7
Albufera de València	23	54
Marjal de Xeresa-Xeraco	10	10
Marjal de Pego-Oliva	8	10
EDAR Santa Pola	-	6

*Censos de chorlitejo chico en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 5 parejas. Se ha detectado en un total de 12 de 31 humedales para un total de 72 par. en 2016 y en 12 de 29 humedales con un total de 108 par. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.*

**Charadrius alexandrinus****Chorlitejo patinegro - Corriol camanegre - Kentish Plover**

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Castellón de la Plana:** 15.II: 9 ej. en playa protegida (MTB); 03.IV: 6 par. repartidos al llarg de 1 km (MBM); 29.XII: 1 ej. Cita invernial (MTB).

**Moncofa:** 2 par. (MAG).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 32 ej. (JBC).

**Massamagrell:** 4 par. reproductoras (MAG).

**Albufera de València:** 12.III: 9 ej. en marjales de Valencia (BDJ); 20.III: 38 ej. en marjales de Catarroja (AAC); 08.VIII: 39 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 11.IX: 18 ej. (VBJ).

**Cullera:** 05.XI: 5 ej. en playa de Cullera (GGO).

**Gandía:** 10.V: 1 par. con 1 pull. (PLP).

**El Pinet:** 26.IV: 1pp. con 3 pull. (JMT).

**El Saladar de Agua Amarga:** 03.V: 21 ej. (SAR); 21.V: 6 par. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 18.I: 36 ej. Cita invernial (JMT); 05.II: 48 ej. (JMT); 27.VII: 115 ej.; 28.X: 105 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 02.XII: 6 ej. Cita invernial (AJR,SAR).

**Desemb. río Segura:** 08.VI: 1pp con 2 pull. (SAR); 15.VI: 30 par. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 28.I: 32 ej. Cita invernial; 09.III: 60 ej.; 05.IV: 77 ej.; 12.VIII: 140 ej. Máximo anual (SAR).

**Cabo Cervera:** 22.II: 4 ej. (SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 18.II: 1 m. Primera cita prenupcial. Sin citas invernales; 30.XII: 1 ej. Cita invernial (MTB,JAF).

**Castellón de la Plana:** 01.I: 3 ej. en la playa del Gurugú. Cita invernial (MTB).

**Massamagrell:** 3 par. reprod. (MAG).

**Albufera de València:** 23.VIII: 33 ej. en l'estany del Pujol (YAM); 13.VIII: 21 ej. en la Milia (BDJ); 01.IX: 21 ej. en el Racó de l'Olla (MCH); 27.X: 18 ej. en la playa de la Malladeta (YAM).

**Requena:** 19.IV: 1 m. ad. (JAI).

**Guardamar de la Safor:** 23.III: 1 par. reprod. (MAG).

**Alacant:** 02.I: 24 ej. en la costa de Agua Amarga. Cita invernial (AJR).

**Cabo Huertas:** 08.I: 5 ej. Cita invernial (AJR).

**Playa del Altet:** 23.I: 7 ej. (OAP).

**El Saladar de Agua Amarga:** 07.I: 18 ej. Cita invernial (AJR); 16.III: 20 ej. (JMT,AAR); 21.IV: 24 ej. (SAR);

Localidad	2016		2017	
	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes	Parejas nidificantes	Ejemplares invernantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	7	0	10	1
Marjal de Almenara	4	0	0	1
Desem. riu Sec	-	0	-	1
Marjal dels Moros	6	0	0	0
Albufera de València	39	15	36	19
Salinas de Santa Pola	38	29	34	0
Saladar de Agua Amarga	8	0	10	0
El Fondo	17	0	7	6
Lagunas de la Mata Torrevieja	66	94	56	36

*Censos de chorlitejo patinegro en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 5 parejas y todas en las que invernaron. Como nidificante se ha detectado en un total de 10 de 30 humedales para un total de 190 par. en 2016 y en 9 de 31 humedales con un total de 158 par. en 2017. Como invernante se han detectado un total de 138 ej. en 2016 y 66 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.*

23.V: 18 ej.; 08.XII: 5 ej. Cita invernal (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 28.III: 140 ej. Máximo anual (SAR); 12.VII: 30 ej. (AJR); 20.IX: 22 ej. (SAR); 23.X: 45 ej. (SAR); 03.XI: 75 ej. (AJR,SAR); 23.XII: 16 ej. Cita invernal (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 20.I: 10 ej. Cita invernal (AJR); 16.III: 12 ej. (JMT,AAR); 30.XII: 60 ej. (EJGU).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 03.IV: 44 ej. (SAR); 31.VII: 42 ej. (SAR); 22.XI: 48 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 17.II: 1 ej.; 10.XII: 2 ej. Cita invernal (AJR).

### ***Charadrius morinellus***

### **Chorlito carambolo - Corriol pit-roig - Eurasian Dotterel**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2016**

**Ares del Maestre:** 17.X: 5 ej. Última cita postnupcial (RPB,ALR).

**Albufera de València:** 04.IX: 5 ej. en la marjal de Sollana. Primera cita postnupcial (BDJ); 05.IX: 1 ej. en la marjal de Catarroja (JHE); 08.IX: 1 juv. en dunas de la Devesa. Presente hasta el 9.IX (AVN,JBL).

**Marjal de Pego-Oliva:** 08.IX: 1 ej. (PLP).

**El Fondo d'Elx:** 07.IX: entre 2 y 4 ej. presentes hasta el 22.IX (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 25.IX: 1 ej. (JDL).

#### **2017**

**Camporrobles:** 25.VIII: 5 ej. (LAM).

**Albufera de València:** 24.VIII: 2 ad. en marjal de Sollana. Primera cita postnupcial (EPS); 09.IX: 1 ej. en marjales de Sollana (BDJ).

**El Fondo d'Elx:** 26.VIII: 1 ej. con plumaje estival (JMT).

La presencia del chorlito carambolo en nuestra región en este bienio ha quedado enmarcada entre el 24 de agosto y el 17 de octubre. Como es habitual, sin citas primaverales.

## SCOLOPACIDAE

### ***Numenius phaeopus***

### **Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de invernada, censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

**Peñíscola:** 09.I: 1 ej. presente hasta el 12.II (ELL,DFE,FRJ).

**Alcossebre:** 07.VII: grupo destacado de 7 ej. (DES).

**Albufera de València:** 04.VII: 1 ad. Primera cita postnupcial (JID,MCH,GGA); 13.VII: 3 ej. en la playa de la Malladeta (MAJ); 08.VIII: 4 ej. presentes hasta el 12.VIII (YAM); 19.VIII: 3 ej. en vuelo hacia el S por el litoral (BDJ,BMA).

**Elx:** 27.XII: 1 ej. Cita invernal (SCEA).

**El Fondo d'Elx:** 02.IX: 2 ej. presentes hasta el 09.IX (AJR).

**Desemb. río Segura:** 30.I: cita invernal de 1 ej. presente hasta el 05.II (AJR).

**Guardamar del Segura:** 11.I: 1 ej. Cita invernal (NGA).

#### **2017**

**Peñíscola:** 02.XII: 1 ej. Cita invernal (DFE,JLA).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 22.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 17.IV: 1 ej. sobrevolando l'Alcatí (MCH); 03.VII: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID,MCH); 10.VII: 3 ej. en el Racó de l'Olla (MCH,JID); 23.VII: 6 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 11.VIII: 18 ej. en la playa de la Garrofera entrando desde el mar al atardecer. Máximo

anual (JID); 30.VIII: 3 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 05.IX: 4 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 09.VIII: 3 ej. en la Milia (PMP).

**Agua Amarga:** 01.II: 1 ej. Cita invernal; 25.III: 2 ej. (AJR).

**Cabo Huertas:** 26.XII: 1 ej. Cita invernal (EGM).

**Elx:** 08.X: 2 ej. en la playa del Carabassí (EDDU).

**Salinas de Santa Pola:** 08.I: 1 ej. Cita invernal (JEG); 01.VII: 1 ej. (AJR).

**Santa Pola:** 09.VII: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 29.VII: 2 ej. (SAR).

**Desemb. río Segura:** 31.XII: 2 ej. Cita invernal (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 31.VII: 3 ej. (SAR).

### ***Numenius arquata***

### **Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2016**

**Peñíscola:** 06.VIII: 1 ej. observado en la jornada RAM (APN).

**La Llosa:** 18.XII: 1 ej. Cita invernal (GGO).

**Marjal dels Moros:** 05.IX: 6 ej. Máximo anual (RNU).

**Albufera de València:** 18.I: 2 ej. en marjales de Sueca. Cita invernal (BDJ); 05.III: 1 ej. en marjales de Catarroja (EPS); 13.VI: 1 ej. Cita estival que podría corresponder con una cita postnupcial temprana (YAM); 27.VI: 1 ad. en la el Racó de l'Olla (JVM,JID,IRU); 13.VIII: 2 ej. en la Milia (PMP); 04.XI: 1 ej. en vuelo sobre la Devesa (EPS); 24.XI: 4 ej. en marjales de Silla (AAC); 05.X: 3 ej. en Milia. Presentes hasta el 12.X (YAM).

**El Pinet:** 11.VII: 1 ej. (NGA).

**Salinas de Santa Pola:** 20.I: 1 ej. Cita invernal (SAR); 12.II: 1 ej.; 17.IX: 1 ej.; 01.X: 2 ej.; 10.XII: 1 ej. Cita invernal (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 29.XI: 1 ej. (SAR,EBPDMF).

**Guardamar del Segura:** 12.I: 1 ej. Cita invernal (PAS).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 10.VI: cita estival de 1 ej. que podría corresponder con una cita postnupcial temprana (SAR).

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.II: 1 ej. Única cita anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 23.I: 4 ej. en arrozales de la Socarrada (JLE); 31.I: 14 ej. en zonas inundadas del Malvinar (YAM), aún 3 ej. el 01.II (HGA); 27.II: 5 ej. en el Saladar (AAC); 22.VI: 1 ad. sesteando en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (MCH,JID); 29.VIII: 1 ej. en un arrozal baldío de Cullera (LAA); 24.XI: 5 ej. en arrozales inundados del vedat vell de Sueca (EPS); 21.XII: 1 ej. en el vedat de Silla (AAC).

**Salinas de Santa Pola:** 24.III: 2 ej.; 24.VIII: 1 ej. (AJR); 03.XI: 4 ej. (AJR,SAR); 02.XII: 2 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 12.VII: 1 ej. (EAAN).

### ***Limosa lapponica***

### **Aguja colipinta - Tètol cuabarrat - Bar-tailed Godwit**

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

**Marjal dels Moros:** 29.XII: 3 ej. Cita invernal (YAM).

**Albufera de València:** 05.V: 2 ej. en la desemb. de la gola de Pujol (YAM); 05.V: 2 ej. en l'estany del Pujol (YAM); 11.V: 2 inm. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU); 02.IX: 1 ej. en l'estany del Pujol, presente hasta el 08.IX (EPS); 12.IX: 1 juv. en marjales de Alfafar (BDJ); 18.IX: 3 ej. en Milia (PMP); 01.X: 3 ej. en el Racó de

l'Olla (GCH); 03.X: 2 juv. en l'estany del Pujol, presentes hasta el 08.X (JOB); 05.X: 11 ej. el Racó de l'Olla (YAM); 13.X: 5 ej. en l'estany del Pujol (AAD); 22.XII: 1 ej. en marjales de Sueca (YAM).

**El Pinet:** 07.I: 1 ej. Cita invernal (JMT,OAP); 10.II: 1 ej. entre agujas colinegras (PBU); 10.X: 5 ej. (SAR).

**El Saladar de Agua Amarga:** 11.X: 2 ej. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 22.IX: 16 ej.; 01.X: 20 ej.; 22.X: 16 ej.; 11.XI: 25 ej. Máximo anual; 10.XII: 7 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 04.IV: 1 ej. (AJR); 07.IX: 2 ej. (SAR); 13.IX: 7 ej. (AJR,PCC); 27.IX: 24 ej. (DMF,EBP); 01.X: 23 ej. (AJR,SAR); 25.XI: 9 ej. (AJR); 02.XII: 12 ej. (AJR,SAR); 29.XII: 2 ej. Cita invernal (JOB).

**Lagunas de La Mata-Torre Vieja:** 07.IV: 1 ej. (AJR).

## 2017

**Albufera de València:** 10.V: 1 ej. (seguramente inm.) con plumaje invernal, comiendo en la el Racó de l'Olla. Primera cita anual. Probablemente el mismo, observado en varias ocasiones hasta el 05.VI (JID, MCH); 13.VII: 1 ad. en Milia. Primer registro postnupcial (EPS,JOB); 30.VIII: 1 ad. en el Racó de l'Olla (MCH); 20.IX: 4 juv. comiendo y sesteando en el Racó de l'Olla (MCH,JID,GGA). Primera observación de aves nacidas la presente temporada; 20.IX: 1 juv. en Milia (HGA).

**Salinas de Santa Pola:** 07.I: 10 ej. (AJR); 14.II: 4 ej. (AJR,SAR); 30.IV: 2 ej.; 11.V: 1 ej. (AJR); 20.IX: 1 ej. (SAR); 26.X: 2 ej. (AJR); 02.XII: 4 ej. Máximo en diciembre (AJR), varias citas más de entre 1 y 4 ej. a lo largo del mes (AJR,SAR,MNG).

**El Fondo d'Elx:** 24.I: 14 ej. (JBN); 22.VI: 6 ej. (JRO).

## *Limosa limosa*

## **Aguja colinegra - Tètol cuanegra - Black-tailed Godwit**

Estatus: Invernante y migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 08.II: 2 ej. (JBC,SMS).

**Benavites:** 09.III: 1 ej. (RMB).

**Albufera de València:** Sueca: 18.I: 148 ej. (BDJ); 27.I: 371 ej. en la el Racó de l'Olla. Primeros indicios de la llegada de aves en migración prenupcial (JID,MCH); 22.II: 1.700 ej. en marjales de Sueca. En el bando hay varios ej. con rasgos propios de la subespecie *islandica* (RFA); 25.II: 2.412 ej. en marjales de Alfafar. Máximo anual (BDJ,JGAC); 04.III: 740 ej. en marjales de Catarroja (BDJ); 16.III: 52 ej. en marjales de Catarroja. Descenso acusado coincidiendo con el secado de los arrozales (AAC); 25.V: 1 ad. en plumaje nupcial. Última cita prenupcial (AAC); 19.VI: 14 ej. en marjales de Sueca. Cita postnupcial temprana (BDJ); 22.VII: 11 ej. (6 juv.) en marjales de Sueca. Primer registro de aves juv. (BDJ); 06.VIII: 18 ej. en marjales de Alfafar (YAM); 04.IX: 9 ej. en marjales de Alfafar (BDJ); 11.XII: 135 ej. (VBJ); 29.XII: 1 ej. Cita invernal (JOB).

**El Pinet:** 25.I: 295 ej. (AJR); 18.III: 400 ej. (AJR,SAR); 10.VIII: 30 ej. presentes hasta el 20.VIII (AJR).

**Clot de Galvany:** 03.III: 1 ej. presente hasta el 22.III (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 10.I: 111 ej. Cita invernal (EBZ); 20.I: 160 ej. (SAR); 31.I: 268 ej. (JMT,OAP); 05.II: 623 ej. (JMT); 25.II: 400 ej. (AJR,SAR); 17.IX: 300 ej. (AJR); 17.X: 89 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 04.II: 59 ej. (OAP); 03.VI: 27 ej. Cita estival (AJR,SAR); 02.IX: 653 ej.; 13.IX: 294 ej. (AJR,PCC).

**Hondo de Amoros:** 08.III: 4 ej. (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torre Vieja:** 11.III: 3 ej. Inusuales en la zona (SAR).

## 2017

**Albufera de València:** 19.II: 1.300 ej. en arrozales fangueados del marjal de Sollana (RFA); 04.IV: 19 ej. (uno de ellos un adulto mostrado rasgos propios de la subesp. *islandica*) en la Milia (VLG,BDJ,JFF); 01.III: todavía un mínimo de 1.000 ej. alimentándose en marjales de Alfafar (YAM); 15.V: 6 ej. hasta el Racó de l'Olla (JID,MCH); 30.VI: 21 ej. en la el Racó de l'Olla. Aumento de efectivos presentes en migración postnupcial (JID,MCH); 04.VII: 47 ej. en Milia (YAM,GGO); 11.IX: 38 ej. sesteando y comiendo en el Racó de l'Olla. Aumento de presencia en la reserva, incluyendo a un ej. marcado que durante el mes pasado pudo

ser observado en el marjal del Moros (JID,MCH,GGA); 25.X: 93 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 30.XI: 270 ej. en el Racó de l'Olla (GGO).

**Salinas de Santa Pola:** 07.I: 111 ej. (AJR); 14.II: 424 ej. (AJR,SAR); 04.III: 478 ej.; 22.IX: 100 ej. (AJR); 23.X: 80 ej.; 12.XII: 120 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 30.IV: 26 ej.; 03.VI: 20 ej. (AJR); 25.VII: 300 ej.; 20.VIII: 90 ej. (SAR).

### ***Arenaria interpres***

### **Vuelvepiedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

**Benicarló:** 11.V: 1 ad. en la playa del Morrongo (PML).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial, varios ej. más en septiembre (MTB).

**Burriana:** 14.I: 4 ej. (JBC,JLB); 01.X: 1 ej. muerto en la playa con un anzuelo en pico (JBC,MIA,JLB).

**Marjal dels Moros:** 25.IV: 1 ej.; 17.X: 2 ej.; 05.XI: 2 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 13.VIII: 1 ad. y 1 juv. en la playa de la Malladeta (YAM); 16.VIII: 2 juv. en la el tan-cat de Milia (BDJ); 04.IX: 3 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 09.IX: 8 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 25.IX: 10 ej. en l'estany del Pujol (GCH); 20.X: 1 ej. (RMB); 31.XII: 2 ej. Cita invernal (YAM).

**Alacant:** 18.I: 5 ej. en la playa del Carabassí (MAA).

**El Pinet:** 31.I: 1 ej. (JMT,OAP); 20.VI: 2 ej. (SAR); 26.VII: 4 ej.; 10.VIII: 5 ej. (AJR); 27.XII: 5 ej. (SCEA).

**El Saladar de Agua Amarga:** 20.VIII: 8 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 05.II: 5 ej. (JMT); 08.II: 12 ej. (AJR,SAR); 06.IV: 11 ej. (AJR); 08.V: 12 ej. (OAP,JMT,TGR); 07.VII: 4 ej. (SAR); 16.X: 8 ej. (JBN); 31.XII: 7 ej. Cita invernal (AJR).

**Desemb. río Segura:** 11.VI: 2 ej. Cita estival (AJR); 21.X: 8 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 11.III: 36 ej. Máximo anual (SAR); 07.IV: 17 ej. (AJR); 04.VII: 13 ej. Primera cita postnupcial (SAR).

**Cabo Cervera:** 11.III: 5 ej. (SAR); 07.X: 6 ej. (AJR,SAR).

**Puerto de Santa Pola:** 24.I: 24 ej. (AJR); 02.II: 6 ej. (JMT,OAP).

#### **2017**

**Marjal dels Moros:** 06.III: 6 ej.; 11.IX: 2 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 02.I: 2 ej. en la playa de la Malladeta. Uno de los pocos registros plenamente in-vernales obtenidos en l'Albufera (YAM); 14.VIII: 1 ej. en l'estany del Pujol. Primer registro postnupcial (YAM); citas de 3 ej. en l'estany del Pujol el 06.IX (JOB,YAM) y el 04.X (JOB).

**Alacant:** 25.III: 9 ej. (AJR).

**Cabo Huertas:** 02.I: 5 ej.; 19.XI: 4 ej. (AJR); 26.XII: 3 ej. (EGM).

**El Saladar de Agua Amarga:** 20.IV: 15 ej.; 30.IV: 12 ej.; 25.VIII: 2 ej. (AJR,SAR) 10.IX: 12 ej.; 08.XII: 10 ej. (AJR).

**Clot de Galvany:** 07.I: 11 ej. (SCEA).

**Salinas de Santa Pola:** 03.V: 10 ej. (SAR); 22.VI: 1 ej.; 21.VII: 1 ej.; 10.VIII: 1 ej. (AJR); 29.IX: 8 ej. (AJR,SAR).

**Cabo de Santa Pola:** 16.II: 8 ej.; 01.III: 9 ej. (AJR); 17.XI: 3 ej. (AJR,SAR).

**Cabo Cervera:** 02.X: 16 ej. (SAR).

**Pilar de la Horadada:** 29.VIII: 36 ej. (VHG).

**Puerto de Santa Pola:** 21.II: 17 ej. (SAR).

### ***Calidris canutus***

### **Correlimos gordo - Territ gros - Red Knot**

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.IX: 1 ej. Única cita anual (MTB).

**Marjal dels Moros:** 23.IV: 1 ej. Única cita prenupcial (JPE).

**Albufera de València:** 01.VI: 1 ad. con plumaje nupcial en marjales de Sueca. Cita estival que podría corresponder con una cita postnupcial temprana (AAC); 31.VII: 2 ej. en l'estany del Pujol. Primera cita postnupcial (YAM); 10.VIII: 1 ej. en el tancat de la Pipa (AVA); 06.IX: 1 ej. en l'estany del Pujol. Presente hasta el 11.IX (RNU); 15.IX: 2 ej. en l'estany del Pujol. Presentes hasta el 27.IX, bajando a 1 ej. el 03.X, presente hasta el 16.X; 23.XII: 1 ej. en marjales de Sueca. Cita invernal (JOB).

**Salinas de Santa Pola:** 17.IX: 3 ej.; 11.X: 6 ej. presentes hasta el 14.X (AJR).

## 2017

**Marjal dels Moros:** 30.IV: 1 ej. (EJNA).

**Albufera de València:** 04.I: 1 ej. asociado a combatientes en la Llonga (AAC); 29.IV: primeros registros primaverales de 1 ej. en el tancat de Milia (VLG) y en l'estany del Pujol (VPA); 30.IV: 2 ej. en Milia (PMP); 01.V: 2 ej. en l'estany del Pujol; 01.XII: 1 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH).

**El Pinet:** 28.II: 50 ej. (SCR); 30.X: 6 ej. (ERCA).

**Salinas de Santa Pola:** 24.III: 2 ej. (SAR); 21.IX: 4 ej. (AJR); 29.IX: 1 ej. (AJR,SAR); 13.X: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.X: 2 ej. (EMMG); 20.X: 4 ej. (AJR,SAR); 28.X: 4 ej. (AJR).

Destacable cita de 50 ej. el Pinet de esta limícola notablemente escasa en gran parte del territorio. Son igualmente destacables las citas plenamente invernales de l'Albufera.

## *Calidris pugnax*

**Combatiente - Redonell - Ruff**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 6 ej. (JBC).

**Albufera de València:** 18.I: 172 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 12.II: 200 ej. en marjales de Sueca. Máximo anual (PMP); 08.III: 115 ej. en marjales de Catarroja (BDJ); 21.V: 5 ej. en Milia. Última cita prenupcial (PMP); 19.VI: 1 m. ad. en marjales de Valencia. Registro postnupcial temprano (BDJ); 15.VII: 12 ej. en Milia (PMP); 25.VIII: 30 ad. y 22 juv. en Milia (BDJ); 17.IX: 164 ej. en Milia (PMP); 13.X: 170 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 09.XII: 142 ej. en marjales de Sueca. Cita invernal (JLE).

**Requena:** 10.IV: 1 ej. (JAI); 15.X: 1 ej. (RMB).

**Salinas de Santa Pola:** 21.X: 2 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.I: 27 ej. Cita invernal (JMT,OAP,MFS); 18.II: 4 ej. (JMT,MFS); 22.III: 19 ej. (AJR); 07.IV: 15 ej. (SAR); 27.VIII: 8 ej. (SAR); 02.IX: 16 ej. (BOR,AJR); 21.X: 109 ej. (AJR); 30.XI: 78 ej. (JMT,OAP); 23.XII: 100 ej. Cita invernal (NGA).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 20.III: 2 ej. Primera cita prenupcial; 06.V: 7 h. Última cita primaverales; 03.IX: 1 ej. Única cita postnupcial (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 31.I: 180 ej. en zonas fangueadas del Malvinar (BDJ); 10.II: 140 ej. en arrozales del Malvinar (JLE); 15.III: 344 ej. Cifra prenupcial destacada en arrozales fangueados de Silla (AAC); 20.IV: 34 ej. en la Milia (BDJ); 01.V: 26 ej. (1 m. en plumaje nupcial) en la el tancat de Milia (BDJ,HGA); 22.VI: 1 m. aparentemente ad. en Milia. Primer registro postnupcial (EPS); 23.VII: 46 ej. un en Milia (BDJ); 16.VIII: 64 ej. en Milia (BDJ); 30.X: 279 ej. en la el Racó de l'Olla. Concentración otoñal destacada (JID,MCH); 30.XI: 83 ej. en la el Racó de l'Olla (GGO).

**Salinas de Santa Pola:** 23.III: 70 ej.; 28.VII: 1 ej.; 23.X: 21 ej. (SAR).

**Catral:** 23.I: 16 ej.; 20.II: 24 ej.; 05.IV: 18 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 20.I: 30 ej. (AJR); 14.II: 22 ej.; 15.III: 15 ej. (SAR); 07.IV: 12 ej. (JBN); 28.VII: 1 ej. (AJR, ERO); 17.VIII: 3 ej.; 11.IX: 7 ej. 23.X: 88 ej. (SAR); 28.XI: 31 ej.; 27.XII: 78 ej. (AJR).

**Calidris falcinellus****Correlimos falcinelo - Territ becadell - Broad-billed Sandpiper**

Estatus: Divagante de Escandinavia y Siberia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 24/15 (may, ago-sep).

**2016**

**Albufera de València:** 16.VIII: 1 ad. el tancat de Milia (BDJ). Observado también los días 18, 20 y 21.VIII. Cita homologada por el CR-SEO.

**El Fondo d'Elx:** 30.VIII: 1 ej. presente hasta el 10.IX (AJR). Observado también los días 31.VIII y 2, 9 y 10.IX. Hay fotos, aunque no se envía al CR-SEO.

**2017**

**Albufera de València:** 01.V: 1 ej. en el tancat de Milia (BDJ,HGA). Observado también el día 02.V (JOB). Cita homologada por el CR-SEO.

Nuevas citas de esta rara limícola de la tundra ártica cuyas rutas migratorias principales discurren por el C y E de Europa y que se viene observando ininterrumpidamente desde 2012. Ambos ej. se han citado en las fechas típicas, mayo y agosto-septiembre.

**Calidris ferruginea****Correlimos zarapitín - Territ bec-llarg - Curlew Sandpiper**

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas y máximos mensuales.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.IX: 5 ej. Máximo anual en la zona (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 02.VIII: 62 ej. en Quartell (AAC); 24.VII: 53 ej. (JBC).

**Albufera de València:** 04.IV: 3 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC); 25.IV: 118 ej. en el Racó de l'Olla (JID, MCH,GGA); 03.V: 96 ej. en el Racó de l'Olla (JID); 09.V: 5 ej. en marjales de Silla; 27.VII: 158 ej. en el tancat de la Ratlla. Máximo anual; 21.VIII: 91 ej. en el tancat de la Ratlla; 05.IX: 32 ej. la mayoría juv. en arrozales de Alfafar (BDJ); 05.XI: 1 ej. Cita tardía (EBZ).

**El Pinet:** 15.III: 5 ej. Primera cita prenupcial (AJR); 20.IV: 736 ej. Máximo anual (SAR); 13.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 10.VIII: 10 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 22.IV: 400 ej. Máximo anual (AJR,JMT); 20.V: 7 ej. Última cita prenupcial (OAP, MFS).

**Salinas del Pinet:** 08.II: 17 ej. en plumaje de invierno; 25.IV: 100 ej. algunos con plumaje nupcial (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 27.VII: 222 ej. (OAP,MFS); 29.VIII: 300 ej. ; 17.IX: 220 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.VIII: 85 ej. (SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 1 ej. Primera cita anual; 04.VIII: 2 ej. Primera cita postnupcial; 08.X: 1 ej. Última cita anual (MTB,JAF).

**Marjal dels Moros:** 05.VIII: 3 ej. (MBM).

**Albufera de València:** 26.III: 1 ej. en arrozales encharcados del Malvinar. Primer registro primaveral (PMP); 20.IV: 46 ej. en la Milia (BDJ); 01.V: 68 ej. en Milia (BDJ,HGA); 29.VI: 1 ej. con plumaje invernal comiendo en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID,MCH); 29.VII: 82 ej. en la Milia (BDJ); 13.VIII: 66 ej. en Milia (BDJ); 04.IX: 12 ej. en l'estany del Pujol (DMF); 27.X: 2 ej. en Milia. Cita tardía (HGA).

**El Pinet:** 22.III: 7 ej.; 29.VII: 4 ej. (SAR); 25.VIII: 20 ej. (AJR,SAR); 14.IX: 27 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 30.III: 158 ej.; 10.IV: 1.013 ej.; 03.V: 200 ej.; 04.VI: 21 ej. (SAR); 10.VIII: 4 ej.; 28.X: 2 ej. (AJR); 03.XI: 1 ej. (AJR,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 16.I: 1 ej. (PAS); 31.VIII: 203 ej. (JMT,MFS,JLEC); 08.IX: 113 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 31.VII: 24 ej. (SAR).

Dos citas en periodo invernal de 1 ej. en el Hondo en enero y de 17 ej. en las salinas del Pinet a principios de febrero. Destacan las enormes concentraciones en las salinas de Santa Pola con más de 1.000 ej. en el paso prenupcial.

***Calidris temminckii*****Correlimos de Temminck - Territ de temminck - Temminck's Stint**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, máximos en migración y fechas extremas.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 09.X: 1 ej. Única cita anual (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 02.VIII: 2 ej. en Quartell (AAC).

**Albufera de València:** 16.IV: 1 ej. en Milia. Primer registro anual, presente hasta el 24.IV (PMP); 01.V: 6 ej. en la Ratlla (BDJ); 03.V: 1 ej. en Milia. Última cita prenupcial (AAC); 22.VII: 1 ej. en Milia. Primera cita postnupcial (BDJ,JFF); 27.VII: 3 ej. en Milia (BDJ); 23.VIII: 6 ej. en Milia (BDJ,JFF); 07.IX: 7 ej. en Milia. Máximo anual (PMP); 02.X: 1 ej. en marjal de Alfafar (BDJ).

**El Fondo d'Elx:** 20.I: 2 ej. Cita invernal. Presentes hasta el 29.II (OAP); 13.III: 3 ej. (JMT,AVDH); 10.IX: 15 ej. Máximo anual (AJR,SAR); 14.X: 6 ej. (AJR); 19.XI: 7 ej. (JMT,IAG,AAR); 25.XI: 2 ej. (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.IV: 1 ej. Única cita anual (MTB,JAF).

**Marjal dels Moros:** 20.VIII: 2 ej. (AAC).

**Albufera de València:** 10.I: 2 ej. en el Racó de l'Olla (SAD); 16.III: 2 ej. en arrozales fangueados del Saladar. Primer registro anual (PMP). Citas en el tancat de Milia de 1 ej. el 05.V (PMP); 1 ad. el 25.VII. Primer registro postnupcial (EPS); 8 ej. el 16.VIII (BDJ); 6 ej. (al menos 1 juv.) el 22.IX (EPS); 3 ej. (al menos 1 ej. de 1er inv.) el 17.X (YAM); 2 ej. el 07.XI; 2 ej. el 21.XII (AAC).

**El Saladar de Agua Amarga:** 30.IV: 2 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.I: 2 ej. (AJR); 16.I: 1 ej. (PAS); 29.I: 2 ej. (OAP); 06.II: 2 ej. (SAR); 21.III: 5 ej. (EDW); 30.IV: 2 ej. (AJR); 17.XII: 3 ej. (OAP).

**Desemb. río Segura:** 14.IX: 3 ej. (SAR).

**Torrevieja:** 08.XI: 5 ej. (EOTH).

Observaciones repartidas a lo largo de todo el año, con citas en todos los meses salvo en junio, con un máximo en este bienio de 15 ej. en el paso postnupcial en el Hondo.

***Calidris alba*****Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: máximos en invernada, fechas extremas y máximos en migración.

**2016**

**Castellón de la Plana:** 29.XII: 5 ej. en la playa, en zona habitual de invernada (MTB).

**Meliana:** 09.I: 16 ej. Censo de aves marinas (EEGA).

**Desemb. barranc del Carraixet:** 22.XII: 58 ej. (RMB).

**Albufera de València:** citas destacadas en la playa de la Malladeta de 72 ej. el 08.VIII (YAM) y de 76 ej. el 26.XII (JLE).

**El Pinet:** 07.I: 7 ej. (JMT,OAP); 26.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial (AJR); 14.XII: 19 ej. (GGO).

**El Saladar de Agua Amarga:** 08.II: 12 ej. en la costa (AJR); 12.VIII: 16 ej. en la costa (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 03.I: 17 ej.; 12.II: 28 ej.; 02.V: 1 ej. Última cita prenupcial (AJR).

**Puerto de Santa Pola:** 24.I: 12 ej. (AJR).

**Playa de la Marina:** 24.I: 23 ej.; 07.XII: 15 ej. (JMT,AAR).

**Desemb. río Segura:** 16.II: 12 ej. (AJR); 22.III: 26 ej. (SAR); 30.IV: 32 ej.; 08.X: 36 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 07.I: 103 ej. (SAR); 05.IV: 102 ej.; 12.VIII: 128 ej. Máximo anual (SAR).

**Cabo Cervera:** 07.X: 32 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.IV: 7 ej. en la gola del Trench. Máximo anual (MTB,JAF).

**Castellón de la Plana:** 02.II: 5 ej. en zona habitual de invernada (MTB).

**Desemb. barranc del Carraixet:** 24.XI: 24 ej. (RMB).

**Albufera de València:** citas destacadas en la playa de la Malladeta de 16 ej. el 02.I (GGO); 46 ej. el 27.VIII (VBJ); 150 ej. el 30.IX (EJCZ); 57 ej. el 27.X (YAM).

**Cullera:** 07.XI: 20 ej. en la playa del Dosel (VBJ).

**El Pinet:** 08.I: 5 ej. (PCC); 22.III: 47 ej. (SAR); 27.V: 4 ej. (AJR); 24.XI: 27 ej. (OAP,JMT,TJP); 07.XII: 5 ej. (AJR).

**Saladar de Agua Amarga:** 04.I: 24 ej.; 01.II: 12 ej.; 18.III: 35 ej.; 30.IV: 35 ej.; 29.XII: 20 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 02.IV: 3 ej. (JMT); 30.XI: 33 ej. (AJR).

**Desemb. río Segura:** 08.I: 28 ej. (JEG); 22.IX: 9 ej. (SAR); 13.X: 23 ej. (AJR).

**Guardamar del Segura:** 18.II: 30 ej. (EJGA).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.XI: 93 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 05.II: 67 ej. (AJR); 18.III: 55 ej. (AJR,SAR); 02.X: 42 ej. (SAR).

Observaciones repartidas a lo largo de todo el año salvo en el mes de junio. Máximos para este beinio de 150 ej. en el paso postnupcial en l'Albufera y de 103 ej. en invernada en las lagunas de La Mata-Torrevieja.

### ***Calidris alpina***

### **Correlimos común - Territ variant - Dunlin**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: máximos mensuales destacados y fechas extremas.

#### **2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 09.X: 10 ej. Máximo anual; 10.XII: 3 ej. Cita invernal (MTB).

**Albufera de València:** 04.I: 320 ej. en marjales de Sueca (AAC); 24.II: 809 ej. en la playa de la Malladeta. Máximo anual (RMB). Presentes hasta el 29.II; 01.III: 230 ej. en marjales de Silla (AAC); 14.VI: 1 ad. en la playa de la Malladeta. Cita estival que parece corresponder con un ave en mal estado ya que presente una pata parcialmente amputada (VPA); 22.VI: 2 ej. en la gola del Perellonet. primera cita postnupcial temprana (MAJ); 07.IX: 54 ej. en la Milia (BDJ); 08.X: 150 ej. en l'estany del Pujol (GLF,GCH,YAM). Presentes hasta el 03.XI; 10.XII: 380 ej. en la playa de la Malladeta. Concentración destacada (BDJ).

**El Pinet:** 25.II: 130 ej. (AJR,SAR).

**Saladar de Agua Amarga:** 05.XI: 36 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 31.I: 503 ej. Cita invernal (JMT,OAP); 22.II: 600 ej.; 05.X: 80 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 18.II: 144 ej. (JMT,MFS); 13.IX: 50 ej. (AJR,PCC); 21.X: 210 ej. (AJR); 28.XI: 130 ej.; 20.XII: 248 ej. Cita invernal (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 21.III: 112 ej.; 22.VIII: 40 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 22.I: 217 ej. Cita invernal. Concentración destacada; 22.II: 130 ej. (SAR).

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.V: 20 ej. Máximo anual; 18.XI: 2 ej. en la playa. 1 de ellos con anilla 7UR blanca; anillado en la desembocadura del Vístula (Polonia) como ad. en julio de 2016 (MTB, JAF).

**Albufera de València:** 31.I: 520 ej. en zonas fangueadas del Malvinar (BDJ); 01.V: 36 ej. en Milia. Marcado incremento de migrantes (BDJ,HGA); 30.VI: 1 ej. en la Milia. Primer registro postnupcial (EPS); 26.VII: 4 ej. en Milia (BDJ,VLG); 30.VIII: 34 ej. (solo 1 juv.) en Milia (BDJ); 04.IX: 32 ej. en l'estany del Pujol (DMF); 07.XI: 170 ej. en el tancat de Milia (AAC).

**El Pinet:** 25.VIII: 5 ej. (AJR,SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 24.II: 300 ej. (AJR); 27.III: 716 ej.; 04.VI: 19 ej.; 24.X: 608 ej.; 10.XI: 1.370 ej. (SAR).

**Catral:** 23.I: 153 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 22.I: 500 ej.; 14.II: 10 ej. (SAR); 27.VI: 1 ej. (EAVP); 01.XI: 220 ej. (AJR); 01.XII: 150 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.XI: 145 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 17.II: 100 ej. (AJR); 18.III: 22 ej. (AJR,SAR); 10.XII: 33 ej. (AJR).

**Pilar de la Horadada:** 29.VIII: 54 ej. (VHG).

Recogemos citas para todos los meses del año, con un máximo destacable de 1.370 ej. en las salinas de Santa Pola en el mes de noviembre de 2017.

***Calidris bairdii*****Correlimos de Baird - Territ de Baird - Baird's Sandpiper**

Estatus: Divagante de N América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 4/2 (ago-sep).

**2016**

**Albufera de València:** 14.IX: 1 juv. en la el tancat de Milia (PMP). Observado también el 15.IX (YAM). Cita homologada por el CR de SEO/BirdLife.

Segunda cita de este correlimos americano para la CV. La anterior es también de l'Albufera en 2008.

***Calidris minuta*****Correlimos menudo - Territ menut - Little Stint**

Estatus: Migrante común, invernante escaso. Criterio: máximos mensuales destacados, fechas extremas.

**2016**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 2 ej. (JBC); 02.VIII: 43 ej. (AAC).

**Albufera de València:** 12.III: 70 ej. en marjales de Valencia (BDJ); 04.IV: 106 ej. en el tancat de Milia (AAC); 01.V: 47 ej. en la Ratlla. Última cita prenupcial (BDJ); 15.VII: 2 ej. en la R.N. de Milia. Primera cita postnupcial (PMP); 11.VIII: 1 juv. en la el Racó de l'Olla. Primera cita de 1 juv. (MCH,JID,GGA); 25.VIII: 140 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 07.IX: 160 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 30.X: 80 ej. en l'estany del Pujol; 03.XI: 60 ej. en l'estany del Pujol; 15.XII: 120 ej. en marjales de Sueca. Cita invernal (YAM).

**El Pinet:** 12.IV: 15 ej. (JMT).

**Salinas de Santa Pola:** 31.I: 200 ej. Máximo anual (JMT,OAP); 17.X: 108 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 09.I: 13 ej. (EBZ); 18.II: 142 ej. (JMT,MFS); 21.X: 90 ej. (AJR); 28.XI: 70 ej. (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 28.I: 40 ej.; 11.III: 80 ej.; 05.IV: 150 ej.; 22.VIII: 65 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 22.I: 18 ej. Cita invernal (SAR).

**2017**

**Albufera de València:** 22.I: 112 ej. en arrozales encharcados de Campanar (BDJ). Citas en el tancat de Milia de 110 ej. el 05.III (PMP); 60 ej. el 23.IV (HGA); 11 ej. el 23.VII. Primeros registros postnupciales (BDJ, EPS); 118 ej. el 13.VIII (BDJ); 120 ej. el 11.IX (BDJ); 80 ej. el 27.X (HGA) y 45 ej. el 07.XI (AAC).

**Salinas de Santa Pola:** 27.III: 917 ej.; 04.VI: 3 ej.; 23.X: 120 ej.; 03.XI: 421 ej. (AJR,SAR); 10.XI: 56 ej. (SAR).

**Catral:** 23.I: 115 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 20.I: 100 ej. (AJR); 14.II: 20 ej. (SAR); 10.III: 20 ej. (AJR); 26.VIII: 100 ej. (JMT); 22.X: 200 ej. (SAR); 30.XII: 60 ej. (MGZ).

**Desemb. río Segura:** 14.IX: 210 ej. (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 10.III: 54 ej.; 27.IV: 149 ej.; 09.V: 57 ej.; 22.XI: 50 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 20.X: 32 ej. (AJR,SAR).

Máximos invernales de 115 ej. en Catral y de 112 en l'Albufera, mientras que el máximo para el bienio ha sido de 917 ej. en las salinas de Santa Pola en el mes de marzo. Por lo demás, citas para todos los meses del año con máximos en ambos pasos.

***Calidris fuscicollis*****Correlimos culiblanco - Territ cuablanc - White-rumped Sandpiper**

Estatus: Divagante del N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 14/6 (abr-may, jun-ago).

**2017**

**Albufera de València:** 02.V: 1 ej. en el tancat de Milia (JOB,PVG). Observado de nuevo los días 3, 4, 5, 7, 8 y última cita el 09.V (AAC).

Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO, de ser aceptado supondría el cuarto registro para l'Albufera y el sexto para la CV, todos ellos en Valencia. Estas citas amplían el rango de presencia de la especie al mes de mayo.

**Calidris melanotos****Correlimos pectoral - Territ pectoral - Pectoral Sandpiper**

Estatus: Divagante E de Asia y N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: I 19/74 (abr-may; jul-nov).

**2016**

**Albufera de València:** 17.IX: 1 juv. en marjales de Alfafar (BDJ). Observado de nuevo el 18.IX (JLP); 06.XI: 1 ej. en l'estany del Pujol (JOB).

**2017**

**Requena:** 01.X: 1 ej. en la balsa el Pontón (RMB).

**Albufera de València:** 21.IV: 1 ej. (por el tamaño, aparentemente h.), observado en Milia. Primer registro anual (PMP). Observado en 5 ocasiones más hasta el 26.IV (GGO); 30.IV: 1 ej. en la Milia (PMP). Observado en 9 ocasiones más hasta el 14.V (PMP,EPS); 20.IX: 1 juv. en un arrozal baldío del Borronar. Primer registro postnupcial (PMP,EPS), observado de nuevo el 22.IX (EPS); 07.X: 1 juv. en Milia, comiendo activamente a escasos metros de un falaropo picofino (YAM,JOB,EPS).

**El Fondo d'Elx:** 05.IX: 1 ej. (MNG,JBN).

Continúa creciendo el total de citas en la CV, con la primera cita para el interior de Valencia y la primera cita para el mes de noviembre en l'Albufera, que acumula el 75% de todos los registros. A pesar de esta abundancia reciente de citas (se viene observando ininterrumpidamente desde 2004) Sigue sin citarse en Castellón.

**Lymnodromus scolopaceus****Agujeta escolopácea - Tetolet bec-llarg - Long-billed Dowitcher**

Estatus: Divagante de N América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: I2/5 (ago-feb).

**2016**

**Albufera de València:** 26.I: 1 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU). Observado también los días 27.I (JID,MCH,GGA), 29.I (CMO), 01.II y 04.II (JID,MCH). Segunda cita para l'Albufera. Cita homologada por el CR de SEO/BirdLife.

**El Fondo d'Elx:** 24.VIII: 1 ej., observado de nuevo el 22.IX (SAR). Cita no tramitada al CR de SEO.

**2017**

**El Fondo d'Elx:** 28.X: 1 ej. junto a un grupo de combatientes (JOC,VIM). Observado de nuevo el 28.XI y el 27.XII (AJR).

Tres nuevos ej. en este bienio de este raro limícola norteamericano que tan solo contaba con dos citas anteriores, una de 1987 en la desembocadura del Mijares y otra de 2007 en l'Albufera de València. Estas citas suponen las primeras citas para Alicante y una notable ampliación del rango de aparición, con la invernada de un ej. en l'Albufera y las primeras citas para los meses de agosto y septiembre.

**Scolopax rusticola****Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock**

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 18.X: 2 ej. Primera cita para Alcossebre (DES).

**Borriol:** 27.IX: 1 ej. sale volando al paso en el barranco de la Botalaria (LPC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 16.XII: 1 ej. (GGO).

**Albufera de València:** 04.I: 1 ej. sale volando al paso en el Racó de l'Olla (MCH); 11.XI: 1 ej. sale volando al paso (MCH,JID,IRU); 28.XI: 1 ej. sale volando al paso en el Pujol Vell (MLX).

**Mislata:** 06.XI: 1 ej. volando bajo por el caso urbano al anochecer (JAI).

**Requena:** 10.XII: 1 ej. volando por el río Magro al anochecer (JAI).

**Cullera:** 04.XI: 1 ej. en la bassa de Sant Llorenç al anochecer (ASL).

**Alcoi:** 11.III: 1 ej. en el barranc del Cinc (PCC).  
**Font Roja:** 12.II: 1 ej. (PCC).  
**Beneixama:** 30.XI: 1 ej. en la sierra de la Solsona (JAG).

### 2017

**Sueras:** 28.X: 1 ej. al anochecer en la pista forestal entre fuente de Castro y la masía de la Campana (PMO).  
**Viver:** 27.XI: 1 ej. en Masías Blancas (ANL).  
**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 07.XI: 1 ej. encontrado muerto en la playa (GGO).  
**Albufera de València:** 06.I: 1 ej. en l'illa (PMP); 04.XII: 1 ej. en el Racó de l'Olla buscando alimento. Primera cita postnupcial (MCH,GGA).  
**Beniarrés:** citas en el barranco de la Encantada de 1 ej. el 18.XI (BOR) y el 26.XI (BOR,DMF).  
**Alcoi:** 04.XII: 1 ej. (PCC).  
**Sant Vicent del Raspeig:** 07.XI: 1 ej. (JMT).  
**Pantano de Elche:** 10.II: 1 ej. (OAP).

### ***Lymnocyptes minimus***

### **Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe**

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

### 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 22.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 31.X: 4 ej. Máximo anual en transecto de 1,2 km (MTB).  
**Quadro de Santiago:** 27.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).  
**Marjal dels Moros:** 24.X: 1 ej. (RMB).  
**Albufera de València:** 01.I: 4 ej. en Milia (PMP); 10.III: 2 ej. en arrozales fangueados de la Torreta Ampla (PMP) 30.IV: 1 ej. anillado en la Ratlla (JGAC); 16.X: 7 ej. en Milia. Primera cita postnupcial y máximo anual (PMP); 24.XII: 3 ej. en malladas litorales de la Devesa (VPA).  
**Cullera:** 20.I: 3 ej. en zonas de arrozal próximas al mareny de Sant Llorenç (VPA).  
**Requena:** 05.XI: 1 ej. en la balsa el Pontón. Primera cita para la localidad y segunda para la comarca (JAI).  
**Elx:** 03.XII: 2 ej. en campos de Vistabella (BOR,DMF).

### 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.I: 3 ej. Máximo invernal en transecto de 1,2 km; 21.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).  
**Quadro de Santiago:** 04.IV: 4 ej. Máximo prenupcial en transecto de 2,3 km; 22.IV: 1 ej. Última cita primavera (MTB).  
**Albufera de València:** 10.IV: 1 ej. en Milia (PMP); 21.IX: 1 ej. en la Pipa. Primer registro postnupcial (AVA); 07.XII: 3 ej. en el tancat de Milia (AAC).  
**El Fondo d'Elx:** 07.I: 8 ej. (OAP); 03.II: 5 ej. (AJR); 16.III: 6 ej. (JPG); 06.IV: 1 ej. (AJR); 28.XI: 4 ej. (EBST, OAP); 15.XII: 5 ej. (OAP).

### ***Gallinago gallinago***

### **Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe**

Estatus: Migrante común e invernante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

### 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.XI: 32 ej. Máximo anual en censo de 1,2 km (MTB).  
**Quadro de Santiago:** 27.I: 13 ej. Máximo anual en censo de 2,3 km (MTB).  
**Albufera de València:** 28.IV: 2 ej. en la Ratlla. Última cita prenupcial (BDJ); 17.VII: 1 ej. en Milia. Primera cita postnupcial (PMP); 30.VIII: 84 ej. en Milia (YAM); 09.IX: 200 ej. en Milia (PMP).  
**Utiel:** 16.I: 2 ej. en el río Magro (JAI).  
**Requena:** 16.III: 4 ej. en la balsa el Pontón. Máximo anual (RMB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 29.IX: 10 ej. (PLP).

**El Fondo d'Elx:** 16.I: 12 ej. (SAR); 29.X: 174 ej. en campos de cultivo (OAP); 25.XI: 240 ej. Máximo anual (AJR); 22.XII: 98 ej. (AJR,LFS).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.III: 28 ej. Máximo primaveral en censo de 1,2 km; 06.V: 2 ej. Última cita primaveral; 28.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 01.XI: 15 ej. Máximo postnupcial en censo de 1,2 km (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 02.IV: 27 ej. levantan el vuelo en la punta de Llebeig al paso de un aguilucho lagunero (BDJ); 16.V: 1 ej. en Milia. Cita primaveral tardía (GCH); 22.VI: 3 ej. en Milia. Primer registro postnupcial (GGO); 11.IX: 70 ej. en Milia (BDJ); 04.X: 93 ej. en la Pipa (AVA).

**Requena:** 07.V: 1 ej. (JAI).

**Marjal de Pego-Oliva:** 12.I: 13 ej. (PLP).

**Catral:** 24.II: 17 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 28.I: 40 ej. (AJR); 30.X: 20 ej. (AJR,SAR); 27.XII: 30 ej. (AJR).

## ***Xenus cinereus***

## **Andarríos del Terek - Siseta cendrosa - Terek Sandpiper**

Estatus: Divagante del NE de Europa y Siberia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 19/14 (may, jun-sep).

## 2016

**Salinas de Santa Pola:** 02.V: 1 ej. (AJR), observado de nuevo los días 03.V (AJR,PPP) y 06.V (AJR). Cita homologada por el CR de SEO/BirdLife.

## ***Phalaropus lobatus***

## **Falaropo picofino - Escurafascons bec-fi - Red-necked Phalarope**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 60/38 (mar-may, jul-dic).

## 2017

**Requena:** 01.X: 1 juv. mudando a plumaje de invierno en la balsa el Pontón. Está en el agua moviéndose continuamente y nadando junto a una orilla (JAI). Observado de nuevo el 07.X (JAI) y el 08.X (RMB, EJNA).

**Albufera de València:** 07.X: 1 juv. en el tancat de Milia (YAM,JOB,EPS). Observado de nuevo el 08.X (PMP,LAA,MAL).

**Salinas de Santa Pola:** 03.V: 1 ej. (SAR). Observado de nuevo los días 04 (SAR), 05 (JBN) y 06.V (AJR).

Primera cita lejos de la costa y ampliación del rango de presencia al mes de mayo.

## ***Phalaropus fulicarius***

## **Falaropo picogruoso - Escurafascons bec-gros - Grey Phalarope**

Estatus: Migrante e invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 17/13 (abr-may; ago-oct, dic-feb).

## 2016

**Salinas de Santa Pola:** 15.I: 1 ej. (AJR,SAR).

## ***Actitis hypoleucos***

## **Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper**

Estatus: Visitante estival, migrante común, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Sant Jordi:** 16.I: 2 ej. Cita invernal (ELL,DFE,FRJ); 26.IV: 11 ej. (ELL).

**Desemb. Bco. de Aigua-Oliva:** 04.V: 9 ej. en la playa de gravas (ELL).

**Embalse de M<sup>a</sup> Cristina:** 17.I: 9 ej. Cita invernal (PGR,JMI).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 05.I: 1 ej. Cita invernal (MTB).

**Quadro de Santiago:** 16.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 08.I: 2 ej. Cita invernal (MTB); 24.VII: 2 ej. (JBC).

**Meliana:** 07.I: 1 ej. (RMB).

**Valencia:** 12.XII: 1 ej. en los alrededores del Oceanográfico. Presente hasta el 23.XII (PAB).

**Albufera de València:** 25.IV: 11 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,GGA); 03.X: 9 ej. en l'estany del Pujol (JOB); 27.VII: 4 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 05.VIII: 10 ej. (YAM).

**Quart de Poblet:** 06.XII: 1 ej. Cita invernal (PAB).

**Requena:** 24.IV: 11 ej. (JAI); 16.VII: 8 ej. Primera cita postnupcial (JAI).

**Sumacàrcer:** 16.I: 1 ej. Cita invernal (PAB,GGS).

**Cabo de Cullera:** 06.IX: 10 ej. (RNU).

**Embalse de Bellús:** 17.I: 5 ej. Cita invernal (BOR).

**Embalse Beniarrés:** 07.I: 1 ej. Cita invernal (EACO).

**Villena:** 21.V: 2 ej. Última cita prenupcial (AAC).

**Pantano de Elche:** 22.VII: 5 ej. (OAP).

**El Pinet:** 26.VII: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 21.VII: 7 ej. (OAP).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 08.XII: 5 ej. Cita invernal (EAVP).

**EDAR de Santa Pola:** 20.IX: 12 ej.; 04.X: 17 ej. Máximo anual (SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.II: 1 ej. Primera cita prenupcial. Sin citas invernales; 13.V: 1 ej. Última cita primaveral; 08.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 04.VIII: 26 ej. Máximo anual; 25.XI: 1 ej. Última cita anual. Sin citas invernales (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 30.IV: 14 ej. Máximo anual (MTB).

Albufera de València: 02.I: 1 ej. en la desembocadura de la gola del Perellonet (BDJ); 22.I: 3 ej. en un arrozal encharcado de Campanar (BDJ) 25.I: 1 ej. en arrozales cerca de la Ratlla (PAB); 31.I: 1 ej. en la gola del Perellonet (YAM); 07.VIII: 25 ej. en l'estany del Pujol (JOB); 10.XII: 1 ej. en l'estany del Pujol (EPS).

Requena: 28.IV: 30 ej. (PRP,JGS); 01.V: 60 ej. número máximo en migración prenupcial por la localidad; 20.VII: 11 ej.; 19.VIII: 14 ej.; 09.IX: 19 ej. (JAI).

**Embalse de Forata:** 23.I: 1 ej. raro aquí en invernada (JAI).

**Embalse de Bellús:** 14.I: 1 ej. (BOR,DMF).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 1 ej. (EAAN).

**Desemb. río Segura:** 03.II: 1 ej.; 10.XII: 2 ej. (AJR).

**EDAR de Santa Pola:** 28.VII: 23 ej. (SAR).

## *Tringa ochropus*

## **Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper**

Estatus: Visitante estival e invernante escaso, migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 12.XI: 18 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 1,2 km; 23.XII: 6 ej. Cita invernal (MTB).

**Quadro de Santiago:** 20.II: 1 ej. Primera cita prenupcial; 28.III: 6 ej. Máximo primaveral en recorrido de 2,5 km (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 30.I: 1 ej. Cita invernal (MBM); 24.VII: 5 ej. (JBC).

**Albufera de València:** 13.I: 15 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 18.III: 8 ej. en la marjal de Catarroja (BDJ); 10.VI: 2 ej. en el tancat de Milia. Cita estival (JF,BDJ); 22.VII: 8 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 24.VIII: 11 ej. en la el tancat de Milia (BDJ).

**Requena:** 20.III: 23 ej. Máximo anual (RMB); 10.IV: 11 ej.; 13.XI: 6 ej.; 11.XII: 3 ej. Cita invernal (JAI).

**Embalse de Bellús:** 17.I: 1 ej. Cita invernal (BOR).

**Marjal de Pego-Oliva:** 08.IX: 8 ej. (PLP).

**El Pinet:** 01.XII: 3 ej. (JDL).

**Pantano de Elche:** 13.VII: 4 ej. (OAP).

**Clot de Galvany:** 23.VI: 1 ej. Cita estival que podría corresponder a aves en movimientos postnupciales tempranos (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 18.II: 3 ej. (SAR); 23.VI: 1 ej. Cita estival que podría corresponder con movimientos postnupciales tempranos (AJR); 17.X: 10 ej. (SAR); 19.XI: 10 ej. (JMT,IAG,AAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 28.I: 2 ej. Cita invernal (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 09.IX: 7 ej. (SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.I: 3 ej. Máximo invernal en censo de 1,2 km; 18.VI: 1 ej. Cita estival; 04.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 21.X: 9 ej. Máximo postnupcial en censo de 1,2 km; 21.XII: 4 ej. Máximo invernal en censo de 1,2 km (MTB, JAF).

**Islas Columbretes:** 05.VIII: 1 juv. (LGB).

**Albufera de València:** 09.I: 3 ej. (JLE); 20.II: 7 ej. en Milia. Agrupación destacada (YAM); 17.III: 11 ej. dispersos en diferentes canales entre Catarroja y Silla (BDJ); 17.IV: bando migratorio de 13 ej. descendiendo desde gran altura a las lagunas de la del tancat de la Pipa (AAC); 22.VI: 10 ej. en la Milia. Primeros registros postnupciales (EPS); 02.VII: 36 ej. en Milia (BDJ); 07.IX: 19 ej. en un arrozal baldío del Borronar y 11 ej. en Milia (BDJ); 24.XI: 6 ej. en canales de la marjal de Massanasa (AAC); 05.XII: 13 ej. en la el tancat de Milia (AAC).

**Utiel:** 23.I: 1 ej. (JAI).

**Requena:** 02.VII: 2 ej. veraneantes; 03.IX: 8 ej. (JAI); 01.X: 8 ej. (RMB); 03.XII: 4 ej. (JAI).

**Marjal de Pego-Oliva:** 04.VII: 10 ej. (HGA).

**Embalse Beniarrés:** 01.VII: 1 ej. (BOR).

**El Fondo d'Elx:** 14.II: 6 ej. (SAR); 12.VII: 4 ej. (AJR); 08.IX: 8 ej. (AJR,SAR); 27.XII: 10 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 14.VII: 2 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 27.II: 1 ej.; 29.IX: 8 ej. (SAR).

## ***Tringa flavipes***

## **Archibebe patigualdo chico - Tifort groc petit - Lesser Yellowlegs**

Estatus: Divagante del N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 27/12 (jul-ene).

## 2016

**Albufera de València:** 13.X: 1 ad. en l'estany del Pujol (AAD,BDJ,MAJ), observado de nuevo el 14.X (JLE,-MAJ,EPS). Cita homologada por el CR de SEO/BirdLife.

**El Fondo d'Elx:** 31.VIII: 1 ej. (BOR,AJR). Observado de nuevo los días 02 (AJR), 06, 07 (SAR), 09 (AJR), 10 (SAR,AJR) y 12 (JBN,PCC). Posteriormente se observa de nuevo 1 ej. el día 20.IX pero probablemente distinto a juzgar por los observadores (AJR,SAR), por último nueva cita de 1 ej. el 20.X (AJR). Cita homologada por el CR de SEO BirdLife.

Dos ejemplares distintos en el Hondo, además de una observación de otro ejemplar separado por un mes en esta localidad, y de 1 ejemplar en l'Albufera, por lo que podría haber habido 3 (o incluso 4) ejemplares implicados en las observaciones de este año, aunque no se pueden descartar movimientos entre ambos humedales.

## ***Tringa totanus***

## **Archibebe común - Tifort - Common Redshank**

Estatus: Visitante estival, migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 09.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 18.III: 1 ej. Primera cita anual; 01.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Benavites:** 09.III: 5 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 26.I: 4 ej. en el Racó de l'Olla. Cita invernal (JID,MCH); 12.II: 3 ej. (RMB); 07.III: 26 ej. en marjales de Catarroja (AAC); 18.III: 56 ej. en marjales de Catarroja. Máximo anual (BDJ); 07.IV: 14 ej. en Milia (JFF,BDJ); 03.V: 15 ej. en Milia (AAC); 28.V: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Cita tardía (VLG,BDJ); 10.VI: 4 ej. en el Racó de l'Olla. Cita estival (MCH,JID,JVM); 15.VII: 42 ej. en Milia (PMP); 27.VII: 23 ej. en la Milia (BDJ); 25.VIII: 4 ej. (3 juv.) en Milia (BDJ).

**Requena:** 06.III: 1 ej.

**El Pinet:** 10.I: 1 ej. en las salinas. Cita invernal (NGA): 10.VIII: 5 ej. (AJR); 16.IX: 7 ej. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 10.I: 6 ej. (EBZ); 01.II: 13 ej. (SAR,AJR); 20.V: 10 ej. (OAP,MFS); 12.XI: 13 ej. (JBN).

**El Fondo d'Elx:** 13.IX: 12 ej. (AJR,PCC,SAR); 23.XII: 1 ej. (NGA) observado de nuevo el 24.XII (PLP).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 11.III: 5 ej.; 12.VIII: 2 ej. (SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 08.IV: 13 ej. Máximo anual; 18.VI: 1 ej. Cita estival (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 07.I: 1 ej. en l'estany del Pujol (YAM); 27.IV: 73 ej. sobrevolando arrozales de la Maquial, 21 aves en un arrozal encharcado en el Malvinar, 23 aves en un arrozal encharcado de la Foia y un total de 47 aves en Milia. Importante llegada de migrantes que coincide con la inestabilidad de la jornada (BDJ); 27.IV: 69 ej., en el Racó de l'Olla. Agrupación destacada coincidente con un temporal de lluvia con vientos de componente E (MCH,JID); 15.VI: 1 ej. en el Racó de l'Olla (JID,MCH); 22.VI: 12 ej. en Milia. Primeros registros postnupciales (EPS); 26.VII: 58 ej. (al menos 2 juv.) en Milia. Primer registro de un aves nacidas la presente temporada (HGA,BDJ,VLG); 10.XII: 3 ej. en l'estany del Pujol (EPS).

**El Saladar de Agua Amarga:** 04.III: 1 ej. (AJR).

**Clot de Galvany:** 17.XII: 1 ej. (EBST).

**Salinas de Santa Pola:** 08.I: 1 ej. (JEG); 14.II: 8 ej. (AJR,SAR); 26.III: 12 ej.; 30.IV: 54 ej.; 04.V: 33 ej.; 27.VI: 1 ej.; 01.VII: 3 ej. (AJR); 03.XI: 17 ej. (AJR,SAR); 02.XII: 19 ej.; 29.XII: 8 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 30.XII: 1 ej. (MGZ).

## *Tringa stagnatilis*

## Archibebe fino - Siseta - Marsh Sandpiper

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

## 2016

**Albufera de València:** 24.III: 1 ej. en Milia (DMO). Presente hasta el 01.IV (PMP); 13.IV: 1 ad. en el Racó de l'Olla (JID,GGA,MCH); 08.VI: 1 ad. en el Racó de l'Olla. Cita estival que podría corresponder con una cita postnupcial temprana (JID,MCH,GGA); 01.VIII: 1 juv. en el Racó de l'Olla (JID,MCH,GGA); 15.VII: 3 ej. en Milia (PMP); 18.VIII: 1 ej. en Milia. Presente hasta el 21.VIII (BDJ).

**El Pinet:** 03.IV: 1 ej. (SCR).

**El Fondo d'Elx:** 25.VIII: 4 ej. presentes hasta el 10.IX, con máximo de 5 ex. el 09.IX (AJR); 12.IX: 1 ej. presente hasta el 17.IX (JBN); 13.IX: 1 ej. presente hasta el 16.IX (AJR,PCC); 20.IX: 2 ej. (AJR,SAR); 27.IX: 1 ej. presente hasta el 28.IX (DMF,EBP).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.X: 1 ej. Única cita anual (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 02.IV: 1 ej. en Milia. Primer registro prenupcial (PMP); 20.VI: 2 ad. comiendo en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID,MCH); 02.VII: 2 ad. en Milia (BDJ), aumentando a 5 ej. el 03.VII (YAM,GGO); 14.VII: 3 ej. en el Racó de l'Olla (MCH,JID); 26.VII: 3 ej. (1 juv.) en Milia. Primer registro de un ave nacida la presente temporada (HGA,BDJ,VLG).

**Salinas de Santa Pola:** 08.I: 1 ej. (PCC,JEG); 27.III: 2 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 06.VIII: 1 ej.; 19.VIII: 4 ej. (SAR); 25.VIII: 3 ej.; 01.IX: 3 ej. (AJR,SAR); 05.IX: 3 ej. (JBN); 08.IX: 5 ej. (AJR,SAR).

**Tringa glareola****Andarríos bastardo - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper**

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.IX: 16 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 1,2 km (MTB).

**Quadro de Santiago:** 04.I: 1 ej. Cita invernal; 09.IV: 3 ej. (MBM); 04.V: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 12.III: 7 ej.; 24.VII: 8 ej. (JBC).

**Marjal dels Moros:** 11.IV: 6 ej. (RMB).

**Desemb. barranc del Carraixet:** 25.IV: 3 ej. (RMB).

**Albufera de València:** citas invernales de 25 ej. en el tancat de Milia el 16.I (PMP) y de 5 ej. en marjales de Suca el 22.I (EPS); 05.III: 4 ej. marjales de Massanassa (ASI); 07.III: 30 ej. marjales de Catarroja (AAC); 04.VII: 15 ej. marjales de Alfafar (MAJ); 27.VII: 52 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 14.VIII: 55 ej. en la Pipa (BDJ); 25.VIII: 39 ej. marjales de Alfafar (JOB) y 44 ej. en el tancat de Milia (BDJ); 05.IX: 44 ej. marjales de Alfafar (BDJ); 18.IX: 33 ej. en marjales de Sollana (BDJ); 05.XI: 12 ej. en el tancat de Milia (GGO); 26.XII: 31 ej. en marjales de Sollana. Cita invernal (MCH).

**Requena:** 27.III: 1 ej.; 24.IV: 1 ej. (JAI).

**Marjal de Pego-Oliva:** 08.IX: 12 ej. (PLP).

**El Pinet:** 11.VIII: 1 ej. (SAR).

**Clot de Galvany:** 29.VII: 1 ej.; 22.XII: 1 ej. Cita invernal (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 26.VIII: 2 ej. (SAR).

**Catral:** 13.I: 9 ej. Cita invernal (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 18.I: 13 ej. Cita invernal; 18.II: 20 ej. (SAR); 22.III: 22 ej. (AJR); 21.VII: 19 ej. (OAP); 29.VIII: 30 ej. (AJR); 15.IX: 15 ej. (SAR); 06.X: 40 ej. (AJR,SAR); 21.X: 76 ej. Máximo anual (AJR); 18.XI: 30 ej. (AJR,-SAR,OAP); 20.XII: 37 ej. Cita invernal (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 22.VIII: inusual presencia de 1 ej. en paso (SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.IV: 51 ej. censo destacado en transecto de 1,2 km (MTB,JAF); 18.IV: 62 ej. (AMG); 06.X: 1 ej. Última cita anual (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 11.III: 1 ej. Primera cita prenupcial. Sin citas invernales (MTB).

**Marjal dels Moros:** 31.XII: 1 ej. (EAAN).

**Albufera de València:** 09.I: 12 ej. sobrevolando el tancat de Zacarés (VBJ). Censos destacados en el tancat de Milia de 38 ej. el 20.II (YAM) y el 05.III (PMP); 44 ej. el 20.IV (BDJ); 3 ej. el 22.VI (primer registro postnupcial) (GGO); 15 ej. el 10.VII (YAM,GGO); 31 ej. el 26.VII (BDJ,VLG); 37 ej. el 15.VIII (BDJ,YAM) y 11 ej. el 21.XII (AAC); 03.IX: 15 ej. alimentándose en un arrozal baldío del Peirat de Cullera (MAL,LAA).

**Marjal de Pego-Oliva:** 30.I: 4 ej. (PLP).

**Catral:** 03.IV: 18 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 04.I: 2 ej. (EAAN); 21.VIII: 61 ej.; 18.IX: 38 ej. (SAR); 22.XII: 13 ej.; 27.XII: 12 ej. (AJR).

**Tringa erythropus****Archibebe oscuro - Xuït - Spotted Redshank**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Albufera de València:** 03.I: 3 ej. en l'estany del Pujol. Cita invernal (LCL,VGA); 07.III: 2 ej. en marjales de Catarroja (AAC); 15.VI: 2 ad. en el Racó de l'Olla. Cita estival que podría corresponder con una cita postnupcial temprana (JID,MCH,GGA); 15.VII: 4 ej. en el tancat de Milia (PMP); 06.IX: 3 juv. en marjales de Alfafar (RNU); 18.IX: 8 ej. en el tancat de Milia (PMP); 19.X: 2 ej. en l'estany del Pujol (AAC); citas invernales en l'estany del Pujol de 6 ej. el 03.XII (YAM) y de 8 ej. el 15.XII (VBJ).

**Requena:** 08.V: 1 ej. con plumaje nupcial. Última cita prenupcial (JAI).

**Marjal de Pego-Oliva:** 17.X: 2 ej. (PLP).

**Salinas de Santa Pola:** 30.I: 40 ej. Cita invernal; 23.II: 14 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 16.I: 7 ej. Cita invernal (SAR); 24.VIII: 58 ej. (SAR); 29.VIII: 100 ej. (AJR); 19.IX: 105 ej. Mximo anual (SAR); 27.IX: 17 ej. (PSH); 28.IX: 90 ej. Cita destacada (SAR); 01.X: 64 ej. (AJR,SAR); 23.XII: 5 ej. Cita invernal (JMT,OAP).

## 2017

**Albufera de Valncia:** 03.III: 16 ej. en el Rac de l'Olla (MCH,JID); 08.III: 19 ej. en el Rac de l'Olla (MNY); 26.VI: 1 ad. con plumaje nupcial en el Rac de l'Olla. Primera observacin postnupcial (MCH,JID,GGA); 28.VI: 5 ej. (YAM); 07.VII: 3 ad. en plumaje nupcial en el Rac de l'Olla (BDJ); 10.XII: 7 ej. en l'estany del Pujol (EPS); 05.XII: 2 ej. en el tancat de Milia (AAC); 18.XII: 3 ej. en el tancat de la Pipa (AAR); 21.XII: 3 ej. en el tancat de Milia (AAC).

**Salinas de Santa Pola:** 08.I: 2 ej. (PCC,JEG); 28.I: 1 ej. (EDBA); 14.II: 13 ej. (AJR,SAR); 18.III: 3 ej.; 30.IV: 1 ej. (AJR); 20.IX: 1 ej.; 30.XI: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 08.I: 2 ej. (OAP); 27.VII: 12 ej. (AJR,SAR); 17.VIII: 26 ej.; 20.VIII: 70 ej. (SAR); 26.VIII: 50 ej. (SMO); 03.IX: 42 ej.; 04.X: 24 ej. (SAR); 20.X: 33 ej. (AJR,SAR); 20.XII: 1 ej. (JMT).

## *Tringa nebularia*

## **Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de inters.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Quadro de Santiago:** 16.IV: 1 ej. ltima cita primaveral (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 02.VIII: 2 ej. (AAC).

**Marjal dels Moros:** 26.II: 3 ej. (SRC,PGR); 05.XI: 1 ej. (RMB).

**Albufera de Valncia:** 18.I: 83 ej. en l'estany del Pujol. Mximo anual (JID,IRU); 01.III: 26 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,MGR,LMR); 20.IV: bando destacado de 21 ej. en el Rac de l'Olla (JID,MCH); 15.V: 1 ej. en marjales de Sueca. ltima cita prenupcial (BDJ); 10.VI: 1 ej. en marjales de Cullera. Cita estival (BDJ,VLG); 19.VI: 3 ej. en el Rac de l'Olla. Cita estival (BDJ); 09.IX: 16 ej. l'estany del Pujol (RNU); 18.IX: 12 ej. en el tancat de Milia (PMP); 15.XII: 55 ej. en l'estany del Pujol (VBJ); 26.XII: 76 ej. en l'estany del Pujol (JLE).

**Requena:** 10.IV: 4 ej. (JAI); 22.X: 1 ej. (RMB).

**Elx:** 26.VII: 2 ej. (AJR); 11.VIII: 1 ej. (SAR); 16.IX: 2 ej. (SAR); 08.XII: 2 ej. Cita invernal (DDD).

**Salinas de Santa Pola:** 30.I: 9 ej. Cita invernal; 12.IV: 14 ej.; 29.VIII: 5 ej.; 10.XI: 8 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 21.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (OAP); 02.IX: 27 ej. (BOR,AJR); 13.IX: 4 ej. (AJR,PCC); 27.IX: 18 ej. (PSH); 01.X: 17 ej. (AJR,SAR).

**San Miguel de Salinas:** 25.I: 1 ej. Cita invernal (NGA).

**EDAR de Santa Pola:** 04.X: 3 ej. (SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 25.III: 1 ej. Primera cita anual; 08.X: 1 ej. ltima cita anual (MTB,JAF).

**Albufera de Valncia:** 30.I: 41 ej. en l'estany del Pujol (YAM); 27.II: 60 ej. (EFCA); 04.III: 10 ej. en el vedat de Silla (AAC); 18.VI: 1 ej. en l'estany del Pujol (YAM); 19.VII: 9 ej. en Milia (HGA); 17.IX: 9 ej. (aparentemente todos juv.) en un arrozal baldo del Borronar (BDJ); citas postnupciales destacadas en l'estany del Pujol de 35 ej. el 05.X (JLE); 45 ej. el 08.XI (GGO) y 54 ej. el 10.XII (EPS).

**El Fondet de la Senieta:** 27.I: 1 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 04.III: 8 ej.; 27.V: 1 ej.; 03.VI: 1 ej.; 05.X: 7 ej.; 02.XII: 4 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 4 ej. (EAAN); 16.III: 1 ej. (JMT,AAR); 27.VII: 1 ej. (AJR,SAR); 21.VIII: 9 ej. (SAR); 16.X: 9 ej. (SAR); 23.XII: 1 ej. (ERPI).

## GLAREOLIDAE

**Glareola pratincola****Canastera común - Carregada - Collared Pratincole**

Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

Conservación: VUL.

**2016**

**Peñíscola:** 09.V: 6 ej. jornada RAM (APN).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 27.III: 1 ej. volando al N (JBC).

**Marjal dels Moros:** 28.III: 10 ej. (MGT).

**Albufera de València:** 26.III: 4 ej. en Milia (PMP); 26.IV: 65 ej. en las praderas del campo de golf (BDJ); 09.VII: 165 ej. en marjales de Sollana. Sólo 3 juv. (PMP); 21.VIII: 156 ej. en barbechos y zonas desprovistas de vegetación de la Maquial (BDJ); 02.IX: 211 ej. en Milia. Máximo anual (BDJ); 08.IX: 100 ej. (RNU); 16.X: 1 ej. en Milia. Última cita postnupcial (PMP).

**Embalse de Bellús:** 18.VI: 1 ej. (BOR).

**Marjal de Pego-Oliva:** 30.III: 3 ej. (EJMO).

**Elx:** 03.IV: 20 ej. (SCR); 12.IV: 50 ej. (JMT); 29.VII: 150 ej. (AJR); 12.VIII: 84 ej. (JMT,PCC,JEG).

**San Isidro:** 16.IV: 8 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 23.III: 2 ej. Primera cita prenupcial; 04.IV: 150 ej. (AJR).

**2017**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 21.III: 1 ej. (JLB).

**Marjal dels Moros:** 19.III: 1 ej. (GGO); 04.V: 50 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 21.III: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC); 09.VIII: 326 ej. en Milia. Máximo postnupcial (BDJ).

**El Pinet:** 22.III: 25 ej. (SAR); 07.IV: 47 ej. (JBN); 11.VII: 84 ej. (AJR,SAR); 28.IX: 3 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 13.IX: 7 ej. (PCC).

**El Fondo d'Elx:** 19.III: 8 ej. Primera cita prenupcial (EJFO); 08.IV: 200 ej. (OAP,RLM).

Localidad	2016	2017
	Parejas nidificantes	Parejas nidificantes
Prat de Cabanes-Torreblanca	15	20
Marjal de Almenara-Sagunto	40	10
Marjal dels Moros	78	1
Albufera de València	45	70
Marjal de Xeresa-Xeraco	10	5
Marjal de Pego-Oliva	14	9
Salinas de Santa Pola	66	30
EDAR Santa Pola	0	1

*Censos de canastera en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificó. Se ha detectado en un total de 7 de 30 humedales para un total de 268 par. en 2016 y en 10 de 31 humedales con un total de 256 par. en 2015. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.*

## LARIDAE

**Rissa tridactyla****Gaviota tridáctila - Gaviota de tres dits - Black-legged Kittiwake**

Estatus: Invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

Sin citas de interés

**Chroicocephalus genei****Gaviota picofina - Gaviota capblanca - Slender-billed Gull**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Albufera de València:** 14 par. nidificantes (CMA); 21.III: 4 ad. con pautas de cortejo en el Racó de l'Olla. Primera cita prenupcial en l'Albufera (JID,MCH,IRU); 12.VI: 8 ej. en marjales de Alfafar (BDJ); 26.VII: 1 ad. y 2 juv. en l'estany del Pujol (JID,MCH,GGA); 27.VII: 1 ad. y 2 juv. en el tancat de Milia (BDJ).

**El Pinet:** 20.V: 281 par. (AJR,SAR); 16.VI: 198 pollos anillados en la colonia (CMA); 14.XII: 1 ej. Cita invernal (YAM).

**Salinas de Santa Pola:** 432 par. nidificantes (CMA); 30.I: 70 ej. Cita invernal; 23.II: 134 ej. (AJR); 07.VII: 137 pollos (SAR); 27.VIII: 700 ej. (AJR); 01.X: 764 ej. Máximo anual (AJR); 14.XII: 450 ej. Cita invernal (YAM).

**El Fondo d'Elx:** 14.IX: 590 ej. (SAR).

**Desemb. río Segura:** 22.VI: 7 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevejea:** 199 par. nidificantes (CMA); 03.II: 554 ej. (AJR,SAR); 21.III: 630 ej.

**Puerto de Santa Pola:** 30.XII: 170 ej. (AJR).

## 2017

**Marjal dels Moros:** 1 par. nidificante (CMA).

**Albufera de València:** 26 par. nidificantes (CMA); 12.III: 1 ad. en arrozales fangueados del tancat del Sarrer junto con gaviota reidora. Primer registro anual (BDJ); 17.IV: 4 ad. en el tancat de la Pipa (AAC); 08.V: 5 ej. en Milia (YAM); 24.V: 5 ad. alimentándose en arrozales del tancat del Recatí (JID,MCH); 18.VI: 17 ej. en l'estany del Pujol (YAM); 05.VII: 11 ej. en l'estany del Pujol (HGA).

**El Pinet:** 25.II: 109 ej. (JBN,NLM); 09.V: 692 par. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 684 par. nidificantes; 16.II: 3 ej. (AJR); 02.II: 114 ej. (AJR); 12.XII: 216 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 17.VIII: 575 ej.; 16.X: 895 ej. (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevejea:** 272 par. nidificantes (CMA); 03.IV: 450 ej.; 31.VII: 1.500 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 05.II: 1 ej. (AJR).

Primer registro conocido de nidificación de gaviota picofina en la marjal dels Moros, coincidiendo con un año de máximos históricos de la población en la CV, alcanzando las 983 parejas, concentradas en su mayoría en los humedales del S de Alicante.

## *Chroicocephalus ridibundus*

## Gaviota reidora - Gavina vulgar - Black-headed Gull

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Burriana:** 24.II: 600 ej. (JBC,JLB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 14.I: aproximadamente 4.000 ej en toda la marjal (MTB); 24.VII: 150 ej. (JBC).

**Requena:** 13.III: 1 ej.; 08.V: 5 ej. (JAI).

**Cabo Huertas:** 07.II: 300 ej. (JMT,AVDH).

**Desemb. río Segura:** 11.I: 1.100 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevejea:** 12.VIII: 1.300 ej. (SAR),

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 13.V: 17 ej. en las lagunas de Torreblanca. Cita estival (MTB,JAF).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 1.700 ej. (JBC,JLB).

**Albufera de València:** 14.VI: 1 ej. Primer joven en vuelo en el Racó de l'Olla (JID,MCH).

**Desemb. río Segura:** 15.I: 1.300 ej.; 07.XII: 2.000 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevejea:** 10.II: 3.000 ej. (AJR,SAR).

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Marjal de Peñíscola	0	509	0	476
Marjal de Almenara	0	2.500	0	1.033
Marjal dels Moros	100	0	65	0
Albufera de Valencia	936	26.188	461	27.827
Salinas de Santa Pola	159	318	151	250
El Fondo	190	952	0	557
Desemb. río Segura	0	374	0	1.150
Salinas de la Mata-Torrevejea	250	834	230	292

*Censos de gaviota reidora en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron o en las que invernaron al menos 400 ej. Como nidificante se han detectado 1.635 par. en 2016 y 915 par. en 2015. Como invernante se ha detectado en un total de 21 de 44 humedales censados con un total de 32.350 ej. en 2016 y en 22 de 45 humedales con un total de 32.161 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.*

***Hydrocoloeus minutus*****Gaviota enana - Gavina menuda - Little Gull**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Albufera de València:** 22.IX: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. en el tancat de Milia (BDJ); 09.XII: 1 ad. manchado de hidrocarburos en la marjal de Sueca. Cita invernal (FLL); 09.XII: 1 ej. ad. en la marjal de Cullera. Presente hasta el 23.XII. Cita invernal (PMP).

**El Fondo d'Elx:** 03.IV: 1 ej. (EGM), presente hasta el 07.IV (JMT).

**2017**

**Alcossebre:** 19.II: 1 ej. (JMI).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 31.III: 1 ej. (YAM,GGO).

**Castellón de la Plana:** 03.II: 1 juv. en el puerto (CGE).

**Marjal dels Moros:** 11.IV: 1 ej. (CMO).

**Albufera de València:** 02.III: 1 ad. en el litoral de la Malladeta con una lesión en la pata izda. (IMO,JCRE), observado en varias ocasiones hasta el 13.IV (YAM); 15.III: 1 ad. sobrevolando el Racó de l'Olla, alimentándose de invertebrados que captura en el aire sobre las lagunas de la reserva (MCH,JID); 17.IV: 1 ej. de 2<sup>o</sup> año en el tancat de la Pipa (AAC); 25.IV: 1 ad. y 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. (JID,MCH).

**El Fondo d'Elx:** 22.III: 1 ej. (PLP), quizás el mismo ej., observado en distintas ocasiones hasta el 05.V (MNG,JBN).

***Larus audouinii*****Gaviota de Audouin - Gavina corsa - Audouin's Gull**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante común, invernante escaso. Criterio: Máximos en invernada, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Peñíscola:** 09.II: 20 ej. Cita invernal (ELL,DFF); 05.VI: 127 ej. jornada RAM (ELL,FRJ).

**Grau de Castelló:** 3.585 par. nidificantes en la colonia del puerto comercial (CMA); 20.I: 103 ej. Cita invernal; 11.IV: primer huevo localizado este año en colonia de cría (PGR).

**Burriana:** 22.I: 32 ej. Cita invernal; 09.III: 474 ej. (JBC).

**Puerto de Valencia:** 320 par. nidificantes (CMA).

**Albufera de València:** 18.I: 23 ej. Cita invernal (BDJ); 16.II: 128 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 20.III: 340 ad. en l'estany de la Plana y en marjales de Catarroja (AAC); 03.VII: 1 juv. Primer registro de un ave nacida la presente temporada (BDJ); 22.VII: 143 ej. en la playa de la Malladeta (YAM).

**Cabo Huertas:** 09.I: 57 ej. Cita invernal (CAM).

**Salinas de Santa Pola:** 22.I: 108 ej. Cita invernal; 27.II: 136 ej.; 10.XI: 144 ej. cifra últimamente inusual; 01.XII: 160 ej. Cita invernal (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 1.934 par. nidificantes (CMA).

**Puerto de Santa Pola:** 19.XII: 42 ej. Cita invernal (OAP).

**2017**

**Puerto de Castellón:** 3.581 par. nidificantes (CMA).

**Puerto de Valencia:** 320 par. nidificantes (CMA).

**Albufera de València:** 19.II: 520 ej. en arrozales todavía inundados de Sueca (BDJ); 11.III: mínimo de 1.000 ej. en marjales de Catarroja (DGA).

**Marjal de Pego-Oliva:** 09.III: 120 ej. (PLP).

**Cabo Huertas:** 08.I: 30 ej. (AJR); 31.I: 23 ej. (JMT,MAA).

**Salinas de Santa Pola:** 04.II: 138 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 1.934 par. nidificantes (CMA).

**Larus melanocephalus****Gaviota cabecinegra - Gavina capnegra - Mediterranean Gull**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Peñíscola:** 09.II: 1.400 ej. a la entrada de los pesqueros a puerto (GGO); 17.II: 2.000 ej. Máximo anual (ELL); 05.III: 926 ej. en jornada RAM (APN); 05.XI: 1.111 ej. en jornada RAM (JLA,ELL,BGC); 05.XII: 391 ej. (ELL,BGC).

**Burriana:** 22.I: 350 ej.; 26.II: 810 ej. dentro del puerto; 15.III: 268 ej. (JBC).

**Albufera de València:** 259 par. nidificantes (CMA); 07.I: 2 ad. y 2 ej. de 1<sup>er</sup> inv. Una de las aves de 1<sup>er</sup> inv. porta anilla húngara; 16.V: 30 ej. en marjales de Sueca (AAC); 19.XII: 58 ej. (RMB).

**Puerto de Gandía:** 18.II: 180 ej. (PLP).

**La Vila Joiosa:** 29.I: 28 ej. (AJR).

**El Pinet:** 26.VII: 650 ej.; 29.VIII: 1.600 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 12.II: 50 ej.; 17.IX: 1353 ej. (AJR); 17.X: 460 ej. (SAR); 28.X: 125 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 67 par. nidificantes (CMA); 14.III: 600 ej. (JMT,OAP); 12.IV: 1.500 ej. (AJR); 19.V: 200 ej. (SAR); 03.VIII: 1.300 ej. en campos de cultivo (OAP); 18.X: 1.000 ej. (SAR).

**Cox:** 16.IV: 600 ej. (SAR).

**Desemb. río Segura:** 21.X: 227 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 200 par. nidificantes (CMA); 12.II: 20 ej.; 28.IV: 200 par. (SAR).

**2017**

**Peñíscola:** 14.I: 410 ej. jornada RAM (ELL,BGC); 02.XII: 286 ej. jornada RAM (DFE,JLA).

**Prat de Cabanes-Torrelblanca:** 06.V: 2 inm. Última cita primaveral (MTB,JAF).

**Benicàssim:** 01.VIII: 1 juv. Primera cita postnupcial (MTB).

**La Llosa:** 06.XI: 160 ej. (AAC).

**Albufera de València:** 13 par. nidificantes (CMA).

**El Pinet:** 24.VIII: 3.605 ej. (AJR); 31.VIII: 2.400 ej. (AJR,SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 02.I: 13 ej. (AJR); 17.VIII: 2154 ej. (SAR); 19.XII: 8 ej. (AJR,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 29.VII: 1.513 ej. (SAR).

**Guardamar del Segura:** 19.IX: 750 ej. (SAR).

**Larus pipixcan****Gaviota pipizcan - Gavina de Franklin - Franklin's Gull**

Estatus: Divagante del N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 8/3 (ene, mar-abr).

**2016**

**El campello:** 10.I: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. (AJR). Cita homologada por el CR-SEO.

Primera cita invernal para la CV y Primera cita para Alicante.

**Larus canus****Gaviota cana - Gavina cendrosa - Mew Gull**

Estatus: Invernante raro, migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

**Peñíscola:** 21.I: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. Presente hasta el 11.II (ELL).

**Grau de Castelló:** 20.I: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. Presente hasta el 05.III (PGR).

**Burriana:** 08.III: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. Presente hasta el 15.III (JBC).

**Albufera de València:** 29.IV: 1 ej. 1<sup>er</sup> ver. en el Racó de l'Olla con una lesión en una pata (MCH,JID,GGA).

**Salinas de Santa Pola:** 21.X: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. Presente hasta el 28.X (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 06.X: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. (AJR,SAR).

**2017**

**La Llosa:** 08.II: 1 ad. integrado en bandada de gaviotas reidoras que descansan cerca de la costa (GGO).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 20.XII: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv.; 20.XII: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. (AAC).

**Albufera de València:** 10.II: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. en compañía de gaviotas reidoras en zonas recién fangueadas cerca del Palmar (PRU); 12.III: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. en arrozales fangueados del tancat del Sarier (BDJ), observado de nuevo el 13.III (AAC).

**Salinas de Santa Pola:** 17.II: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv.; 24.VIII: 1 ej. (AJR).

**Desemb. río Segura:** 22.I: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. (SAR); 03.II: 1 ej. (AJR).

**Torre vieja:** 13.IV: 1 ej. (EATX).

**Larus delawarensis****Gaviota de Delaware - Gavina de Delaware - Ring-billed Gull**

Estatus: Divagante de Norteamérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 106/7 (ene-ago, oct-dic).

**2016**

**Burriana:** 28.XI: 1 ad. Primera cita invernal del ej. invernante desde 2005; 19.I: 1 ad. presente todo el mes de enero hasta el 29.III (JBC).

**Canet d'en Berenguer:** 17.XII: 1 ej. ad. posado en la playa con otras gaviotas. Posiblemente se trate del ej. del port de Borriana (GGO).

**2017**

**Burriana:** 06.II: 1 ej. Primera cita invernal del ej. invernante desde 2005 (JBC), presente hasta el 26.II (CFA); 28.XI: 1 ad. Primera cita invernal del ej. invernante desde 2005 (JBC).

**La Llosa:** 06.I: 1 ad. (GGO,YAM). Quizás el mismo ej. de Burriana.

**Salinas de Santa Pola:** 15.XII: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv., observado de nuevo el 18.XII (AJR).

**Larus argentatus****Gaviota argétea europea - Gavinet argentat de potes rosa - Herring Gull**

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 48/34 (nov-abr).

**2016**

**Albufera de València:** 09.I: 1 ad. en la marjal de Alfafar (BDJ), presente hasta el 20.I (AAC); 08.II: 1 ej. 2<sup>o</sup> inv. en marjales de Sueca (BDJ).

**Cullera:** 27.I: 1 ej. ad. en la marjal de Cullera. Probablemente el mismo ej. observado en la marjal de Alfafar (BDJ).

**Salinas de Santa Pola:** 12.II: 1 ad. (AJR).

**2017**

**Albufera de València:** 10.II: 1 ej. de 2<sup>o</sup> inv. en arrozales inundados en la Malva (BDJ); 10.III: 1 ej. de 2<sup>o</sup> inv. en arrozales fangueados del tancat dels Peixcadors. Atendiendo al estado de muda, parece corresponderse con un ej. diferente al observado días antes en Silla (BDJ). Observado también el día 15.III (AAC,BDJ); 13.III: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. y 1 ej. de 2<sup>o</sup> inv. en campos fangueados del tancat de la Naia (YAM,AAC); 04.XI: 1 ej. de 3<sup>er</sup> inv. en zonas inundadas dels Bassals, junto con gaviotas sombrías y patiamarillas. Primer registro otoñal temprano (GCH,BDJ).

**Salinas de Santa Pola:** 03.II: 1 ad. observado también el 10.II: 1 ej.; 28.XII: 1 ad. (AJR).

**Larus cachinnans****Gaviota del Caspio - Caspian Gull**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 38/27 (ene-abr, oct-nov).

**2016**

**Peñíscola:** 9.II: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. posado en la playa con otros cientos de gaviotas (GGO).

**Albufera de València:** 31.I: 1 ej. 2<sup>o</sup> inv. en marjales de Sueca (AAC); 03.II: 1 ej. 3<sup>er</sup> inv. en marjales de Sueca (JLE); 24.III: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. en marjales de Sueca; 04.IV: 1 ej. de 1<sup>er</sup> ver. en el tancat de la Ratlla (AAC).

**2017**

**La Llosa:** 06.XI: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. junto a gaviotas patiamarillas y sombrías (AAC).

**Albufera de València:** 22.II: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. entre gaviotas sombrías en campos recién fangueados cerca de la casa del Trompón (AAC); observado de nuevo el 25.II (JMT,AAE); 10.III: 1 ej. de 2<sup>o</sup> inv. en arrozales fangueados del tancat dels Peixcadors (BDJ), observado de nuevo el 12.III (GCH) y el 13.III, en este caso junto a un ej. de 1<sup>er</sup> inv. anillado en la República Checa (YAM,AAC); 15.III: 3 ej. (2 ej. de 1<sup>er</sup> inv. y 1 ej. de 2<sup>o</sup> inv.) en campos fangueados del tancat dels Germanells (AAC,BDJ).

Recogemos la primera cita para el mes de noviembre, junto a otra en el Grao de Castellón de un ejemplar anillado en Polonia que son las únicas postnupciales, el resto se pueden considerar todas prenupciales: 2 a finales de enero, 13 en febrero, 14 en marzo y 4 en abril.

**Larus michahellis****Gaviota patiamarilla - Gavinet argentat mediterrani - Yellow-legged Gull**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Peñíscola:** 05.III: 456 ej. jornada RAM (APN).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.XI: 550 ej. Máximo anual (MTB).

**Embalse del Sitjar:** 09.I: 350 ej. (MBM); 17.I: 677 ej. (PGR,JMI).

**Requena:** 03.IV: 2 ej. sobrevolando los campos de cultivo a media altura. Muy rara en la comarca (JAI).

**Albufera de València:** 07.I: 1 ej. 2<sup>o</sup> inv. con rasgos propios de la ssp. *lusitanicus*. A pesar de la prudencia que requiere la identificación de estos taxones no portadores de anilla, el pequeño tamaño, la estructura y el diseño del plumaje, parecen coincidir plenamente con lo que muestra la ssp. atlántica (AAC).

**Xàbia:** 09.I: 940 ej. (CAM).

**Alacant:** 18.I: 550 ej. (MAA); 21.I: 400 ej. (MAA); 16.III: 300 ej. (JMT,OAP).

**2017**

**Requena:** 15.IV: 1 subad. en la balsa el Pontón, quizás la segunda cita conocida para la comarca (JAI).

Localidad	2016		2017	
	Par. nid.	Ej. inv.	Par. nid.	Ej. inv.
Puerto de Castellón	134	-	139	-
Embalse de Sitjar	0	677	0	577
Puerto de Valencia	69	-	68	-
Albufera de Valencia	1	25	68	41
Salinas de Santa Pola	61	432	37	2.052
El Fondo	0	9	0	4
Salinas de la Mata-Torrevieja	65	127	32	314
Embalse de la Pedrera	0	255	0	111

*Censos de gaviota patiamarilla en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 10 parejas o invernaron 200 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 6 de 30 localidades con un total de 334 par. en 2016 y en 7 de 31 localidades con un total de 288 par. en 2017. Como invernante se ha detectado en un total de 17 de 44 humedales censados para un total de 1.811 ej. en 2016 y en 21 de 45 humedales con un total de 3.383 ej. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. - Censo no realizado.*

**Larus fuscus****Gaviota sombría - Gavinet fosc - Black-backed Gull**

Estatus: Invernante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Peñíscola:** 09.I: 78 ej. (ELL,DFE,FRJ); 05.III: 144 ej. (APN); 05.V: 1 ad. Cita tardía (ELL); 05.VI: 1 ej. Cita estival (ELL,FRJ).

**Burriana:** 15.III: 73 ej. (JBC).

**Albufera de València:** 09.I: 1.870 ej. en marjales de Alfafar. Máximo anual (BDJ); 15.IV: 30 ej. posadas en

estacas del lago (AAC,EGO); 26.V: 2 ad. y 18 inm. en marjales de Sollana. Cita tardía (AAC); 24.IX: 740 ej. en marjales de Sollana (BDJ).

**Salinas de Santa Pola:** 22.I: 90 ej.; 12.II: 188 ej. (AJR).

**Embalse de La Pedrera:** 17.I: 95 ej. (PPP).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 07.I: 880 ej.; 12.II: 650 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 22.II: 190 ej. (SAR).

## 2017

**Peñíscola:** 06.V: 1 ad. jornada RAM (APN).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.IV: 1 inm. Última cita primaveral (MTB, JAF).

**Albufera de València:** 13.II: 4.000 ej. (YAM, GGO); 01.V: 1 ad. en el tancat de Milia (BDJ); 23.V: 3 inm. en arrozales inundados del Malvinar (BDJ).

**Salinas de Santa Pola:** 17.II: 250 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 10.II: 1682 ej. (SAR, AJR, SGA); 22.XI: 863 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 18.II: 330 ej. (SAR).

## ***Gelochelidon nilotica***

## **Pagaza piconegra - Curroc - Gull-billed Tern**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Albufera de València:** 469 par. nidificantes (CMA); 07.III: 1 inm. en el tancat de la Naia (AAC); 26.III: grupo de 6 ej. en un arrozal apenas encharcado de la Torreña Ampla. Primer registro prenupcial tras las observaciones invernales registradas los últimos meses (aparentemente de un mismo ej.) (ASI); 04.IX: 9 ej. salen volando del tancat de Milia. Última cita postnupcial (BDJ).

**Embalse de Bellús:** 10.VIII: 7 ej. (BOR).

**El Pinet:** 28.VII: 15 ej. (AJR, ERO); 29.VII: 26 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 1 par. nidificante (CMA); 10.VIII: 40 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 84 par. nidificantes (CMA).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.XI: 1 ej. Cita tardía (MTB, JAF).

**Requena:** 04.VI: 2 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 920 par. nidificantes (CMA); 13.VII: 30 ej. (JOB); 14.IX: 3 ej. en un arrozal baldío del Borronar. Última cita postnupcial (PVG).

**Marjal de Xeresa - Xeraco:** 21.VII: 20 ej. en paso hacia el S (PLP).

**El Pinet:** 10.VIII: 13 ej. (AJR).

**El Saladar de Agua Amarga:** 27.IV: 17 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 21.VII: 65 ej. (AJR); 28.VII: 85 ej. (SAR).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 96 par. nidificantes (CMA).

## ***Hydroprogne caspia***

## **Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.IX: 1 ej. Única cita anual (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 04.X: 2 ej. (RPB).

**Massamagrell:** 06.VI: 1 ej. 1 ej. volando por la playa (MAG).

**Albufera de València:** 11.II: 1 ej. sesteando entre gaviotas en el Malvinar. Primera cita anual (AAC); 21.II: 1 ej. sobrevolando la gola del Pujol (YAM); 08.III: 1 ad. en arrozales fangueados del tancat de Naia (BDJ); 11.III: 1 ej. sesteando entre gaviotas en el tancat de la Naia (AAC), observado de nuevo el 18.III

(BDJ); 21.IV: 4 ej. en el Racó de l'Olla, el inmaduro de fechas previas y 3 (o tal vez 4) ad. (JID,MCH,GGA); 19.VIII: 1 ad. y 1 juv. en el tancat de la Pipa (PVG); 04.IX: 12 ej. (al menos 3 juv.) en el tancat de Milia (BDJ); 14.IX: 7 ej. (al menos 1 juv.) en Milia (PMP,JFF); 23.IX: 4 ej. sobrevolando l'estany del Pujol (AAD).

**Salinas de Santa Pola:** 08.II: 3 ej. (AJR,SAR); 30.IV: 2 ej. (AJR).

**Desemb. río Segura:** 17.I: 1 ej. (AJR); 07.IV: 1 ej. (SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.IV: 4 ej. (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 16.VIII: 6 ej. (al menos 2 juv.) sobrevolando el tancat de Milia (BDJ); 20.IX: 7 ej. sobrevolando el Racó de l'Olla. Un juv. del grupo reclamaba constantemente a un ad. (JID,MCH,GGA); 25.IX: 8 ej. en el tancat de Milia (PLP,EPS); 07.X: 3 ej. (JOB).

**El Pinet:** 21.IX: 2 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 01.II: 2 ej. uno de ellos anillado como pollo en Suecia en 2015 (AJR).

**Desemb. río Segura:** 14.I: 1 ej. (CAM).

## *Thalasseus bengalensis*

## Charrán bengalí - Xatrac bengalí - Lesser Crested Tern

Estatus: Migrante raro, nidificante ocasional. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 30/30 (ene, abr, jun-nov).

## 2017

**Benicarló:** 11.IX: 1 ej. en las rocas de enfrente del parador nacional junto a charranes patinegros (JLA).

**Albufera de València:** 19.IV: 1 ad. sesteando junto con otros charranes en la el Racó de l'Olla (JID,BLO,JVM). Aunque se conocen siete casos de reproducción en esta reserva entre 1994 y 1998, todos referidos a la formación de parejas híbridas con charrán patinegro, su presencia en l'Albufera es más rara de lo que cabría esperar y no se obtenían citas desde 2011 (BDJ); 02.X: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. en la desembocadura del Pujol (HGA), observado de nuevo el 04.X (GGO).

Primeras citas de charrán bengalí para los meses de abril y septiembre. La cita de Benicarló es tan solo la segunda para la provincia de Castellón, la anterior, es también de la misma zona en julio de 2012.

## *Thalasseus sandvicensis*

## Charrán patinegro - Xatrac bec-llarg - Sandwich Tern

Estatus: Nidificante moderado muy localizado, migrante abundante, invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Peñíscola:** 09.V: 105 ej. jornada RAM (APN); 03.IX: 243 ej. jornada RAM (ELL,PML,EJL).

**Burriana:** 15.III: 74 ej. Máximo anual (JBC).

**Marjal dels Moros:** 65 par. nidificantes (CMA); 25.IV: 53 ej. cópulas (RMB).

**Puerto de Valencia:** 176 par. nidificantes (CMA).

**Albufera de València:** 857 par. nidificantes (CMA).

**El Pinet:** 20.IV: 801 ej. (SAR); 06.V: 150 ej.; 31.V: 5 pull. Primeros pollos; 10.VIII: 110 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 17.IX: 150 ej. (AJR).

## 2017

**Peñíscola:** 01.IV: 345 ej. jornada RAM (ELL,JLA,PML); 01.VII: 78 ej. jornada RAM (ELL,JLA,PML).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 08.IV: 194 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Burriana:** 07.X: 43 ej. control aves marinas (RAM) durante 3 h. (MIA,JLB,JBC).

**Marjal dels Moros:** 100 par. nidificantes (CMA).

**Puerto de Valencia:** 1.161 par. nidificantes (CMA).

**Albufera de València:** 23 par. nidificantes (CMA); 11.VII: 111 ej. (GGO).

**El Pinet:** 22.IV: 104 ej. (SAR); 11.VII: 194 ej. (AJR,SAR); 09.VIII: 252 ej. (SAR); 10.VIII: 211 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 20.VII: 262 ej.; 14.VIII: 242 ej. (SAR).

Aparición de dos nuevas colonias en la marjal dels Moros y el puerto de Valencia, que parece que acoge gran parte de las parejas que nidificaban en l'Albufera.

### ***Thalasseus elegans***

### **Charrán elegante - Xatrac elegant - Elegant Tern**

Divagante del océano Pacífico americano. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: pendiente de revisión.

#### **2016**

**Marjal dels Moros:** 02.V: 2 ej. criando en la colonia de charranes patinegros (JOB); 31.V: al menos 1 pull en el nido de la pareja nidificante (GGO).

**Albufera de València:** 21.IV: 2 ej. atendiendo un nido con un huevo en el Racó de l'Olla. Al día siguiente, el nido aparecía desierto y la puesta seguramente depredada por una gaviota. El fracaso de este intento reproductor parece asociado a una acusada escasez de peces clupeidos en el mar frente a las playas de l'Albufera (JID,MCH,IRU); 27.VI: 1 ej. sesteando y realizando pautas de cortejo junto a otros charranes. Seguramente el mismo de fechas previas (GGA, JID,JVM); 21.VII: 2 ad. y 1 juv. en el Racó de l'Olla. Estos 3 charranes se corresponden con el ad. observado desde final de junio en la reserva y con uno de los ad. reproductores que instaló una puesta fallida en abril y su joven, nacido finalmente tras una puesta de reposición en otra localidad cercana a l'Albufera (JID,MCH,IRU); observados de nuevo el 22.VII (JID,MCH).

**El Pinet:** 18.IV: 1 par. (AJR,SAR).

#### **2017**

**Marjal dels Moros:** 15.VIII: 1 ej. (BGA), observado de nuevo el 20.VIII (AAC).

**Albufera de València:** 08.V: 1 m. de cortejo junto con otros charranes en el Racó de l'Olla. Se trata de un m. distinto del observado en fechas previas en el puerto de Valencia y sería el mismo observado en la misma reserva en 2016 por primera vez (JID,MCH); 12.V: 3 ad. con actividad reproductora en el interior del puerto de Valencia. Se trata de una par. y una segunda h. que pudo ser vista copulando con charrán patinegro (JID,MCH); 28.VI: 1 ej. (YAM); 05.VII: 1 h. en el Racó de l'Olla con muda postnupcial iniciada, participando de los cortejos junto con otros charranes. Se trata del quinto ej. ad. de esta temporada, distinto de los observados en fechas previas y seguramente no visto en años previos en esta localidad (JID,MCH); 14.VII: 2 ej. (BGA); 14.VII: 1 ej. Todavía permanece en el interior del puerto de Valencia el juv. nacido durante la presente temporada. Se trata de la última fecha de presencia del juv. que ha permanecido acompañado por los ad. progenitores (JID,MCH); 17.VII: 1 ej. (YAM); 23.VII: 2 ej. (EERA); 01.VIII: todavía presente el m. no reproductor en el Racó de l'Olla. Última observación de este ej. que ha frecuentado la reserva desde principios de mayo (JID,MCH); 02.VIII: 1 ej. todavía está presente la h. que ha frecuentado el Racó de l'Olla durante el mes de julio. Es la última cita anual de la especie en l'Albufera durante la presente temporada (JID,MCH).

**Alacant:** 24.VIII: 1 ej. en la costa de Agua Amarga (AJR).

### ***Sternula albifrons***

### **Charrancito común - Mongeta - Little Tern**

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

#### **2016**

**Marjal dels Moros:** 23.IV: grupo de unos 120 ej. preparándose para nidificar (JPE).

**Albufera de València:** 17.VII: 71 ej. en l'estany del Pujol. Máximo anual (YAM).

**El Pinet:** 04.IV: 2 ej. Primera observación prenupcial; 22.VI: 93 par. nidificando, al menos 70 en la 2ª gran isleta. Completo abandono de la nidificación en esta 2ª isleta el 22.VI (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 07.VII: 200 ej. (SAR).

Localidad	2016		2017	<i>Censos de charrancito común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 10 parejas. Como nidificante se han detectado 1.098 par. en 2016 y 1.284 par. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.</i>
	Par. nid.	Par. nid.		
Marjal dels Moros	110	100		
Puerto de Valencia	12	1.161		
Albufera de Valencia	56	23		
Salinas de Santa Pola	165	0		
El Fondo	8	0		
Salinas de la Mata-Torrevieja	45	0		

**Sterna dougallii****Charrán rosado - Xatrac rosat - Roseate Tern**

Estatus: Visitante raro del Atlántico. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 23/9 (abr-ago, nov).

**2016**

**El Pinet:** 16.IV: 1 ej. anillado en ambas patas. Metálica y una que parece algo más fina pero gris o blanca (JMT,PPP); 20.IV: 1 par. (SCR); 25.IV: 1 par. hacen cortejo y copulan; 29.IV: 1 par. hacen preparativos para el nido rascando y limpiando de piedrecillas (SAR,AJR); 31.V: la par. abandona la puesta por molestias (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 01.V: 2 ej. (JPG); 01.VI: 1 ej. (GGO); 16.IV: 1 ej. (NGA).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 26.V: 1 ej. incubando. Se tratará de los charranes rosados observados durante el mes de abril en las salinas del Pinet (SAR).

Primer intento de cría de charrán rosado en la Comunidad Valenciana.

**Sterna hirundo****Charrán común - Xatrac d'albufera - Common Tern**

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Marjal dels Moros:** 25.IV: estima de 400 ej. Primeras cópulas (RMB).

**2017**

**Marjal dels Moros:** 28.IV: 150 ej. Cópulas y ofrendas (RMB).

**El Pinet:** 20.IV: 100 ej. (AJR); 05.VI: 256 ej. con cópulas, cortejos e instalación de nidos, llegada muy tardía. El 29.V solo 9 ej. y 1 o 2 posibles nidos (SAR).

Localidad	2016	2017	<i>Censos de charrán común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que nidificó. Se han detectado 1.369 par. en 2016 y 1.302 par. en 2017. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.</i>
	Par. nid.	Par. nid.	
Puerto de Castellón	1	33	
Marjal dels Moros	300	107	
Puerto de Valencia	147	34	
Albufera de Valencia	403	528	
Salinas de Santa Pola	372	414	
Salinas de la Mata-Torrevieja	146	186	

**Sterna paradisaea****Charrán ártico - Xatrac àrtic - Arctic Tern**

Estatus: Divagante del Ártico y del N de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 10/8 (jun-ago, nov).

**2016**

**Albufera de València:** 13.VII: 1 ad. sesteando en el Racó de l'Olla junto con charranes comunes. Observado de nuevo el día 14.VII (MCH,JID,IRU); 15.VII: 1 ad. sesteando en el Racó de l'Olla. El estado de muda, menos avanzada, indica con seguridad que se trata de un ej. diferente (JID,MCH).

**2017**

**Albufera de València:** 27.VII: 1 ej. sesteando en el Racó de l'Olla al mediodía (JID,EPS,CFR), a las pocas horas aparece un segundo ej. sesteando junto al anterior (MCH,JID,GGA).

**Chlidonias hybrida****Fumarel cariblanco - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern**

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 16 par. nidificantes (CMA).

**Marjal dels Moros:** 25.IV: 36 ej. (RMB).

**Marjal de Rafalell i Vistabella:** 4 par. nidificantes (CMA).

**Albufera de València:** 16.V: 60 ej. en zonas inundadas de la finca de Marco; 01.VI: mínimo de 230 aves en varios grupos descansando y alimentándose en diferentes puntos de los vedats de Sueca. Se observan 2 juv.del año (AAC).

**Marjal de Pego-Oliva:** 11 par. nidificantes (CMA).  
**El Fondo d'Elx:** 102 par. nidificantes (CMA); 04.V: 600 ej. (SAR).  
**Salinas de Santa Pola:** 25 par. nidificantes (CMA).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.V: 17 ej. Máximo anual (MTB, JAF).  
**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 35 par. nidificantes (CMA).  
**Marjal dels Moros:** 36 par. nidificantes (CMA).  
**Marjal de Rafalell i Vistabella:** 4 par. nidificantes (CMA).  
**Albufera de València:** 27.IV: 167 ej. en la desembocadura del nuevo cauce del río Turia y la playa de Pinedo (BDJ); 21.V: mínimo de 95 ej. en arrozales recién inundados de Catarroja (BDJ); 06.VI: concentración destacada de 178 ej. en arrozales, la mayor parte de ellos sesteando (PVG).  
**Requena:** 19.IV: 2 ej.; 01.V: 1 ej. (JAI).  
**Marjal de Pego-Oliva:** 6 par. nidificantes (CMA).  
**Clot de Galvany:** 3 par. nidificantes (CMA); 02.VI: 20 ej. (AJR).  
**Salinas de Santa Pola:** 25.IV: 50 ej. (AJR).  
**El Fondo d'Elx:** 06.IV: 300 ej. (AJR).  
**EDAR de Santa Pola:** 07.VI: 64 ej. (SAR).

## ***Chlidonias leucopterus* Fumarel aliblanco - Fumarell d'ala blanca - White-winged Black Tern**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, máximos anuales y citas de interés.

## 2016

**Albufera de València:** 05.II: 1 ej. en el tancat de Milia. Posiblemente el mismo ej. observado a lo largo del pasado mes de noviembre (PMP), observado de nuevo el 06.II (PMP) y el 01.III sesteando junto a gaviotas en el tancat dels Pescadors (AAC); 28.IV: 1 ad. con plumaje nupcial en el Racó de l'Olla. Primera observación tras las citas invernales (MCH, JID, IRU); 04.V: 1 ad. junto con fumareles cariblanco en el tancat de la Pipa (PVG); 17.V: 1 ad. en plumaje nupcial asociado a fumareles cariblanco atravesando el lago (AAC, EGO); 30.V: 1 ej. de 1<sup>er</sup> año junto con fumareles cariblanco en arrozales de la Llonga. Se trataría del mismo ej. observado ya hace meses (YAM) observado de nuevo el 13.VII (JCAR); 23.VIII: 1 juv. y 1 inm. en el tancat de Milia. Primer registro de un ave nacida la presente temporada. Casi con total seguridad, el inm. se refiere al mismo ej. observado regularmente desde el pasado invierno (BDJ, JFF); 09.IX: siguen presentes 2 juv. en el tancat de Milia, observados de nuevo el 17.IX y el 18.IX (PMP).  
**Salinas de Santa Pola:** 10.V: 1 ej. (AJR).

## 2017

**Albufera de València:** 14.IV: 1 ej. en plumaje invernal (GGO, YAM); 13.VII: 1 ad. en Milia (JOB, EPS) y 2 ej. el 19.VII (HGA); 23.VII: sigue presente 1 ad. en Milia (PMP); 03.VIII: 1 ad. alimentándose en arrozales junto con fumareles cariblanco (BDJ); 7.VIII: 1 ad. quizás distinto al ya observado anteriormente (HGA); 15.VIII: 1 juv. y el ad. observado estos días (BDJ, YAM); 19.VIII: 1 nuevo juv. en Milia y 1 ad., con una lesión en la pata derecha, que podría hacer referencia a un tercer ad. (PMP); 4.IX: última cita de un ad. (VLG, BDJ); 11.IX: última cita anual de 1 juv. (BDJ).  
**El Pinet:** 10.VIII: 1 ej. (AJR).  
**El Fondo d'Elx:** citas invernales de 1 ej. los días 04.I (OAP, RLM, JGS); 12.I y 01.II (OAP); 25.IV: primera cita primaveral; 04.V: 1 ej. (AJR).  
**Salinas de Santa Pola:** 28.IV: 1 ej. (AJR).

Destacan dos nuevas citas invernales para la CV en l'Albufera y en el Fondo d'Elx. Por lo demás, presencia en ambos pasos aunque implicando a pocos ejemplares.

***Chlidonias niger*****Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Marjal dels Moros:** 02.V: 3 ej. (JOB).

**Albufera de València:** 20.IV: 6 ad. sesteando en el Racó de l'Olla (JID,MCH,IRU); 05.VII: 13 ad. sesteando en el Racó de l'Olla (JID,MCH,GGA); 17.VII: 74 ej. en el Racó de l'Olla (BDJ); 09.IX: 2 juv. en Milia (PMP); 07.X: 1 ej. en la Devesa, última cita anual (EPS).

**El Pinet:** 07.VII: 7 ej. (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.X: 1 ej. (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 25.VII: 10 ad. posados en estacas de Zacarés (YAM,JID,MCH); 06.VI: 3 ad. con plumaje nupcial alimentándose en la laguna (MCH,JID); 18.VIII: 5 ej. (4 juv.) en Milia. Primer registro de aves nacidas la presente temporada (BDJ).

**Requena:** 27.IV: 20 ej. al anochecer (PRP).

**El Pinet:** 05.VIII: 680 ej.; 09.VIII: 1969 ej.; 14.VIII: 1537 ej. (SAR).

**Salinas de Santa Pola:** 26.VII: 4 ej. (SAR,AJR).

**El Fondo d'Elx:** 05.V: 12 ej. (JBN).

**STERCORARIIDAE*****Stercorarius skua*****Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Albufera de València:** 09.I: 3 ej. frente a la desembocadura del Pujol (RMB).

**Cabo de Cullera:** 06.II: 4 ej. observados desde el cabo de Cullera (MAL,VBJ,LAA); 03.III: 1 ej. acosado por una gaviota sombría frente al cabo de Cullera (VPA).

**La Vila Joiosa:** 09.I: 3 ej. (CAM).

**Santa Pola:** 24.I: 2 ej. (JMT,OAP).

**Cabo Cervera:** 18.III: 1 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 1 ej. (MTB,JAF).

**Burriana:** 04.II: 9 ej. volando a ras de agua hacia el S (MIB,ILB,JBC).

**Albufera de València:** 08.I: 3 ej. (GGO); 14.I: 5 ej. en el litoral de la Devesa (RMB,LAM,ASZ).

**Cabo de Cullera:** 14.I: 3 ej. en vuelo hacia el N (MAL,VPA,JLO); 03.IV: 2 ej. (VPA).

**Desemb. río Segura:** 14.I: 2 ej. (CAM).

**Cabo Cervera:** 18.III: 5 ej. (AJR,SAR); 24.III: 3 ej. (AJR); 20.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR,SAR).

***Stercorarius pomarinus*****Págalo pomarino - Paràsit cuaample - Pomarine Skua**

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

**Albufera de València:** citas de 1 ad. los días 26.XI y 27.XI (GGO,YAM).

**Cabo de Cullera:** 22.XII: 1 inm. (CRE,MCS).

**2017**

**Cabo Cervera:** 24.III: 1 ej. de MC, con la cola completa, que persegue sin éxito a una gaviota patiamarilla y después a una gaviota de Audouin a la que picotea y pateo hasta que consigue que suelte un pez de buen tamaño (AJR).

***Stercorarius parasiticus*****Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua**

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados, citas de interés.

**2016**

**Benicarló:** 19.X: 1 ej. de MO (JLA).

**Peñíscola:** 09.V: 1 ej. (APN).

**València:** 20.IV: 1 ej. de MO (VPA).

**Cabo de Cullera:** 03.III: 3 ej. (VPA); 13.XII: 2 juv. de MO y 1 ej. de 3<sup>er</sup> inv. de MO (VPA).

**Santa Pola:** 24.I: 3 ej. (JMT,OAP).

**2017**

**Peñíscola:** 01.IV: 1 ej. (ELL,JLA,PML); 02.IX: 1 ej. (DFE,JLA,PML).

**Alcossebre:** 17.IV: 1 ej.; 04.V: 2 ej. (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 08.IV: 2 ej. (MTB,JAF).

**Cabo de Cullera:** 03.IV: 1 ad. MO y 1 juv. de MI; 13.IV: 1 ej. en paso; 12.V: 1 ej. de MO; 14.V: 2 inm. (VPA).

**ALCIDAE*****Alca torda*****Alca común - Cauet - Razorbill**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, máximos y citas de interés.

**2016**

**Peñíscola:** 06.II: 5 ej. (ELL,FRJ,JLA); 18.II: 1 ej. dentro del puerto (ELL); 03.III: 1 ej. en la zona playa S (ELL,DFE); 05.III: 1 ej. jornada RAM (APN).

**Castellón de la Plana:** 03.II: 7 ej. alimentándose cerca de la costa (MTB).

**Grau de Castelló:** 23.I: 5 ej. entre el puerto de Castellón y la piscifactoría (MIA,PGR,JCS); 08.III: 1 ej. (PGR,SR).

**Playa de Almassora:** 10.I: 3 ej. (MBM).

**Burriana:** 30.I: 11 ej. menjant prop de l'escollera (MBM); 06.II: 4 ej. dentro del puerto (JBC, JLB).

**Sagunt:** 31.I: 4 ej. posados en el agua muy próximos a la bocana del puerto marítimo de Sagunto (RPM).

**Meliana:** 09.I: 3 ej. (EEGA).

**Alboraya:** 07.I: 3 ej.; 11.I: 4 ej.; 02.II: 8 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 09.I: 12 ej. (RMB); 18.I: 11 ej. (JOB).

**Cabo de Cullera:** 18.I: 8 ej.; 01.II: 5 ej. en vuelo hacia el N (VPA); 06.II: 15 ej., mayoritariamente en vuelo hacia el S (MAL,VBJ,LAA); 22.II: 8 ej. en vuelo hacia el S a cierta distancia de la costa; 02.III: 6 ej. (4 subad.) descansando y 2 en vuelo hacia el S; 03.III: 6 ej. en migración activa hacia el S (VPA); 05.III: 8 ej., 7 de ellas en aparente migración hacia el S y la otra posada mostrando ya plumaje estival (MAL,JLO,VPA).

**Gandía:** 15.I: 3 ej. (PLP).

**Dénia:** 16.II: 4 ej. (PLP).

**La Vila Joiosa:** 09.I: 7 ej. (CAM).

**Alacant:** 31.I: 7 ej. (MAA); 16.II: 4 ej. (AJR).

**Santa Pola:** 20.I: 7 ej. (OAP); 22.I: 7 ej. (AJR); 24.I: 7 ej. (JMT,OAP).

**Desemb. río Segura:** 03.I: 3 ej. (AJR); 08.I: 12 ej. (AJR,SAR); 22.I: 10 ej. (AJR); 01.II: 9 ej. (SAR).

**Guardamar del Segura:** 12.I: 5 ej. (EBZ).

**Cabo de Cullera:** 01.X: 2 ej. a mucha distancia de la costa en vuelo hacia el N. Primer registro postnupcial (MAL,JLE,JLO).

**2017**

**Peñíscola:** 04.III: 22 ej. jornada RAM (ELL,JLA,FRJ).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 18.II: 7 ej. (MTB,JAF).

**Burriana:** 14.I: 6 ej. (JLB).

**Albufera de València:** 14.I: 38 ej. en el litoral de la Devesa (RMB,LAM,ASZ).

**Cabo de Cullera:** 14.I: 9 ej. (MAL,VPA,JLO); 17.II: 11 ej. (VPA,RBL); 03.IV: 23 ej. en paso hacia el S (VPA).

**Alacant:** 28.II: 26 ej. (AJR).

**Cabo Huertas:** 14.I: 64 ej. Presencia notable y destacada a lo largo de la mañana (CAM).

**Elx:** 02.I: 5 ej. (OAP,TGR); 04.III: 113 ej. (JCO).

**Clot de Galvany:** 07.I: 6 ej. (SCEA).

**Santa Pola:** 04.I: 5 ej. (AJR); 25.II: 9 ej. (JBN,NLM); 04.III: 113 ej. (JMT,PCC,JEG); 08.III: 187 ej. (AJR); 08.III: 196 ej. (SAR); 10.III: 40 ej. (AJR); 07.IV: 1 ej. (JBN).

**Desemb. río Segura:** 04.I: 13 ej.; 03.II: 42 ej.; 31.XII: 2 ej. (AJR).

**Cabo Cervera:** 17.II: 25 ej. (AJR); 17.III: 12 ej. (SAR).

**Puerto de Santa Pola:** 17.II: 8 ej. (OAP).

Destacan los 196 individuos del 8 de marzo de 2017 en la playa de la Marina de Santa Pola, así como los 113 del de unos días antes en la Playa de Pinet. Ha sido un buen año de observaciones durante la invernada y de aves en paso al S.

### ***Fratercula arctica***

### **Frailecillo atlántico - Fraret - Atlantic Puffin**

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2017**

**Cabo de Cullera:** 14.II: 2 ej. en vuelo hacia el N. Primer registro anual y uno de los pocos obtenidos en los meses invernales; 24.V: 1 ej. (VPA).

**Cabo Cervera:** 17.III: 17 ej. (SAR).

## **P**TEROCLIDIFORMES

### **P**TEROCLIDIDAE

### ***Pterocles alchata***

### **Ganga ibérica - Ganga - Pin-tailed Sandgrouse**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

#### **2016**

**Villena:** 20.II: 40 ej. posados en una parcela de centeno apenas crecido (MCR).

#### **2017**

**Villena:** 25.II: 4 ej. en Cañada Almela ; 30.IV: 22 ej. (BOR,DMF).

**Moratillas-Almela:** estimación de ej. en época de cría en la zona ZEPA de 56 ej. (CMA).

**Meca-Mugrón-San Benito:** estimación de ej. en época de cría en la zona ZEPA de 8 ej. (CMA).

### ***Pterocles orientalis***

### **Ganga ortega - Xurra - Black-bellied Sandgrouse**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

#### **2016**

**Villena:** 08.X: 3 ej. en rastrojos de las bodegas Eval (MCR).

#### **2017**

**Villena:** 30.IV: 18 ej. (BOR,DMF).

**Moratillas-Almela:** estimación de ej. en época de cría en la zona ZEPA de 38 ej. (CMA).

**Meca-Mugrón-San Benito:** estimación de ej. en época de cría en la zona ZEPA de 2 ej. (CMA).

## COLUMBIFORMES

## COLUMBIDAE

***Columba livia*****Paloma bravía - Colom roquer - Rock Dove**

Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Asilvestrada desde poblaciones domesticas. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Estatus: A, C, E3, D

**2016**

**Náquera:** 09.VII: 9 par. (JPH,RMQ);18.IX: 24 ej. (JPH,RMQ).

**2017**

**Albufera de València:** 14.IV: 2 ej. en arrozales roturados de Alfassar. Aunque no se puede descartar que puedan tratarse de ej. domésticos o asilvestrados, los rasgos del plumaje y lo esquivos a la presencia humana, podrían indicar aves de origen natural (BDJ).

***Columba oenas*****Paloma zurita - Xixella - Stock Dove**

Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vilanova d'Alcolea:** 29.II: 25 ej.; 11.IV: 1 ej.; 12.IX: 1 ej.; 25.XII: 21 ej. (VET).

**Albufera de València:** 17.IV: 2 ej. en vuelo sobre el tancat de la Pipa (VBJ,PLP,YAM).

**Dénia:** 05.XII: 2 ej. (EPBU).

**El Montgó:** 05.XII: 2 ej. (EPBU).

**Cocentaina:** 01.XI: 5 ej. (EACO).

**Villena:** 31.I: 2 ej. Especie muy escasa en la actualidad, posible cortejo de pareja (MLG).

**El Fondo d'Elx:** 27.IX: 2 ej. (PSH).

**Sierra de Escalona:** 20.IV: 1 ej. (PPP).

**Fontanars dels Alforins:** 04.VII: 1 ej. (PCC).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 02.III: 1 ej. (PLP).

**Albufera de València:** 22.I: 277 ej. en 2 grandes grupos en arrozales de la Palmera. La mayor cifra registrada hasta la fecha en l'Albufera que podría estar relacionada con la llegada de aves asociada con el fuerte temporal de nieve y frío de los últimos días (BDJ). 22.X: 1 ej. sobre los arrozales del Romaní. Primer registro otoñal (EPS).

**Fuenterrobles:** 04.VI: 1 par. (RMB).

**Requena:** 05.III: 4 ej. (RMB); 19.III: 2 par. en celo en la cantera de caolín; 23.IV: 1 par. (JAI); 03.VII: 1 par. (RMB).

**El Fondo d'Elx:** 25.I: 6 ej. (JMT,OAP); 04.II: 6 ej. (OAP,TGR); 28.XII: 11 ej. forrajeando (AAR).

**Hondo de Amoros:** 18.XII: 1 ej. (AJR).

***Columba palumbus*****Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 31.X: 95 ej. en paso hacia el S (MTB).

**Benicàssim:** 26.VII: 112 ej. Máximo postnupcial (MTB).

**Castellón de la Plana:** 29.XII: 85 ej. concentración invernal cerca de la desembocadura del río Seco (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 04.VIII: 142 ej. (JBC,JLB).

**Albufera de València:** 26.III: 371 ej. en arrozales de la Torreta Ampla (ASI); 10.VI: 80 ej. en arrozales de Cullera (VLG,BDJ); 12.VI: 90 ej. en diferentes grupos en arrozales de Alfafar (BDJ); 03.IX: 751 ej. posados en tendidos aéreos arrozales de Alfafar (EPS); 15.X: 200 ej. (VBJ).

**Salinas de Santa Pola:** 01.XII: 200 ej. (AJR).

## 2017

**Islas Columbretes:** 09.III: 3 juv. (LGB).

**Castellón de la Plana:** 02.II: 70 ej. concentración invernal en prados asociados a la desembocadura del río Seco (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 04.VII: 50 ej. (MBM).

**Vila-real:** 21.X: 45 ej. volando sobre campos de naranjos (JBC,JLB).

**Burjassot:** 22.XII: Impresionante concentración de 1.310 ej. en un campo (JOB).

**Albufera de València:** 19.X: 1.100 ej. en la Devesa al amanecer (GGO); 30.VIII: 450 ej. en arrozales de Alfafar (BDJ); 01.XI: cerca de 1.000 ej. en tendidos de alta tensión entre Albal y Catarroja (VBJ); 09.VII: 460 ej. en zonas de transición de huerta y arrozales de l'Ale. Primeras concentraciones postnupciales de importancia (BDJ); 26.XII: 30 ej. (TPA).

**Clot de Galvany:** 06.VII: 40 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 30.XI: 100 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 15.XI: 328 ej. (SAR).

**Desemb. río Segura:** 05.II: 40 ej. (AJR).

## ***Streptopelia turtur***

## **Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove**

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Traiguera:** 19.IV: 1 ad. (FRJ,DFF).

**Alcossebre:** 10.IV: 1 ad. Primera cita primaveral (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 01.VIII: 8 ej. (JBC).

**Benicàssim:** 10.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Albufera de València:** 15.I: 1 ej. en zonas arboladas próximas al port de Catarroja en compañía de tórtola turca. Aunque vuela perfectamente parece mostrar una lesión en las alas (BDJ); observada de nuevo el 09.III (AAC); 08.IV: 1 par. en el Racó de l'Olla (MCH,PVG,JID); 15.X: 3 ej. (VBJ); 18.X: 1 ej. en el Saladar. Última cita otoñal (PMP).

**Mislata:** 17.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial de 1 ej. cantando en el parque de la Canaleta (PAB).

**Sierra de Escalona:** 16.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (JMT,PPP).

## 2017

**Alcossebre:** 09.IV: 2 ad. Primera cita; 01.X: 1 ad. Última cita anual (DES).

**La Barona:** 03.IX: 20 ej. (MBM).

**Puçol:** 06.X: 2 ej. (JPH).

**València:** 26.I: 1 ej. en zonas de huerta cerca del Saladar (PMP). Tercer registro plenamente invernal en l'Albufera tras el de diciembre de 2010 y el recogido el pasado año y que hacía referencia a un ej. en mal estado físico (BDJ); 09.II: 1 ej. en las instalaciones ganaderas de Massanassa formando parte de un grupo de tórtola turca (AAC); 10.II: 1 ej. (YAM,GGO); 30.III: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Primer registro prenupcial (GGO,JID,MCH); 10.VI: 15 ej. (GCH); 02.VIII: 12 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,MAT,IPE); 04.IX: 94 ej. en tendidos aéreos de arrozales cerca del Palmar (VLG,BDJ); 04.X: 1 ej. cerca del casco urbano de Sollana (LAA); 10.X: 1 ej. cerca de la casa forestal del Saler. Última cita anual (VBJ).

**Benidorm:** 05.IX: 8 ej. (EJPR).

**Orihuela:** 26.V: 8 ej. (EJMP).

***Streptopelia decaocto*****Tórtola turca - Tórtola turca - Eurasian Collared-dove**

Estatus: Residente común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2017**

**Benicàssim:** 19.VIII: 164 ej. concentración postnupcial destacada (MTB).

**Islas Columbretes:** 11.III: 1 ad. (LGB).

**Massanassa:** 01.IX: 130 ej. (YAM).

**PSITTACIFORMES****PSITTACIDAE*****Psittacula krameri*****Cotorra de Kramer - Cotorra de Kramer - Rose-ringed Parakeet**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Categoría: C.

**2016**

**Castellón de la Plana:** 18.V: 18 ej. en el Parque Ribalta (LPC); 13.XII: 14 ej. (PGR).

**Grau de Castelló:** 07.IV: 4 ej. (PGR).

**València:** 29.II: 1 ej. lleva ramas a un hueco en un plátano de sombra en el jardín central de Fernando el Católico (RMB); 14.XI: 1 par. entra al nido en hueco de plátano frente a los jardines en av. Fernando el Católico, sacan y tiran fuera virutas de madera de dentro (RMB); 24.XII: 8 ej. (VBJ).

**Mislata:** 16.X: 5 ej. acosan a 3 gaviotas patiamarillas posadas en el hospital militar (PAB).

**Alacant:** 24.III: 43 ej. Primera cita de la especie para la zona y la cita más numerosa registrada para Alicante; 07.VII: bando de 165 ej. que entra a dormir a unos arboles de un parque. El bando desaparece a finales de 2016; 10.VII: 91 ej.; 24.VII: 133 ej. (EGM).

**2017**

**València:** 10.V: 20 ej. (GDU); 14.VI: 20 ej. (GGO).

**Sant Vicent del Raspeig:** 02.III: 2 ej. (JMT).

***Myiopsitta monachus*****Cotorra argentina - Cotorra gris - Monk Parakeet**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Categoría: C.

**2016**

**Vinaròs:** 26.XII: 3 ej. en el pinar Fora Forat. Primera cita reciente para el núcleo urbano (DFF).

**Benicarló:** 02.VIII: 10 ej. (DFF).

**Peñíscola:** 24.I: 6 ej. en una zona del paseo marítimo. Se observa acumulación de ramas en palmeras, con posible nidificación (ELL).

**Burriana:** 24.II: 2 ej. comiendo en árboles al lado de la carretera del Grau (JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 14.I: 14 ej. volando y posados en torre eléctrica cerca de la playa (JBC,JLB).

**Marjal dels Moros:** 09.I: 3 ej. (GCH).

**València:** 24.II: 61 ej. volando en un parque (ESBE).

**Albufera de València:** 28.I: grupo de 10 ej. sobre la pista de Silla (ASI); 09.XII: 2 ej. en la Devesa (TPE); 18.XII: 12 ej. (APL).

**Mislata:** 26.XII: 20 ej. (RMB).

**Dénia:** 06.II: 7 ej. atareados haciendo un nido (JMT).

**La Marina:** 11.V: 2 ej. nido en palmera (OAP,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 24.XII: 1 ej. (JMT,GLL,RBB).

**Desemb. río Segura:** 30.IV: 1 ej. (AJR).

**Lagunas de La Mata-Torre Vieja:** 11.III: 11 ej. (SAR).

**Cabo Cervera:** 10.II: 17 ej. (JDL).

## 2017

**Peñíscola:** 01.XI: nido en una palmera del paseo marítimo con 3 ej. (ELL).

**La Llosa:** 12.I: 3 ej. (YAM).

**Canet d'en Berenguer:** 15.X: 12 ej. (TPA).

**Marjal dels Moros:** 21.XI: 11 ej. (RMB); 31.XII: 16 ej. (EAAN).

**Bétera:** 11.IX: 13 ej. 3 nidos en pino carrasco y 1 en casuarina entorno a la alameda Escultor Ramon Inglés (MAG).

**Pobla de Farnals:** 12.X: 12 ej. (TPA).

**València:** 20.I: grupo de 10 ej. en los jardines de l'Oceanogràfic (PAB); 16.IX: 50 ej. (EWBO).

**Mislata:** 06.XII: 14 ej. (PAB).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 03.IV: 3 ej. (SAR).

## CUCULIFORMES

### CUCULIDAE

#### *Clamator glandarius*

#### Críalo europeo - Cucut real - Great Spotted Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Alcossebre:** 17.II: 2 ad. Primera cita primaveral (DES).

**Picassent:** 28.II: primera cita prenupcial de 1 ej. cantando (PAB).

**Alacant:** 04.III: 1 ej. Primera observación prenupcial (JMT,PAS,JCO).

**La Marina:** 10.IX: 1 ej. (NGA).

## 2017

**Alcossebre:** 03.II: 1 ad. Primera cita primaveral; 20.VII: 1 juv. Última cita anual (DES).

**Benicàssim:** 21.III: 1 ej. Primera cita prenupcial. Extendido, aunque poco abundante, en varios ambientes de la plana de Castellón; 22.VII: 1 juv. Última cita anual (MTB).

**Islas Columbretes:** 13.II: 1 ad. (LGB).

**Albufera de València:** 01.VI: 1 juv. volantón en el Racó de l'Olla. Primera observación de un ave nacida la presente temporada (MCH,JID).

**Salinas:** 11.II: 3 ej. (AJR).

**Elx:** 01.II: 1 ej. (NGA).

**Embalse del Amadorio:** 17.VII: 1 ej. (EGM).

#### *Cuculus canorus*

#### Cuco común - Cucut - Common Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Torreblanca:** 21.III: 1 ej. (PLP).

**Albufera de València:** 07.IX: 1 ej. en la el tancat de la Pipa (AVA).

**Planes:** 25.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (JMT,AVDH).

**La Marina:** 14.III: 1 ej. Primera cita del año (NGA).

## 2017

**Requena:** 12.VII: 1 ej. (RMB).

**Chiva:** 02.III: 1 ej. (ANL).

**Albufera de València:** 07.VII: 1 ej. en arrozales entre Favara y Cullera (PMP); 10.VII: 1 juv. recogido con

síntomas de desnutrición en arrozales del Malvinaret (BDJ).

El Fondo d'Elx: 22.IV: 4 ej. (MNG).

Embalse de La Pedrera: 12.III: 1 ej. (EBNM).

## STRIGIFORMES

### TYTONIDAE

#### ***Tyto alba***

#### **Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl**

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

Estany de Nules: 22.XI: 1 ej. cruzando a carretera (JBC,JLB).

Marjal dels Moros: 29.XII: 2 ej. (YAM).

Albufera de València: 12.X: 6 ej. (YAM).

#### **2017**

Almenara: 11.II: 1 ej. atropellado en la CV-10 (LPC).

Massamagrell: 12.IX: 1 ej. reclamando en vuelo (TPA,FTD).

Albufera de València: 06.I: 3 ej. (YAM).

El Fondo d'Elx: 10.I: 1 ej. atropellado, lleva una anilla no oficial, quizás de cetrería (JSR).

### STRIGIDAE

#### ***Otus scops***

#### **Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl**

Estatus: Estival nidificante común, invernante raro. Criterio: Citas de invernada, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

Alcossebre: 21.III: 1 ad. Primera cita primaveral (DES).

Albufera de València: 22.X: 1 ej. atropellado en la CV500 cerca del embarcadero del Pujol (AAC).

#### **2017**

Alcossebre: 11.IV: 1 ad. Primera cita primaveral; 20.VIII: 1 ad. Última cita otoñal (DES).

Vistabella del Maestrazgo: 18.III: 1 ej. (JPH).

Castellón de la Plana: 18.II: 1 ej. Primera cita anual (MTB).

Embalse del Regajo: 30.III: 1 ej. (JAI).

Alcublas: 16.IV: cita prenupcial de 1 ej. cantando por la zona del Prao (PAB,ODB,MPA).

Massamagrell: 02.X: 1 ej. volando por naranjales (TPA,FTD).

Requena: 07.III: 1 ej. cantando al anochecer en los alrededores de la fuente Bernate. Primera cita anual (PRP); 01.IV: 2 territorios distanciados 600 m. Reclamos insistentes en las pinadas (JAI).

Alcocer de Planes: 13.IV: 3 ej. (PCC).

Sierra de Mariola: 26.IV: 6 ej. en 3 puntos de Alcoy (BOR).

#### ***Bubo bubo***

#### **Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl**

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

#### **2016**

Alcalá de Chivert: 24.II: 1 ad. rescatado en la AP-7 (CMA).

Barracas: 25.IX: 1 ej. atropello en autovía (JMA).

Caudete de las Fuentes: 14.V: 1 ad. con 2 pull. en nido (RMB).

Albufera de València: 04.III: 1 ej. encontrado muerto en zonas de huerta de Vilella (CDR).

El Fondo d'Elx: 13.IX: 1 ej. Muy inusual en la zona (AJR,PCC).  
Sierra de Escalona: 16.IV: 1 ej. cantando (JMT,PPP).

### 2017

Alcossebre: 01.XII: 1 ej. atropellado en la CN-340 (MIA).  
Utiel: 17.XII: 1 h. (JBS).  
Monòver: 21.XI: 1 ej. (ELSO).  
Sierra de Escalona: 19.IV: 3 ej. (JPG); 29.XII: 3 ej. (PPP).

## ***Strix aluco***

## **Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl**

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

### 2016

Borriol: 05.IX: 1 ej. desplazándose mientras ulula por los tejados del casco antiguo del pueblo (LPC).

### 2017

Cocentaina: 19.III: 2 ej. (PCC).  
Alcoi: 11.II: 2 ej.; 20.XII: 1 ej. (PCC).  
Monòver: 28.III: 2 ej. (ELSO).

## ***Athene noctua***

## **Mochuelo europeo - Mussol común - Little Owl**

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

### 2016

Peñíscola: 06.XII: 1 ej. atropellado carretera de acceso a Peñíscola (JBC).  
Vilanova d'Alcolea: 06.VIII: 1 ej. (JBC).  
La Pobla Tornesa: 22.VIII: 1 ej. atropellado entre la Pobla y Cabanes (JBC).  
Náquera: 21.V: 9 ej. (JPH,RMQ).  
Ayora: 04.XI: 4 ej. (GGO).  
Benifallim: 10.XI: 1 ej. sobre las piedras de un canchal a mas de 1200 m s.n.m. (JCO,ROL).  
El Fondo d'Elx: 07.I: 4 ej. (JMT,OAP,IAG).

### 2017

Almassora: 04.VII: 2 ej. morts atropellats (MBM).  
La Vall d'Uixó: 02.VII: 2 ej. atropellados en carretera La Vall - Algar del Palancia (JBC).

## ***Asio otus***

## **Búho chico - Duc petit - Northern Long-eared Owl**

Estatus: Nidificante escaso, invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

### 2016

Náquera: 21.V: 1 ej. un individuo escuchado desde el hospital Doctor Moliner (JPH,RMQ).  
Albufera de València: 08.VI: 1 ej. en zonas arboladas próximas al tancat de Burriel. Primeras observaciones tras una larga ausencia de cuatro meses en esta localidad habitual de alimentación (VVA); 23.XII: 1 ej. en la Devesa (GGO).  
Cullera: 23.XII: 2 ej. en zonas arboladas de la sierra de Cullera (EPS).  
Font Roja: 28.I: 1 ej. (PCC).  
Salinas de Santa Pola: 26.IV: 1 ej. atropellado (JMT).  
La Marina: 08.III: 1 ej. reclamando desde unos pinos piñoneros (NGA).  
Guardamar del Segura: 09.VI: detectados al menos 2 territorios (SAR,AJR).

**2017**

**Vistabella del Maestrazgo:** 25.III: 2 ej.; 10.VI: 2 ej. (JPH).

**Pobla de Farnals:** 05.IX: 1 ej. observado volando y posado en la copa de un naranjo (TPA,FTD); 09.IX: 1 ej. sobrevolando la zona al amanecer (TPA).

**Albufera de València:** 15.II: 1 ej. dormido en un pino (GGO) 20.XII: 1 ej. atropellado en la CV-500 (VPA); 14.XII: 1 ej. atropellado en la C-3320 (EGO).

**Cullera:** 10.I: 4 ej. en el entorno del Cabeçol (VPA).

**Alcocer de Planes:** 12.XI: 1 ej. (ENAG).

**Sant Vicent del Raspeig:** 23.X: 1 ej. atropellado (DMF).

**Asio flammeus****Búho campestre - Mussol marí - Short-eared Owl**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

**Borriol:** 30.XI: 1 ej. se levanta al paso en el sotobosque de coscojas y romeros cerca de la cabecera del barranco de la Botalaria (LPC).

**Nules:** 02.I: 1 ej. volando por zona de cultivos/herbazal (JBC); 08.I: 2 ej. volando en actitud de alimentarse sobre zona de herbazal y naranjos (JBC,JLB).

**Marjal dels Moros:** 24.III: 2 ej. en la playa (AAC).

**Albufera de València:** 17.I: 4 ej. en arrozales de la Llonga (ASI); 07.III: 5 ej. en arrozales ya secos y roturados del Borronar (MCH); 11.IV: 1 ej. posado en un arrozal seco cerca de la Socarrada (LAA); 02.XII: 12 ej. concentrados en arrozales de Sueca. Se trataría de una de las mayores concentraciones registradas hasta la fecha en l'Albufera (MAJ); 10.XII: 2 ej. en dunas litorales en el tramo sur de la Devesa (VPA); 11.XII: Varios ej. en vuelo y posados. Grupo familiar (VBJ).

**Marjal de Pego-Oliva:** 23.I: 1 ej. herido de disparo, muere al día siguiente (NGO).

**Alacant:** 02.XI: 1 ej. (JAG).

**2017**

**Benicàssim:** 26.XI: 1 ej. sale de un acebuche al amanecer. Primera cita para la localidad (MTB).

**Marjal dels Moros:** 09.I: 1 ej.; 18.II: 1 ej. (RPM); 30.XI: 4 ej. (AAC); 10.XII: 4 ej. descansan acostadas en el suelo en la franja costera, en la playa de cantos rodados, muy cerca, solo separadas unos metros unos de otros (RMB).

**Albufera de València:** 06.I: 2 ej. en arrozales de Massanassa (YAM); 29.I: 2 ej. en dunas litorales de La Devesa (VPA,LAM); 03.II: 1 ej. en arrozales fangueados de la Corretjola (VPA,PF,ACB); 29.X: 2 ej. en arrozales del camí de l'Alter del Malvinar (BDJ); 09.XII: 1 ej. en arrozales próximos a la muntanyeta dels Sants (GCH); 09.XII: 1 ej. (GCH); 09.XII: 1 ej. en arrozales de la Llonga (PMP).

**CAPRIMULGIFORMES****CAPRIMULGIDAE****Caprimulgus ruficollis****Chotacabras cuellirrojo - Saboc coll-roig - Red-necked Nightjar**

Estatus: Estival nidificante moderado. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Pedralba:** 27.III: 1 ej. Primera cita del año (JAI).

**València:** 16.IV: primera cita prenupcial de 1 ej. en los jardines del Oceanogràfic (PAB,JLC).

**Mislata:** 15.IV: primera cita prenupcial de 1 ej. en la huerta (PAB).

**Turis:** 10.X: Última cita postnupcial de 1 ej. en unos campos a las afueras de la población (GGS).

**Albufera de València:** 15.IV: 1 ej. en la R.N. de Milia. Primer registro prenupcial (PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 30.III: 5 ej. en el camino de la estación de anillamiento (EJMO).

**Sant Vicent del Raspeig:** 13.IV: 1 ej. (JMT).

**Sierra de Escalona:** 16.IV: 1 ej. (JMT,PPP).

## 2017

**Alcossebre:** 04.V: 1 ad. Primera cita primaveral (DES).

**Nules:** 21.X: 1 ej. atropellado en CN-340 (JBC,JLB).

**València:** 30.IV: 1 ej. Cita prenupcial de 1 ejemplar en los jardines del Oceanogràfic (PAB).

**Albufera de València:** 30.IV: 1 ej. en zonas de huerta del Brosquill. Primer registro primaveral (PVG).

**Marjal de Pego-Oliva:** 23.VII: gran concentración de 35 ej. (EJFO).

**Orihuela:** 14.III: 1 ej. volando junto al río cazando insectos (ASS).

**Embalse de La Pedrera:** 15.IV: 1 ej. (PPP).

## *Caprimulgus europaeus*

## Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar

Estatus: Estival nidificante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Albufera de València:** 23.IV: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants. Primer registro prenupcial (BDJ,VLG);

29.IV: 1 ej. cantando en la Devesa al anochecer (EPS); 09.VI: 3 ej. en zonas abiertas del tramo sur de la Devesa. La presencia regular desde el pasado mes de mayo parece confirmar la nidificación de esta especie en la Devesa (EPS); 06.IX: 1 ej. cerca del Canyar (ASI).

## 2017

**Benicarló:** 17.IX: 1 ej. (JLA).

**Vistabella del Maestrazgo:** 14.IV: 2 ej. (JPH).

**Albufera de València:** 23.IV: 1 ej. en la Devesa. Primer registro prenupcial (EPS); 02.IX: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP).

**El Fondo d'Elx:** 23.IX: 1 ej. (EAVP).

# APODIFORMES

## APODIDAE

## *Tachymarptis melba*

## Vencejo real - Falcia de panxa blanca - Alpine Swift

Estatus: Nidificante moderado, migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Benicarló:** 09.III: 3 ej.; 25.III: 50 ej. (JLA).

**Vilanova d'Alcolea:** 24.X: bando de 100 ej. (VET).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.IX: 45 ej. Última cita anual (MTB).

**Benicàssim:** 10.III: 2 ej. Primera cita anual; 21.V: 2 ej. Cita primaveral tardía; 18.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 14.III: 15 ej. (PSH).

**Alacant:** 06.X: 8 ej. (ELSO).

**Cabo Huertas:** 09.III: 15 ej. (EGM,MAA).

**El Fondo d'Elx:** 04.III: 4 ej. Primera observación prenupcial; 05.III: 4 ej. (JMT).

## 2017

**Benicàssim:** 13.III: 4 ej. Primera cita anual; 11.VI: 1 ej. Cita estival (MTB).

**Castellón de la Plana:** 13.III: 2 ej. volando cerca del parque Ribalta (PGR).

**La Vall d'Uixó:** 28.IX: 24 ej. (JBC).

**Estivella:** 23.IX: cita postnupcial destacada de 65 ej. en paso (TPE,MACA,MASA).

**Albufera de València:** 23.X: 3 ej. en la Devesa alimentándose junto con aviones comunes. Cita tardía (GGO,YAM).

**Crevillent:** 05.X: 50 ej. (PLP).

**El Fondo d'Elx:** 04.III: 2 ej. (EGDE); 04.III: 1 ej. (PCC,JEG).

Primeras citas, bien sincronizadas a principios de marzo y última cita a finales de octubre en l'Albufera, ambos periodos dentro de la fenología habitual.

### ***Apus apus***

### **Vencejo común - Falcia - Common Swift**

Estatus: Nidificante y migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Benicàssim:** 24.IV: 900 ej. Máximo anual; 10.VIII: última cita anual de 42 ej. en paso al S (MTB).

**Tales:** 29.VII: abandono de las colonias de cría (JBC).

**Vila-real:** 25.VII: abandono de las colonias de cría (JBC).

**Camporrobles:** 16.VII: mínimo de 100 par. reproductoras bajo las tejas de la iglesia (JAI).

**Clot de Galvany:** 27.IX: 1 ej. (PSH).

**El Fondo d'Elx:** 26.II: 3 ej. (PLP); 29.II: 2 ej. (AJR,SAR); 04.III: 3 ej.; 05.III: 3 ej. (JMT).

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 2 ej. Primera cita anual; 29.VI: 2.160 ej. La mayoría en paso hacia el SO tras día de fuerte poniente (MTB,JAF).

**Benicàssim:** 23.III: 1 ej. (AMG); 07.VII: 50 ej. hostigando a un halcón sobre la colonia de cría; 16.IX: 3 ej. Última cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 16.II: 1 posible ej., identificado sin certeza, sobre el Racó de l'Olla. Primer registro anual temprano (JID,MCH).

**Mislata:** 01.IV: 6 ej. Primera cita del año (JAI).

**Requena:** 01.IV: 8 ej. Primera cita del año (JAI).

**Alacant:** 06.X: 1 ej. (EEAP).

**El Fondo d'Elx:** 19.II: 1 ej. (YAM); 04.III: 1 ej. (AJR); 02.IV: 500 ej. (EFAL).

Destacan las primeras citas muy tempranas a finales de febrero en el Fondo d'Elx (y otra de un posible ej. a mediados de febrero en l'Albufera).

### ***Apus pallidus***

### **Vencejo pálido - Falcia pàl·lida - Pallid Swift**

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Villafranca del Cid:** 29.VIII: 1 par. atendiendo un nido (ALR,RPB).

**Alcossebre:** 23.III: 2 ad. Primera cita primaveral (DES); 29.XI: 2 ad. en paso al S. Última cita anual (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 12.XI: 1 ej. Última cita anual tardía (MTB).

**Cabanes:** 28.III: llegada de numerosos individuos a las colonias de cría del casco urbano (VET); 01.VIII: 50 ej., algunos se meten en nidos en las paredes y tejas (JBC).

**Benicàssim:** 16.III: 1 ej. Primera cita anual; 09.IV: 80 ej. Máximo anual (MTB).

**Albufera de València:** 05.II: 1 ej. formando parte de un grupo de avión roquero cerca del rec de Portes (ASI).

**Caudete de las Fuentes:** 09.VII: 2 ej. Especie escasa en el interior, deben criar en el casco urbano de

Fuenterrobles (RMB).

**Requena:** 27.III: 2 ej. Primera cita del año. 1 ej. sale de uno de sus nidos bajo un alero de una colonia de cría (JAI).

**Cullera:** 18.IX: 3 ej. en el entorno del castillo de Cullera (VBJ,ASL,FGR).

**Cabo de Cullera:** 29.III: 18 ej. entrando en la cueva del cabo de Cullera. Primeros registros de presencia en localidades tradicionales de reproducción (VPA).

**Cabo Huertas:** 09.III: 6 ej. (EGM,MAA).

**La Marina:** 13.V: 400 ej. Grandes números entrando desde el mar; 19.X: última cita de 1 ej. (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 04.II: 1 ej. (OAP); 27.II: 1 ej. volando con golondrinas y aviones (EIGU); 18.III: 300 ej. notable llegada de ej. (JMT,OAP).

## 2017

**Peñíscola:** 05.VIII: 30 ej. jornada RAM (ELL,JLA,BGC).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.IV: 46 ej. Máximo anual (MTB,JAF).

**Desert de Les Palmes:** 07.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Benicàssim:** 23.III: 3 ej. Primera cita prenupcial (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 28.X: 3 ej. (MBM).

**Marjal dels Moros:** 31.III: 33 ej. en migración (AAC).

**Albufera de València:** 06.III: 1 ej. sobrevolando l'Aterrissador. Primer registro primaveral (YAM); 04.X: 3 ej. en paso sobre l'estany del Pujol. Última cita postnupcial (JOB); 02.X: 1 ej. Última cita en el casco urbano de Sueca, donde se reproduce (MPB).

**Cullera:** 01.X: 2 ej. en el entorno de la montaña de Cullera (VBJ).

**Cabo de Cullera:** 01.IV: 22 ej. en el entorno del cabo de Cullera. Primeros registros en los núcleos habituales de reproducción (VPA).

**Embalse d'Elx:** 22.IV: 150 ej. (JPG).

**Pantano de Elche:** 12.IX: 30 ej. (SAR).

**Elx:** 08.X: 1 ej. (JPG).

**El Fondo d'Elx:** 04.III: 10 ej. (JCO); 16.III: 40 ej. (JMT,AAR).

## CORACIIFORMES

### CORACIIDAE

#### ***Coracias garrulus***

#### **Carraca europea - Cavalier - European Roller**

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Alcossebre:** 23.IV: 1 ad. Primera cita primaveral; 26.VII: 1 juv. Posible nidificación local (DES).

**Torre Endoménech:** 23.IX: 1 ej. posado en cable teléfono (JBC,JLB).

**Vilafamés:** 25.V: 1 ej. (RPB).

**Benicàssim:** citas de 1 ej. los días 11 y 23.V (MTB).

**Albufera de València:** 11.IV: 2 ej. en el Racó de l'Olla. Primera cita anual (MCH,JID,IRU); 23.IV: 1 ej. en el entorno del tancat de l'Illa (BDJ,VLG); 04.VI: 1 ej. en zonas próximos a Pinedo. Cita tardía (JOB).

**Requena:** 14.VIII: 1 juv. posado en el tendido telefónico en la carretera de Chera (JGA,PRP); 16.VIII: 1 ej. (RMB); 18.VIII: 1 juv. presente hasta el 26.VIII en unos herbazales y barbechos. Paso migratorio (JAI).

**Elx:** 12.VIII: 1 juv.; 29.VIII: 1 ej. (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 20.IV: 2 ej. (PPP); 27.VII: 5 ej. grupo familiar (AJR).

**La Marina:** 16.IV: 1 ej. posado en cables junto a la carretera. Primera cita anual (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 15.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (MLP); 25.IV: 10 par. (AJR,SAR).

**2017**

**Alcossebre:** 28.IV: 1 ad. Primera cita primaveral (DES).

**Benicàssim:** 03.V: 1 ej. (MTB).

**Almassora:** 04.V: 1 ej. (JCS).

**La Llosa:** 08.IX: 2 ej. (JPE).

**Albufera de València:** 05.V: 1 ej. posado en un tendido telefónico. Primera cita anual (JAGO); 21.VI: 1 ej. posado en un tendido aéreo cerca del tancat de la Sardina (AVA); 26.IV: 3 ej. (YAM).

**Requena:** 10.VI: 1 ej.; 03.IX: 1 ej. (RMB).

**Elx:** 13.VI: 2 ej. (ASS); 27.VII: 2 ej. (EJFO).

**Salinas de Santa Pola:** 06.V: 1 ej.; 11.V: 2 ej.; 21.VII: 2 ej. (AJR).

**La Marina:** 12.VI: 2 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 30.IV: 1 ej. (JCO); 04.V: 1 ej. (AJR); 16.V: 2 ej. (EDDU); 17.VI: 2 ej. (SMO); 10.VII: 2 ej. (EPBB); 30.VIII: 1 ej. (EJFO).

**San Fulgencio:** 03.VII: 2 ej. (EJRR).

## ALCEDINIDAE

**Alcedo atthis****Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher**

Estatus: Residente, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

Conservación: VUL.

**2016**

**Peñíscola:** 08.IV: 1 ej. observado en la jornada RAM (APN).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 01.X: 11 ej. Máximo anual en 2,5 km de censo (MTB).

**València:** 08.IX: primera cita postnupcial de 3 ej. en el cauce viejo del Turia donde permanecen todo el invierno (PAB).

**Albufera de València:** 21.V: 1 h. anillada en Milia. Mostraba placa incubatriz (PMP); 30.V: 1 ej. en el entorno de l'Alteró (EGO,PVG); 03.VI: 1 ej. sale volando al paso de una embarcación en la zona S de la laguna (VLG,BDJ); 17.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (AVA).

**Pantano de Elche:** 11.VII: 1 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 05.IV: 2 ej. (JMT,MFS); 22.VII: 2 ej. (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 29.VI: 1 ej. Cita estival que corresponde probablemente a los primeros ej. dispersivos; 21.X: 7 ej. Máximo anual en recorrido de 2,3 km (MTB,JAF).

**Valencia:** 23.VIII: Primera cita postnupcial de 1 ej. en el cauce viejo del Turia donde permanece todo el invierno (PAB).

**Albufera de València:** 01.I: 8 ej. (YAM); 28.V: 1 ej. en una de las acequias que discurre cerca de l'Ale (BDJ); 14.VI: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Se trata de una de las pocas observaciones de toda la primavera (MCH); 23.VI: 1 ej. en el tancat de l'Illa (PVG).

## MEROPIDAE

**Merops apiaster****Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater**

Estatus: Nidificante común, migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vinaròs:** 04.IX: 170 ej. censo destacado en paso hacia el S en 3 h. de observación (ELL,DFF).

**Alcossebre:** 24.IV: paso destacado de 80 ej. en paso hacia el NE (DES).

**Benicàssim:** 11.V: 114 ej. en paso en 1,5 h.; 24.V: 2 ej. Última cita primaveral; 15.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 25.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 18 ej. (JBC).

**Náquera:** 18.IX: 58 ej. (JPH,RMQ).

**Albufera de València:** 25.III: 3 ej. sobrevolando el tancat de l'Establiment. Primera cita anual (MCH); 16.IV: al menos 220 ej. en migración activa sobre la Devesa en 3 h. de observación (MGR,PVG).

**Cocentaina:** 02.IV: 5 ej. (PCC,PAS,JCO,JMT).

**Clot de Galvany:** 29.III: 5 ej. Primera cita prenupcial (AJR).

**Isla de Tabarca:** 04.IV: 2 ej. capturados para su anillamiento científico (PIC).

**El Fondo d'Elx:** 27.IX: 12 ej. (PSH); 27.IX: 46 ej. (PSH).

**Rojales:** 31.III: 1 ej. (NGA).

**Embalse de La Pedrera:** 01.IV: 3 ej. (JMT,PPP).

## 2017

**Desert de Les Palmes:** 17.IX: 23 ej. Última cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 03.IV: 1 ej. Primera cita anual; 08.IX: 137 ej. máximo postnupcial en grupos en toda la marjal (MTB).

**Marjal dels Moros:** 22.VII: 160 ej. por todo el marjal varios grupos (GCH).

**Albufera de València:** 08.IV: varios ej. cantando sobre arrozales del Recatí. Primer registro primaveral (JOB); 30.IV: 250 ej. en paso activo hacia el N sobre la Devesa en unas horas (YAM); 23.VI: pequeño bando sobrevolando el Racó de l'Olla sin rumbo aparente. Primera observación realizada tras el paso primaveral (MCH,JID).

**Requena:** 03.IV: 1 ej. en migración activa. Primera cita prenupcial (PRP).

**Salinas de Calpe:** 14.X: 3 ej. (EAJA).

**Alacant:** 05.IV: 21 ej. (JBN).

**Pantano de Elche:** 01.IV: 2 ej. (OAP).

**La Marina:** 02.IV: 4 ej. (SAR).

**El Fondo d'Elx:** 06.IX: 200 ej. (PLP); 15.IX: 180 ej. (AJR,SAR); 27.IX: 30 ej. (SAR).

**Orihuela:** 29.III: 1 ej. (JPG).

## UPUPIDAE

### *Upupa epops*

### Abubilla común - Puput - Hoopoe

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante escaso. Criterio: Citas de invernada, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Quadro de Santiago:** 09.I: 2 ej. Máximo en invernada; 03.IX: 21 ej. Máximo anual en transecto de 2,5 km, grupo destacado de 12 ej. (MTB).

**Borriol:** 16.I: 1 ej. se desplaza por garrofales abandonados (LPC).

**Castellón de la Plana:** 06.XII: 4 ej. grupo invernal en prados junto a la desem. del río Seco (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 23.I: 1 ej. (MBM).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 30.I: 3 ej. (MBM).

**Marjal de Pego-Oliva:** 31.VIII: 16 ej., la mayoría en solitario alimentándose en los caminos entre los campos de arroz (EBDO).

**Alacant:** 24.I: 1 ej. (JDL).

**Clot de Galvany:** 12.I: 2 ej.; 31.I: 1 ej. (JMT,OAP).

**Cabo de Santa Pola:** 12.XII: 11 ej. número destacado (OAP).

**EDAR de Santa Pola:** 31.I: 3 ej. (JMT,OAP).

## 2017

**Benicàssim:** 01.I: 2 ej. Máximo invernal en censo de 0,9 km (MTB).

**Quadro de Santiago:** 04.IV: 8 ej. Máximo primaveral en censo de 1,2 km en pastizal; 02.IX: 18 ej. Máximo

postnupcial en censo de 2,3 km (MTB).

**Castellón de la Plana:** 23.XII: 5 ej. Máximo invernal en censo de 1,2 km por zonas de naranjal (MTB).

**Moncofa:** 26.I: 3 ej. (JBC,JLB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 6 ej. (JBC).

**Marjal dels Moros:** 03.I: 4 ej. (SAD); 21.X: 13 ej. en paso activo en grupos de 1, 2 o 3 ej. (GCH).

**València:** 10.I: 1 ej. (SAD).

## PICIFORMES

### PICIDAE

#### *Jynx torquilla*

#### Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck

Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas de invernada, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### 2016

**Benicàssim:** 02.I: 1 ej. observado en varias ocasiones en el mes de enero en campos abandonados; 06.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 18.XII: 1 ej. observado en varias ocasiones en el mes de diciembre en campos abandonados (MTB).

**Burriana:** 08.XII: 1 ej. (JMI).

**Burjassot:** 11.I: 1 ej. (JOB).

**Albufera de València:** 08.IX: 1 ej. en el Racó de l'Olla entre vegetación ribereña (MCH,JID); 03.XII: 1 ej. anillado en la Milia. Cita tardía que podría corresponderse con un invernante (JMR,MPB,PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 07.XII: 1 ej. (PLP).

**Benidorm:** 01.XII: 1 ej. (JSR).

**Sant Vicent del Raspeig:** 03.XII: 1 ej. muerto tras colisionar contra una cristalera (JMT,IAG).

**Saladar de Agua Amarga:** 01.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (AJR).

**Clot de Galvany:** 31.I: 1 ej. (SCEA).

**El Fondo d'Elx:** 16.I: 1 ej. (SAR).

#### 2017

**Benicàssim:** 15.II: 1 ej. Primera cita prenupcial. Sin citas invernales; 23.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Clot de Galvany:** 30.XII: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 08.I: 1 ej. (OAP).

**Embalse de La Pedrera:** 09.XII: 1 ej. (ELCO).

#### *Dendrocopos major*

#### Pico picapinos - Picot garser gros - Great Spotted Woodpecker

Estatus: Residente moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

#### 2016

**València:** 15.V: 1 m. tamborileando en una rama de sauce en zonas arboladas del margen del río Xúquer, entre los terminos de Sueca y Cullera. Primer registro anual y uno de los pocos obtenidos en estas zonas próximas al litoral de La Ribera (ASL).

#### *Picus sharpei*

#### Pito real ibérico - Picot - Eurasian Green Woodpecker

Estatus: Residente moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

#### 2017

**Salinas de Santa Pola:** 11.V: 1 ej. (AJR).

**Desemb. río Segura:** 05.II: 1 ej. (AJR).

**EDAR de Santa Pola:** 26.IV: 1 ej. (AJR,SAR).

## FALCONIFORMES

## FALCONIDAE

**Falco naumanni****Cernícalo primilla - Xoriguer petit - Lesser Kestrel**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Criterio: Aves migrantes, datos de nidificación y citas de interés.

Conservación: VUL.

**2016**

**Vilanova d'Alcolea:** 01.VII: 1 ej. encontrado muerto en medio de un camino rural que bordea el aeropuerto de Castellón. Con anilla (PVC roja letras blancas "66P" anilla metálica con inscripción: Aranzadi. San Sebastian, AX01217 y negra lisa). Anillado por ICO en Lerida a principio mes de junio de este año (JBC).

**Camporrobes:** 25.IX: 1 ej. (RMB).

**Ayora:** 24.VII: concentración estival de 10 ej. posados en cable cerca de San Benito (PAB, ODB, MPA).

**Villena:** 20.III: 4 ej. (JDL).

**Fontanars dels Alforins:** 04.VII: 1 ej. (PCC).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.IV: 2 ej., m. y h. en paso hacia el N (MTB, JAF).

**Ayora:** 04.VI: 4 ej. (JOB).

**Sant Vicent del Raspeig:** 09.X: 6 ej. en el Moralet (MLP).

**Villena:** 30.IV: 4 ej. (JCO).

**Elx:** 04.X: 4 ej. posados en una cornisa (JEG).

**El Fondo d'Elx:** 15.IV: 2 ej., m. y h. cazando en pradera lindante y recién segada (EMSE).

**Fontanars dels Alforins:** 13.IV: 10 ej. (JBN).

**Falco tinnunculus****Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel**

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Ares del Maestre:** 04.X: concentración de 26 ej. cazando insectos (RPB).

**Vinaròs:** 26.IX: máximo registro de 7 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (JLA, ELL, PML).

**Desemb. río Mijares:** 12.XII: 5 ej. (JBC).

**Burriana:** 22.I: 9 ej. posados y cernidos por distintas partes del Clot (JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 7 ej. (JBC).

**Barracas:** 10.VIII: 10 ej. distribuidos por todo el llano (JBC).

**Estivella:** 23.X: máximo registro de 10 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (TPE, VMA, MACA).

**Requena:** 08.X: 30 ej. en paso activo durante 3 h. de observación. Máximo postnupcial (PRP, JAI).

**Barx:** 08.X: máximo registro de 8 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (JML, ASL).

**Elx:** 29.VI: 9 ej. volando por los campos, mayormente adultos (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 02.XII: 15 ej. (AJR, SAR).

**2017**

**Vinaròs:** 18.X: máximo registro de 5 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (JLA, FRJ).

**Vilanova d'Alcolea:** 12.I: 7 ej. (JLB).

**Desert de Les Palmes:** 30.IX: 63 ej. Máximo destacado en 3 h. de censo en seguimiento de la migración postnupcial de rapaces (MTB).

**Moncofa:** 26.I: 6 ej. (JBC, JLB).

**Estivella:** 07.X: máximo registro de 7 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (TPE).

**Marjal dels Moros:** 21.X: 20 ej. (GCH).

**Requena:** 01.X: 7 ej. en paso activo durante 3 h. de observación. Máximo postnupcial (PRP, JAI).

**Villena:** 17.IX: máximo registro de 6 ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (JCH).

**El Fondo d'Elx:** 16.XI: 15 ej. alimentándose de libélulas en los alrededores de San Felipe Neri (PLP).

### ***Falco vespertinus***

### **Cernícalo patirrojo - Falco cama-roig - Red-footed Falcon**

Estatus: Migrante raro del E de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2016**

**Albocácer:** 14.V: 2 ej. cazando insectos en un cultivo de cereal (ALR,RPB).

**Desierto de las Palmas:** 13.V: 1 m. ad. en migración (IBR).

**València:** 13.V: 1 h. ad. migrando al N sobre el casco urbano a baja altura (AAC).

**Albufera de València:** 01.V: 1 m. sobrevolando los arrozales del Recatí (BDJ).

#### **2017**

**El Fondo d'Elx:** 30.IV: 1 m. (PLN).

### ***Falco eleonora***

### **Halcón de Eleonora - Falcó de la reina - Eleonora's Falcon**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

Conservación: VUL.

#### **2016**

**Peñíscola:** 06.VIII: 3 ej. jornada RAM (APN); 01.X: 1 ej. jornada RAM (JLA,ELL,PML).

**Alcossebre:** 29.VI: 1 ad. Primera cita anual (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 28.VII: 1 ej. (JBC).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 03.VI: 1 ej. de MO volando a baja altura (PLP).

**La Pobla Tornesa:** 28.VII: 18 ej. alimentándose de insectos voladores. Llegan al atardecer y desaparecen cerca de las 22 h. (JBC).

**Islas Columbretes:** 22.IV: 1 ej. (RPM).

**Borriol:** 20.IX: 2 ad. volando por la tarde sobre la sierra de Borriol. Uno de ellos ciclea junto a un gavilán (PLL,FGL,JGS).

**Tales:** 01.VIII: 1 ej. alimentándose de insectos en vuelo al atardecer (JBC).

**La Vall d'Uixó:** 24.VIII: 1 ej. de MO posado en un algarrobo al lado de una balsa de riego. Posible desplazamiento para conseguir alimento (JBC,JLB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 20.VI: 1 ej. volando y alimentándose en el pinar (JBC); 04.VIII: 1 ej. (JBC, JLB).

**Albufera de València:** 17.VI: 1 inm. sobrevolando la gola del Pujol hacia el N. Primer registro anual (VBJ);

03.VIII: 1 ej. de MC tomando altura sobre el Racó de l'Olla (JID); 09.IX: 1 ej. de MO sobre la Devesa (RNU).

**Alacant:** 06.X: 2 ej. (ELSO).

**Salinas de Santa Pola:** 06.VI: 1 ej. (AJR).

**Cala de Granadella:** 10.IX: 2 ej. (VBJ).

#### **2017**

**Peñíscola:** 01.VII: 1 ej. (ELL,JLA,PML).

**Alcossebre:** 07.V: 1 ad. Primera cita primaveral; 14.IX: 1 ad. Última cita anual (DES).

**La Pobla Tornesa:** 14.VI: 3 ej. (VET); 09.VII: 27 ej. al atardecer (JBC); 16.VIII: 15 ej. volando y cazando (SMS).

**Desert de Les Palmes:** 14.VIII: 2 ej. cazando cigarras (MTB).

**Benicàssim:** 04.VI: 1 ej. volando sobre zona de matorral y huertos de naranjos (JBC).

**Islas Columbretes:** 21.X: 20 ej. (AAR).

**Albufera de València:** 07.VIII: 1 ej. de MO sobrevolando y tomando altura en los arrozales del rec de Portes. Primer registro anual (BDJ); 07.VIII: 1 ej. sobrevolando el Fanguaret (MCH); 01.IX: 1 ej. en dirección S (GGO).

**Requena:** 09.IX: 1 ej. adulto de MC en dirección S (PRP, JAI).

**Penyal d'Ifach:** 09.VIII: 4 ej. (ESAR).

**Muro:** 05.VII: 1 ej. (DMF).

### **Falco columbarius**

### **Esmerejón - Esmerla - Merlin**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

**Olocau del Rey:** 06.XII: 1 ej. (RPB, JCMO).

**Catí:** 02.III: 1 ej. (RPB).

**Ares del Maestre:** 24.X: 1 ej. (RPB).

**San Rafael del Río:** 31.III: 1 ej. (ELL).

**Vilanova d'Alcolea:** 25.XII: 1 h. acosada por urracas (VET).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 25.XI: 1 h. Única cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 11.X: 1 ej. Única cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 04.I: 2 ej. tipo h. en marjales de Sueca (AAC); 08.I: 2 ej. (m. y h.), efectuando vuelos de caza cerca de l'ullal de baldoví (VPA); 05.II: 2 ej. (JOB); 30.III: 1 ej. en paso hacia el N sobre la Ratlla (BDJ); 24.XI: 1 ej. (h./juv.) en el camí del Xelvano (AAC); 23.XII: 2 ej. en arrozales del Cebollar (BDJ).

**Valencia:** 18.IV: cita prenupcial tardía de 1 ej. en paso activo hacia el N (PAB).

**Camporrobles:** 29.IX: 1 ej. (RMB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 17.X: 1 ej. (PLP).

**Pantano de Elche:** citas de 1 ej. los días 11.I y 08.II (OAP).

**Salinas de Santa Pola:** 07.I: 1 ej. (JMT, OAP).

**La Marina:** 09.XII: 1 ej. (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 02.I: 2 ej. (AJR); 02.II: 1 ej. (JMT, OAP); 14.III: 1 ej. (JMT, OAP); 25.IX: 1 ej. Primera cita temprana de la especie (CAG); 21.X: 1 h. junto a un grupo de pardillos (NGA); 06.X: 1 ej. (AJR, SAR); 29.X: 1 ej. (STH); 02.XI: 2 ej. (SAR); 30.XI: 2 ej. (JMT, OAP); 09.XII: 2 ej.; 26.XII: 2 ej. (OAP).

#### **2017**

**Ares del Maestre:** 05.I: 1 ej. (RPB).

**Benicarló:** 03.IV: 1 ej. por el casco urbano (JLA).

**Vilanova d'Alcolea:** 12.I: 2 ej. (JLB).

**La Llosa:** 06.I: 1 ej. (GGO).

**Alcublas:** 09.III: 1 h. (AAC).

**Marjal dels Moros:** 18.XI: 2 ej. (EJNA).

**Albufera de València:** 05.II: 1 h. intentando cazar paseriformes en los arrozales del Peirat de Cullera (LAA); 29.X: 1 ej. en arrozales de la Llonga (BDJ); 19.XII: 2 ej. (AAC); 23.XII: 1 ej. en el camí del Cavalló (JOB); 29.XII: 1 ej. (h./juv.) en arrozales de la Maquial (BDJ).

**Sinarcas:** 18.III: 1 m. ad. posado en una cepa del viñedo (JAI).

**Marjal de Pego-Oliva:** 28.II: 1 ej. (PLP).

**Salinas de Santa Pola:** 23.III: 1 ej. (SAR); 25.IV: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 27.I: 3 ej. (AJR); 01.II: 2 ej. (JMT); 25.XI: 2 ej. (JMT); 30.XII: 1 ej. (EJDR).

### **Falco subbuteo**

### **Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby**

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

#### **2016**

**Borriol:** 02.IX: 1 ad. posado en un apoyo de tendido de alta tensión (PLL).

**Albufera de València:** 20.IV: 1 ej. sobrevolando el Racó de l'Olla a primeras horas de la tarde realizando intentos de caza. Primera cita anual (JID); 14.X: 1 ej. en paso, sobre l'estany del Pujol (JLE, MCH, GGA).

**Requena:** 08.X: 2 ej. en paso activo en 3 h. de observación. Máximo postnupcial (PRP, JAI).

**Benifallim:** 01.IX: 4 ej. sobrevolando un área montañosa (JCO).

**El Fondo d'Elx:** 07.X: 1 ej. (AJR, SAR).

## 2017

**Vinaròs:** 09.IX: 1 m. ad. Primer ej. en paso de la campaña de migración postnupcial (ELL, DFF, PML).

**Alcossebre:** 12.IV: 1 ad. Primera cita primaveral (DES).

**Desert de Les Palmes:** 30.IX: 6 ej. Máximo postnupcial en 3 h. de censo (MTB).

**Marjal dels Moros:** 12.X: 3 ej. (GCH).

**Font Roja:** 27.IX: 2 ej. en migración dirección S acosados por un gavilán a su paso (PCC).

**Alacant:** 17.X: 1 ej. (JCO).

**Villena:** 03.IX: 2 ej. Primeros ej. en paso de la campaña de migración postnupcial de rapaces (JCH).

## **Falco peregrinus**

## **Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon**

Estatus: Residente moderado, migrante raro. Criterio: Citas de aves migrantes o invernantes, citas de interés.

## 2016

**Vinaròs:** 11.XI: 1 ej. volando por el casco urbano (MBT).

**Alcossebre:** 21.XI: 1 ad. única cita anual (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 01.II: 1 ej. (VET).

**Benicàssim:** 06.XII: 1 m. junto al pueblo. Caza una urraca (MTB).

**Tales:** 27.XII: 1 ej. realiza un picado sobre un grupo de palomas pero no consigue hacer presa (JBC).

**Albufera de València:** 19.II: 1 juv. captura una avefría en la marjal de Alfafar (AAC); 07.III: 1 h. ad. y 1 m. inm. en el tancat de la Naia (AAC); 25.IV: 1 ej. posado en una torre de suministro eléctrico de Alfafar (ASI); 26.XI: 2 ej. en arrozales de Alfafar (VBJ).

**Requena:** 25.IX: 2 ej. en paso activo (PRP, JAI, JGA).

**Xàbia:** 14.V: nido con 2 pull. (VBJ).

**Alacant:** 15.V: 1 ad. y 2 juv. Reproducción en zona urbana (MAA).

**Salinas de Santa Pola:** 11.I: 1 ej. (AJR, SAR); 26.VIII: 1 ej.; 30.XII: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 07.I: 1 ej. (JMT, OAP, IAG); 18.II: 2 ej. (JMT, MFS); 15.IV: 1 ej. (MLP); 28.X: 2 ej. (JMT, PPP, MFS).

## 2017

**Vinaròs:** 12.XII: 1 ej. cazando estorninos (MBT).

**Olocau:** 21.V: 4 ej. (JOB).

**Albufera de València:** 29.X: 2 ej. (ad. e inm.) en arrozales de la Llonga y 1 ej., aparentemente ad., en arrozales de l'Alter del Malvinar (BDJ); 19.XII: 2 ej. en el tancat de Caro (AAC); 24.XI: 1 juv. de gran tamaño en la marjal de Alfafar y 1 ad. con tórtola turca capturada en la marjal de Massanasa (AAC).

**Salinas de Santa Pola:** citas de 2 ej. los días 02.I y 30.XI (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 24.II: 1 ej. (AJR); 15.XI: 1 ej. (SAR).

**Hondo de Amoros:** 18.XII: 1 ej. (AJR).

## PASERIFORMES

### LANIIDAE

## **Lanius collurio**

## **Alcaudón dorsirrojo - Capsot d'esquena roja - Red-backed Shrike**

Estatus: Migrante raro, nidificante raro muy localizado. Criterio: Todas las citas recibidas.

## 2016

**Morella:** 10.VI: 1 m. ad. (RPB, CFA).

**Villafranca del Cid:** 20.VII: se localizan 9 par. reproductoras en las cuadrículas 1x1 YK 2782, YK 2877,

YK2779, Y 2778 (RPB,ALR,JCMO).

**Alcossebre:** 05.IX: 1 juv. Única cita anual (DES).

**Vistabella del Maestrazgo:** 13.VIII: 1 juv. (CFA).

## 2017

**Villafranca del Cid:** 29.VI: aumenta a 11 par. reproductoras en las cuadrículas 1X1 YK 2878, YK2778, YK 3179, YK2782, YK 2881 Y YK2682 (RPB,ALR,JCMO).

**Castell de Cabres:** 09.VII: 1 m. posado en una zona de pastos con arbustos espinosos (VFT); 23.VII: 1 par. Reproducción comprobada (RPB,ALR).

**El Toro:** 08.VI: 1 par. y 1 m. ad. Primeras observaciones conocidas en la zona; 31.VII: 4 ej. ad. y pull. del año. Primera cita de reproducción confirmada en la comarca (MGT).

Continúa aumentando la población nidificante en la provincia de Castellón. Con estos nuevos registros son ya cuatro los núcleos reproductores: la Tinença, els Ports, l'Alcalatén (Penyagolosa) y Alto Palancia (El Toro).

## *Lanius meridionalis*

## Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike

Estatus: Residente moderado. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Alcossebre:** 07.VIII: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Quadro de Santiago:** 26.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Borriol:** 27.V: 1 par. en el barranco de Atzavara que saca 3 pull. (LPC).

**Albufera de València:** 29.VI: 1 par. en zonas de matorral abierto en la Devesa. Podría tratarse de un registro de reproducción (VBJ).

**Lagunas de Rabassa:** 21.VI: 1 ej. (AJR).

**Clot de Galvany:** 19.XI: 4 ej. (RBA).

**El Fondo d'Elx:** 07.VI: 1 ej. (AJR).

## 2017

**Quadro de Santiago:** 18.VI: 1 ej. Cita estival (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 2 ej. (JBC).

**Catarroja:** 23.V: 1 ej. en zonas de huerta (PVG).

**Albufera de València:** 28.V: citas de 1 ej. en zonas de transición entre huertas y arrozales de Trullàs (BDJ); 07.VI: 1 ej. en arrozales del Borrónar (PVG); 09.VII: 1 ej. en arrozales de l'Estell (BDJ).

**Lagunas de Rabassa:** 09.III: 8 ej. (JBN).

Destacamos las citas estivales y de reproducción en enclaves costeros o muy cercanos a la costa, donde hay pocos registros de reproducción.

## *Lanius senator*

## Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

## 2016

**Benicarló:** 17.III: 1 ej. en el casco urbano (JLA).

**Alcossebre:** 21.III: 1 m. ad. Primera cita anual; 12.IV: 14 ad. Importante concentración prenupcial (DES).

**Benicàssim:** 19.III: 1 ej. Primera cita anual; 21.V: 1 ej. Última cita primaveral; 15.VII: 1 m. ad. Primera cita postnupcial; 12.IX: 1 juv. Última cita anual (MTB).

**València:** 20.III: 1 ej. en zona de cultivo de naranjos junto a los arrozales del Brosquil de Cullera. Primera cita prenupcial (MAL,LAA); 11.IV: 1 m. de la ssp. *badius* en el Racó de l'Olla buscando alimento entre

vegetación palustre con tarays a orillas del canal del Racó de l'Olla (JID,IRU).

**Mislata:** 17.IV: 1 ej. transportando materiales para nido en el parque de la Canaleta (PAB).

**Clot de Galvany:** 20.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (SCEA).

## 2017

**Alcossebre:** 29.III: 1 h. ad. Primera cita primaveral; 13.VII: primer juv. (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 1 ej. (VET).

**Benicàssim:** 27.III: 1 h. Primera cita anual; 15.IV: 1 m. de la ssp. *badius*; 01.V: 3 ej. Máximo primaveral en recorrido de 0,9 km; 15.V: 1 h. Última cita primaveral; 27.X: 1 ej. aún con plumaje casi completamente juvenil (MTB).

**Quadro de Santiago:** 17.IV: 1 m. de la ssp. *badius* (MTB).

**Castellón de la Plana:** 30.III: 1 ej. (XBC).

**Albufera de València:** 26.III: 1 ej. anillado en l'Illa. Primer registro prenupcial (PMP); 14.IV: 1 ej. de la ssp. *badius* (AAC); 17.IV: 1 ej. de la ssp. *badius* en el tancat de la Pipa (AAC), posiblemente el mismo, anillado el 20.IV (AVA,YAM); 16.VII: 1 juv. anillado en Mília. Primer juv. del año (PMP).

**Salinas de Santa Pola:** 30.III: 1 ej. (SAR).

**La Marina:** 22.V: 8 ej. en varios recorridos por la sierra del Molar Este (EFAD).

Primeras citas bien sincronizadas en la segunda quincena de marzo y una última cita muy tardía a finales de octubre de un juv. aún sin mudar. Destacan igualmente el buen número de ej. de la ssp. balear *badius*.

## ORIOLIDAE

### ***Oriolus oriolus***

### **Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Alcalá de Chivert:** 17.IV: 1 ej. al menos un individuo oído, posiblemente más (IMR).

**Alcossebre:** 21.IV: 3 ad. Primera cita primaveral (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 24.IX: 5 ej. Última cita anual (MTB).

**Benicàssim:** 23.IV: 1 m. Primera cita anual; 19.VII: 1 juv. Primer juvenil del año (MTB).

**Alpuente:** 12.VI: 12 ej. (EJCP).

**Marjal de Xeresa - Xeraco:** 16.IV: 1 ej. (PLPROL).

**Bocairent:** 16.IV: 1 ej. (BOR).

**Monòver:** 14.IV: 1 ej. Primera observación anual (ELSO).

**Sierra de Escalona:** 20.IV: 2 ej. (PPP).

## 2017

**Alcossebre:** 15.IV: 1 ej. (GGO).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 03.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 31.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Castellón de la Plana:** 23.IV: 1 ej. Primera cita anual (MTB).

**Riba-Roja de Túria:** 13.VIII: grupo numeroso de 15-20 ej. y varios grupos más en recorrido de 4 km por el parque fluvial del Turia (MASA).

**Albufera de València:** 22.IV: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants. Primer registro primaveral (GLF); 12.IX: 1 m. en zonas arboladas próximas al Palmar (EGO).

**Requena:** 23.IV: 1 ej. Primera cita del año (JAI).

**Montroy:** 02.IX: 1 ej. (SAD).

**Desemb. río Segura:** 13.IX: 1 ej. (SAR).

## CORVIDAE

***Garrulus glandarius*****Arrendajo euroasiático - Gaig - Eurasian Jay**

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de interés

***Cyanopica cookii*****Rabilargo ibérico - Garsa blava - Azure-winged Magpie**

Estatus: Visitante ocasional. Criterio: Citas de interés.

**2016****Torreveja:** 18.I: 3 ej. volando hacia un seto de cipreses (NGA).***Pica pica*****Urraca común - Garsa - Common Magpie**

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

**2016****Vilanova d'Alcolea:** 12.I: 7 ej.; 08.III: 6 ej. (JLB).**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.VII: 11 ej. (JBC).**Marjal dels Moros:** 02.VIII: 30 ej. (EMRR).**Náquera:** 18.IX: 22 ej.; 13.XII: 19 ej. (JPH,RMQ).**Pantano de Elche:** 08.II: 13 ej. dormidero en carrizal (OAP).**El Fondo d'Elx:** 03.I: 11 ej. concentración destacada. No es habitual en el entorno (JMT); 15.II: 14 ej. aumenta el número de ej. en la zona (SAR).**2017****Desembocadura del río Seco:** 26.I: 32 ej. en grupo sobre un gran chopo. Máximo anual (MTB).**Marjal dels Moros:** 06.XII: 460 ej. saliendo del dormidero (GCH).**Olocau:** 10.VIII: concentración de 109 ej. en varios pinos (MAG).**Picanya:** 11.II: 25 ej. (SAD).**Albufera de València:** 25.I: grupo de 22 ej. en el entorno de Sollana (PAB).**Pantano de Elche:** 10.II: 61 ej. en dormidero (OAP).**Salinas de Santa Pola:** 28.XII: 24 ej. (OAP).

La colonización de las zonas costeras de la CV parece seguir avanzando con máximos crecientes ahora en el S de Alicante. Esta colonización, que comenzó a finales del s. XX, parece haberse producido de N a S. Es destacable el gran dormidero de la marjal dels Moros con 460 ej. Posiblemente la mayor concentración registrada en la CV.

***Pyrhcorax pyrrhcorax*****Chova piquirroja - Gralla de bec roig - Red-billed Chough**

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

**2016****Barracas:** 04.IX: grupo destacado de 70 ej. (FLL,EUG).**Albufera de València:** 29.V: 1 par. alimentándose en arrozales cercanos al Brosquill de Cullera; 14.VIII: 2 ej. en arrozales del Brosquill (LAA).**Ayora:** 05.XI: 40 ej. (RMB).**Confrides:** 20.XI: 81 ej. (JBN,NLM).**Cocentaina:** 31.I: 48 ej. (DMF); 25.VI: 38 ej. (BOR).**Xixona:** 26.XI: 160 ej. (JDL).

**Monòver:** 09.IX: 170 ej. (ELSO).

**Sierra de Mariola:** 03.III: 40 ej. (JCO,PAS); 12.X: 35 ej. (BOR).

## 2017

**Tuéjar:** 29.VII: grupo destacado de 50 ej. (PAB).

**Cullera:** 28.VIII: 2 ej. en la montaña de Cullera. Primer registro post reproductor (VBJ).

**Albufera de València:** 25.XI: 1 ej. alimentándose junto a avefrías en arrozales cercanos al Brosquil de Cullera (LAA).

**Ayora:** 03.XII: 100 ej. (VBJ).

**La Vall d'Ebo:** 08.XI: 200 ej. (PLP).

**Benifato:** 04.VIII: 100 ej. (VBJ).

**Cocentaina:** 01.II: 130 ej. (DMF).

**Font Roja:** 15.XI: 100 ej. (EDAS).

**Xixona:** 04.XI: 100 ej. (VBJ).

## **Corvus monedula**

## **Grajilla occidental - Gralla - Eurasian Jackdaw**

Estatus: Residente e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Albufera de València:** 05.I: 46 ej. en arrozales fangueados del clot de Castillo (BDJ); 20.I: 118 ej. acudiendo al atardecer a un dormitorio de garcilla bueyera (VPA); 22.I: 36 ej. en arrozales de Cullera (BDJ); 04.XI: 140 ej. en arrozales inundados del vedat de Cullera (JLE).

**Requena:** 11.XII: 140 ej. en un bando que se dirige al atardecer al dormitorio del casco urbano (JAI).

**Pantano de Elche:** 11.I: 330 ej. en dormitorio; 03.XII: 331 ej. en dormitorio (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 300 ej. (JMT); 20.VII: 500 ej. (AJR); 05.XI: 400 ej. (JPG).

## 2017

**Albufera de València:** 10.X: 2 ej. sobrevolando el tancat de l'Establiment. Primer registro otoñal (MCH).

**Requena:** 16.IV: 5 par. en los nidos de la cantera de caolín; 20.VII: 180 ej. salen desde el dormitorio (JAI); 02.IX: bando postnupcial de 45 ej. que entra a dormir a los jardines del casco urbano (RMB).

**Embalse d'Elx:** 05.XI: mínimo de 450 ej. en el dormitorio (JPG).

**Pantano de Elche:** 26.II: 92 ej. (JPG).

**Salinas de Santa Pola:** 21.IX: 30 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 07.IX: 200 ej.; 22.XII: 278 ej. (AJR).

La especie forma importantes dormitorios en distintos puntos de la provincia de Alicante, también en el interior de la de Valencia y en l'Albufera, aunque es muy escasa en Castellón.

## **Corvus corone**

## **Corneja negra - Cornella negra - Carrion Crow**

Estatus: Residente común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Barracas:** 10.VIII: 65 ej. (JBC).

**Ayora:** 05.XI: 12 ej. (GGO).

**El Fondet de la Senieta:** 15.II: 4 ej. especie muy inusual en la provincia (AJR).

**EDAR de Santa Pola:** 13.XII: 2 ej. (AJR,SAR).

## 2017

**Alcossebre:** 22.II: 1 ad. Única cita anual (DES).

**Alpuente:** 17.VI: 22 ej. (VBJ).

**Clot de Galvany:** 28.V: 1 ej.; 02.VI: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 01.II: 3 ej. (YAM).

***Corvus corax***

**Cuervo grande - Corb - Common Raven**

Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vilanova d'Alcolea:** 01.II: 32 ej. (VET); 01.VIII: 24 ej.; 06.VIII: 47 ej. (JBC).

**Sinarcas:** 22.IX: 43 ej. Concentración destacada (VBJ).

**2017**

**Vilanova d'Alcolea:** 21.VII: 59 ej. Importante concentración en el entorno del aeropuerto (MTB).

**Camporrobles:** 16.IX: 28 ej. bando laxo en vuelo al NO (RMB).

**Villena:** 30.IV: 36 ej. (BOR,DMF); 25.XII: 54 ej. en el suelo cerca del dormitorio (JMG).

**PARIDAE**

***Periparus ater***

**Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit**

Estatus: Residente abundante. Criterio: Citas de interés.

**2016**

Sin citas de interés

***Lophophanes cristatus***

**Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit**

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

**2017**

**Valencia:** 31.V: 1 ej. en los jardines de l'Oceanogràfic. Primer registro de la especie en la zona (PAB).

***Cyanistes caeruleus***

**Herrerillo común - Ferrerolet - Eurasian Blue Tit**

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

sin citas de interés

***Parus major***

**Carbonero común - Totestiu - Great Tit**

Estatus: Residente abundante. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de interés

**REMIZIDAE**

***Remiz pendulinus***

**Pájaro moscón europeo - Teixidor - Eurasian Penduline-tit**

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas en época de cría, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Quadro de Santiago:** 26.II: 30 ej. en varios grupos. Máximo anual destacado en censo de 2,5 km; 28.III: 2 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Marjal dels Moros:** 24.III: 32 ej. por toda la marjal (AAC).

**Albufera de València:** 02.IV: 3 ej. en zonas arboladas de la Pipa (BDJ); 14.X: 4 ej. (JCO).

**Clot de Galvany:** 01.III: 2 ej. inusual en el paraje; 14.XII: 5 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 04.III: 15 ej. (AJR); 26.III: 2 ej. (LLO,ALF).

**Desemb. río Segura:** 08.X: 1 ej. (AJR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 25.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 28.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 01.XI: 11 ej. Máximo anual en censo de 2,3 km (MTB, JAF).

**Marjal dels Moros:** 31.XII: 12 ej. (EAAN).

**Albufera de València:** 30.III: 1 h. capturada para anillamiento científico mostrando placa incubatriz incipiente en el tancat de la Pipa. Primera evidencia de reproducción de la especie en la zona en los últimos años (AVA, YAM); 19.VI: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Una de las pocas citas obtenidas en la reserva durante la primavera (JID); 01.VII: 1 ej. reclamando en la Pipa (PVG); 01.VII: 1 h. capturada para anillamiento mostrando placa incubatriz en regresión (MPB, GTR); 08.X: 1 ej. cantando la Pipa. Primer registro otoñal (JOB, EPS, YAM).

**El Fondo d'Elx:** 06.VIII: 5 ej. con 2 juv. (SAR).

## PANURIDAE

### *Panurus biarmicus*

### **Bigotudo - Serenet - Bearded Parrotbill**

Estatus: Residente raro muy localizado, visitante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: VUL.

## 2016

**Albufera de València:** 13.I: 1 ej. en la Ratlla al atardecer (PAB); 05.II: 4 ej. reclamando en zonas de carrizal de la Ratlla (DMO); 19.II: se escucha un mínimo de 3 ej. en zona de carrizo tupido en el tancat de la Ratlla (AAC); 30.V: se escucha en varias ocasiones el reclamo típico de una h. en la Mata del Fang 07.VI: de nuevo se escucha el reclamo de una h. en la Mata del Fang, respondida en varias ocasiones aparentemente por aves juv. (EGO, PVG).

**Marjal de Pego-Oliva:** 18.I: 1 ej. (RTV).

**El Fondo d'Elx:** 23.II: 1 h. ad.; 03.III: 1 ej. (AJR); 10.X: 2 ej. (SAR); 03.XII: 2 m. y 6 h. Grupo destacado (ABM, LDG); 13.XII: 2 ej. (JMT, OAP).

## 2017

**Albufera de València:** 09.I: 2 ej. en la la Ratlla (PAB); 27.I: 2 ej. en la orilla O de la laguna (DMO); 01.III: 3 ej. en Silla (ASI); 02.VI: 1 ej. reclamando en la Mata de Sant Roc (EGO, PVG); 17.IV: se escucha 1 ej. reclamando en diversas ocasiones en la punta del Llebeig (AAC); 03.V: se escuchan 2 ej. desde el tancat de la Pipa y al menos 2 ej. en la Punta de Llebeig (PVG); 31.V: se escuchan al menos 8 ej. en varios puntos de la mata de l'Antina. Las observaciones se referirían a al menos 2 par. y juv. nacidos este año (EGO, PVG).

**El Fondo d'Elx:** 08.I: 3 ej. (PCC); 08.I: 3 ej. (PCC, JEG); 06.IV: 3 ej. (OAP).

## ALAUDIDAE

### *Lullula arborea*

### **Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark**

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Alcossebre:** 02.XI: 4 ad. Única cita anual (DES).

**Mislata:** 13.III: 1 ej. encontrado muerto en pleno casco urbano de Mislata. Primer registro de la especie en el municipio (PAB, MPA).

**El Fondo d'Elx:** 09.I: 25 ej. (EBZ).

## 2017

**Benicàssim:** 12.III: 1 ej. Única cita anual (MTB).

***Alauda arvensis*****Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark**

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 18.X: 4 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Quadro de Santiago:** 27.I: 50 ej. Máximo invernal; 29.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 11.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Bocairent:** 06.I: 50 ej. (BOR).

**Marjal de Pego-Oliva:** 07.XII: 35 ej. (PLP).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 150 ej. (JMT); 11.XII: 160 ej. (JEG).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 29.I: 50 ej. Máximo anual; 04.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Burjassot:** 05.XII: 30 ej. (JGG).

**Mislata:** 29.X: primera cita postnupcial de 2 ej. en la huerta de Mislata. Se trata de una especie poco frecuente en la zona (PAB,ODB,MPA).

**Albufera de València:** 04.X: 4 ej. en zonas próximas al port de Silla. Primer registro otoñal (PMP).

**Elx:** 29.XII: 100 ej. (JBN).

**El Fondo d'Elx:** 27.I: 100 ej. (AJR).

***Galerida theklae*****Cogujada montesina - Cogullada fosca - Thekla Lark**

Estatus: Residente común, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2017**

**Desemb. río Mijares:** 11.III: 1 ej. (MBM).

Destacable registro en la plana de Castellón, donde apenas se conocen citas de la especie.

***Galerida cristata*****Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark**

Estatus: Residente común, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Ayora:** 04.XI: 30 ej. (GGO).

**El Fondo d'Elx:** 14.III: 8 ej. en un único bando (JMT,OAP).

**2017**

**Quadro de Santiago:** 24.III: 16 ej. Máximo prenupcial en recorrido de 1,2 km por pastizal (MTB).

**Godella:** 20.X: 50 ej. (JOB).

***Calandrella brachydactyla*****Terrera común - Terrerola - Greater Short-toed Lark**

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vilanova d'Alcolea:** 28.III: 1 ej. en vuelo. Primera cita prenupcial (VET).

**Quadro de Santiago:** 27.III: 3 ej. Primera cita anual; 23.IV: 1 ej. Última cita primaveral. Sin citas postnupciales (MTB).

**Albufera de València:** 28.III: grupo de 7 ej. en arrozales roturados de la Maquial. Primer registro prenupcial (BDJ).

**Alcocer de Planes:** 25.IX: 1 ej. (JBN).

**El Pinós:** 19.VI: 1 ej. (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 26.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 16.IV: 8 ej. Máximo primaveral; 24.V: 1 ej. Última cita primaveral; 14.VIII: 1 ej. Única cita postnupcial (MTB).

**Massamagrell:** 02.IX: 2 ej. reclaman en un campo abandonado entre naranjos (TPA,FTD).

**Camporrobles:** 04.VI: 4 ej. (RMB).

**Fuenterrobles:** 21.V: 3 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 24.IV: grupo de 14 ej. en un campo de cebollas recién roturado de la Maquia (BDJ).

**Alcozer de Planes:** 26.III: 13 ej.; 07.X: 1 ej. (PCC).

Notable sincronización de primeras citas a finales de marzo. Los máximos anuales se han producido en primavera, como es habitual. Las citas postnupciales son muy escasas, con un último registro a principios de octubre en Alcozer de Planes, dentro de la fenología habitual.

***Chersophilus duponti*****Alondra ricotí - Alosa becuda - Dupont's Lark**

Estatus: Nidificante raro muy localizado. Criterio: Censos de nidificantes, citas de interés. Conservación: PE.

**2016**

**Castielfabib:** 01.V: cantos de 4 ej. (RMB); 20.V: 1 ej. (AAC,VSA).

**2017**

**Castielfabib:** 03.III: cantos de 11 ej. diferentes (RMB).

***Melanocorypha calandra*****Calandria común - Calàndria comú - Calandra Lark**

Estatus: Nidificante raro localizado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Ayora:** 04.XI: 5 ej.; 05.XI: 3 ej. (GGO); 05.XI: 1 ej. (RMB).

**Villena:** 20.III: 14 ej. (JDL).

**Fontanars dels Alforins:** 04.VII: 1 ej. (PCC).

**2017**

**Villena:** 26.XII: 80 ej. en 2 grupos de 30 y 50 aves forrajeando en rastrojeras de cereal (JMG).

***Alaudala rufescens*****Terrera marismeña - Terrerola rojena - Lesser Short-toed Lark**

Estatus: Nidificante raro localizado, migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

**Quadro de Santiago:** 23.IV: 1 ej. en zona de saladar (MTB).

**El Saladar de Agua Amarga:** 21.V: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 07.VI: 2 ej. (AJR); 12.XI: 1 ej. (JCO).

**2017**

**El Fondo d'Elx:** 19.III: 1 ej. (EJFO); 01.IV: 5 ej. (MNG).

## PYCNONOTIDAE

***Pycnonotus jocosus*****Bulbul orfeo - Red-whiskered Bulbul**

Estatus: originario de la India y el SE asiático. Naturalizado. Categoría: C.

**2016**

**Bétera:** 13.VII: 3 ej. constatación de la cría en parcela de Bétera, urbanización Montesano (JLH).

**La Pobla de Vallbona:** 01.IV: 1 ej. (JBS).

**Paterna:** 03.VIII: 1 par. ad. (JBS).

**Mislata:** 05.III: 2 par. en almeces de jardín urbano (JAI).

## 2017

**l'Eliana:** 20.XII: 11 subad.+ ad. (JBS).

**Paterna:** 12.X: grupo de 12 ej. que suele venir a alimentarse por esta zona. Se les ve sobre adelfas, hibiscos, limoneros y hiedras cuando tienen fruto. Es una exótica habitual en la zona desde 2003 (EFJG).

**Benidorm:** 24.XII: 3 ej. (PLP).

## HIRUNDINIDAE

### ***Riparia riparia***

### **Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante común. Conservación: VUL.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 18.IX: 202 ej. Máximo anual en dormitorio; 06.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 26.II: 1 ej. Primera cita anual; 02.V: última cita primaveral de 4 ej. en paso (MTB).

**Marjal dels Moros:** 29.II: 1 ej. (JOB).

**Albufera de València:** 26.II: 2 ej. integrados en un bando de algo más de 100 aviones roqueros. Primera cita anual (JID); 29.VI: 21 ej. posados en un tendido telefónico junto al Palmar (MCH); 10.VII: grupo de 150 ej. posados en cables de líneas telefónicas. Primeras concentraciones postreproductoras destacadas (EPS); 23.VIII: concentración post-reproductora descada de más de 2.000 ej. en tendidos telefónicos del camí de l'Estell (YAM); 16.VIII: 500 ej. alimentándose en arrozales de Sollana (BDJ); 28.X: 2 ej. asociados a aviones roqueros en l'estany del Pujol (AAC); 05.XI: 1 ej. entre un grupo de golondrina común (EBZ); 05.XI: 1 ej. en el entorno del portet de Sollana (GGO).

**Gandía:** 10.V: nueva colonia de reducido tamaño (3 par.) establecida en un muro en las proximidades del barranco de San Nicolás (PLP).

**Pantano de Elche:** 25.I: 1 ej. (OAP).

**Clot de Galvany:** 21.III: 100 ej. concentración destacada (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 06.VI: 20 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 29.II: 2 ej. (AJR,SAR).

**Lagunas de Lo Monte:** 24.II: 10 ej. (PPP,TGR,CSN).

**EDAR de Santa Pola:** 04.XI: 1 ej. (OAP,SAR).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.III: 3 ej. Primera cita anual; 25.III: 71 ej. Máximo prenupcial; 08.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 01.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 28.V: 1 ej. Última cita primaveral tardía (MTB).

**Marjal dels Moros:** 19.VI: 1 ej. (SAD).

**Albufera de València:** 28.II: 1 ej. alimentándose junto con otros hirundínidos. Primera cita anual (JID, IRU); 17.VI: 1 ej. (GCH); 27.VI: 12 ej. posados sobre tendido telefónico. Primera observación postnupcial; 30.VI: 300 ej. Notable llegada de ej. en migración (MCH); 12.VII: concentración de 600 ej. en tendidos telefónicos (VLG,BDJ); 30.VIII: concentración de 650 ej. en tendidos telefónicos en el Palmar (BDJ).

**Requena:** 19.IV: 40 ej. sobrevolando el agua y posándose en las orillas, junto a un enorme bando de golondrinas comunes y algún avión común (JAI).

**Embalse d'Elx:** 26.II: 3 ej. en un bando de aviones roqueros, golondrinas y aviones comunes (JPG).

**Pantano de Elche:** 26.II: 3 ej. (JPG).

**Clot de Galvany:** 28.IV: 40 ej. (MAA); 31.V: 6 ej. (AJR,SAR); 21.VII: 22 ej. (JMT,JPG).

**Salinas de Santa Pola:** 28.II: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 05.III: 40 ej. (EAPC,EJMP); 27.VI: 2 ej. (EAVP).

**Hirundo rustica****Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow**

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 24.II: 1 ad. Primera cita primaveral; 23.IX: 1.800 ej. en paso al S en 1 h.; 13.XI: 5 ej. Última cita anual (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 18.IX: 1.660 ej. al amanecer levantándose de varios dormitorios; 24.IX: 1.233 ej. en paso hacia el S en 1,5 h. ; 12.XI: 2 ej. Última cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 11.II: 1 ej. Primera cita anual; 25.IX: 1.478 ej. alimentándose sobre el humedal y en paso hacia el S (MTB).

**Albufera de València:** 11.XI: 30 ej. en Milia (PMP); 17.XI: 1 ej. en la Pipa (PVG); 15.XII: 8 ej. en Milia (YAM).

**Alcoi:** 12.II: 4 ej. (PLP).

**Sant Vicent del Raspeig:** 19.I: 1 ej. (JDL).

**Alacant:** 3.000 ej. en paso el 13.IX en el parque La Marjal, más de 400 alimentándose sobre la laguna (EGM).

**Pantano de Elche:** 08.II: 1 ej.; 11.XI: 1 ej.; 15.XI: 1 ej. (OAP).

**Clot de Galvany:** 17.II: 1 ej. Primera cita prenupcial (SCEA); 11.XI: 1 ej. (AJR); 12.XI: 2 ej. (JMT,OAP).

**Salinas de Santa Pola:** 07.XII: 4 ej. (PAS); 08.XII: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 17.I: 1 ej.; 04.II: 8 ej.; 17.XI: 3 ej. (OAP); 25.XI: 1 ej. (JMT,OAP); 26.XI: 1 ej. junto con dáuricas, aviones comunes y roqueros (EAVP); 02.XII: 5 ej. (AJR,SAR).

**Desemb. río Segura:** 02.II: 1 ej. (AJR).

**Lagunas de Lo Monte:** 05.II: 1 ej. (AJR,SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 17.XI: 1 ej. (OAP,SAR); 13.XII: 1 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Cervera del Maestre:** 18.II: 2 ej. volando cerca del castillo junto a varios aviones roqueros (JBC).

**Benicàssim:** 06.IV: 246 ej. Máximo prenupcial en paso hacia el N 1 h. de censo; 02.IX: 140 ej. Máximo postnupcial discreto en paso hacia el S en 1 h. de censo; 11.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Islas Columbretes:** 13.II: 1 ej. (LGB).

**Moncofa:** 28.XII: 12 ej. (MIB).

**Quartell:** 06.XI: 45 ej. Cita tardía (AAC).

**Marjal dels Moros:** 18.II: 2 ej. volando junto a aviones roqueros (RPM).

**Albufera de València:** 16.II: 2 ej. en el Racó de l'Olla. Primeros registros anuales (JID,MCH); 11.XI: 6 ej. junto a avión roquero. Cita tardía (MPB); 24.XI: 10 ej. sobre la el tancat de Milia (PMP); 05.XII: 6 ej. en el tancat de Milia. Cita invernal (AAC); 09.XII: 2 ej. Cita invernal (MPB).

**Mislata:** 05.III: 5 ej. Primera cita prenupcial (PAB).

**Requena:** 28.IV: 700 ej. concentración de ej. en paso junto a unos 50 aviones comunes y 5 aviones zapadores (PRP,JGS).

**Alcocer de Planes:** 01.X: Censo estimado de 2.000 ej. en dormitorio (JBN).

**Pantano de Elche:** 05.II: 1 ej. (OAP).

**Santa Pola:** 03.XII: 2 ej. (EBST).

**El Fondo d'Elx:** citas en enero de 1 ej. los días 03 (JUI); 04 (EAAN); 06 (2 ej.) (EAAN); 08; 12.I (OAP) y 28 (EDBA); 04.II: 1 ej. (OAP,TGR); 23.XI: 6 ej. (OAP,SAR,MFS); 17.XII: 1 ej. (OAP).

**EDAR de Santa Pola:** 14.II: 1 ej. (OAP).

De nuevo se recogen varias citas plenamente invernales de golondrina, sobre todo en Alicante, aunque también en el entorno de la Albufera de València. Las máximas concentraciones anuales, como es habitual, se han observado durante el paso postnupcial en zonas costeras, especialmente humedales.

***Ptyonoprogne rupestris*****Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin**

Estatus: Residente nidificante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Peñíscola:** 05.III: 422 ej. jornada RAM (APN); 05.XII: 241 ej. jornada RAM (ELL,BGC).

**Alcossebre:** 23.III: 19 ad. Última cita anual; 18.X: 23 ej. Primera cita postnupcial (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 05.I: 1.300 ej. Máximo anual destacado (MTB); 09.II: 1.300 ej. alimentándose sobre el humedal (GGO); 13.III: 30 ej. (MBM).

**Borriol:** 12.II: 200 ej. bando sobre el casco urbano (LPC).

**Castellón de la Plana:** 24.III: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Burriana:** 15.III: 20 ej. (JBC).

**Requena:** 06.III: 15 ej. número elevado para la zona, quizás en paso (JAI).

**Cullera:** 18.IX: 2 ej. en el entorno del castillo. Primer registro postnupcial (VBJ,ASL,FGR).

**Alacant:** 10.X: 5 ej. Primeros de la temporada (EGM).

**El Fondo d'Elx:** 05.III: 100 ej. (JMT).

**2017**

**Peñíscola:** 14.I: 640 ej. jornada RAM (ELL,BGC).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 30.XI: 550 ej. alimentándose sobre el carrizal (GGO).

**Benicàssim:** 16.III: 4 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**La Vall d'Uixó:** 05.X: 6 ej. en migración al S (JBC).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 26.I: 378 ej. (JBC).

**Canet d'en Berenguer:** 03.X: 50 ej. Primera cita otoñal (TPA).

**València:** 09.III: 5 ej. Última cita invernal (PAB); 19.XII: 300 ej. (JGG).

**Cullera:** 01.X: 1 ej. en el entorno de la montaña de Cullera. Primer registro otoñal (VBJ).

**El Campello:** 12.X: 1 ej. (AJR).

**Pantano de Elche:** 26.II: 250 ej. (JPG).

**El Fondo d'Elx:** 14.I: 300 ej. concentración destacada (JMT,MAA).

***Delichon urbicum*****Avión común - Oroneta cua-blanca - Northern House Martin**

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante. Invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vinaròs:** 26.IX: censo destacado de cerca de 1.000 ej. en paso en 3 h. de observación (JLA,ELL,PML).

**Sant Jordi:** 18.II: 2 ej. (ELL,DFP).

**Alcossebre:** 14.X: 3 ad. Última cita anual (DES).

**Torreblanca:** 01.II: 2 ej. (IMR).

**Benicàssim:** 01.V: 242 ej. Máximo anual; 25.IX: 190 ej. Máximo anual en colonia de cría; 12.X: 8 ej. Última cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 11.I: 1 ej. junto con avión roquero (MCH); 10.II: 1 ej. sobrevolando arrozales del rec del Diputat (BDJ); 16.XI: 3 ej. en l'estany del Pujol (YAM); 02.XII: 1 ej. junto con avión roquero en el tancat de la Pipa (PVG); 09.XII: cita invernal de 1 ej. volando en un grupo de aviones roqueros (PAB); 07.XII: 3 ej. en la Pipa (PVG).

**Pantano de Elche:** citas en enero de 1 ej. el 04 y el 11; 5 ej. el 21, subiendo a 10 ej. el 25 y a 12 ej. el 26; 08.II: 80 ej. aumento notorio de individuos; 15.XI: 1 ej.; 21.XI: 1 ej.; 01.XII: 1 ej. (OAP).

**Clot de Galvany:** 27.I: 10 ej. (AJR); 28.I: 2 ej. (SCEA); 31.I: 2 ej. (JMT,OAP).

**Salinas de Santa Pola:** 15.I: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 17.XI: 5 ej.; 28.XI: 2 ej.; 28.XI: 2 ej. (OAP); 13.XII: 1 ej. (JMT,OAP); 14.XII: 1 ej. (YAM).

**EDAR de Santa Pola:** 31.I: 20 ej. (JMT,OAP).

**2017**

**Santa Magdalena de Pulpis:** 18.II: 1 ej. entrando en un nido de la iglesia, sacando hierba seca. Pelea con gorriones comunes por el mismo nido (JBC).

**Torreblanca:** 19.II: 1 ej. Primer avistamiento en la zona este año (IMR).

**Benicàssim:** 19.II: 1 ej. en dormitorio junto a avión roquero. Primera cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 25.III: 249 ej. concentración primaveral sobre la marjal (MTB).

**Islas Columbretes:** 13.II: 1 ej. (LGB).

**Albufera de València:** 04.I: 13 ej. en la Pipa. La mayor cifra invernal registrada hasta la fecha en l'Albufera (PVG); 11.II: 1 ej. en el racó de l'Olla (JOB).

**Cullera:** 11.XI: 4 ej. en el casco urbano junto a avión roquero. Cita tardía (MPB).

**Chera:** 18.II: 1 ej. Primera cita anual (PRP).

**Requena:** 11.VI: 94 par. Censo de 82 nidos ocupados y 12 posiblemente ocupados (JAI).

**Marjal de Pego-Oliva:** 20.III: 300 ej. (EJFO).

**La Romana:** 28.I: 25 ej. Primera cita prenupcial (PMON).

**Pantano de Elche:** 31.I: 1 ej.; 05.II: 3 ej.; 07.II: 7 ej.; 18.II: 50 ej. (OAP).

**Elx:** 08.I: 1 ej. (BOR,EBP,DMF); 02.II: 1 ej. (OAP).

**Clot de Galvany:** 17.I: 1 ej. (SCEA); 17.XII: 1 ej.; 22.XII: 4 ej. junto a avión roquero (EBST).

**El Fondo d'Elx:** 07.I: 1 ej.; 12.I: 1 ej. (OAP); 04.II: 7 ej. (OAP,TGR); 18.II: 100 ej. (OAP,JMT); 01.XII: 3 ej. (AJR,SAR); 15.XII: 1 ej.; 17.XII: 1 ej. (OAP).

Importante aumento de las citas plenamente invernales, sobre todo en Alicante, donde se ha convertido en un invernante regular. Las llegadas de los primeros ejemplares migrantes están bien sincronizadas a mediados de febrero.

***Cecropis daurica******Golondrina dáurica - Oroneta cua-rogenca - Red-rumped Swallow***

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Morella:** 14.IV: 1 par. nueva localidad cría en el interior; 29.VI: 1 par. (RPB).

**Ares del Maestre:** 08.VI: 1 par. (RPB).

**Alcossebre:** 10.IX: 30 ej. censo destacado (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 28.II: 2 ej. (MBM); 18.IX: 20 ej. Máximo postnupcial (MTB).

**Benicàssim:** 26.II: 2 ej. Primera cita anual; 01.IV: máximo anual de 16 ej. en paso; 04.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 11.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Barracas:** 13.VI: 3 ej. Primera observación en la localidad en época de cría; 25.VIII: 1 par. nido encontrado en un túnel de la autovía (MGT).

**Albufera de València:** 26.II: 1 ej. en el Racó de l'Olla integrado en un bando de algo más de 100 aviones roqueros. Primera cita anual (JID); 19.IX: 25 ej. junto con avión común; 05.X: 60 ej. al atardecer en zonas de huertos del Dosel de Cullera. Mayor grupo registrado hasta la fecha en l'Albufera y su entorno (ASL); 27.XII: 1 ej. en el Tancat de la Pipa (AVA).

**El Pinós:** 09.VII: 8 ej. (AJR).

**Pantano de Elche:** 08.II: 1 ej.; 30.VII: 100 ej. Primeras concentraciones postreproductoras de importancia en dormitorio; 19.VIII: 300 ej. dormitorio (OAP).

**Clot de Galvany:** 17.II: 1 ej. Primera cita prenupcial (AJR).

**Salinas de Santa Pola:** 25.II: 2 ej. (AJR,SAR).

**Santa Pola:** 13.IX: 50 ej. (EKAO).

**El Fondo d'Elx:** 05.I: 2 ej. (OAP); 26.II: 8 ej. (PLP); 05.III: 30 ej. (JMT); 17.XI: 2 ej. (OAP); 18.XI: 1 ej. (JM-T,OAP); 26.XI: 1 ej. (EAVP).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.III: 3 ej. (MBM); 21.X: 7 ej. Última cita anual (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 08.IX: 95 ej. en paso hacia el S al atardecer en poco más de media hora. Concentración destacada (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 25.XI: 1 ej. (MBM).

**Albufera de València:** 28.II: 1 ej. en el Racó de l'Olla alimentándose junto con otros hirundínidos. Primera cita anual (JID,IRU); 04.X: concentración postnupcial destacada de 30 ej. al atardecer (ASL).

**Requena:** 23.IX: 4 nidos con signos de haber sido ocupados en los alrededores del pueblo (JAI).

**Pantano de Elche:** 19.II: 1 ej. (OAP).

**Elx:** 28.II: 5 ej. (SCR).

**Clot de Galvany:** 17.I: 1 ej. (SCEA); 27.XI: 1 ej. (EBST); 26.XII: 1 ej. (AJR).

**Santa Pola:** 10.IX: 250 ej. (EKAO).

**El Fondo d'Elx:** 02.I: 2 ej. (OAP,TGR); 18.II: 1 ej. (OAP,JMT); 16.XI: 1 ej. (PLP); 16.XI: 1 ej. (PLP); 01.XII: 1 ej. (AJR,SAR).

Destacan las nuevas localidades de cría en la comarca dels Ports y del Alto Palancia en Castellón y las importantes concentraciones costeras, desconocidas hace años, lo que evidencia el aumento paulatino de esta especie en la CV. También son relevantes las citas invernales en el Hondo de Elche.

**SCOTOCERCIDAE*****Cettia cetti*****Cetia Ruiseñor - Rossinyol bord - Cetti's Warbler**

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Quadro de Santiago:** 12.IV: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).

**El Fondo d'Elx:** 10.IX: 1 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 07.I: 25 ej. Máximo invernal en recorrido de 2,3 km; 01.V: varias citas de 1 ej. cantando en mayo y junio, nidificante muy escaso en la zona; 01.XI: 40 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 2,3 km (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 27.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 02.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**València:** 26.IX: primera cita postnupcial de 1 ej. cantando en el cauce viejo del Turia donde permanecen todo el invierno (PAB).

**AEGITHALIDAE*****Aegithalos caudatus*****Mito común - Senyoreta - Northern Long-tailed Tit**

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 09.XI: 4 ej. Primera cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 13.XI: primera cita invernal de 6 ej. que permanecen en pinada todo el invierno (MTB).

**2017**

**Alcossebre:** 30.X: 2 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 14.I: citas invernales de un pequeño grupo a lo largo del mes de enero en una pinada litoral (MTB).

**Albufera de València:** 21.II: dos nidos en construcción en la pinada del Racó de l'Olla. Primeros nidos de la temporada (MCH,JID,GGA).

**Clot de Galvany:** 08.XII: 12 ej. (AJR).

## PHYLLOSCOPIDAE

### *Phylloscopus sibilatrix*

### Mosquitero silbador - Mosquiter xiulaire - Wood Warbler

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### 2016

**Benicàssim:** 09.IV: 1 ej. Única cita anual (MTB).

**Almassora:** 27.IV: 1 ej. alimentándose en unos olmos (XBC).

**Albufera de València:** 06.IV: 1 ej. en zonas arboladas de la Devesa. Primer registro prenupcial (ASI); 08.IV: 1 ej. en zonas arboladas del Racó de l'Olla (AAC); 15.IV: 1 ej. en zona arbolada del Palmar (AAC); 15.IV: 1 ej. cantando en el Racó de l'Olla en zona de caducifolios (JID,MCH); 27.IV: 1 ej. en la Pipa (PVG); 04.V: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants (AAC).

**Elx:** 26.IV: 1 ej. encontrado muerto en la playa con una pata rota (JMT).

#### 2017

**Alcossebre:** 28.IV: 1 ad. Única cita anual (DES).

**Benicàssim:** 23.IV: 1 ej. Única cita anual (MTB).

**València:** 11.IV: 1 ej. comiendo en álamos blancos del Racó de l'Olla. Primera cita prenupcial (MCH,JID,GGA); 3 ej. anillados en Milia los días 20, 21 y 22.IV (PMP); 22.IV: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants (GLF); 23.IV: 1 ej. anillado en l'Illa (PMP); 25.IV: 1 ej. cantando en una chopera en el Saladar (PMP); 27.IV: 1 ej. en la Pipa (AVA); 27.IV: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants (BDJ); 01.V: 1 ej. (posiblemente 2) en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants (JOB).

**Requena:** 24.IV: 1 ej. en álamos blancos del soto fluvial (JAI).

**Altea:** 20.IV: 2 ej. anillados (JLJ).

**Albufera de Gaianes:** 24.IV: 2 ej. (BOR).

**Font Roja:** 20.IV: 1 ej. (JBN).

**Alacant:** 30.IV: 1 ej. (JMT).

**Elda:** 30.IV: 1 ej. (JLJ).

**Clot de Galvany:** 24.IV: 5 ej. (JPG); 27.IV: 1 ej. (AJR).

### *Phylloscopus bonelli*

### Mosquitero papialbo - Mosquiter pàl·lid - Western Bonelli's Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

#### 2016

**Alcossebre:** 17.VII: 1 ad. Única cita anual (DES).

**Benicàssim:** 14.IV: 20 ej. en una pequeño pinar de 2 ha; 04.V: 1 ej. Última cita primaveral; 12.VI: 1 ej. Cita estival en una pequeña pinada; 15.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Albufera de València:** 20.III: 1 ej. (CFA); 22.III: 1 ej. anillado en la Pipa (AVA,YAM); 17.IV: 15 ej. Paso marcado de migrantes en diferentes zonas de l'Albufera (JGOM,CTA).

**Mislata:** 17.IX: Última cita postnupcial de 1 ej. en el parque de la Canaleta (PAB).

**Clot de Galvany:** 29.III: 1 ej. (AJR).

#### 2017

**Alcossebre:** 10.V: 1 ej. Última cita prenupcial (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.V: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB,JAF).

**Benicàssim:** 27.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 02.IV: 13 ej. Máximo primaveral en una pequeña pinada

de 2 Ha.; 11.VIII: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 18.III: 1 ej. en La Devesa. Primera cita anual, la más temprana de las registradas en Birding Albufera (GGO); 27.III: 2 ej. en la Ratlla (VBJ).

**Alborache:** 31.VIII: 1 ej. (EJNA).

### ***Phylloscopus inornatus* Mosquitero bilistado - Mosquiter de doble ratlla - Yellow-browed Warbler**

Estatus: Divagante de Asia Central y Oriental. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 93/69 (oct-ene).

#### **2016**

**Benicarló:** 18.X: 1 ej. en el casco urbano (JLA).

**Benicàssim:** 06.I: 1 ej. Cita invernal; 24.XI: 1 ej. Única cita postnupcial (MTB).

**Almassora:** 02.XI: 1 ej. (MMV).

**Burjassot:** citas de 1 ej. los días 19.X y 22.X (JOB).

**Albufera de València:** 08.X: 1 ej. reclamando durante varios minutos en zonas arboladas de pino cerca de la gola del Pujol. Primer registro anual. Observado también el día 14.X (BDJ,GCH,LAA); 09.X: 1 ej. reclamando en zonas de bosque de ribera del Racó de l'Olla, Observador también el 10 y el 11.X (GCH); 17.X: 1 ej. cantando en zonas arboladas cerca de l'estany del Pujol. Observado también el 19, el 22 y el 23.X y probablemente el 7.XI (DMO); 07.XI: 1 ej. a les Gavines (RMB); 30.XI: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC); 03.XII: 1 ej. anillado en Milia. Se trataría del mismo ej. observado a finales de noviembre en esta misma localidad (JMR,MPB,PMP).

**Cullera:** 22.X: 2 ej. observados alimentándose en zonas arboladas próximas a uno de los accesos de la Basa de Sant Llorenç. Un nuevo registro en un año en el que se ha registrado la mayor irrupción de aves en Europa hasta la fecha (BDJ); 22.X: 1 nuevo ej. en zona de pinos cerca del campo de tiro de Cullera (AAC); 02.XI: 2 ej. observados en el entorno del cabeçol. Uno de ellos observado también los días 4 y 5.XI (EPS).

**Cabo de Cullera:** 22.X: 1 ej. observado en zona de pinos en el cabo de Cullera (BDJ).

**Mislata:** 16.X: cita postnupcial de 1 ej. emitiendo reclamo en la pinada del hospital militar. Segunda cita de la especie para la localidad (PAB).

**Xeraco:** 23.X: 1 ej. (PLP).

#### **2017**

**Desert de Les Palmes:** 09.X: 1 ej. alimentándose en unos algarrobos (VET).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 06.XI: 1 ej. en olmos de Quartell, observado y escuchado reclamando (AAC); 06.XI: 1 ej. en el camí de l'Assagador (AAC).

**Albufera de València:** 07.X: 1 ej. cantando en zonas arboladas de la Sanxa. Primer registro otoñal (PLP); 08.X: 1 ej. cantando en zonas arboladas de l'Aterissador (YAM); 08.X: 1 ej. cantando y observado a lo largo de toda la mañana en zonas arboladas próximas al centro de visitantes de la Pipa (AVA,JOB); 10.X: 1 ej. en la pinada del Racó de l'Olla (MCH); 08.XI: 1 ej. (GGO).

**Xàtiva:** 22.X: 1 ej. fotografiado en bebedero (JVE).

Dos buenos años de citas de mosquitero bilistado, la gran mayoría en el enorno de l'Albufera, como es habitual. La especie sigue siendo muy rara en Alicante, que solo cuenta con 2 citas en 2015 en Altea. Por otro lado, recogemos la primera cita para el mes de enero de un ave observada en Benicàssim.

### ***Phylloscopus trochilus* Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler**

Estatus: Migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Alcossebre:** 17.III: 1 ad. Primera cita anual; 21.VIII: 1 ad. Primera cita postnupcial; 25.X: 1 ej. Última cita anual (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Benicàssim:** 19.III: 1 ej. Primera cita anual; 02.V: 10 ej. Máximo prenupcial en censo de 0,9 km (MTB).  
**València:** 28.IV: 1 ej. Última cita prenupcial de 1 ejemplar en los jardines del Oceanogràfic (PAB).  
**Albufera de València:** 20.III: 2 ej. en zona de tarajes del tancat de la Ratlla. Primera cita prenupcial (AAC);  
 20.III: 3 ej. (CFA); 22.III: 3 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primeras observaciones  
 (AVA, YAM); 04.VI: 1 ej. mostrando rasgos propios de la subespecie *acredula*, anillado en la Ratlla. Cita  
 prenupcial tardía (JGAC); 25.VIII: 3 ej. anillados en la Torre de Ampa. Primer registro postnupcial (PMP).  
**Cullera:** 21.X: 1 ej. en zonas de cultivos abandonados del mareny de Sant Llorenç. Cita tardía (EPS).  
**Guadalest:** 22.III: 1 ej. (EJMA).  
**Altea:** 19.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (TZL, EGM).  
**Clot de Galvany:** 21.III: 1 ej. Primera observación prenupcial (AJR).  
**Río Magro, San Juan:** 24.IV: 20 ej. Paso numeroso en el bosque de ribera (JAI).

## 2017

**Alcossebre:** 27.III: 1 ad. Primera cita anual; 21.VIII: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).  
**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 1 ej. (VET).  
**Desert de Les Palmes:** 30.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).  
**Benicàssim:** 21.III: 1 ej. Primera cita primaveral; 28.IV: 15 ej. Máximo prenupcial en recorrido de 0,9 km;  
 09.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 11.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).  
**Castellón de la Plana:** 06.IX: 20 ej. Máximo postnupcial en censo de 1,2 km en naranjales (MTB).  
**Paterna:** 27.III: 4 ej. (JOB).  
**Mislata:** 27.IX: Última cita postnupcial de 1 ej. en el parque de la Canaleta (PAB).  
**Requena:** 01.V: 1 ej. (JAI); 23.IX: 6 ej. Paso en el soto fluvial (JAI).  
**Albufera de València:** 11.III: 2 ej. anillados en l'Illa. Primer registro primaveral (PMP); 26.III: 12 ej. anilla-  
 dos en l'Illa. Llegada marcada de migrantes (PMP); 23.IV: 1 ej. mostrando rasgos propios de la subesp.  
*acredula* en la l'Illa (PMP); 19.VIII: 1 ej. anillado en l'Illa. Primer registro postnupcial (MPB).  
**Oliva:** 17.X: 1 ej. (EAJA).  
**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 27.IV: 20 ej. (SAR).

## ***Phylloscopus collybita***

## **Mosquitero común - Mosquitero común - Common Chiffchaff**

Estatus: Nidificante raro localizado. Migrante e invernante abundante. Criterio: Citas estivales, fechas extremas, censos  
 destadados y citas de interés.

## 2016

**Alcossebre:** 29.IV: 1 ad. última cita prenupcial (DES).  
**Benicàssim:** 22.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).  
**El Toro:** 14.VI: varios machos cantando (MGT).  
**València:** 28.IV: Última cita prenupcial de 1 ej. en los jardines del Oceanogràfic (PAB).  
**Albufera de València:** 22.IV: 2 ej. capturados para anillamiento en la el tancat de la Pipa. Últimas citas  
 prenupciales (AVA); 29.IX: 1 ej. en unos tarajes altos del Pujol Vell. Primera cita postnupcial (JID); 03.XII: 1  
 ej. mostrando rasgos propios de la subespecie norteña *abietinus* anillado en Milia (JMR, MPB, PMP).  
**Carcaixent:** 10.VII: 1 ej. (EJMO).  
**Sierra de Mariola:** 31.XII: 1 ej. de la ssp. *tistis*. Identificación confirmada por fotografía y reclamo (JEG).

## 2017

**Alcossebre:** 24.V: 1 ej. Cita prenupcial muy tardía; 07.X: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).  
**Penyagolosa:** 17.VI: 1 ej. Reproducción posible (JPH).  
**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 07.I: 81 ej. Máximo invernal en censo de 2,3 km. 24 de ellos en unos 150 m  
 en un canal con vegetación orientado al S alimentándose de insectos en la superficie del agua (MTB, JAF).  
**Benicàssim:** 10.V: 1 ej. cantando. Cita primaveral tardía (MTB).  
**Castellón de la Plana:** 30.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 05.XI: 24 ej. Máximo postnupcial en censo de

1,2 km en naranjales (MTB).

**Burriana:** 30.V: 1 ej. cantando en el bosque de ribera de la desembocadura del río Anna (JCA).

**Domeño:** 26.VII: 3 ej. (MASA).

**Albufera de València:** 03.V: 1 ej. cantando en el tancat de la Pipa. Últimas citas prenupciales (PVG); 03.VI: 1 ej. anillado en l'Illa. Cita prenupcial tardía (PMP); 05.X: 1 ej. cerca de l'estany del Pujol. Primer registro otoñal (JLE); 29.X: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. *tristis* anillado en Milia. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO (PMP).

**Font Roja:** 21.V: 3 ej. cantando; 10.VI: 1 ej.; 01.VII: 1 ej. cantando (BOR).

**Clot de Galvany:** 24.VI: 1 ej. (SMO).

**El Fondo d'Elx:** 03.VI: 1 ej. cantando (JMT,GLI).

**Rio Polop:** 03.VI: 1 ej. cantando (BOR).

Notable presencia de ejemplares tardíos durante el mes de mayo e incluso del mes de junio en 2017 en toda la geografía de la CV. Se detecta la posible nidificación en el entorno del Peñagolosa y en El Toro.

### ***Phylloscopus ibericus***

### **Mosquitero ibérico - Mosquiter ibèric - Iberian Chiffchaff**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2016**

**Font Roja:** 26.V: 1 ej.; 01.VII: 2 ej. (PCC).

**Isla de Tabarca:** 16.IV: 1 ej. (PIC).

#### **2017**

**Tuéjar:** 27.IV: 2 ej. (YAM).

**Albufera de València:** 22.II: 1 ej. cantando la Pipa. Primera cita prenupcial temprana (PVG), observado de nuevo el 24.II (AVA).

**Penyal d'Ifach:** 09.VIII: 2 ej. (ESAR).

**Polop:** 10.VIII: 3 ej. (ESAR).

**Benidorm:** 05.IX: 1 ej. en la serra Gelada (EJPR).

**Font Roja:** 30.IV: 1 ej. (JCO); 03.V: 1 ej.; 06.V: 1 ej. (PCC); 07.X: 1 ej. (JBN).

**Clot de Galvany:** 10.VIII: 1 ej. (ESAR).

**Isla de Tabarca:** 27.III: 2 ej.; 28.III: 1 ej. capturada para su anillamiento científico; 31.III: 3 ej. capturada para su anillamiento científico (PIC).

**Serra Mariola:** 10.IX: 2 ej. observados y reclamando en dos puntos diferentes; 16.IX: continúa 1 ej. reclamando cerca de una balsa; 17.IX: 1 ej. (BOR).

La identificación en el campo del mosquitero ibérico es complicada a no se que el ave se esuche cantando o reclamando, esta identificación es especialmente complicada en otoño, cuando aún en mano, puede resultar muy difícil su determinación, por ello, hay que tomar con precaución las citas de visu, especialmente las postnupciales. Son en cualquier caso, destacables, las citas tempranas de finales de febrero en l'Albufera, ya que la especie no suele observarse en nuestra región hasta mediados o finales de marzo.

## ACROCEPHALIDAE

### ***Acrocephalus arundinaceus***

### **Carricero tordal - Xitxarrot - Great Reed-warbler**

Estatus: Estival nidificante moderado localizado, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Albufera de València:** 08.V: 8 ej. cantando en una acequia de unos 3 km entre arrozales del Brosquill de Cullera. Se repite la densidad detectada el año anterior en la misma zona (MAL,LAA); 25.X: 1 ej. anillado

en el Pujol Vell. Última cita otoñal (JGAC).

**Oliva:** 17.X: 1 m. cantando. Cita tardía (PLP).

**Clot de Galvany:** 21.III: 1 ej. Primera observación prenupcial (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 16.III: 1 ej. (OAP).

### 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 03.VI: máximo destacado de 11 m. cantando en 2,3 km de recorrido (MTB, JAF).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.X: 1 m. cantando (BSS).

**Marjal dels Moros:** 12.X: 1 ej. (GCH); 17.X: 1 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 18.III: 1 ej. capturado para anillamiento. Se trataría del registro más temprano en l'Albufera (MPB,GTR,PMP); 11.X: 1 ej. anillado en la Pipa. Cita tardía (AVA).

**El Fondo d'Elx:** 22.III: 1 ej. (PLP); 24.III: 1 ej. cantando (ASS).

## ***Acrocephalus melanopogon***

## **Carricerín real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler**

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

### 2016

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 08.III: 8 ej. cantando (RMB).

**Albufera de València:** 19.II: 5 ej. cantando con insistencia en el tancat de la Ratlla (AAC); 07.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera observación de un ave nacida durante el presente año (PVG).

**El Fondo d'Elx:** 26.III: 3 ej. (LLO,ALF); 13.XII: 1 ej. cantando (JMT,OAP).

### 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.V: máximo primaveral destacado de 28 m. cantando en recorrido de 2,3 km (MTB,JAF).

**Desemb. río Mijares:** 04.VII: 1 ej. Escaso en la zona (MBM).

**Albufera de València:** 02.III: 1 ej. capturado para anillamiento la Pipa con anilla francesa (AVA); 03.VI: 2 juv. anillados en l'Illa. Primer registro de aves nacidas la presente temporada de cría (PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 28.II: 2 ej. (PLP).

**Altea:** 05.III: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 24.II: 5 ej. (AJR); 21.III: 2 ej. (EDW); 07.IV: 1 ej. (JBN).

Destaca la importante concentración prenupcial de ejemplares en el Prat de Cabanes-Torreblanca, que es una de las mejores zonas de cría de la especie en la CV.

## ***Acrocephalus paludicola***

## **Carricerín cejudo - Xitxarra d'aigua - Aquatic Warbler**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

### 2016

**Quadro de Santiago:** 23.IV: 1 ej. en una pequeña balsa con carrizo y juncos. Quizás el mismo, observado de nuevo el día siguiente (MTB).

**Albufera de València:** capturas en el marco de una campaña de anillamiento de carricerín cejudo: 3 ej. los días 10.IV (MPB,JMP,GTR), 11.IV (MPB,GTR) y 12.IV; y 1 ej. el 22.IV (PMP) y el 23.IV (PMP,JMR).

### 2017

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 14.IV: 1 ej. (AAC).

**Marjal dels Moros:** 12.IV: 1 ej. (AAC,AAD).

**Albufera de València:** 26.IV: 1 ej. cantando en un pequeño masegar en la mata del Fangaret. Primer registro anual (PVG,EGO).

**Acrocephalus schoenobaenus****Carricera común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler**

Estatus: Migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Quadro de Santiago:** 09.IV: 9 ej. Máximo primaveral destacado en censo de 2,5 km (MTB).

**Albufera de València:** 28.II: 1 ej. anillado en Milia. Primer registro prenupcial temprano (JMR); 02.IV: 6 ej. anillados en Milia (PMP); 24.VII: 1 ej. anillado en Milia. Primer registro postnupcial (PMP); 14.X: 1 ej. en el tancat de la Pipa (JCO); 12.X: 1 ej. anillado en Milia. Cita tardía (PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 22.II: 2 ej. (FAN).

**El Pinós:** 22.V: 9 ej.; 09.VII: 5 ej. (AJR).

**Clot de Galvany:** 23.VI: 3 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 18.II: 3 ej. Primera cita anual muy temprana (JMT,MFS); 03.III: 1 ej. (JMT,FBO).

**2017**

**Albufera de València:** 02.III: 1 ej. anillado en el tancat de La Pipa. Primera cita prenupcial temprana (AVA); 24.III: 4 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa (AVA,YAM); 30.III: 4 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa (AVA,YAM); 28.V: 2 ej. anillados en l'Illa (PMP); 22.VII: 1 ej. anillado en l'Illa. Primer registro postnupcial (MPB); 29.VII: 6 ej. anillados en Milia (PMP); 09.IX: 4 ej. anillados en Milia (JMR).

**Marjal de Pego-Oliva:** 25.II: 2 ej. capturados en estación de anillamiento (EJMO).

**Alacant:** 05.V: 1 ej. (AJR).

**El Pinós:** 02.IX: 12 ej. concentración destacada (AJR,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 04.III: 1 ej. (PCC,JEG); 07.X: 1 ej. (SMO).

**Acrocephalus scirpaceus****Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.IX: 23 ej. Máximo anual en censo de 1,8 km; 19.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Benicàssim:** 13.XI: 1 ej. Cita tardía en campos abandonados de naranjos (MTB).

**Castellón de la Plana:** 29.III: 1 ej. Primera cita anual en la desem. del río Seco (MTB).

**Marjal dels Moros:** 29.XII: 2 ej. (YAM).

**Alboraya:** 10.V: 10 ej. cantando en el bc. del Carraixet en 16,5 Ha censadas (0,60 macho/Ha) (RMB).

**Valencia:** 07.VI: Última cita prenupcial tardía de 1 ej. en cañas del cauce viejo del Turia junto al Oceanogràfic (PAB).

**Albufera de València:** 23.I: 1 ej. anillado en Milia. Primer registro plenamente invernal que se obtiene en el entorno de l'Albufera (PMP); 20.II: 1 ej. cantando en la Ratlla. Primer registro temprano (VPA); 28.II: 1 ej. anillado en Milia (JMR); 07.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera observación de un ave nacida durante el presente año (PVG); 17.XI: 1 ej. cantando en la Pipa. Cita tardía (PVG); 10.XII: 1 ej. anillado en Milia. Un nuevo registro invernal tras las primeras citas en un mes de diciembre del año 2011 (MPB).

**Río Algar:** 02.IV: 1 ej. recuperado carricero anillado en Holanda (TZL,EGM); 03.XII: 1 ej. capturado para su anillamiento. Cita muy tardía que podría corresponder a un ej. invernante (TZL).

**Pantano de Elche:** 03.XI: 1 ej. (OAP); 04.XI: 2 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 09.I: 1 ej. escuchado entre los carrizos (NGA); 14.XII: 1 ej. oído uno cantando (GGO).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 08.IV: 1 ej. Primera cita primaveral; 04.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 21.V: máximo primaveral de 12 m. cantando en recorrido de 2,4 km (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 06.XII: 1 ej. (MBM).

**Marjal dels Moros:** 12.I: 1 ej. (YAM).

**Valencia:** 05.IV: primera cita prenupcial de 2 ej. en una zona de cañas de l'Oceanogràfic; 05.VI: Última cita prenupcial de 1 ej. en el cauce viejo del Turia junto a l'Oceanogràfic (PAB).

**Mislata:** 28.V: Última cita prenupcial de 1 ej. en la huerta de Mislata (PAB).

**Albufera de València:** 22.III: 1 ej. cantando en un canal perimetral del tancat de Mília. Primera cita prenupcial (PVG); 09.VI: 3 juv. anillados en la Pipa. Primeros registros de aves nacidas la presente temporada de cría (AVA); 24.XI: 1 ej. anillado en l'Illa. Cita excepcionalmente tardía (PMP).

**Requena:** 02.VII: 1 ej. canto en el carrizal de una orilla. Probable reproductor (JAI).

**El Fondo d'Elx:** 04.III: 1 ej. Primera cita primaveral (JEG); 25.XI: 1 ej. cantando (EMAX).

### ***Iduna opaca***

### **Zarcero Bereber - Bosqueta pà'l·lida - Western Olivaceous Warbler**

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

#### **2016**

**Albat de la Ribera:** 23.V: mínimo de 2 m. cantando en zona de chopos en la orilla del río Júcar (AAC).

**Cocentaina:** 21.V: 4 m. cantando y 1 h. (BOR,DMF).

**Elx:** 01.VI: 1 ej. en el molí de la Rambla (GGO).

**Clot de Galvany:** 02.X: 1 ej. (PSH).

**Isla de Tabarca:** 17.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 24.IV: 1 ej. (PIC).

**La Marina:** 25.VI: 1 ej. (NGA).

**Rio Serpis:** 24.IV: 1 m. cantando (BOR); 01.V: 3 m. cantando (BOR,DMF).

#### **2017**

**Albat de la Ribera:** 22.VI: 2 m. territoriales en bosques de ribera del río Júcar. Un año más se confirma la presencia de la especie en esta zona durante el periodo reproductor (AAC); 26.VI: 1 ej. (JOB).

**Altea:** 01.VII: 2 ej. (EJRR).

**Xixona:** 22.V: 1 ej. (EAAN).

**Monòver:** 17.VI: 1 ej.; 17.VIII: 1 ej. (ELSO).

### ***Hippolais polyglotta***

### **Zarcero políglota - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Benicàssim:** 16.IV: 1 ej. Primera cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 08.IV: 1 ej. en la devesa. Primera cita prenupcial (ASI).

**Isla de Tabarca:** 04.IV: 3 ej. capturados para su anillamiento. Cita muy temprana; 12.IV: 6 ej. (PIC).

**La Marina:** 07.IX: 1 juv. (NGA).

#### **2017**

**Benicarló:** 23.IV: 1 ej. en el casco urbano (JLA).

**Vistabella del Maestrazgo:** 13.IV: 1 ej. (JPH).

**Benicàssim:** 25.IV: 1 ej. Primera cita anual tardía (MTB).

**Quadro de Santiago:** 08.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Marjal dels Moros:** 17.IX: 1 ej. (EJNA).

**Albufera de València:** 25.IV: 1 ej. cantando en el entorno de la acequia de l'Overa (EGO,PVG).

**Callosa d'En Sarrià:** 15.IV: 1 ej. (JBN).

**Sierra Aitana:** 25.IV: 1 ej. (JSR).

***Hippolais icterina*****Zarcero icterino - Bosqueta icterina - Icterine Warbler**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2017**

**La Pobra de Farnals:** 17.IX: 1 ej. anillado (TPA,PLT,SAD).

**Albufera de València:** 25.V: 1 ej. anillado en la Pipa. Uno de los pocos obtenidos en los últimos años (AVA).

**LOCUSTELLIDAE*****Locustella naevia*****Buscarla pintoja - Boscarler pintat - Western Grasshopper-warbler**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Quadro de Santiago:** 29.IV: 3 ej. en tramo de 2,5 km. Máximo primaveral (MTB).

**Albufera de València:** 20.II: 1 ej. cantando en la Ratlla. Primer registro anual excepcionalmente temprano (VPA); 23.III: 1 ej. (posiblemente hasta 2) cantando (YAM,BDJ,VLG); 15.IV: 3 ej. anillados en Milia (PMP).

**Clot de Galvany:** 22.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (SCEA).

**2017**

**Quadro de Santiago:** 30.IV: 4 m. cantando. Máximo primaveral en censo de 2,3 km; 27.VIII: 1 ej.; 31.VIII: 1 ej. (MTB).

**Castellón de la Plana:** 26.IV: 1 ej. Primera cita anual en zona de naranjal (MTB).

**Albufera de València:** 14.III: 1 ej. anillado en la Pipa. Primer registro primaveral temprano (AVA); 24.III: 1 ej. cantando en la Punta de Llebeig (YAM,PVG); 30.IV: 1 ej. anillado en l'Illa (PMP); 02.VIII: 1 ej. reclamando en el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial (PVG,MAT,IPE).

**Quatretonda:** 29.IV: 1 ej. (PVG).

**Isla de Tabarca:** 24.III: 1 ej. capturada para su anillamiento científico (PIC).

**El Fondo d'Elx:** 09.IV: 1 ej. (ELCA).

***Locustella luscinioides*****Buscarla unicolor - Boscarler comú - Savi's Warbler**

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Quadro de Santiago:** 20.III: 1 ej. Primera cita anual (MTB).

**Benavites:** 23.III: 7 ej. cantando en la Closa (RMB).

**Albufera de València:** 10.III: 2 ej. cantando en la Torreta Ampla. Primer registro prenupcial (PMP); 10.VI: 2 juv. en el tancat de la Pipa. Primera observación de aves nacidas durante la presente temporada (PVG); 30.X: 1 ej. anillado en la l'Illa. Cita tardía (PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 14.III: 1 ej. (PSH).

**Clot de Galvany:** 22.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (SCEA).

**El Fondo d'Elx:** 12.X: 2 ej. (JDL).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.III: 1 m. cantando. Primera cita anual; 06.V: 5 ej. machos cantando. Máximo primaveral en censo de 2,3 km (MTB,JAF).

**Albufera de València:** 10.III: 3 ej. cantando en la mata del Fang. Primera cita anual (MCH,PVG); 03.VI: 1 juv. anillado en Milia. Primer registro de un ave nacida la presente temporada (JMR); 09.X: 1 ej. anillado en Milia. Cita tardía (PMP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 11.III: 3 ej. anillados (EJMO); 18.VI: 9 ej. cantando en varios puntos del marjal (JOC).

**El Fondo d'Elx:** 26.IX: 3 ej. (SAR); 07.X: 1 ej. (EDDU).

## CISTICOLIDAE

***Cisticola juncidis*****Cistícola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola**

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de interés.

**2016**

**Quadro de Sanatigo:** 04.VI: 36 ej. Máximo anual en censo de 2,5 km (MTB).

**Requena:** 24.I: 6 ej. zona con juncales y herbazales. Raro como invernante en la zona (JAI).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 13.V: 27 m. cantando. Máximo primaveral en recorrido de 3,2 km (MTB, JAF).

**Quadro de Santiago:** 22.V: 12 m. cantando. Máximo primaveral en recorrido de 2,5 km (MTB).

**Albufera de València:** 24.VI: 38 ej. en el barranco del Poyo (GCH).

## SYLVIIDAE

***Sylvia atricapilla*****Curruca capirotada - Busquereta de casquet - Blackcap**

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

**2016**

**Benicàssim:** 25.III: 10 ej. Máximo primaveral en censo de 0,9 km.; 03.V: 1 h. Última cita primaveral; 22.IX: 1 h. Primera cita postnupcial; 04.XI: 30 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 0,9 km (MTB).

**Náquera:** 09.VII: 1 par.; 13.XII: 21 ej. (JPH,RMQ).

**Alacant:** 01.X: 22 ej. en la partida Almorqui (ELSO).

**2017**

**Benicàssim:** 28.V: cita primaveral tardía de 1 m. cantando; 07.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Islas Columbretes:** 13.II: 3 m. y 2 h. (LGB).

**Castellón de la Plana:** 26.I: 26 ej. Máximo invernal en censo de 1,2 km en naranjal (MTB).

**Requena:** 23.IX: 10 ej. Paso fuerte en las riberas del río (JAI).

***Sylvia borin*****Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler**

Estatus: Nidificante raro, migrante escaso. Criterio: Citas de cría, fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 23.IV: 1 ad. Primera cita anual (DES).

**Benicàssim:** 17.IV: primera cita primaveral de 1 m. cantando; 02.V: 6 ej. Máximo primaveral en recorrido de 0,9 km; 16.V: 1 ej. Última cita primaveral; 17.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Islas Columbretes:** 22.IV: 1 ej. (RPM).

**Albufera de València:** 15.IV: 2 ej. anillados en Milia. Primer registro prenupcial (PMP); 09.V: 16 ej. en grupo en zonas arboladas del barranco de Catarroja (BDJ); 10.X: 1 ej. alimentándose de frutos de lentisco en el Racó de l'Olla (AAC).

**Clot de Galvany:** 02.X: 3 ej. (PSH).

**La Marina:** 15.V: 1 ej.; 03.X: 1 ej. entre los matorrales (NGA).

**2017**

**Benicàssim:** 26.IV: 1 ej. Primera cita primaveral; 02.V: 4 ej. Máximo prenupcial en censo de 0,9 km; 24.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Castellón de la Plana:** 15.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 20.IX: 2 ej. Última cita anual (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 24.X: 1 ej. capturado para el anillamiento (GAU).

**Albufera de València:** 17.IV: 1 ej. en zona arbolada el tancat de la Pipa (AAC); 21.V: 1 ej. anillado en Milia. Cita primaveral tardía (PMP).

**Zarra:** 25.IX: 1 ej. (ROL).

**Dénia:** 04.VIII: 1 ej. en el barranco del Infierno (RBA).

### ***Sylvia hortensis*                      Curruca mirlona - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler**

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

#### **2016**

**Benicàssim:** 13.V: 1 ej.; 30.VIII: 1 ej. (posible juv.) (MTB).

**Sot de Chera:** 29.V: 1 m. territorial cantando (CMO).

**Náquera:** 04.VI: al menos 2 m. territoriales cantando en la subida al Pi del Salt (CMO).

**Albufera de València:** 07.V: 1 ej. anillado en Ratlla (JGAC).

**Mislata:** 17.IV: cita prenupcial de 1 ej. en el parque de la Canaleta (PAB).

**Picassent:** 21.IX: cita postnupcial de 1 ej. (PAB).

**Isla de Tabarca:** 24.IV: 2 ej. Primera cita prenupcial (PIC).

#### **2017**

**Tirig:** 29.V: 5 ej. cantando en 3 puntos diferentes (VET).

**Benicàssim:** 14.IV: 1 m. Única cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 11.V: 1 m. anillado en la Pipa. Primer registro anual (AVA).

**Xàbia:** 01.V: 1 ej. (EFMA).

**Penyal d'Ifach:** 09.VIII: 1 ej. (ESAR).

**Isla de Benidorm:** 11.VIII: 1 ej. (ESAR).

### ***Sylvia communis*                      Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat**

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

#### **2016**

**Alcossebre:** 09.IV: 1 m. ad. Primera cita anual (DES).

**Benicàssim:** 06.IV: 1 ej. Primera cita anual; 02.V: 8 ej. Máximo primaveral en recorrido de 0,9 km (MTB).

**Burjassot:** 22.X: 3 ej. (JOB).

**Alboraya:** 06.IV: 1 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 09.IV: 1 ej. anillado en Milia. Primer registro prenupcial (PMP); 14.IV: 3 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa (AVA); 04.V: 6 ej. en la muntanyeta dels Sants y el tancat de l'Illa (AAC); 19.VI: 1 h. anillada en la Pipa. Cita prenupcial tardía (YAM,AVA).

**Requena:** 20.III: 1 ej. (RMB); 10.IV: 3 ej. Primeras citas anuales (JAI).

**Altea:** 04.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (TZL).

**Isla de Tabarca:** 01.IV: 2 ej. (PIC).

#### **2017**

**Benicàssim:** 02.IV: 1 ej. Primera cita anual 01.V: 4 ej. Máximo primaveral en censo de 0,9 km; 11.V: 1 ej. Última cita primaveral; 16.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Islas Columbretes:** 05.IV: 2 h. y 1 m. (LGB).

**Chiva:** 06.V: 1 h. ad. (ANL).

**Alborache:** 01.IV: 1 ej. (EJNA).

**Albufera de València:** 10.IV: 1 ej. anillado en Milia. Primer registro primaveral (PMP).

**Xàbia:** 01.IV: 1 ej. (EFMA).

**Monòver:** 30.IX: 1 ej. (ELSO).

***Sylvia undata******Curruca rabilarga - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler***

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Quadro de Santiago:** 12.I: 5 ej. Máximo invernal destacado en recorrido de 2,5 km; 19.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 12.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Albufera de València:** 25.IX: 1 ej. en la devesa. Primer registro postnupcial (EPS); 04.XI: mínimo de 20 ej. en el tramo litoral de la devesa (EPS); 02.XII: 1 h. juv. capturada para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera observación de la especie en la reserva (AVA,PVG).

**Font Roja:** 15.IX: 19 ej. (JBN).

**El Campello:** 02.X: 1 ej. (AJR).

**Clot de Galvany:** 21.III: 1 ej. (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.I: 7 ej. Máximo invernal destacado en censo de 2,3 km (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 21.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Islas Columbretes:** 09.III: 1 m. ad. (LGB).

**Castellón de la Plana:** 01.III: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Cullera:** 22.X: varios ej. en la sierra de les Raboses. Primeros registros otoñales (VBJ).

**Bocairent:** 05.I: 9 ej. (PAS).

***Sylvia conspicillata******Curruca tomillera - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler***

Estatus: Nidificante moderado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 13.X: 1 m. Última cita anual (DES).

**Quadro de Santiago:** 19.III: 1 ej. Primera cita anual; 10.IV: 1 m. Última cita primaveral, sin citas postnupciales (MTB).

**Ademuz:** 17.IV: 2 ej. (RMB).

**Vallanca:** 22.V: 1 ej. (RMB).

**Casas Bajas:** 10.IV: 2 ej. (RMB).

**Náquera:** 18.IX: 2 ej. (JPH,RMQ).

**Albufera de València:** 21.IX: 3 ej. observados en zona de pinada abierta con matorral el Racó de l'Olla. Primera observación anual (JID,MCH).

**Sierra Aitana:** 13.III: 1 ej. (PCC).

**Font Roja:** 14.VIII: 5 ej. capturados para anillamiento (PCC,JMT); 20.VIII: 7 ej. (PCC).

**El Pinós:** 26.III: 1 m.; 22.V: 2 ej.; 17.VII: 1 ej. en una zona donde no cría, ej. dispersivo (AJR).

**El Saladar de Agua Amarga:** 01.III: 2 m. (AJR).

**Isla de Tabarca:** 04.IV: 1 ej. (PIC).

**Embalse de la Pedrera:** 18.VI: 1 par. (AJR).

**2017**

**Alcossebre:** 29.VIII: 1 m. Única cita anual (DES).

**Quadro de Santiago:** 02.IV: 1 m. Primera cita prenupcial; 03.IV: 1 m.; 05.IV: 2 ej. Máximo anual en pastizales; 06.IV: 1 ej. (MTB).

**Albufera de València:** 16.IV: 1 m. en zonas arboladas del Pujol Vell. Primer registro primaveral (BDJ).

**Requena:** 20.V: 2 m. cantores en zona apropiada para la cría en la cumbre del pico del Tejo (JAI).

**Font Roja:** 20.VII: 6 ej. (JCO,PCC).

**Lagunas de Rabasa:** 30.III: 2 ej.; 05.IV: 4 ej. (JBN).

**El Saladar de Agua Amarga:** 05.I: 1 ej.; 07.I: 1 ej. (AJR).

**Lagunas de Lo Monte:** 28.IX: 1 ej. (EJTH).

***Sylvia cantillans*****Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler**

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

**2016**

**Vinaròs:** 17.III: 2 m. ad. (DFF).

**Alcossebre:** 16.III: 1 m. Primera cita anual; 23.VIII: 1 m. ad. Primera cita postnupcial; 15.X: 1 h. Última cita anual (DES).

**Torreblanca:** 16.III: 1 m. curioseando en la esparraguera del balcón (IMR).

**Benicàssim:** 19.III: 1 m. Primera cita anual; 10.IV: 5 ej. Máximo primaveral en recorrido de 0,9 km; 05.V: 1 ej. Última cita primaveral; 28.VII: 1 juv. Primera cita postnupcial; 24.VIII: 20 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 0,9 km; 05.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 20.III: 1 m. (MBM).

**València:** 17.III: primera cita prenupcial de 1 m. en los jardines de l'Oceanogràfic (PAB); 17.IX: 45 ej. en un par de tarais en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (AAC).

**Albufera de València:** 16.III: 1 m. en zona arbolada. Primera cita prenupcial; 20.III: más de una 12 ej. observados en diferentes puntos de las marjales de Sueca y Silla. Patente arribada de aves migrantes (AAC); 02.IV: 10 ej. anillados en la Milia (PMP); 14.IV: 5 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa (AVA); 23.VIII: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (YAM).

**Mislata:** 25.VIII: primera cita postnupcial de 1 ej. en la huerta de Mislata (PAB,ODB).

**Villena:** 28.V: 5 ej. (AJR).

**Elx:** 17.VIII: 2 ej. (OAP); 21.X: 1 m. (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 18.III: 1 ej. (EEIV).

**2017**

**Benicàssim:** 18.III: 1 ej. Primera cita anual; 01.V: 1 m. Última cita primaveral; 31.VII: 1 juv. Primera cita postnupcial (MTB).

**Castellón de la Plana:** 30.VIII: 27 ej. Máximo postnupcial en censo de 1,2 km en campos de naranjos; 30.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Mislata:** 27.IX: última cita postnupcial de 1 ej. en el parque de la Canaleta (PAB).

**Albufera de València:** 12.III: 1 ej. (DGA); 16.III: 1 m. anillado en la Pipa. Primer registro prenupcial (AVA); 05.VIII: 1 ej. anillado en l'Illa. Primer registro postnupcial (PMP).

**Alacant:** 15.X: 3 ej. (EMG,JMT) (EGM).

**El Saladar de Agua Amarga:** 20.III: 1 ej. (AJR).

***Sylvia subalpina*****Curruca subalpina - Busquereta de Moltoni - Moltoni's Warbler**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 4/4 (abr-may, sep).

**2016**

**Benicàssim:** 13.V: 1 m. cantando. Cuarta cita para la localidad (MTB).

***Sylvia melanocephala*****Curruca cabecinegra - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler**

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Benicàssim:** máximos en transecto de 0,9 km de 27 ej. el 06.XI y de 28 ej. el 11.XII (MTB).

**2017**

**Benicàssim:** 01.I: 20 ej. Máximo invernal en transecto de 0,9 km (MTB).

## REGULIDAE

***Regulus ignicapilla*****Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest**

Estatus: Residente e invernante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 19.X: 1 ad. Primera cita desde 2013 (DES).

**Benicàssim:** 06.I: 10 ej. bando destacado en zona de invernada; 11.I: 2 ej. en zona de matorral y cultivos abandonados (MTB).

**Albufera de València:** 17.V: 6 par. localizadas en zonas arboladas de la Devesa. Se consolida la presencia de esta especie ausente como reproductora hace apenas unos años (YAM); 22.X: 1 ej. en zonas arboladas del barranco de Catarroja (GCH).

***Regulus regulus*****Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest**

Estatus: Invernante escaso. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Penyagolosa:** 08.X: 1 ej. (JPH).

**Benicàssim:** 20.I: 3 ej. Múltiples citas invernales en pequeña pinada litoral; 02.II: Máximo anual de 4 ej. en pequeña pinada litoral; 06.III: 2 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Albufera de València:** 15.I: 1 ej. en zonas arboladas (BDJ); 18.III: 1 ej. formando parte de un pequeño grupo de reyezuelos listados. Últimas citas prenupciales (EPS); 11.XII: 1 ej. (VBJ).

**Xeraco:** 17.I: 3 ej. (PLP).

**Cocentaina:** 03.III: 2 ej. (JCO,PAS).

**El Pinós:** 10.III: 1 ej. (AJR).

**Santa Pola:** 07.II: 5 ej. (OAP).

**Isla de Tabarca:** 22.III: 1 ej. Primera captura esta especie para la isla (PIC).

**Sierra de Mariola:** 16.I: 1 ej. (BOR).

**2017**

**Castell de Cabres:** 11.IX: 1 ej. (VFT).

**Vistabella del Maestrazgo:** 04.II: 2 ej. (CGE); 08.IV: 1 ej. (JPH).

**Albufera de València:** 02.XI: 1 ej. anillado en la Pipa. Primer registro otoñal (AVA); 15.X: 1 ej. en el Racó de l'Olla (ELCA).

**Genovés:** 23.XII: 1 ej. (CMO).

**Sierra de Mariola:** 19.XI: 2 ej. (BOR).

## TROGLODYTIDAE

***Troglodytes troglodytes*****Chochín paleártico - Caragolet - Northern Wren**

Estatus: Nidificante común, invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Benicarló:** 01.XII: 1 ej. en la desembocadura del río Seco. Invernante muy raro en el lugar (JLA).

**Quadro de Santiago:** 17.I: varias citas invernales de 1 ej. en área de saladar; 23.II: última cita invernal (MTB).

**Albufera de València:** 18.III: 4 ej. cantando en distintas zonas de la Devesa (EPS).

**Pantano de Elche:** 29.X: 1 ej. raro en el paraje (OAP).

**2017**

**Castellón de la Plana:** citas de 1 ej. en campos abandonados entre naranjos el 17.II, el 24.XI: y el 21.XII (MTB).

**Albufera de València:** 09.XII: 1 ej. anillado en l'Illa. Primer registro en esta localidad (PMP).

## SITTIDAE

***Sitta europaea*****Trepador azul - Pica-soques blau - Eurasian Nuthatch**

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de interés

## TICHODROMADIDAE

***Tichodroma muraria*****Treparriscos - Pela-roques - Wallcreeper**

Estatus: Invernante y migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: pendiente de revisión.

**2016**

**Penyagolosa:** 08.X: 1 ej. en la cima del Penyagolosa (JPH).

**Montanejos:** 02.I: 1 ej. muy cerca de los miradores del túnel (MGT); 16.I: 1 ej. en la base de un cortado (CIZ).

**Estivella:** 15.X: primera cita postnupcial de 1 ej. en los cortados del Garbí (TPE,MACA,MASA).

**Alcoi:** 26.XI: 1 ej. (BOR).

**2017**

**Embalse de Arenós:** 15.X: 1 ej. observado subiendo por un cortado que cae al embalse (PMO).

**Tuéjar:** 17.XII: 1 ej. encontrado muerto (MAJ).

**Alcoi:** 05.I: 1 ej. (BOR), observado de nuevo el 10.I (PAS) y el 11.I (DMF).

## CERTHIIDAE

***Certhia brachydactyla*****Agateador europeo - Raspinell comú - Short-toed Treecreeper**

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de intrés

## STURNIDAE

***Sturnus vulgaris*****Estornino pinto - Estornell - Common Starling**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante muy abundante. Criterio: datos de nidificación, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 14.IV: 2 ad. Última cita prenupcial (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 10.XII: 3.000 ej. Máximo en invernada (MTB).

**Benicàssim:** 19.III: 5 ej. Última cita prenupcial; 05.X: 15 ej. Primera cita postnupcial ; 09.XI: 2.500 ej. en paso hacia el N desde los dormideros de Castellón de la Plana. Máximo anual (MTB).

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 30.I: 3.000 ej. (MBM).

**Mislata:** 17.IX: primera cita postnupcial de 3 ej. junto a un grupo de estorninos negros (PAB).

**La Marina:** 01.I: 5.000 ej. en paso en tres grandes grupos (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 05.II: 10.000 ej. (JMT).

**2017**

**Alcossebre:** 19.IV: 50 ej. Última cita prenupcial; 21.VIII: 20 ej. Primera cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 02.V: 1 ej. Cita primavera; 20.VIII: 35 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**València:** 16.VI: 1 ej. en jardines de la ciudad (EMCU).

**Albufera de València:** 31.VII: 1 juv. en el Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID,MCH).30.XII: bando enorme de unos 55.000 ej. (EAAN).

**Embalse d'Elx:** 18.II: dormidero de un mínimo de 150.000 ej. (JPG).

**Pantano de Elche:** 31.I: 40.000 ej.; 10.II: 10.000 ej. en dormidero (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 08.I: 3.375 ej. (PCC,JEG).

***Sturnus unicolor*****Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling**

Estatus: Residente abundante. Estatus: censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Benicàssim:** 21.V: 150 juv. Primera concentración destacada de juv. del año (MTB).

**Albufera de València:** 08.II: 3.000 ej. en campos fangueados por tractores (GGO); 19.VI: grupo de casi 110 ej. en arrozales del Petxinar. Primeros grupos postreproductores (BDJ).

**2017**

**Benicàssim:** 02.IX: 420 ej. Máximo postnupcial (MTB).

**El Fondo d'Elx:** 30.XII: 20.000 ej. Gran bando en vuelo (JBN).

**TURDIDAE*****Turdus torquatus*****Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 29.III: 1 m. ad. Única cita anual (DES).

**Albufera de València:** 08.IV: 1 h. de la ssp. nominal en zona arbolada del tancat de la Ratlla (AAC).

**Bocairent:** 13.XI: 10 ej. cerca del camping (BOR).

**Sagra:** 05.X: 1 ej. Cita temprana (PLP).

**Sierra Aitana:** 02.I: 25 ej. (BOR); 03.IV: 5 ej. (JSR,PLP); 01.XI: 20 ej. (AJR).

**El Pinós:** 27.III: 2 ej. (AJR).

**Isla de Tabarca:** 27.III: 1 h. ad. Primera captura para la isla (PIC).

**Sierra de Mariola:** 23.I: 22 ej. en el Montcabrer y zonas cercanas; 06.II: 17 ej. (BOR); 09.IV: 6 ej. (DMF) 22.X: 5 ej. cerca del Montcabrer (BOR).

**2017**

**Islas Columbretes:** 08.IV: 1 ej. (LGB).

**Aras de los Olmos:** 15.XI: 4 ej. en zona de pinar (PAB).

**Alpuente:** 26.XI: 2 ej. (VBJ).

**La Yesa:** 09.XI: 6 ej. en bebedero (TPA).

**Utiel:** 11.XI: 20 ej. (MSL).

**Cullera:** 15.X: 1 ej. en la serra de les Raboses. Primer registro anual y uno de los pocos obtenidos en los últimos años (JLE,LAA).

**Ayora:** 08.XI: 1 m. en bebedero (VPA).

**Xeraco:** 10.XII: 1 ej. anillado de la ssp. *alpestris* (PLP).

**Gandía:** 10.XII: 1 m. ad. anillado. Destaca la cita a escasos km de la costa (PLP).

**Confrides:** 28.XII: 5 ej. (AAR).

**Font Roja:** 22.X: 4 ej.; 28.X: 20 ej.; 18.XI: 10 ej. (BOR); 07.XII: 21 ej. Especie muy abundante este invierno en toda la comarca. Concentración de aves comiendo bayas de almez y *Pyracantha* sp. (PCC).

**Sierra de Mariola:** 19.XI: 2 ej.; 25.XI: 3 ej.; 03.XII: 36 ej. (BOR); 06.XII: 36 ej. (BOR, DMF,JFL).

***Turdus merula*****Mirlo común - Merla - Common Blackbird**

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Sant Vicent del Raspeig:** 02.II: 2 juv. volantones en el campus de la UA. Reproducción temprana (GLI).

***Turdus obscurus*****Zorzal rojigrís - Eyebowed Thrush**

Estatus: Divagante del E de Asia central. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: I/I (ene).

**2016**

**Rossell:** 17.I: 1 m. juv. cazado. Primera cita para España (AGF). Cita homologada por el CR SEO.

***Turdus pilaris*****Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare**

Estatus: Invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Albufera de València:** 04.IV: 1 ej. en zonas de transición entre arrozales y huertas del Borronar. Primer registro anual y el primero que se produce en el mes de abril (BDJ).

**Polop:** 11.III: 1 ej. cerca del pueblo (DMF).

**Sierra Aitana:** 02.I: 50 ej. (BOR); 20.XI: 2 ej. (JMT,IAG,AAR).

**Cocentaina:** 16.I: 3 ej. (BOR).

**Font Roja:** 13.I: 1 ej. (PCC).

**Clot de Galvany:** 01.III: 1 ej. (AJR).

**Sierra de Mariola:** 16.I: 10 ej.; 12.III: 2 ej. en la font de Mariola (BOR); 11.I: 1 ej. en la font de Mariola (PAS); 03.I: 1 ej. (BOR); 12.II: 6 ej. (PLP).

**2017**

**Benicàssim:** 24.XII: 1 ej. muy raro en la zona, primera cita en 11 años de censo (MTB).

**El Toro:** 10.XII: 1 ej. (MGT).

**Alpuente:** 26.XI: 1 ej. ; 26.XI: 1 ej. (VBJ).

**Bocairent:** 26.XI: 5 ej. (BOR); 03.XII: 5 ej. (DMF); 27.XII: 14 ej. (PAS).

**Confrides:** 11.XI: 3 ej. observados desde hide (EJDR); 28.XII: 2 ej. bebiendo en la font de l'Arbre (AAR).

**Sierra Aitana:** 18.XI: 15 ej. (BOR); 13.XII: 25 ej. (PLP,JSR).

**Banyeres de Mariola:** 17.XII: 2 ej. (PAS).

**Alcoi:** 11.XI: 1 ej. (BOR); 09.XII: 1 ej. (JCO).

**Font Roja:** 03.XII: 3 ej. Especie frecuente este invierno por toda la comarca (PCC).

**El Fondo d'Elx:** 23.XI: 1 ej. posado en un eucalipto. Muy raro en la zona (OAP,SAR,MFS).

**Sierra de Mariola:** 15.XI: 1 ej. en la Font de Mariola (PLP); 03.XII: 7 ej. (BOR).

***Turdus iliacus*****Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Penyagolosa:** 10.X: 4 ej. en itinerario entre Sant Joan, Refugi y la Pregunta (VET).

**Bocairent:** censos destacados en la font de Mariola de 40 ej. el 30.I; 25 ej. el 20.II y 7 ej. el 12.III; 13.XI: 30 ej. cerca del camping (BOR).

**Sierra Aitana:** 10.I: 100 ej. (OAP,RLM,LUR); 13.III: 1 ej. (PCC).

**Alcoi:** 08.X: 1 ej. (BOR).

**Sierra de Mariola:** 03.III: 5 ej. (JCO,PAS).

**2017**

**Requena:** 12.XI: 7 ej. en almeces y quejigos (JAI).

**Albufera de València:** 04.XI: 2 ej. en zona de olivos junto con zorzales comunes (AAC). Primera cita post-nupcial y una de las pocas registradas en l'Albufera en los últimos años. La última observación de enero de 2002 y la anterior de 1997 (BDJ).

**Bocairent:** 11.II: 10 ej. en campos cerca casa Domínguez; 26.XI: 30 ej. (BOR).

**Sierra Aitana:** 18.XI: 10 ej. (BOR).

**Cocentaina:** 19.II: 30 ej. (BOR).

**Monòver:** 17.XI: 45 ej. Bando compacto y numeroso, inusual para esta especie en la zona (ELSO).

**Serra Mariola:** 29.X: 2 ej. en la font de Mariola; 10.XII: 25 ej. (BOR).

**Rio Polop:** 04.III: 1 ej. (BOR).

### ***Turdus philomelos***

### **Zorzal común - Tord - Song Thrush**

Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante e invernante abundante. Criterio: Citas estivales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Vinaròs:** 09.X: primera cita postnupcial de 2 ej. en paso (ELL,JLA,FRJ).

**Alcossebre:** 29.III: 1 ej. Última observación prenupcial; 07.X: 1 ad. Primera observación postnupcial (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 23.XII: 68 ej. (JBC,JLB).

**Benicàssim:** 19.III: 28 ej. Máximo primaveral en recorrido de 0,9 km; 14.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 10.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 12.X: 24 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 0,9 km (MTB).

**Valencia:** 10.X: Primera cita postnupcial de 5 ej. en los jardines del Oceanogràfic (PAB).

**Albufera de València:** 24.V: 2 ej. en la reserva de samaruc de Algemesí y otro m. cantando en campo de naranjos colindante (AAC). Parece consolidarse la presencia de aves durante el periodo reproductor dentro de los límites del parque natural (BDJ); 07.X: varios ej. en la Devesa. Primeras citas otoñales (EPS).

**Mislata:** 16.X: primera cita postnupcial de 5 ej. en la pinada del hospital Miliar (PAB).

**Requena:** 09.X: 2 ej. Primera cita otoñal (JAI).

**Altea:** 08.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (TZL).

#### **2017**

**Alcossebre:** 05.X: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 07.V: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Castellón de la Plana:** 17.II: 14 ej. Máximo prenupcial en censo de 1,2 km por campos de naranjos; 20.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 29.X: 18 ej. Máximo postnupcial en censo de 1,2 km (MTB).

**València:** 06.X: primera cita postnupcial de 7 ej. en l'Oceanogràfic (PAB).

**Requena:** 07.X: 7 ej. Primera cita otoñal (JAI).

**Chiva:** 02.X: 12 ej. (ANL).

**Bocairent:** 26.XI: 200 ej. (BOR).

**Orxa:** 24.XI: 31 ej. (ROL).

**El Pinós:** 06.I: 24 ej. (AJR).

**Pantano de Elche:** 25.XI: 30 ej. (OAP).

### ***Turdus viscivorus***

### **Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush**

Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Benicàssim:** 18.III: cita primaveral destacada de 3 ej. Muy escaso en la zona; 27.X: 1 ej. Única cita postnupcial (MTB).

**Alpuente:** 07.II: 20 ej. (EJCP).

**Albufera de València:** 28.X: 1 ej. en la pinada del Racó de l'Olla (JID,GGA).

**Bocairent:** 12.III: 28 ej. en la font de Mariola (BOR).

**Sant Vicent del Raspeig:** 07.II: 2 ej. Inusual en la zona (JMT).

**Salinas de Santa Pola:** 07.VI: 2 ej. (AJR).

**Cabo de Santa Pola:** 07.VI: 2 ej. (SAR).

**EDAR de Santa Pola:** 15.III: 2 ej. (AJR).

**2017**

**Albufera de València:** 08.X: 1 ej. en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants (AAC,MGC). Primer registro anual y uno de los pocos obtenidos en los últimos años (BDJ).

**Bocairent:** 15.XII: 23 ej. (PAS).

**MUSCICAPIDAE*****Cercotrichas galactotes*****Alzacola rojizo - Cuaenlairat - Rufous Scrub-robin**

Estatus: Estival nidificante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés. Conservación: VUL.

**2016**

**Alacant:** 01.VI: 1 m. (GGO).

**Elx:** 26.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (AJR,ADQ).

**La Marina:** 21.V: 2 ej. juntos en vuelo (NGA); 06.VII: 1 ej. cantando desde un posadero (NGA).

**San Fulgencio:** 17.V: 3 m. cantando (RMB).

**2017**

**La Marina:** 22.V: 2 ej. en varios recorridos por la sierra del Molar (EFAD); 07.VII: 1 m. cantando. Seguimiento censo de alzacola (EFAD); 09.VII: 1 ej. acosando a una h. de aguilucho cenizo (EPBB); 12.VII: 2 ej. en itinerarios por la sierra del Molar. Censo de alzacola (EFAD).

**San Fulgencio:** 03.VII: 2 ej. en zona habitual (EJRR).

***Muscicapa striata*****Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 22.IX: 1 ad. Última cita postnupcial (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 29.X: 2 ej. (JBC).

**Elx:** 11.XII: 2 ej. presentes en la ciudad durante el invierno a partir de este día (OAP); 04.V: 1 ej. de la ssp. *balearica* (OAP).

**Desemb. río Segura:** 25.III: 2 ej. (NGA).

**2017**

**Benicàssim:** 20.IV: 1 ej. Primera cita anual; ; 30.IV: 1 ej. con rasgos de la ssp. *balearica* (MTB).

**Quadro de Santiago:** 27.IV: 2 ej. con rasgos de la ssp. *balearica* (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 24.IX: 1 ej. (MBM).

**València:** 06.X: última cita postnupcial de 1 ej. en los jardines de l'Oceanogràfic (PAB); 09.XI: 1 ej. de la ssp. *balearica* presente hasta el 5.XII (AAD); 28.XII: 1 ej. (JJG).

**Albufera de València:** 14.III: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. *balearica*, en zonas arboladas de l'Aterrissador. Primer registro excepcionalmente temprano (YAM); 19.IV: 1 ej. en la Pipa (PVG); 08.X: 1 ej. en zonas arboladas cerca del Barranquet de Silla. Última cita otoñal (MGR).

**Quart de Poblet:** 21.X: 1 ej. cazando insectos (JOB).

**Mislata:** 09.X: última cita postnupcial de 2 ej. en el parque de la Canaleta (PAB).

**Alacant:** 15.X: 1 ej. (EGM); 15.X: 1 ej. tardío (JMT).

**Elx:** 03.I: 2 ej.; 16.I: 2 ej. (OAP).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 27.IV: 1 ej. (SAR).

Destacan las citas invernales en la ciudad de Elche, las primeras invernales que publicamos en el Anuario. Destaca igualmente el alto número de ej. de la ssp. *balearica* detectados en 2017.

***Erithacus rubecula*****Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin**

Estatus: Nidificante común, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Benicàssim:** 04.VI: 1 ej. varias citas en el mes de junio en jardines, no cría en la zona; 27.X: 37 ej. Máximo anual en campos abandonados en censo de 0,9 km (MTB).

**Albufera de València:** 21.V: 1 ej. cantando en zonas ajardinadas en una de las zonas residenciales de la Devesa. Existen muy pocos registros en el periodo reproductor de la especie en l'Albufera (VLG,BDJ).

**Font Roja:** 14.I: 41 ej. (PCC).

**Alacant:** 22.X: 63 ej. en el parque inundable La Marjal (JMT).

**2017**

**Alcossebre:** 11.IV: 1 ad. Primera cita postnupcial; 08.X: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Islas Columbretes:** 13.II: 1 ej.; 05.IV: 1 ej. (LGB).

**Albufera de València:** 28.IX: 3 ej. en los itinerarios del Racó de l'Olla. Primera cita postnupcial (JID,GGO).

***Luscinia svecica*****Ruiseñor pechiazul - Pit-blau - Bluethroat**

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 22.X: 10 ej. Máximo anual en censo de 1,8 km (MTB).

**Quadro de Santiago:** 18.III: 9 ej. Máximo anual en censo de 2,5 km; 03.IV: 1 h. Última cita primaveral (MTB).

**Albufera de València:** 19.VIII: 1 m. juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial (PVG).

**Altea:** 06.III: 1 ej. (JMT,AVDH).

**Clot de Galvany:** 03.III: 2 ej.; 07.III: 1 ej. (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 14.III: 1 ej. (JMT,OAP); 10.IX: 1 ej. (AJR,SAR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 11.III: 5 ej. Máximo prenupcial en censo de 2,3 km (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 07.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 14.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 21.X: 6 ej. Máximo postnupcial en censo de 2,3 km (MTB).

**Marjal dels Moros:** 31.XII: 6 ej. (EAAN).

**Albufera de València:** 15.VII: 1 h. anillada en la Ratlla (JGAC). Primer registro postnupcial excepcionalmente temprano (BDJ); 13.VIII: 1 ej. anillado en l'Illa (MPB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 12.I: 6 ej. (PLP).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 10 ej. (EAAN); 03.I: 8 ej. (JUI) 30.XII: 9 ej. (EJDR).

***Luscinia megarhynchos*****Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale**

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Benicàssim:** 27.III: 1 ej. Primera cita anual; 11.IV: 8 ej. Máximo anual en campos abandonados en tramo de 0,9 km; 10.V: 1 ej. Última cita primaveral; 05.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 14.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 03.IV: 1 ej. cantant (MBM).

**Albufera de València:** 06.IV: 2 ej. cantando en la Pipa. Primer registro prenupcial (AVA).

**Alcocer de Planes:** 24.IX: 1 ej. (PCC).

**Cocentaina:** 02.IV: 2 ej. (PCC).

**Font Roja:** 02.IV: 1 ej. (PCC).

**Clot de Galvany:** 06.IV: 1 ej. (AJR).

**2017**

**Benicàssim:** 24.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 30.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 22.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Embalse del Regajo:** 31.III: 1 ej. Primera cita del año (JAI).

**La Pobra de Farnals:** 01.X: 3 ej. capturados para anillamiento científico (SAD).

**Albufera de València:** 26.III: 1 ej. anillado en la l'Illa. Primer registro prenupcial (PMP).

**Planes:** 06.V: 22 ej. (JBN).

**Alacant:** 26.II: 1 ej. Oído junto al cauce en la entrada a les Fonts de l'Algar (EFRO).

**El Fondo d'Elx:** 16.II: 1 ej. (AJR).

***Ficedula hypoleuca* Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher**

Estatus: Migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Desert de Les Palmes:** 02.IV: 1 ej. (EAOR).

**Benicàssim:** 03.IV: 1 m. Primera cita anual; 29.IV: 13 h. Máximo anual censo de 0,9 km (MTB).

**Albufera de València:** 23.III: 1 m. inm. en zonas arboladas próximas al Palmar. Primer registro prenupcial (EGO,BDJ); 05.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita muy temprana (YAM); 22.X: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants. Última cita postnupcial (AAC).

**Mislata:** 23.III: primera cita prenupcial de 1 ej. en el hospital Militar (PAB).

**La Marina:** 19.X: 1 ej. (NGA).

**El Fondo d'Elx:** 12.VIII: 1 ej. (OAP,SAR,AJR).

**Font de Mariola:** 22.X: 1 ej. (BOR).

**2017**

**Benicarló:** 06.IV: 1 m. en el casco urbano (JLA).

**Alcossebre:** 02.XI: 1 m. ad. Última cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 19.IV: 8 ej. Máximo prenupcial en recorrido de 0,9; 11.V: 1 h. Última cita primaveral; 08.IX: 8 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 0,9 km (MTB).

**Islas Columbretes:** 15.IV: 2 m. (LGB).

**Ludiente:** 14.IV: 1 m. (XBC).

**Albufera de València:** 05.IV: 1 ej. en la Devesa. Primer registro primaveral (YAM); 13.VIII: 1 ej. en zonas de transición de huerta en la Torreña Ampla. Primer registro postnupcial (PMP); 26.X: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Observación tardía (MCH).

**Mislata:** 07.V: última cita prenupcial de 1 ej. en la huerta de Mislata (PAB).

**Alcoi:** 10.IV: 1 ej. (PCC).

**Alacant:** 30.IV: 10 ej. (JMT).

**El Fondo d'Elx:** 22.IV: 9 ej. (MNG).

***Ficedula parva* Papamoscas papirrojo - Papamosques menut - Red-breasted Flycatcher**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 21/14 (ago-nov).

**2016**

**El Fondo d'Elx:** 10.XI: 1 ej. (MLP,BCH), observado en varias ocasiones. Presente hasta el 25.XI (AJR).

***Phoenicurus ochruros* Colirrojo tizón - Cua-roja fumada - Black Redstart**

Estatus: Residente común, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 16.IV: 1 m. ad. Última cita primaveral; 13.X: 1 h. ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 07.II: 22 ej. Máximo anual en censo de 0,9 km; 19.X: 1 h. Primera cita postnupcial; 25.XII: 17

ej. Máximo postnupcial en censo de 0,9 km (MTB).

**Gilet:** 30.XII: 50 ej. (JPE).

**Albufera de València:** 17.X: varios ej. en zonas de la Devesa. Primeros registros postnupciales (BDJ,VLG).

**Cullera:** 12.X: 1 ej. en la sierra de Cullera. Primer registro otoñal (EPS).

## 2017

**Alcossebre:** 30.IX: 1 m. ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 09.III: 11 ej. Máximo prenupcial en censo de 0,9 km; 15.XI: 15 ej. Máximo postnupcial en recorrido de 0,9 km (MTB).

**Islas Columbretes:** 05.IV: 3 ej. (LGB).

**Castellón de la Plana:** 09.IV: 2 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Albufera de València:** 02.IV: 1 ej. en uno de los cortados rocosos de la muntanyeta dels Sants. Últimas citas primaverales (BDJ); 08.X: 1 ej. en la Devesa. Primer registro otoñal (TPE).

**Font de Mariola:** 07.I: 30 ej. (PAS).

## *Phoenicurus phoenicurus*

## Colirrojo real - Cua-roja reial - Common Redstart

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

Conservación: PE.

## 2016

**Benicàssim:** 30.III: 1 m. Primera cita anual; 04.V: 1 h. Última cita primaveral; 21.VIII: 1 m. juv. Primera cita postnupcial; 27.X: 1 h. Última cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 19.III: 1 m. en arrozales junto al Brosquil de Cullera. Primer registro prenupcial (MAL,LAA); 04.V: 8 h. en la muntanyeta dels Sants y el tancat de l'Illa (AAC); 04.V: 3 h. en el tancat de la Pipa (PVG); 29.VIII: 1 m. juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial (AVA).

**Bocairent:** 25.III: 1 m. cerca del camping (BOR).

**Altea:** 19.III: 2 ej. (TZL,EGM).

**Xixona:** 25.IX: 12 ej. (BOR,DMF).

**Monòver:** 26.VIII: 7 ej. (ELSO).

**Clot de Galvany:** 20.X: 1 ej. (AJR).

**La Marina:** 27.X: 1 ej. (NGA).

## 2017

**Alcossebre:** 13.X: 1 m. Última cita anual (DES).

**Benicàssim:** 31.III: 1 m. Primera cita anual; 28.IV: 5 ej. Máximo prenupcial en recorrido de 0,9 km; 10.V: 1 h. Última cita prenupcial; 08.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Calles:** 29.X: 1 ej. (MAG).

**Albufera de València:** 26.III: 4 ej. en l'Illa. Primer registro prenupcial (PMP); 10.VIII: 1 m. en el Racó de l'Olla. Cita postnupcial temprana (JID).

**Font Roja:** 31.III: 1 ej. (JBN).

**Monòver:** 28.III: 1 ej. (ELSO).

**Serra Mariola:** 03.IX: 1 ej. (BOR).

Todas las citas recibidas hacen referencia a ejemplares migranes, la población nidificante, muy escasa, pasa casi completamente desapercibida.

## *Monticola saxatilis*

## Roquero rojo - Merla roquera - Common Rock-thrush

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2017

**Altura:** 20.III: 1 ad. (PLL).

**Monticola solitarius****Roquero solitario - Merla blava - Blue Rock-thrush**

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2017**

**Alcossebre:** 24.XII: 1 m. Único registro anual en la localidad (DES).

**Albufera de València:** 17.III: 1 m. cantando en lo alto de un edificio en el casco urbano de Silla. Apenas parecen existir citas previas en este entorno (PMP).

**Saxicola rubetra****Tarabilla norteña - Bitxac rogenic - Whinchat**

Estatus: Migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Ares del Maestre:** 14.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (RPB,ALR).

**Alcossebre:** 02.V: 9 ad. Concentración destacada (DES).

**Quadro de Santiago:** 01.V: 13 ej. Máximo anual en recorrido de 2,5 km; 04.V: 1 h. Última cita primaveral (MTB).

**Albufera de València:** 12.III: 1 m. en zona de huerta y cultivos arbolados de la marjal de Silla (PVG); 05.V: 1 h. capturada para anillamiento en el tancat de la Pipa (AVA); 06.V: 1 m. en zonas próximas a Pinedo. Última cita prenupcial (VBJ).

**Bocairent:** 02.V: 1 ej. cerca del Mas de Guilella (BOR).

**Sant Vicent del Raspeig:** 16.X: 1 h. (JDL).

**La Marina:** 05.V: 1 h. (NGA).

**2017**

**Quadro de Santiago:** 27.III: 1 m. Primera cita primaveral; 28.IV: 6 ej. Máximo primaveral en recorrido de 1,4 km de pastizales; 09.V: 1 h. Última cita primaveral (MTB).

**Marjal dels Moros:** 17.X: 1 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 13.IX: 4 ej. en zonas de barbecho del Borronar. Primer registro postnupcial; 20.X: 1 ej. (EPS).

**Villena:** 13.V: 2 ej. Migrante escaso en el área (YAM).

**El Fondo d'Elx:** 06.IX: 1 ej. (PLP); 12.IX: 1 ej. (AJR).

**Saxicola rubicola****Tarabilla europea - Cagamànecs - European Stonechat**

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 21.III: 1 m. Última cita en invernada; 10.X: 1 m. Primera cita postnupcial (DES).

**Quadro de Santiago:** 17.I: 14 ej. Máximo anual en recorrido de 2,5 km; 08.IV: 1 m. cantando en zona de saladar; 10.VIII: 1 juv. Posiblemente un ave local. Nidificante muy escaso en la Plana; 28.IX: 1 m. Primera cita postnupcial (MTB).

**Clot de Galvany:** 19.XI: 10 ej. en recorrido por los caminos del parque (RBA).

**2017**

**Alcossebre:** 03.IV: 1 h. Última cita en invernada; 04.X: 1 m. Primera cita postnupcial (DES).

**Quadro de Santiago:** 01.X: 1 m. Primera cita postnupcial (MTB).

**La Llosa:** 09.XII: 25 ej. (MASA).

**Albufera de València:** 04.X: 1 m. en el Racó de l'Olla. Primera observación postnupcial (MCH).

**Cullera:** 02.IX: 1 ej. en la montaña de Cullera. Primer registro postnupcial (VBJ,EPS).

***Oenanthe oenanthe*****Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear**

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Peñíscola:** 09.V: 1 ej. (APN).

**Alcossebre:** 22.III: 1 m. Primera cita primaveral; 01.IX: 1 h. ad. Primera cita postnupcial; 13.X: 3 ad. Última cita anual (DES).

**Quadro de Santiago:** 20.III: 1 m. Primera cita anual; 04.V: 5 h. Última cita primaveral y máximo anual en recorrido de 1,5 km; 03.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 16.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Desemb. río Mijares:** 19.III: 1 m. ad. (MBM).

**Marjal dels Moros:** 06.XI: 2 ej. (MGT,FLL).

**Albufera de València:** 28.III: 1 h. en arrozales de Campanar. Primer registro prenupcial (BDJ); 25.VIII: 1 ej. (h./juv.) en campos baldíos del Borronar. Primer registro postnupcial temprano (BDJ); 20.X: 1 ej. en dunas litorales. Última cita otoñal (YAM).

**Ayora:** 05.XI: 1 ej. Observada también el día anterior (GGO).

**Marjal de Pego-Oliva:** 31.VIII: 2 ej. (EBDO).

**Benifallim:** 10.XI: 1 ej. (JCO,ROL).

**Salinas de Santa Pola:** 18.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (AJR,SAR).

**Isla de Tabarca:** 20.III: 1 ej. Primera captura prenupcial (PIC).

**2017**

**Vilanova d'Alcolea:** 15.XI: 1 ej. Cita tardía (VET).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 2 ej. (VET); 18.IV: concentración destacada de 10 ej. en la playa (AMG).

**Quadro de Santiago:** 18.III: 1 m. Primera cita prenupcial; 15.IV: 5 ej. Máximo anual en censo de 2,3 km; 31.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Albufera de València:** 05.III: 1 ej. en arrozales de Massanassa. Primer registro primaveral temprano (VLG); 29.VIII: 1 ej. en huertas del Romaní. Primer registro postnupcial (EPS); 25.X: 2 ej. en arrozales del rec del Diputat. Última cita otoñal (BDJ).

**La Vall d'Ebo:** 08.XI: 1 ej. (PLP).

**Agost:** 27.X: 1 ej. cazando desde oteadero en suelo (EMMG).

**Serra Mariola:** 01.X: 1 ej. (BOR).

***Oenanthe hispanica*****Collalba rubia - Còlbit ros - Black-eared Wheatear**

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 18.III: 1 m. ad. Primera cita anual (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 28.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (VET).

**Quadro de Santiago:** 27.III: 1 m. Primera cita anual; 26.IV: 1 h. Última cita primaveral. Sin citas postnupciales (MTB).

**Borriol:** 27.IX: 1 ej. (LPC).

**Albufera de València:** 28.III: 1 m. cazando en un campo con vegetación herbácea (LAA).

**Xàbia:** 13.XI: 2 ej. (PLP); 07.XII: 2 ej. Cita muy tardía. Posiblemente invernantes (PLP).

**Monòver:** 21.III: 1 m. de garganta pálida. Primera observación (ELSO).

**2017**

**Alcossebre:** 06.IV: 2 ad. Primera cita anual (DES).

**Vilanova d'Alcolea:** 21.VII: 1 juv. Única cita postnupcial (MTB).

**Benicàssim:** 01.IV: 1 m. Primera cita anual (MTB).

**Marjal dels Moros:** 19.IX: 1 h. (RMB).

**Requena:** 02.IV: 2 ej. Primera cita del año (JAI).

**Chiva:** 02.IV: 1 m. ad. (ANL).

**Alacant:** 03.IV: 1 par. (PLP).

**El Pinós:** 02.IX: 1 ej. (AJR,SAR).

**El Fondo d'Elx:** 13.X: 1 ej. (EGCS).

### ***Oenanthe leucura***

**Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear**

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

#### **2016**

**Cabo de San Antonio:** 13.XI: 4 ej. (PLP).

**Ponoig:** 28.V: 8 par. (DMF).

**Alcoi:** 18.III: 2 par. en el bco. del Cint (DMF).

**Monnegre:** 04.III: 25 ej. (JMT,PAS,JCO); 16.III: 5 par. (JMT,OAP).

**Monòver:** 26.VIII: 5 ej. en Casas del Señor (ELSO).

#### **2017**

**Alicante:** 02.VII: 6 ej. Varias parejas en el bco. del río Montnegre (EJRR).

## CINCLIDAE

### ***Cinclus cinclus***

**Mirlo acuático europeo - Merla d'aigua - White-throated Dipper**

Estatus: Residente escaso localizado. Criterio: Citas de interés. Conservación: PE.

#### **2016**

**Zorita del Maestrazgo:** 21.XII: 1 ej. se alimenta y deambula durante toda la mañana en un meandro del río, cercano a Cantalbadat (FRB).

**Ludiente:** 31.VIII: 1 ej. (XBC).

**Embalse de Arenós:** 04.I: 3 ej. posados y volando por el cauce del riu Millars (JBC,JLB).

**El Toro:** 16.IV: 1 ej. en el río Palancia (EEGA).

#### **2017**

**Zorita del Maestrazgo:** 18.IV: grupo familiar de 5 juv. y 1 ad. (RPB,ALR,JCMO).

**Cedraman:** 08.VI: 4 ej. (MAG).

**Río Palancia:** reproducción en solo 2 territorios de todo el río Palancia (MAG).

**Río Villahermosa:** reproducción en solo 6 territorios de todo el río Villahermosa (MAG).

Interesante seguimiento en los ríos Palancia y Villahermosa, que parece detectar un descenso poblacional respecto a trabajos anteriores (Gómez-Serrano, 1999; Servicio de Biodiversidad, 2007, 2013). Destaca también la presencia de una nueva pareja en el curso alto del riu Bergantes en Zorita.

## PASSERIDAE

### ***Passer domesticus***

**Gorrión común - Teuladí - House Sparrow**

Estatus: Residente abundante. Estatus: censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Quadro de Santiago:** 21.VIII: 110 ej. en varios grupos, concentración postnupcial destacada (MTB).

**Alacant:** 22.I: 1 pollo muerto, ya emplumado. Reproducción temprana (MAA).

**El Fondo d'Elx:** 11.VIII: 700 ej. en cultivos (OAP).

***Passer hispaniolensis*****Gorrión moruno - Teuladí de passa - Spanish Sparrow**

Estatus: Visitante ocasional del interior de la península Ibérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 9/35 (ene, mar, may, jun, oct, dic).

**2016**

**Requena:** 24.I: 2 m. en un seto de zarzales junto a 15 gorriónes comunes y 5 molineros. En mosaico agrícola con viñedos, baldíos y riberas del Magro en Fuentes Flores (JAI).

**Salinas de Santa Pola:** 01.I: 4 ej.; 08.I: 127 ej. (OAP); 10.I: 190 ej. (JMT,DMF,BOR); 12.I: 80 ej. (SAR);14.I: 146 ej. (JMT,OAP); 17.I: 145 ej. (OAP); 25.XI: 2 m. y 1 h.; 25.XI: 3 ej. (OAP,JMT); 26.XI: 8 ej. ; 29.XI: 40 ej. ; 26.XII: 1 m. (OAP).

**2017**

**Hortunas:** 12.VII: 60 ej. 2 bandos y varios ejemplares sueltos en valle del río Magro; 12.VII: 60 ej. varios bandos en la vega del Magro (unos 60 ej., mayoría de h. y juv.); 06.VIII: aproximadamente 15 nidos en ramas altas de un bosque de chopos a orillas del río Magro. Varios nidos 2-3 se agrupan en la misma horquilla mientras otros están aislados (RMB); 06.VIII: 15-17 nidos en choperas formadas por 6 chopos altos a orilla del Magro. No se observa ningún ej.; 19.XI: entre 39-42 nidos (RMB).

**Marjal de Pego-Oliva:** 18.VI: al menos 1 m. junto a otros gorriónes en un charco (JOC).

**Salinas de Santa Pola:** 20.XII: 30 ej.; 22.XII: 2 ej.; 24.XII: 40 ej. (OAP).

Tras las citas del año 2015, en el que un grupo de 30 ej. permaneció en el entrono de las salinas de Santa Pola, observamos la fuerte irrupción de esta especie en la CV, con grupos invernales de casi 200 ej. en esta localidad y sobre todo la presencia de colonias reproductoras de cierta importancia en la plana de Utiel entorno a las choperas del río Magro. Se produce también una cita estival más al N en la marjal de Pego-Oliva. El gorrión moruno no tenía citas conocidas en Alicante, en Valencia hay algunas referencias de mediados del s. XX en l'Albufera y en Requena (Ferrer et al, 1986), mientras que en Castellón, hubo un núcleo de cría que desapareció en los años 80 del s. XX en una zona de naranjos de Burriana (Pardo, 1984).

***Passer montanus*****Gorrión molinero - Teuladí torredà - Eurasian Tree Sparrow**

Estatus: Residente nidificante moderado, invernante común. Estatus: censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

**2016**

**Quadro de Santiago:** 09.III: 39 ej. Máximo anual en pequeña colonia nidificante (MTB).

**Requena:** 24.IX: bando otoñal de unos 150 ej. que se alimenta de gramíneas en la orilla de la balsa (RMB).

**El Fondo d'Elx:** 28.XI: 70 ej. (OAP).

**Hondo de Amoros:** 26.II: 80 ej. (AJR).

**2017**

**Castellón de la Plana:** 29.XII: 50 ej. Máximo invernal en patatal con rastrojos cerca de una pequeña área de cría (MTB).

**Albufera de València:** 02.I: grupo de 120 ej. en zonas de arrozal de Sollana (VBJ); 22.I: grupos destacados de 240, 150 y aproximadamente 200 ej. (este último en un grupo mixto con gorrión común) en arrozales de la Palmera y la Maquial. Importante número de aves que podría estar vinculado con la llegada de ej. después del fuerte temporal de nieve y frío de los últimos días; 06.XII: grupo destacado de al menos 230 ej. alimentándose en los rastrojos de arrozales de la Maquial (BDJ).

**Mislata:** 18.IX: concentración postnupcial destacada de 80 ej. en la huerta, formando un gran grupo con verdecillos y jilgueros (PAB).

**Marjal de Xeresa - Xeraco:** 21.VII: 26 ej. anillados, en su mayoría juv. (PLP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 19.XII: 120 ej. (PLP).

**El Fondo d'Elx:** 22.XII: 600 ej. (AJR).

**Hondo de Amoros:** 18.XII: 300 ej. (AJR).

***Petronia petronia*****Gorrión chillón - Pardal roquer - Common Rock-sparrow**

Estatus: Residente moderado. Estatus: censos destacados, fechas extremas y citas de iterés.

**2016**

**Requena:** 06.III: bando de 74 ej. (RMB).

**Ayora:** 04.XI: 220 ej. posados en cables junto a la balsa de agua (GGO).

**El Pinós:** 22.V: 1 ej. Escaso en término (AJR).

**2017**

**Bellús:** 15.XII: 80 ej. cerca del casco urbano (CMO).

**Bocairent:** 27.XII: 30 ej. (PAS).

**Sierra Aitana:** 13.XII: 23 ej. (PLP,JSR).

**Pantano de Elche:** 01.IV: 6 ej. Muy raro en la zona (OAP),

***Estrilda astrild*****Estrilda común - Bec de corall senegalès - Common Waxbill**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Criterio: Citas de cría, censos destacados y citas de interés. Categoría: C1.

**2016**

**Desem. del Carraixet:** 07.I: 2 ej.; 15.II: 4 ej. (RMB).

**Albufera de València:** 22.III: 25 ej. en la vegetación de carrizal a orillas del canal del Racó de l'Olla (MCH,JID,GGA); 10.IV: 30 ej. alimentándose en zonas densamente vegetadas de zarzamora de la acequia del Racó de l'Olla (BDJ); 01.XI: 13 ej. en zonas de huerta del Cabeçol y 8 ej. en zonas arboladas cerca del litoral del Mareny de Sant Llorenç (BDJ); 12.XI: 20 ej. en carrizales de un canal del entorno del Palmar (MCH); 05.XII: 30 ej. (3 juv.) (ELCA).

**Mislata:** 11.X: 10 ej. en la huerta. Se trata de la cifra más elevada de la especie en la población (PAB).

**Marjal de Xeresa - Xeraco:** 15.XII: 20 ej. (PLP).

**Marjal de Pego-Oliva:** 22.XII: 20 ej. (PLP).

**El Campello:** 06.V: 4 ej. (PSH).

**2017**

**Desem. del riu Millars:** 05.I: 9 ej. (VBJ).

**Quadro de Santiago:** 01.X: 7 ej. Única cita anual (MTB).

**Desem. del Carraixet:** 20.II: 26 ej. (RMB).

**Mislata:** 29.X: al menos 20 ej. en la huerta. Máximo para la localidad (PAB,ODB,MPA).

**Albufera de Valencia:** máximos en el Racó de l'Olla de 8 ej. el 31.I (BDJ) y de 6 ej. el 18.V (MCH); 24.XI: al menos 15 ej. en huertas de Sueca (BDJ).

**Cullera:** citas en áreas de transición de zonas forestales y cultivos de cítricos de unos 20 ej. el 19.X y de al menos 25 ej. el 06.XII (BDJ). 20.XI: 20 ej. la playa del Brosquill (TPA).

**Moncada:** 22.XII: 8 ej. (JOB).

**Paterna:** 14.X: 9 ej. en el parque fluvial del Turia en tramo de 2 km (MASA).

**Riba-Roja de Túria:** 13.VIII: 11 ej. en el parque fluvial del Turia en tramo de 4 km (MASA).

**Tavernes de la Vallidigna:** 20.XI: 6 ej. en l'ullal Gran (TPA).

**Xeraco:** 09.XII: 5 ej. en la playa (AAC).

**Aleta:** 01.VII: grupo de 6 ej. en el río Algar (EJRR).

***Estrilda melpoda*****Estrilda carinaranja - Bec de corall de galta taronja - Orange-checked Waxbill**

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET. Categoría: C, E1.

**2016**

**Grau de Castelló:** 20.X: 10 ej. (PGR).

**Desemb. río Mijares:** 04.V: 8 ej. (MBM).

**Burriana:** 09.X: 6 ej. exótica habitual en la zona (JMI).

**2017**

**Burriana:** 01.XI: 6 ej. exótica habitual en la zona (JMI).

**PRUNELLIDAE*****Prunella collaris*****Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor**

Estatus: Invernante escaso localizado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Morella:** 03.I: 6 ej. (EARS).

**Ares del Maestre:** 17.X: 6 ej. Primera cita invernal (RPB,ALR).

**Borriol:** 07.XI: 4 ej. buscan dormitorios en los paredones del barranco de la Botalaria (LPC).

**Alfondeguilla:** 21.II: 5 ej. (PGR,SGM).

**Bejís:** 10.XI: 12 ej. comiendo entre las rocas en el Castillo de Bejís (CFA).

**Utiel:** 01.XI: 6 ej. en la cumbre del pico del Negrete y 3 en un roquedo junto a la carretera (JAI).

**Xeresa:** 16.II: 8 ej. (CMO,RPM).

**Benicadell:** 13.II: 18 ej. 15 de ellos con anilla. Cita máxima para el Benicadell (ROL); 20.XI: 11 ej. 10 de ellos anillados y la mayoría con anilla de lectura a distancia (JBN,NLM); 15.XII: 14 ej. (ROL).

**Montcabrer:** 30.I: 22 ej. se anillaron 6 ej. (ROL,TMF); 09.IV: 3 ej. (DMF); 22.X: 8 ej. (BOR).

**Callosa d'En Sarrià:** 20.XI: 4 ej. (JDL).

**Gaïanes:** 16.I: 16 ej. (ROL).

**2017**

**Borriol:** 03.II: 1 ej. en el bco. de Atzavara; 10.XI: 4 ej. acceden a los dormitorios de los paredones del bco. de la Botalaria (LPC).

**Mondúver:** 17.XI: 3 ej. (PLP).

**Loriguilla:** 21.XI: 1 ej. en el embalse (VPA).

**El Grabí:** 05.I: 3 ej. (GGO).

**Utiel:** 11.XI: 2 ej. en el pico del Remedio (MSL).

**Montcabrer:** 01.II: 6 ej., 3 de ellos anillados (DMF); 29.XII: 12 ej. (JCO).

**Benicadell:** 17.II: 14 ej. en la solana de Benicadell (EJMO); 19.XII: 12 ej. en la cima (JCO).

**Sierra de Mariola:** 03.XII: 8 ej. (BOR).

Profusión de citas de esta especie de la que mostramos una selección. Esta especie ha empezado a conseguir atención por parte de los ornitólogos y cuya invernada era prácticamente desconocida no hace tantos años. El resultado de estos seguimientos ha puesto de manifiesto que se trata de una especie que está presente en una gran cantidad de zonas montañosas y picos de la CV. Las campañas de anillamiento del Grup Reiet d'Anellament y del Grupo Pit Roig (p. ej. Greño et al., 2013), apuntan a una alta fidelidad a las zonas de invernada.

***Prunella modularis*****Acentor común - Rossarda - Dunnock**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante moderado. Criterio: Citas estivales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 21.X: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Quadro de Santiago:** 08.I: 1 ej. varias citas invernales. Escaso (MTB).

**Alpuente:** 07.II: 4 ej. (EJCP).

**Albufera de València:** 27.X: 2 ej. en dunas litorales del Recatí. Primer registro otoñal y una de las pocas citas obtenida en los últimos años (VPA).

El Pinós: 10.III: 1 ej. Primera cita para la localidad (AJR).

Rio Serpis: 01.XI: 1 ej. (BOR).

## 2017

Ares del Maestre: 24.VII: 1 juv. en la Mola (RPB,ALR).

Quadro de Santiago: 27.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

## MOTACILLIDAE

### **Motacilla flava**

### **Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail**

Estatus: Nidificante escaso, migrante común, invernante raro. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

Prat de Cabanes-Torreblanca: 06.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB).

Quadro de Santiago: 08.IV: 261 ej. Máximo anual en recorrido de 2,5 km (MTB).

Desem. río Seco: 06.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (MTB).

Desem. del Carraixet: 31.I: 1 ej. (EJLM).

Albufera de València: 16.I: 1 ej. en Milia (PMP); 28.I: 1 ej. alimentándose en campos fangueados del tancat de la Sardina (PVG); 07.III: 1 ej. de la ssp. nominal en campos encharcados del tancat de la Naia (AAC); 11.III: 20 ej. con claro predominio de m. (AAC); 01.V: 1 m. mostrando rasgos propios de la ssp. *feldegg* observado en arrozales cerca del Portet de Sollana (FAZ). Observación pendiente de homologación. Con este serían ya cuatro las observaciones realizadas desde 2008; 03.XI: 1 m. mostrando rasgos de la subespecie *beema* en arrozales cerca del portet de Sollana (YAM); 05.XI: 1 ej. cerca del portet de Sollana (GGO); 03.XII: 1 ej. en Milia (JMR,MPB,PMP); 21.XII: 1 ej. en el entorno de la séquia del Port de Catarroja (CRE,MCS).

Salinas de Santa Pola: 25.II: 5 ej. (AJR,SAR); 29.XII: 1 ej. (OAP).

El Fondo d'Elx: 18.I: 1 ej. de 1<sup>er</sup> inv. (SAR); 04.XI: 1 ej. (AJR,SAR); 19.XI: 1 ej. (JMT,IAG,AAR); 04.XII: 2 ej. (ASS).

## 2017

Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.III: 2 m. Primera cita anul; 20.III: 1 m. de la ssp. *feldegg* reclamando desde el suelo; 04.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB,JAF).

Marjal dels Moros: 29.I: 1 ej. (VBJ); 17.XII: 1 ej. (JPH).

Alacant: 08.XII: 1 ej. en una pequeña marjal artificial con varias charcas (EGSP).

Salinas de Santa Pola: 02.I: 1 ej. (OAP,TGR).

El Fondo d'Elx: 01.XII: 1 ej. (AJR,SAR).

Resulta muy complicada la asignación específica de la ssp. *beema* fuera del rango de presencia durante el periodo reproductor. Existen varios registros en la península Ibérica que podrían corresponderse con esta subespecie cuya área de reproducción se limita a la parte central y occidental de Asia. Sin embargo, este tipo de registros no pueden ser confirmados fuera de su ares de cría ya que parecen existir fenotipos idénticos cuando se produce el cruce de dos subespecies. Por lo demás, destacan las dos nuevas citas de ej. de la ssp. *feldegg* y las numerosas citas invernales.

### **Motacilla citreola**

### **Lavandera cetrina - Cueta citrina - Citrine Wagtail**

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 86/42 (dic-may, ago-oct).

## 2016

Prat de Cabanes-Torreblanca: 24.IX: 1 juv. (MTB).

Sagunt: 31.III: 1 m. (YAM).

**2017**

**Albufera de València:** 09.IX: 1 ej. 1<sup>er</sup>. inv. en un arrozal recién cosechado de la Llonga (BDJ); 20.IX: 1 ad. en compañía de lavandera boyera en arrozales ya cosechados en el tancat de l'Escorredor (AAC,YAM).

Después de la fuerte irrupción que se produjo en los años 2014 y 2015, con al menos 17 ejemplares, 2016 y 2017 con dos citas por año, han estado más en consonancia con lo que se viene observando desde hace unos 10 años.

**Motacilla cinerea****Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 19.III: 1 ad. Última cita invernal (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Quadro de Santiago:** 24.III: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Albufera de València:** 22.IX: 1 juv. en una acequia del Borronar Primer registro postnupcial (BDJ).

**Elx:** 19.XI: 15 ej. por el río Vinalopó a su paso por Elche (OAP).

**EDAR de Santa Pola:** 30.X: 4 ej. (JMT,OAP).

**2017**

**Alcossebre:** 08.III: 1 ad. Última cita invernal; 19.X: 1 ad. Primera cita invernal (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 23.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).

**València:** 02.X: 1 ej. Primera cita postnupcial en l'Oceanogràfic (PAB).

**Motacilla alba****Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail**

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 14.I: 240 ej. repartidos en varios campos encharcados en los arrozales de Almenara (MTB).

**Albufera de València:** 12.II: 2 ej. de la ssp. *yarrellii* (1 m.) en arrozales fangueados de la Perereta (BDJ); 20.II: 1 ej. de la ssp. *yarrellii* en arrozales fangueados de Alfafar (JLE); 07.III: 2 ej. de la ssp. *yarrellii* en campos encharcados del tancat de la Naia (AAC).

**Requena:** 28.II: 121 ej. (RMB); 13.XI: 160 ej. al anochecer se van a dormir hacia Requena (JAI).

**El Fondo d'Elx:** observaciones de ej. de la ssp. *yarrellii*: 09.II: 1 m. ad. (TGR,RHW); 18.II: 1 ej. (SAR, AJR); 18.III: 1 ej. (JMT,OAP).

**2017**

**Albufera de València:** 26.I: 1 h. de la ssp. *yarrellii* en arrozales recién fangueados del Fus (PVG); 27.XI: 3 m. de la ssp. *yarrellii* en arrozales del camí de Xelvano formando parte de un grupo de lavandera blanca (JOB).

**El Fondo d'Elx:** 04.III: 1 ej. de la ssp. *yarrellii* (AJR); 19.XII: 1 m. de la ssp. *yarrellii* (AJR,SAR).

**Hondo de Amoros:** 23.XII: 1 m. de la ssp. *yarrellii* (AJR).

**Anthus richardi****Bisbita de Richard - Titeta de Richard - Richard's Pipit**

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

**Marjal d'Almenara-Sagunt:** 14.I: 3 ej. en zonas cercanas a la playa; 26.III: 2 ej. en zona de invernada cercana a la playa (MTB); 11.XII: 3 ej. en el aeródromo (JOB).

**Albufera de València:** 04.I: 1 ej. en el camí del Xelvano (AAC); 27.I: 1 ej. alimentándose en los laterales del

camí de la Bassa Rassa (BDJ); 11.XII: 1 ej. en uno de los caminos en la Socarrada (JMT).

**Salinas de Santa Pola:** 29.I: 1 ej. (NGA).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 04.XI: 1 ej. Quizás la primera cita para la localidad (MTB, JAF).

**La Llosa:** 06.XI: 3 ej. (AAC).

**Quartell:** 06.XI: 3 ej. (AAC).

**Marjal dels Moros:** 28.X: 1 ej. (GCH).

**Albufera de València:** 07.I: 1 ej. en zona herbácea del Dosel (AAC) 09.IV: 2 ej. en praderas del campo de Golf de la Devesa (GCH,JAZ).

## ***Anthus campestris***

## **Bisbita campestre - Titeta d'estiu - Tawny Pipit**

Estatus: Estival nidificante común y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 01.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Quadro de Santiago:** 27.III: 1 ej. Primera cita anual; 24.IV: 5 ej. Máximo anual; 04.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

## 2017

**Quadro de Santiago:** 01.IV: 2 ej. Primera cita anual; 06.IV: 19 ej. Máximo anual en pastizal (MTB).

## ***Anthus pratensis***

## **Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit**

Estatus: Migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Alcossebre:** 07.IV: 5 ad. última cita prenupcial; 11.X: 2 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 09.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Quadro de Santiago:** 09.IV: 1 ej. (MBM); 13.IV: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).

**Albufera de València:** 08.X: 1 ej. en el Racó de l'Olla. Primera cita otoñal (BDJ).

**Requena:** 02.X: 2 ej. Primera cita otoñal (JAI).

**Isla de Tabarca:** 08.IV: 1 ej. (PIC).

## 2017

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 15.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Albufera de València:** 05.X: 1 ej. en arrozales del Saladar. Primer registro otoñal (PMP).

## ***Anthus trivialis***

## **Bisbita arbóreo - Titeta dels arbres - Tree Pipit**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Morella:** 15.VIII: 2 ej. Cita postnupcial temprana (RPB,ALR,VBJ).

**Quadro de Santiago:** 24.III: 1 ej. Primera cita anual; 02.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 12.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Alpuente:** 06.IX: 3 ej. (JOB).

**Albufera de València:** 23.III: 1 ej. en zonas de tarays próximos a la Pipa. Primer registro primaveral (BDJ); 28.IV: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants; 19.X: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants. Última cita postnupcial (AAC).

**Bocairent:** 30.VIII: 1 ej. cerca del Mas Guillella (BOR).

**Alfafara:** 09.X: 2 ej. (BOR).

**2017**

**Castell de Cabres:** 28.VIII: 1 ej. alimentándose en el suelo (VFT).

**Quadro de Santiago:** 19.IV: 7 ej. Máximo anual en recorrido de 3,2 km; 09.V: 1 ej. Última cita primaveral; 16.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).

**Castellón de la Plana:** 20.III: 1 ej. en campos de naranjos. Primera cita anual (MTB).

**Albufera de València:** 27.X: 1 ej. en zonas arboladas del Racó de l'Olla. Cita algo tardía (YAM).

**Casinos:** 23.IX: 1 ej. (EEAR).

**La Pobla de Farnals:** 24.IX: 1 ej. (TPA).

***Anthus hodgsoni*****Bisbita de Hodgson - Piula de Hodgson - Olive-backed Pipit**

Estatus: Divagante de Asia central y oriental. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 1/2 (dic).

**2017**

**Elx:** 12.XII: 2 ej. aquerenciados a huerto de palmeras del campo de Elche (OAP,EGM,JMT,YAM). Presentes en la zona durante varios días. Cita homologada por el comité de rarezas de la SEO.

***Anthus cervinus*****Bisbita gorgirrojo - Titeta gola-roja - Red-throated Pipit**

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

**Quadro de Santiago:** citas de 1 ej. los días 03.IV, 05.IV, 08.IV y 10.IV (MTB).

**Albufera de València:** 24.II: 1 ej. de 2º año en arrozales de Silla. Primer registro prenupcial temprano (PMP). Observaciones en el tancat de la Naia de 2 ej. el 07.III; 3 ej. el 11.III (AAC); 1 ej. con plumaje invernal el 14.III (PVG) y 1 ej. el 16.III (AAC). 04.IV: 2 ej. con plumaje nupcial asociadas a un gran bando de lavanderas boyeras en campos roturados del tancat de les Basses (AAC); 08.IV: 7 ej. en migración activa, en solitario y reclamando sobre la línea de costa entre Pinedo y el Saler en menos de 1 h. de observación y otros 2 ej. alimentándose en el tancat de la Ratlla (AAC); 09.IV: 1 ej. en la Ratlla (BDJ); 16.IV: 2 ej. alimentándose en zonas encharcadas del tancat de la Ratlla (AAC); 16.IV: 1 ej. en migración activa en l'estany del Pujol (PVG); 17.IV: 2 ej. en la Pipa (VBJ,PLP,YAM); 21.IV: 1 ej. en migración activa y reclamando sobre las dunas de la Devesa (AAC); 28.IV: 2 ej. en zonas de cultivos hortícolas de Silla (BDJ); 30.XI: 1 ej. en el marjal de Albal (PVG).

**Elx:** 03.XII: 1 ej. (BOR,DMF).

**Salinas de Santa Pola:** 26.XII: 1 ej.; 31.XII: 2 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 17.XI: 1 ej. (OAP); 24.XI: 1 ej. distinto al observado anteriormente días atrás (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 22.IV: 6 ej. Máximo primaveral en recorrido de 1,2 km. (MTB,JAF); 25.IV: 4 ej. (ESWR); 06.V: 1 ej. Última cita primaveral. Año extraordinario con 20 citas primaverales; 04.XI: 1 ej. Cita postnupcial tardía (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 28.IV: 2 ej. Máximo primaveral (MTB).

**Albufera de València:** 06.II: 1 ej. junto a lavanderas boyeras, lavanderas blancas, bisbitas comunes y bisbitas alpinos (CGE); 16.II: 1 ej. en arrozales del Bony (CGU); 05.IV: se escucha 1 ej. sobre las dunas de la Creu volando hacia el N en día de paso de golondrinas y lavanderas boyeras (JID,MCH); 24.IV: 1 ej. junto con lavanderas boyeras en un campo de cebollas recién roturado en la Maquial (BDJ).

**Salinas de Santa Pola:** 02.I: 2 ej. (OAP,TGR); 20.XI: 1 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 29.XII: 1 ej. (EAAN).

Continúa el importante aumento de citas de esta especie detectado años atrás en el entorno de la Comunidad Valenciana. Además de las importantes concentraciones primaverales, destacan las citas plentamente invernales detectadas en el S de Alicante en 2016 y 2017.

**Anthus spinoletta****Bisbita alpino - Titeta de muntanya - Water Pipit**

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 15.X: 5 ej. Primera cita postnupcial; 12.XI: 36 ej. Máximo anual en censo de 1,8 km (MTB).

**Quadro de Santiago:** 20.IV: 1 h. Última cita primaveral (MTB).

**Albufera de València:** 08.IV: todavía 10 ej. alimentándose en zonas inundadas del tancat de la Ratlla (AAC); 22.IV: 1 ej. en la Ratlla (FAZ); 23.X: 2 ej. en arrozales de Sueca. Primeros registros otoñales (EPS).

**El Fondo d'Elx:** 14.III: 35 ej. algunos ya en plumaje nupcial (JMT,OAP).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 06.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 26.V: 1 ej. Cita prenupcial tardía (MTB).

**Albufera de València:** 14.X: 1 ej. en l'estany del Pujol. Primer registro otoñal (YAM,GGO).

**Requena:** 09.IV: 1 ej. (JAI).

## FRINGILLIDAE

**Fringilla coelebs****Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Alcossebre:** 15.X: 2 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Benicàssim:** 28.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 16.X: 4 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Alpuente:** 01.I: 250 ej. (EJCP).

**Albufera de València:** 15.X: 3 ej. en zonas arboladas de l'Abre del Gos. Primer registro otoñal (BDJ).

**2017**

**Alcossebre:** 17.IX: 3 ad. Primera cita postnupcial (DES).

**Desert de Les Palmes:** 07.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Benicàssim:** 25.III: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).

**Fringilla montifringilla****Pinzón real - Pinsà mec - Brambling**

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Gaibiel:** 01.I: 1 ej.(CMO); 09.I: 1 m. posado en un nogal (CMO,RPM).

**Alpuente:** 01.I: 6 ej. (EJCP).

**Chelva:** 29.I: 1 m. entre pinzones vulgares en mas del Pinar (PRP).

**Albufera de València:** 04.I: 19 ej. (predominio de m.) alimentándose en campo fangueado cercano a la muntanyeta dels Sants (AAC); 18.II: 6 ej. en arrozales del Rabisanxo (YAM).

**Utiel:** 16.I: 80 ej. junto con pinzones vulgares, jilgueros, escribanos palustres y gorriones molineros en un viñedo semiabandonado. Mayor cita histórica para la comarca de Requena-Utiel (JAI).

**Requena:** 24.I: 1 ej. en un bando con pinzones vulgares y pardillos (JAI); 16.III: 1 ej. (RMB).

**Bocairent:** 20.II: 2 ej. en la font de Mariola (BOR).

**Sierra Aitana:** 10.I: 17 ej. (OAP,RLM,LUR); 24.X: 2 ej. (JSR).

**Salinas de Santa Pola:** 17.I: 1 ej. (OAP).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 1 m. ad. (JMT).

**Benejúzar:** 11.II: 3 ej. en un taray junto a pinzones vulgares (NGA).

**Sierra de Mariola:** 29.I: 2 ej. (DMF).

## 2017

**La Yesa:** 09.XI: 3 ej. en bebedero artificial (TPA).

**Marjal dels Moros:** 31.XII: 4 ej. (EAAN).

**Albufera de València:** 06.II: 4 ej. en arrozales de Catarroja. Primer registro invernal (CGU); 27.X: 3 ej. en la Devesa (YAM); 21.XI: mínimo de 170 ej. alimentándose en campos de rastrojos en las proximidades de l'ullal de Baldoví. Máximo registrado hasta la fecha en la Albufera (AAC); 25.XI: mínimo de 60 ej. en l'ullal de Baldoví (JOB); 27.XI: 11 ej. en arrozales de Alfafar (YAM).

**Godolleta:** 15.XI: 1 ej. (VPA).

**Bocairent:** 26.XI: 5 ej. (BOR).

**Sierra Aitana:** 01.XI: 8 ej. observados desde un *hide* (ECAM).

**Hondo de Amoros:** 20.XII: 3 ej. (AJR,SAR).

**Font de Mariola:** 29.X: 3 ej. (BOR).

**Serra Mariola:** 10.XII: 1 ej. (BOR).

## **Coccothraustes coccothraustes**

## **Picogordo común - Trencapinyols - Hawfinch**

Estatus: Nidificante raro, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

## 2016

**Bocairent:** 16.I: 3 ej.; 13.XI: 5 ej. cerca del camping (BOR).

**Sierra Aitana:** 03.IV: 1 h. (JSR,PLP).

**Embalse Beniarrés:** 24.III: 1 ej. (BOR).

**Alcoi:** 26.VI: 1 par. (BOR).

**Onil:** 16.I: 5 ej. en los jardines de la Casa Tapena (MCR).

**Ibi:** 04.XI: 1 ej. (JBN).

**Font de Mariola:** 31.XII: 3 ej. (BOR).

**Sierra de Mariola:** 12.III: 1 ej. en la Foia Ampla (BOR).

## 2017

**Desem. del riu Sènia:** 10.XI: 7 ej. máximo anual, habitual en la zona desde noviembre (MBT).

**Alcossebre:** 9.X: 3 ej. Primera cita postnupcial; 23.XII: 5 ej. máximo invernal (DES).

**Benicàssim:** 31.XII: 3 ej. Máximo anual en recorrido de 0,9 km (MTB).

**La Llosa:** 22.X: 20 ej. (ANL).

**Bétera:** 18.X: 21 ej. migrando al amanecer en diversos grupos pequeños (TPA,PLT).

**Manises:** 100 ej. en paso activo entre el 21 y el 22.X en grupos de 5 a 30 ej. (JMPU).

**Valencia:** 10.X: 3 ej. Primera cita postnupcial (PAB).

**Albufera de València:** 04.III: 1 ej. en el escaso arbolado del barranco del Poio (AAC).

**Sierra Mariola:** 12.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 29.X: 7 ej. Máximo postnupcial; 10.XII: 7 ej. Máximo invernal (BOR).

**Lliria:** 26.X: 4 ej. en paso activo (PPA).

**La Pobla de Farnals:** 12.X: 5 ej. Primera cita postnupcial (TPA); 20.X: 3 ej. en paso activo (MPO).

**Requena:** 7.X: 1 ej. Primera cita otoñal en el río Cabriel; 12.XI: 10 ej. en el Bco. de Hórtola (JAI).

**Utiel:** 11.XI: 30 ej. en el pico del Remedio (MSL).

**Torrent:** 27.XI: 7 ej. comiendo frutos de *Washingtonia* (JGG).

**Alcocer de Planes:** 08.X: 7 ej. en el embalse de Beniarrés; 15.X: 30 ej. (BOR).

**Alcoi:** 08.XII: 6 ej. en la serra dels Plans; 26.XII: 5 ej. en una plaza del casco urbano (BOR).

**Font Roja:** 10.VI: 1 ej.; 01.VII: 1 m. varias citas más en el mes de julio; 28.X: 8 ej. (BOR).

**Onil:** 01.XI: 41 ej. en los almeceas de la Casa Tapena (EJDR).

Destacables las citas estivales en la Font Roja, ya que el picogordo es una especie muy escasa en la CV durante la época de cría. Su presencia como reproductor, solo se ha constatado, aunque de forma muy escasa, en la comarca dels Ports (Prades, 2018). Es igualmente remarcable la importante irrupción en 2017, con bandos en paso activo y concentraciones elevadas en muchos puntos de la CV.

### ***Bucanetes githagineus***

### **Camachuelo trompetero - Pinsà trompeter - Trumpeter Finch**

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante raro. Conservación: VUL.

#### **2016**

**Sant Vicent del Raspeig:** 17.III: 1 m. (AJR).

**Alacant:** 22.II: 4 ej. uno de ellos m. haciendo movimientos de ala tipo *display* (PLP); 06.V: 1 par. (JMT, DAF); 12.V: 10 ej. (PLP).

### ***Chloris chloris***

### **Verderón común - Verderol - European Greenfinch**

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Quadro de Santiago:** 03.IX: 23 ej. Máximo anual en campo con plantas anuales; 06.IX: 2 juv. con pocos días volando tras la h. Cita algo tardía de reproducción (MTB).

**Requena:** 26.VIII: 2 juv. de un grupo familiar de 5 ej. chocan contra un cable de tendido eléctrico (PRP).

**Sant Vicent del Raspeig:** 14.XII: 65 ej. (JBN).

**Santa Pola:** 06.XII: 43 ej. (JMT,OAP).

**El Fondo d'Elx:** 01.XII: 300 ej. (AJR,SAR).

#### **2017**

**Islas Columbretes:** 06.IV: 11 ej. bando estimado (LGB).

### ***Linaria cannabina***

### **Pardillo común - Passerell - Common Linnet**

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Albufera de València:** 01.X: 20 ej. volando hacia el S sobre la gola del Perellonet. Primer registro otoñal (BDJ); 24.XI: 140 ej. en tres bandos en diferentes puntos de la marjal de Sueca (AAC).

**Ayora:** 04.XI: 350 ej. Grandes concentraciones en los campos (GGO).

**Clot de Galvany:** 23.III: 5 pollos. Primera pollada del año (AJR).

**El Fondo d'Elx:** 18.XI: 160 ej. (JMT,OAP).

#### **2017**

**Benicàssim:** 30.IV: 1 h. Última cita prenupcial (MTB).

**Quadro de Santiago:** 16.III: 179 ej. sedimentados en un pastizal en pequeños grupos. Máximo anual; 01.X: 3 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Islas Columbretes:** 06.IV: bando de 16 ej. (LGB).

**Titaguas:** 15.VIII: bando postreproductor de 250 ej. (VBJ).

### ***Loxia curvirostra***

### **Piquituerto común - Bec-tort - Red Crossbill**

Estatus: Nidificante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Desert de Les Palmes:** 08.X: 1 ej. volando cerca del Bartolo (MTB).

**Albufera de València:** 15.I: 1 ej. en zonas arboladas de la Devesa. Uno de los pocos obtenidos en los últimos años (TPA); 17.I: 2 ej. reclamando en zonas arboladas de la Devesa (VPA).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 18.IX: 3 ej. en paso al N (JCA).  
**Albufera de València:** 12.IX: 10 ej. volando hacia el N en la Devesa (GGO).  
**Cullera:** 03.XI: 3 ej. en zonas arboladas del Cabeçol (BDJ).

***Carduelis carduelis*****Jilguero europeo - Cadenera - European Goldfinch**

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Vilanova d'Alcolea:** 01.VIII: 123 ej. (JBC).  
**Quadro de Santiago:** 25.IX: 270 ej. Máximo anual en zona abierta con abundantes cardos (MTB).  
**Barracas:** 10.VIII: 145 ej. grupo de unos 90 ex. juntos (JBC).  
**Ayora:** 04.XI: 100 ej. (GGO).  
**Salinas de Santa Pola:** 04.II: 100 ej. (OAP).

**2017**

**Castellón de la Plana:** 30.VIII: máximo anual de 170 ej. en un naranjal abandonado (MTB).  
**Marjal dels Moros:** 02.XII: máximo invernal de 150 ej. (GCH).

***Carduelis citrinella*****Verderón serrano - Verderolet - Citril Finch**

Estatus: Nidificante localizado, invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016**

**Alpuente:** 31.I: 1 ej. (EJCP).

**2017**

**Aras de los Olmos:** 25.XI: 200 ej. en un único bando alimentándose en barbechos (AAC,CVA).  
**La Yesa:** 09.XI: 30 ej. en bebedero (TPA).  
**Confrides:** 11.XI: 20 ej. observados desde *hide* (EJDR).  
**Sierra de Mariola:** 03.XII: 10 ej. (BOR).

***Serinus serinus*****Serín verdecillo - Gafarró - European Serin**

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Benicàssim:** 12.III: 72 ej. en paso hacia el N en 40 min. en grupitos de hasta 17 ej. (MTB).  
**Albufera de València:** 24.XI: bando destacado de 200 ej. en zona de huertas de Silla (AAC).  
**Sant Vicent del Raspeig:** 14.XII: 300 ej. Buena concentración de estos alimentándose en los matorrales (JBN).  
**El Fondo d'Elx:** 31.XII: grupo destacado de 250 ej. (OAP).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 16.XII: bando destacado de 140 ej. comiendo semillas de salicornia cerca de la costa (MTB,JAF).  
**Islas Columbretes:** 06.IV: bando de 14 ej. (LGB).  
**Villavieja:** 60 ej. en paso en grupos hacia el S (JBC,JLB).  
**Mislata:** 05.III: Primeros 3 juv. de la temporada (PAB).  
**Albufera de València:** 05.XII: bando destacado de más de 600 ej. alimentándose en rastrojos en Utxana (AAC).  
**El Hondo:** 02.I: 400 ej. en dos bandos de 300 y de 100 ej. (OAP, TGR); 28.XI: 400 ej. (AJR).  
**Sant Vicente del Raspeig:** 31.I: 170 ej. en la Universidad de Alicante (JBM).

***Spinus spinus*****Jilguero lúgano - Lluer - Eurasian Siskin**

Estatus: migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Benicàssim:** 09.I: 2 ej. muy escaso este invierno. Máximo invernal; 28.II: 1 ej. Última cita prenupcial; 13.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial; 25.XII: 4 ej. Máximo anual. Muy escaso este invierno (MTB).

**El Toro:** 26.III: 2 m. cantando (MGT).

**Utiel:** 16.I: 20 ej. (JAI).

**Bocairent:** 03.I: 14 ej. (BOR).

**Embalse Beniarrés:** 24.III: 13 ej. (BOR).

**Planes:** 25.III: 35 ej. (JMT,AVDH).

**Cocentaina:** 02.IV: 50 ej. (PCC); 02.IV: 50 ej. (PCC,PAS,JCO).

**Font Roja:** 10.I: 30 ej. capturados para su anillamiento científico; 21.II: 48 ej. capturados para su anillamiento científico. De los cuales 13, han sido controles propios (PCC).

**El Pinós:** 27.III: 5 ej. (AJR).

**Sierra de Mariola:** 03.III: 25 ej. (JCO,PAS).

**2017**

**Alcossebre:** 17.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES).

**Desert de Les Palmes:** 15.X: 1 m. (PGR).

**Benicàssim:** 7.XII: 17 ej. Máximo anual (MTB).

**València:** 14.X: 4 ej. en vuelo sobre La Devesa. Primera cita postnupcial (GGO,YAM).

**Font de Mariola:** 21.X: 15 ej. Máximo anual (BOR).

**Marjal dels Moros:** 20.X: máximo anual de 16 ej. (RMB).

**Embalse Beniarrés:** 12.X: 1 ej. (BOR).

**Sierra de Mariola:** 12.X: 8 ej. (BOR).

**Font Roja:** 28.X: 20 ej. (BOR); 17.XII: 75 ej. (AAR,ENAG,ESA).

**Elx:** 21.XII: 13 ej. (OAP).

**EMBERIZIDAE*****Emberiza calandra*****Escribano Triguero - Cruixidell - Corn Bunting**

Estatus: Nidificante común, migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016**

**Cuadro de Santiago:** 18.III: 55 ej. grupo destacado en paso al N (MTB).

**Albufera de València:** 16.XII: 36 ej. en zonas de cultivos hortícolas de la Maquial (PMP).

**El Fondo d'Elx:** 03.I: 200 ej. (JMT); 22.I: 80 ej. (AJR).

**2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 21.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB,JAF).

**Quadro de Santiago:** 21.III: 76 ej. Máximo anual; 22.V: 1 juv. Primer juvenil en pequeña colonia de cría, nidificante esporádico en el área (MTB).

**Mislata:** 08.IV: 1 ej. Poco frecuente en la población (PAB,TPA).

**Requena:** 02.IX: bando de 80 ej. que entran a beber en la balsa El Pontón (RMB).

**Albufera de València:** 01.V: 1 ej. en arrozales de l'Alter (BDJ); 11.VI: 1 m. cantando a las afueras de Sueca (MPB).

**El Hondo:** 02.I: 100 ej. (OAP,TGR).

**Emberiza citrinella****Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer**

Estatus: Invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

**2016****Villafranca del Cid:** 22.II: 2 ej. (RPB,ALR).**Bocairent:** 28.II: 1 m. en la font de Mariola; 13.XI: 2 ej. en los campos cerca de la Casa Domínguez (BOR).**2017****Casinos:** 21.XI: 1 ej. en bebedero artificial (GGO).**Bocairent:** 29.I: 2 ej. en campos cerca de la Casa Domínguez; 11.II: 3 ej. campos cerca casa Domínguez; 25.XII: 9 ej. (BOR).**Font de Mariola:** 15.XII: 1 ej. (PAS).**Emberiza cia****Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting**

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016****Benicàssim:** 24.XII: 2 h. invernantes (MTB).**Cullera:** 03.XII: 1 ej. en el Cabeçol. muy escaso en el área (VBJ).**Pantano de Elche:** 21.XII: 2 ej. raro en la zona (OAP).**2017****Benicàssim:** 01.I: 3 ej. Máximo invernal en transecto de 0,9 km (MTB).**Pantano de Elche:** 11.II: 3 ej. Raro en la zona (OAP).**Emberiza hortulana****Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting**

Estatus: Nidificante poco abundante, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016****Alcossebre:** 24.IV: 1 m. ad. Única cita anual (DES).**València:** 24.IV: 4 ej. en dunas de l'Abre del Gos. Primer registro prenupcial (FAZ).**Isla de Tabarca:** 24.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (PIC).**2017****Quadro de Santiago:** 20.IV: 1 ej. (MTB).**Albufera de València:** 17.IV: 1 m. alimentándose en herbazal en el tancat de la Pipa. Primer registro anual (AAC).**Emberiza cirlus****Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting**

Estatus: Nidificante y residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

**2016****Benicàssim:** 20.III: 1 ej. Única cita prenupcial; 16.X: 1 ej. Única cita postnupcial (MTB).**2017****Castellón de la Plana:** 26.I: 7 ej. Máximo invernal en transecto en naranjales (MTB).**Emberiza pusilla****Escribano pigmeo - Sit petit - Little Bunting**

Estatus: Invernante raro, divagante de Escandinavia y Siberia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 12/12 (sep-ene, mar).

**2017****Albufera de València:** 16.XII: 1 ej. anillado en Milia (PMP,MPB). Observación homologada por el Comité de Rarezas de la SEO.

Segunda cita para Valencia, tras el ejemplar observado en 2014 en la marjal dels Moros, que era la última cita registrada hasta el momento en la Comunidad Valenciana, y que junto con ésta son las dos únicas citas invernales. De las anteriores, todas en Castellón, todas se produjeron en los meses otoñales en Columbretes y solo una durante el paso prenupcial en el mes de marzo en el marjal de Peñíscola.

### ***Emberiza melanocephala***

### **Escribano cabecinegro - Sit capnegre - Black-headed Bunting**

Estatus: Divagante del SE de Europa. Liberado o escapado de cautividad. Criterio: Todas las citas recibidas. Estatus: A, D. Rango: 4/4 (may-jun, nov).

#### **2017**

**Albufera de València:** 03.VI: 1 h. en zonas vegetadas del bco. del Poyo en zonas de transición de huertas del Bony. Observación realizada a medio día en un ambiente densamente vegetado y sin que pueda ser relocalizado nuevamente (GCH). Observación homologada por el Comité de Rarezas de la SEO.

Cuarta cita para la Comunidad Valenciana, las tres anteriores en las Columbretes. No se citaba desde 1997. Actualmente se considera que una parte significativa de los ej. de la especie son introducidos o proceden de introducciones realizadas anteriormente (Rouco et al. 2019).

### ***Emberiza schoeniclus***

### **Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting**

Estatus: Migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

#### **2016**

**Alcossebre:** 21.X: 1 m. Primera cita postnupcial (DES).

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 22.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 12.XI: 49 ej. Máximo anual en censo de 1,8 km (MTB).

**Cuadro de Santiago:** 22.IV: 1 ej. Última cita primaveral muy tardía (MTB).

**Albufera de València:** Últimas citas prenupciales el 02.IV de 2 ej. en la Pipa (BDJ) y de 1 ej. anillado en Milia (PMP); 23.X: 1 ej. en la Ratlla. Primer registro otoñal (EPS).

**Utiel:** 16.I: 15 ej. (JAI).

**Embalse de Bellús:** 21.II: 15 ej. (BOR).

**Marjal de Pego-Oliva:** 14.III: 12 ej. (PSH).

**Salinas de Santa Pola:** 10.I: 50 ej. (JMT,DMF,BOR).

#### **2017**

**Prat de Cabanes-Torreblanca:** 27.III: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB,JAF).

**Cuadro de Santiago:** 27.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

**Albufera de València:** 22.X: varios ej. en la l'Illa. Primero registro otoñal (PMP).

**El Hondo:** 24.XII: 62 ej. (AJR).

# LISTA SISTEMÁTICA

(I)

CATEGORÍAS D Y E

***Branta leucopsis x Anser indicus***

Criterio: todas las citas recibidas.

**2016**

**Albufera de València:** 05.I: 3 ej. observados de forma continua hasta el 06.III en distintas localidades de l'Albufera (AAC, EPS, GGA).

**Salinas de Santa Pola:** 08.II: 3 ej. observados también el 09.II (PPP, AJR, SAR)

***Callonetta leucophrys*****Pato acollarado - Ringed Teal**

Estatus: Originario de América del Sur. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

**2017**

**Albufera de Valencia:** 10.XI: 1 m. en la Mata del Fang. No llevaba anillas, pero con toda probabilidad corresponde a un ave no silvestre. Posiblemente el mismo ej. fue abatido por cazadores en un Vedat de Sueca el 4.XII (JID, MCH).

Especie de origen sudamericano escasamente migrante. Se ha registrado un caso de posible cría de ejemplares asilvestrados en el S de Inglaterra (Carboneras & Kirwan, 2020b).

***Anas bahamensis*****Ánade gargantillo - Ànec de les Bahames - White-cheeked Pintail**

Estatus: Originario del Caribe y América del Sur. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

**2017**

**València:** 15.XI: 2 ej. (m. y h.), sin anillar, aunque con seguridad se corresponde con aves escapadas o liberadas (JID, MCH, GGA). Presentes también el 21.I.17 (JID, MCH).

Especie popular en colecciones privadas que se observa frecuentemente en condiciones semi salvajes a lo largo de toda Europa.

***Cairina moschata*****Pato criollo - Muscovy Duck**

Estatus: Originario de América central y del Sur. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E2.

**2016**

**Desemb. río Mijares:** 10.I: 1 ej. (MBM).

**Albufera de Valencia:** 03.XII: 1 ej. solitario de plumaje muy blanco (VBJ).

**Burriana:** 23.X: 35 ej. en la desemb. del río Anna (RMB).

**2017**

**Barrc. del Carraixet:** 24.XI: 8 ej. (RMB).

**València:** 11.I: 6 ej. en la sèquia de la Font (RMB).

El pato criollo ha sido domesticado en sus áreas de origen desde antiguo. Las aves que se observan siempre están asociadas a este tipo de plumajes domésticos alejados de la forma salvaje.

***Phasianus colchicus*****Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant**

Estatus: desde el mar Negro al E de Asia. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E1.

**2016**

**Marjal dels Moros:** 26.III: 3 m y 1 h. Los machos reclamando (AAC).

**Albufera de Valencia:** 17.IV: 1 h. en la orilla de un canal en la zona de la Rebassada (JGOM, CTA). Apenas existen registros recientes de un m. durante la primavera de 1988 en dunas litorales de la Devesa y en compañía de perdiz roja y en abril de 2001 en el Racó de l'Olla (BDJ).

**Cocentaina:** 01.XI: 1 ej. (BOR).

**Salinas de Santa Pola:** 14.XII: 1 ej. (JMT,OAP,GMG).

**El Hondo de Elche:** 06.II: 1 m. (TOA).

## 2017

**La Salzadella:** 17.IV: 1 ej. eBird. Programa SACRE.. (VET).

**Marjal dels Moros:** 29.X: 2 ej. (GCH) ; 06.XII: 1 ej. (GCH).

**Casinos:** 16.X: 1 h. en la vía de servicio (TPA).

**Puçol:** 29.VIII: 2 ej. (JPH).

**La Pobla de Farnals:** 12.VI: 1 m. cantando y al menos 5 pull. (TPA) ; 27.IX: 1 ej. eBird. macho cantando. (TPA) ; 01.X: 1 ej. eBird. Anillamiento científico. (SAD)

**Requena:** 16.XI: 1 ej. eBird. Zona de vid entre Arundo donax cerca del rio. Macho. (EMRS)

**Elx:** 26.XI: 1 ej. eBird. (EAOS)

**Cox:** 12.XI: 1 ej. eBird. (EDDU).

Recientemente retirada de la categoría C, por considerarse que su presencia es muy dependiente de las sueltas cinegéticas (Rouco et al., 2019).

## ***Ciconia abdimii***

## **Cigüeña de Abdim - Cigonya de Abdim - Abdim's Stork**

Estatus: Originaria de África subsahariana. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

## 2017

**Albufera de Valencia:** 30.VI: 1 ej. observado alimentándose en arrozales del Malvinar (CMZ). Especie originaria del continente africano que realiza una migración trans-ecuatorial pero de la que no parecen existir registros naturales en el Paleártico occidental. Presumiblemente se trataría de un ej. escapado procedente del Bioparc de Valencia (BDJ); observada de nuevo el 17.VII en arrozales del camí de Xelvano (EPS). Es recogido al día siguiente con síntomas aparentemente de intoxicación.

## ***Parabuteo unicinctus***

## **Gavilán mixto - Harris' Hawk**

Estatus: Originario del continente Americano. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

## 2016

**Vinaròs:** 29.X: 1 ej. fugado de cetrería. Visto en dos ocasiones en distintos puntos del municipio (DFF)

**El Hondo de Elche:** 09.I: 1 ej. (PPP,TGR).

## 2017

**Cullera:** 14.XII: 1 ej. (ASL).

**Oliva:** 20.XII: 1 ej. (FAN).

**Lagunas de La Mata-Torrevieja:** 29.I: 1 ej. con anilla de cetrería (MLO).

## ***Platycercus elegans***

## **Perico elegante - Periquito de Pennat - Crimson Rosella**

Estatus: Originario del O de Australia. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

## 2017

**Vinaròs:** 11.IV: 1 ej. en las palmeras del casco urbano. Permanece en la zona hasta el día 14.IV (MBT).

## ***Nymphicus hollandicus***

## **Cacatúa ninfa - Cacatua nimfa - Cockatiel**

Estatus: Originaria de Australia. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

## 2016

**Castellón de la Plana:** 11.VII: 1 ej. cerca de la universidad (PGR).

**El Fondo d'Elx:** 06.X: 1 ej. (JMT, GLI).

**Sierra de Escalona:** 03.IV: 1 ej. (JMT,PPP).

**2017**

**Albufera de Valencia:** 12.IV: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa (GGO,YAM).

**Almàssera:** 22.VIII: 1 ej. (RMB).

**Nàquera:** 22.VIII: 1 ej. (TPA).

---

***Agapornis roseicollis* Inseparable de Namibia - Agapornis de Namibia - Rosy-faced Lovebird**

Estatus: Originario del SE de África. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

**2016**

**Benicarló:** 31.III: 1 ej. en el casco urbano (JLA).

**Alcoi:** 10.XI: 1 ej. (PCC).

**2017**

**Valencia:** observaciones de 1 ej. los días 15.IX (TPA) y 04.XI (MCC)

---

***Agapornis fischeri* Inseparable de Fischer - Agapornis de Fischer - Fischer's Lovebird**

Estatus: Originario de Tanzania. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E1.

**2016**

**Elx:** 09.II: 5 ej. en palmeras (NGA).

---

***Psittacara mitratus* Aratinga mitrada - Aratinga mitrada - Mitred Parakeet**

Estatus: Originario de los Andes centrales. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E1.

**2016**

**València:** 17.XI: 4 ej. (DFA).

---

***Psittacus erithacus* Loro yaco - Grey Parrot**

Estatus: Originario de África tropical. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

**2017**

**Mislata:** 04.XII: 1 ej. en el parque la Canaleta (PAB).

---

***Thectocercus acuticaudatus* Aratinga cabeciazul - Aratinga de cap blau - Blue-crowned Parakeet**

Estatus: Originaria de Sudamérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

**2017**

**Sax:** observaciones de 1 ej. los días 25 y 30 y 31.XII (ESA)

---

***Melopsittacus undulatus* Periquito común - Periquito - Budgerigar**

Estatus: Originario de Australia. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

**2016**

**Castellón de la Plana:** 01.VIII: 1 ej. Podría llevar un tiempo en la zona (PGR).

**Mislata:** 17.IX: 1 ej. en un grupo de cotorras de Argentina en el parque de la Canaleta (PAB).

**2017**

**Burriana:** 05.VIII: 1 ej. volando entre eucaliptos (EFRO)

**Albufera de Valencia:** 08.XII: 1 ej. (VPA).

**Burjasot:** 21.IX: 1 ej. (JOB).

**Mislata:** 06.XII: 1 ej. junto a un grupo de gorriones en el parque de la Canaleta (PAB).

***Psittacara erythrogenys***      **Aratinga de Guayaquil - Aratinga de màscara roja - Red-masked-Parakeet**

Estatus: Originario del SO de Ecuador y del NO de Perú. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E1.

**2016**

**València:** 02.IX: 4 ej. (SAL) ; 10.X: 6 ej. (JOB).

**Mislata:** 04.IV: 30 ej. en almeces de un jardín urbano comiendo frutos (JAI); 10.VII: cita estival de 10 ej. observados en el parque de la Canaleta; la cifra anual más elevada en el municipio (PAB, ODB, MPA).

**2017**

**València:** 10.V: 10 ej. (LCD); 14.VI: 7 ej. establecida desde hace tiempo (GGO); 01.X: 46 ej. Gran bando sobrevolando los jardines y emitiendo reclamos (CFA).

**Mislata:** 01.II: grupo destacado de 45 ej. por la zona del parque de la Canaleta. Se trata del grupo más numeroso registrado hasta la fecha en la población (IMO); 03.VI: cita estival de 22 ej. en el parque de la Canaleta (PAB).

**Catarroja:** 12.II: 26 ej. de distintas edades comiendo frutos de almez en el suelo (CFA).

***Passer italiae***

**Gorrión italiano - Pardal italià - Italian Sparrow**

Estatus: Originario de Italia. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: D.

**2017**

**Benidorm:** 30.VIII: 1 ej. fotografiado (DSU).

Primera cita de gorrión italiano para la CV. Se ignora el origen de los gorriónes italianos observados hasta la fecha en España, que podrían haber llegado asistidas por barco, por lo que se mantiene en la categoría D (Rouco et al. 2019).

***Rhodospiza obsoleta***

**Camachuelo desertícola - Pinsà del desert - Desert Finch**

Estatus: Originario de Asia, desde Israel a China central. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: D.

**2017**

**València:** 03.VII: 1 ej. escapado de cautividad (TPA)

***Haemorhous mexicanus***

**Camachuelo mexicano - Pinsà casolà - House Finch**

Estatus: Originario de América del N América central. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E1.

**2017**

**Cullera:** 21.XII: 1 ej. escapado de cautividad (ASL).

***Taeniopygia guttata***

**Diamante cebra - Diamant zebat de Timor - Timor Zebra Finch**

Estatus: Originario de Australia. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E1.

**2017**

**Rocafort:** 16.XII: 1 ej. (ACB).





***Clangula hyemalis***

Albufera de València.

Diciembre 2016.

© Toni Alcocer.



***Aythya nyroca***

El Fondo d'Elx.

Febrero 2016.

© Jacobo Ramos.




***Melanitta stejnegeri***

Playa de la Marina, Elche.

Diciembre 2016.

© Jana Marco.



***Melanitta nigra***

Playa de Pinedo, Valencia.

Marzo 2016.

© Toni Alcocer.




***Oxyura leucocephala***

El Fondo d'Elx.

Marzo 2016.

© Jacobo Ramos.



***Gyps rueppelli***

Sierra de Mariola, Alcoi.

Octubre 2017.

© Pau Lucio.



***Clanga pomarina***

El Fondo d'Elx.

Diciembre 2016.

© Rolf Karlsson.



***Elanus caeruleus***

El Fondo d'Elx.

Octubre 2017.

© Sergio Arroyo.



***Tringa flavipes***

El Fondo d'Elx.

Septiembre 2016.

© Jacobo Ramos.



***Limnodromus scolopaceus***

El Fondo d'Elx.

Diciembre 2017.

© Jacobo Ramos.



***Phalaropus lobatus***

Santa Pola, Alicante.

Mayo 2017.

© Sergio Arroyo.



***Larus cachinnans***

Albufera de València.

Marzo 2017.

© Toni Alcocer.



***Larus argentatus***

Albufera de València.

Enero 2016.

© Toni Alcocer.



***Larus pipixcan***

El Campello, Alicante.

Enero 2016.

© Jacobo Ramos.



***Sterna dougallii***

Salinas del Pinet, Santa Pola.

Abril 2016

© Pau Lucio.



***Porzana porzana***

El Fondo d'Elx.

Febrero 2017.

© Lola López.



***Porzana pusilla***

Charca del Prado, Elche

Abril 2017.

© Sergio Arroyo.



***Phoeniconaias minor***

El Fondo d'Elx.

Abril 2017.

© Sergio Arroyo.



***Threskiornis aethiopicus***

Marjal de Pego-Oliva.

Julio 2017.

© Pau Salort.



***Ciconia nigra***

Albufera de València.

Enero 2016.

© Toni Alcocer.



***Alca torda***

Calpe, Alicante.

Enero 2016.

© Juanma Ferreira.



***Iduna opaca***

Albalat de la Ribera, Valencia

Mayo 2016.

© Toni Alcocer.



***Ficedula parva***

El Fondo d'Elx.

Noviembre 2016.

© Jana Marco.



***Panurus biarmicus***

El Fondo d'Elx.

Octubre 2016.

© Sergio Arroyo.



***Passer hispaniolensis***

Santa Pola, Alicante.

Enero 2016.

© Oscar Aldeguer.



***Bucanetes githagineus***

Monnegre, Alicante.

Mayo 2016.

© Jana Marco.



***Anthus hodgsoni***

Santa Pola, Alicante.

Diciembre 2017.

© Jana Marco.

## Bibliografía

- Acadèmia Valenciana de la Llengua.** 2014. Denominació dels municipis valencians. <http://www.avl.gva.es/va/AVL/seccions-i-comissions/seccio-Onomastica/contingutOnomastica>. Consultado en junio de 2014. Díaz, M., Asensio, B., Tellería, J.L. 1996. Aves ibéricas I. No paseriformes. J.M. Reyero Editor. Madrid.
- Bierregaard, R. O., A. F. Poole, M. S. Martell, P. Pyle, and M. A. Patten (2020).** Osprey (*Pandion haliaetus*), version 1.0. In *Birds of the World* (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Billerman, S. M., Keeney, B. K., Rodewald, P. G. & Schulenberg, T. S. (Eds.).** *Birds of the World*. Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://birdsoftheworld.org/bow/home>.
- Brown, P. W. & Fredrickson, L. H. 2020.** White-winged Scoter (*Melanitta deglandi*), v. 1.0. En del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A. & de Juana, E. *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Carboneras, C. & Kirwan, G. M. 2020a.** Ruddy Shelduck (*Tadrona ferruginea*), v. 1.0. En del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A. & de Juana, E. *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Carboneras, C. & Kirwan, G. M. 2020b.** Ringed Teal (*Callonetta leucophrys*), v. 1.0. En del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A. & de Juana, E. *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Clavell, J. 2002.** Catàleg dels ocells dels Països Catalans. Lynx Edicions. Barcelona.
- Crochet, P. A. & Joynt, G. 2015.** AERC list of Western Palearctic birds. July 2015 version. <http://www.aerc.eu/tac.html>.
- Del Moral, J. C. y Molina, B. (Eds.) 2018.** El águila perdicera en España, población reproductora en 2018 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
- Ferrer, X., Martínez-Vilalta, A. & Muntaner, J.** *Història Natural del Paísos Catalans. 12 Ocells*. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
- de Juana, E. & García, E. 2015.** *The birds of the iberian peninsula*. Helm. Bloomsbury publishing. Londres.
- del Hoyo, J., P. F. D. Boesman, E. F. J. Garcia, and G. M. Kirwan 2020.** Lesser Flamingo (*Phoeniconaias minor*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Gómez-Serrano, M.A. 1999.** Situación y conservación del Mirlo acuático en Castellón. Informe Inédito.
- Greño, J.L., Cantó, J.L., Mompó, C., Oliver, R. & Monrós, J.** Supervivencia inter e intra-invernal del acentor alpino en Alicante y Valencia: científicos y excursionistas trabajando en equipo. Revista de anillamiento nº 35. SEO / BirdLife.
- Gutiérrez, R., de Juana, E. & Lorenzo, J. A. 2012.** Lista de las Aves de España. Edición de 2012. Versión online 1.0: nombres castellano, científico e inglés. 2012. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). [www.seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Lista\\_-Aves\\_Espana\\_2012.pdf](http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Lista_-Aves_Espana_2012.pdf). Consultado en junio de 2015.
- Keller, V., Herrando, S., Vorisek, P., Franch, M. Kipson, M., Milanese, P., Martí, D., Antón, M., Klvanova, A., Kalyakin, M. V., Bauer, H.-G. & Foppen, R. P. B. 2020.** *European Breeding Atlas 2: Distribution, Abundance and Change*. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.
- Kemp, A. C., D. A. Christie, G. M. Kirwan, and C. J. Sharpe 2020.** Rüppell's Griffon (*Gyps rueppelli*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ruegri1.01>.
- López-López, P., Urios, V. 2017.** Ecología espacial y conservación del águila-azor perdicera en la Comunidad Valenciana. Anualidad 2017. Informe inédito.
- Miguel, B., & Font, J. V. 1990.** El nom valencià dels ocells d'Europa. *Medi Natural*, 1, 103-112.
- Pardo, R. 1984.** Las aves del naranjal de la provincia de Castellón. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Castellón de la Plana.
- Prades, R. Llopis, A., Cerdà, J., Colomer, C. & Surroca, M. 2018.** Les aus de la comarca dels Ports: 20 anys d'observacions. *Papers dels Ports*.
- Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019.** Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife. Madrid.
- Servicio de Biodiversidad, 2007.** Censo de Pares Reproductoras de Mirlo Acuático *Cinclus cinclus* en la provincia de Castellón 2007. Inédito.
- Servicio de Biodiversidad, 2013.** Censo de pares reproductoras de mirlo acuático (*Cinclus cinclus*) en la provincia de Castellón. Año 2013.
- Urios, V., Escobar, J. V., Pardo, R. & Gómez, J. A. (Eds.). 1991.** Atlas de las Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. Valencia.

**Índice de nombres científicos****A**

*Accipiter gentilis* 54  
*Accipiter nisus* 53  
*Acrocephalus arundinaceus* 137  
*Acrocephalus melanopogon* 138  
*Acrocephalus paludicola* 138  
*Acrocephalus schoenobaenus* 139  
*Acrocephalus scirpaceus* 139  
*Actitis hypoleucos* 84  
*Aegithalos caudatus* 133  
*Aegyptius monachus* 49  
*Agapornis fischeri* 175  
*Agapornis roseicollis* 174, 175  
*Aix galericulata* 21  
*Alauda arvensis* 127  
*Alaudala rufescens* 128  
*Alca torda* 102  
*Alcedo atthis* 114  
*Alectoris rufa* 30  
*Anas acuta* 23  
*Anas bahamensis* 173  
*Anas crecca* 24  
*Anas platyrhynchos* 23  
*Anser anser* 19  
*Anser fabalis* 19  
*Anthus campestris* 163  
*Anthus cervinus* 164  
*Anthus hodgsoni* 164  
*Anthus pratensis* 163  
*Anthus richardi* 162  
*Anthus spinoletta* 165  
*Anthus trivialis* 163  
*Apus apus* 112  
*Apus pallidus* 112  
*Aquila adalberti* 52  
*Aquila chrysaetos* 52  
*Aquila fasciata* 52  
*Ardea alba* 43  
*Ardea cinerea* 42  
*Ardea purpurea* 42  
*Ardeola ralloides* 41  
*Arenaria interpres* 76  
*Asio flammeus* 110  
*Asio otus* 109  
*Athene noctua* 109  
*Aythya ferina* 26  
*Aythya fuligula* 27  
*Aythya nyroca* 26  
*Aythya nyroca x ferina* 27

**B**

*Botaurus stellaris* 39  
*Branta canadensis* 19–171  
*Branta leucopsis x Anser indicus* 173  
*Bubo bubo* 108  
*Bubulcus ibis* 42  
*Bucanetes githagineus* 167  
*Bucephala clangula* 29  
*Burhinus oedicephalus* 64  
*Buteo buteo* 59  
*Buteo rufinus* 58

**C**

*Cairina moschata* 173  
*Calandrella brachydactyla* 127  
*Calidris alba* 79  
*Calidris alpina* 80  
*Calidris bairdii* 81  
*Calidris canutus* 76  
*Calidris falcinellus* 78  
*Calidris ferruginea* 78  
*Calidris fuscicollis* 81  
*Calidris melanotos* 82  
*Calidris minuta* 81  
*Calidris pugnax* 77  
*Calidris temminckii* 79  
*Callonetta leucophrys* 173  
*Calonectris diomedea* 32  
*Caprimulgus europaeus* 111  
*Caprimulgus ruficollis* 110  
*Carduelis carduelis* 168  
*Carduelis citrinella* 168  
*Cecropis daurica* 132  
*Cercotrichas galactotes* 151  
*Certhia brachydactyla* 147  
*Cettia cetti* 133  
*Charadrius alexandrinus* 72  
*Charadrius dubius* 71  
*Charadrius hiaticula* 70  
*Charadrius morinellus* 73  
*Chersophilus duponti* 128  
*Chlidonias hybrida* 99  
*Chlidonias leucopterus* 100  
*Chlidonias niger* 101  
*Chloris chloris* 167  
*Chroicocephalus genei* 90  
*Chroicocephalus ridibundus* 91  
*Ciconia abdimii* 174  
*Ciconia ciconia* 38

*Ciconia nigra* 37  
*Cinclus cinclus* 157  
*Circaetus gallicus* 50  
*Circus aeruginosus* 54  
*Circus cyaneus* 55  
*Circus macrourus* 56  
*Circus pygargus* 56  
*Cisticola juncidis* 142  
*Clamator glandarius* 107  
*Clanga clanga* 50  
*Clanga pomarina* 50  
*Clangula hyemalis* 29  
*Coccothraustes coccothraustes* 166  
*Columba livia* 104  
*Columba oenas* 104  
*Columba palumbus* 104  
*Coracias garrulus* 113  
*Corvus corax* 125  
*Corvus corone* 124  
*Corvus monedula* 124  
*Coturnix coturnix* 30  
*Crex crex* 60  
*Cuculus canorus* 107  
*Cyanistes caeruleus* 125  
*Cyanopica cookii* 123

**D**

*Delichon urbicum* 131  
*Dendrocopos major* 116

**E**

*Egretta garzetta* 43, 44  
*Egretta gularis* x *garzetta* 43  
*Elanus caeruleus* 47  
*Emberiza calandra* 169  
*Emberiza cia* 170  
*Emberiza cirrus* 170  
*Emberiza citrinella* 170  
*Emberiza hortulana* 170  
*Emberiza melanocephala* 171  
*Emberiza pusilla* 170  
*Emberiza schoeniclus* 171  
*Erithacus rubecula* 152  
*Estrilda astrild* 159  
*Estrilda melpoda* 159

**F**

*Falco columbarius* 119  
*Falco eleonorae* 118

*Falco naumanni* 117  
*Falco peregrinus* 120  
*Falco subbuteo* 119  
*Falco tinnunculus* 117  
*Falco vespertinus* 118  
*Ficedula hypoleuca* 153  
*Ficedula parva* 153  
*Fratercula arctica* 103  
*Fringilla coelebs* 165  
*Fringilla montifringilla* 165  
*Fulica atra* 63  
*Fulica cristata* 62

**G**

*Galerida cristata* 127  
*Galerida theklae* 127  
*Gallinago gallinago* 83  
*Gallinula chloropus* 62  
*Garrulus glandarius* 123  
*Gavia immer* 31  
*Gavia stellata* 31  
*Gelochelidon nilotica* 96  
*Glareola pratincola* 90  
*Grus grus* 64  
*Gyps fulvus* 49  
*Gyps rueppelli* 49

**H**

*Haematopus ostralegus* 65  
*Haemorhous mexicanus* 176  
*Hieraaetus pennatus* 51  
*Himantopus himantopus* 66  
*Hippolais icterina* 141  
*Hippolais polyglotta* 140  
*Hirundo rustica* 130  
*Hydrobates pelagicus* 31  
*Hydrocoloeus minutus* 92  
*Hydroprogne caspia* 96

**I**

*Iduna opaca* 140  
*Ixobrychus minutus* 40

**J**

*Jynx torquilla* 116

**L**

*Lanius collurio* 120  
*Lanius meridionalis* 121  
*Lanius senator* 121

*Larus argentatus* 94  
*Larus audouinii* 92  
*Larus cachinnans* 94  
*Larus canus* 93  
*Larus delawarensis* 94  
*Larus fuscus* 95  
*Larus melanocephalus* 93  
*Larus michahellis* 95  
*Larus pipixcan* 93  
*Limosa lapponica* 74  
*Limosa limosa* 75  
*Linaria cannabina* 167  
*Locustella luscinioides* 141  
*Locustella naevia* 141  
*Lophophanes cristatus* 125  
*Loxia curvirostra* 167  
*Lullula arborea* 126  
*Luscinia megarhynchos* 152  
*Luscinia svecica* 152  
*Lymnocyptes minimus* 83  
*Lymnodromus scolopaceus* 82

**M**

*Mareca penelope* 23  
*Mareca strepera* 22  
*Marmaronetta angustirostris* 24  
*Melanitta deglandi* 28  
*Melanitta fusca* 28  
*Melanitta nigra* 28  
*Melanocorypha calandra* 128  
*Melospittacus undulatus* 175  
*Mergus serrator* 29  
*Merops apiaster* 114  
*Milvus migrans* 58  
*Milvus milvus* 57  
*Monticola saxatilis* 154  
*Monticola solitarius* 155  
*Morus bassanus* 44  
*Motacilla alba* 162  
*Motacilla cinerea* 162  
*Motacilla citreola* 161  
*Motacilla flava* 161  
*Muscicapa striata* 151  
*Myiopsitta monachus* 106

**N**

*Neophron percnopterus* 48  
*Netta rufina* 25  
*Numenius arquata* 74

*Numenius phaeopus* 73  
*Nycticorax nycticorax* 41

**O**

*Oenanthe hispanica* 156  
*Oenanthe leucura* 157  
*Oenanthe oenanthe* 156  
*Oriolus oriolus* 122  
*Otis tarda* 59  
*Otus scops* 108  
*Oxyura leucocephala* 29

**P**

*Pandion haliaetus* 46  
*Panurus biarmicus* 126  
*Parabuteo unicinctus* 174  
*Parus major* 125  
*Passer domesticus* 157  
*Passer hispaniolensis* 158  
*Passer montanus* 158  
*Periparus ater* 125  
*Pernis apivorus* 48  
*Petronia petronia* 159  
*Phasianus colchicus* 173  
*Phalacrocorax aristotelis* 45  
*Phalacrocorax carbo* 45  
*Phalaropus fulicarius* 84  
*Phalaropus lobatus* 84  
*Phoeniconaias minor* 36  
*Phoenicopterus roseus* 35  
*Phoenicurus ochruros* 153  
*Phoenicurus phoenicurus* 154  
*Phylloscopus bonelli* 134  
*Phylloscopus collybita* 136  
*Phylloscopus ibericus* 137  
*Phylloscopus inornatus* 135  
*Phylloscopus sibilatrix* 134  
*Phylloscopus trochilus* 135  
*Pica pica* 123  
*Picus sharpei* 116  
*Platalea leucorodia* 39  
*Platycercus elegans* 174  
*Plegadis falcinellus* 38  
*Pluvialis apricaria* 68  
*Pluvialis dominica* 69  
*Pluvialis squatarola* 69  
*Podiceps cristatus* 34  
*Podiceps nigricollis* 35  
*Porphyrio porphyrio* 61

Porzana parva 60  
 Porzana porzana 61  
 Porzana pusilla 61  
 Prunella collaris 160  
 Prunella modularis 160  
 Psittacara erythrogenys 176  
 Psittacara mitratus 175  
 Psittacula krameri 106  
 Psittacus erithacus 175  
 Pterocles alchata 103  
 Pterocles orientalis 103  
 Ptyonoprogne rupestris 131  
 Puffinus mauretanicus 33  
 Puffinus yelkouan 32  
 Pycnonotus jocosus 128  
 Pyrrhocorax pyrrhocorax 123

**R**

Rallus aquaticus 60  
 Recurvirostra avosetta 67  
 Regulus ignicapilla 146  
 Regulus regulus 146  
 Remiz pendulinus 125  
 Rhodospiza obsoleta 176  
 Riparia riparia 129  
 Rissa tridactyla 90

**S**

Saxicola rubetra 155  
 Saxicola rubicola 155  
 Scolopax rusticola 82  
 Serinus serinus 168  
 Sitta europaea 147  
 Spatula clypeata 21  
 Spatula querquedula 21  
 Spinus spinus 169  
 Stercorarius parasiticus 102  
 Stercorarius pomarinus 101  
 Stercorarius skua 101  
 Sterna dougallii 99  
 Sterna hirundo 99  
 Sterna paradisaea 99  
 Sternula albifrons 98  
 Streptopelia decaocto 106  
 Streptopelia turtur 105  
 Strix aluco 109  
 Sturnus unicolor 148  
 Sturnus vulgaris 147

Sylvia atricapilla 142  
 Sylvia borin 142  
 Sylvia cantillans 145  
 Sylvia communis 143  
 Sylvia conspicillata 144  
 Sylvia hortensis 143  
 Sylvia melanocephala 145  
 Sylvia subalpina 145  
 Sylvia undata 144

**T**

Tachybaptus ruficollis 34  
 Tachymarptis melba 111  
 Tadorna ferruginea 20  
 Tadorna tadorna 19, 20  
 Taeniopygia guttata 176  
 Tetrax tetrax 60  
 Thalasseus bengalensis 97  
 Thalasseus elegans 98  
 Thalasseus sandvicensis 97  
 Thectocercus acuticaudatus 175  
 Tichodroma muraria 147  
 Tringa erythropus 88  
 Tringa flavipes 86  
 Tringa glareola 88  
 Tringa nebularia 89  
 Tringa ochropus 85  
 Tringa stagnatilis 87  
 Tringa totanus 86  
 Troglodytes troglodytes 146  
 Turdus iliacus 149  
 Turdus merula 148  
 Turdus obscurus 149  
 Turdus philomelos 150  
 Turdus pilaris 149  
 Turdus torquatus 148  
 Turdus viscivorus 150  
 Tyto alba 108

**U**

Upupa epops 115

**V**

Vanellus gregarius 68  
 Vanellus vanellus 67

**X**

Xenus cinereus 84