



En las aves el volar ha sustituido en cierto modo al pensar.

El estudio de las aves
Oskar Heinroth

Las Aves en Alicante

Anuario Ornitológico / 1999



SEO/BirdLife



Grupo local de Alicante





Equipo editorial:

Antonio Jacobo Ramos Sánchez
Antonio Zaragoza Llenes
Elías Gomis Martín.
Germán López Iborra
Pep Cantó Corchado
Luis Fidel Sarmiento
Luis Sogorb Mallebrera

Maquetación:

Luis Sogorb Mallebrera
luisogmall@terra.es

Impresión:

Direcciones de contacto:

Grupo Local SEO-Alicante.
Colón, 114. 03570 Villajoyosa (Alicante).
Tel. 965 890 919-627 237 219
correo electrónico: seo-alicante@ctv.es
página web: www.ctv.es/USERS/elgomis

Cita recomendada para esta publicación:

SEO-Alicante. *Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante-1999*. Alicante, 2001
Si la cita es por el autor (AUTOR/ES) del registro, se mencionará de la siguiente forma:
AUTOR/ES en SEO-Alicante. *Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante-1999*.
Alicante, 2001.

Reproducción de contenidos de esta publicación:

Se autoriza la difusión y reproducción de los datos contenidos en esta publicación siempre que se cite su origen y procedencia y cuyos fines sean no lucrativos.
No se permite la reproducción de los dibujos, ilustraciones, fotografías y otras imágenes que contiene sin la autorización de los propietarios de los derechos de autor.

Portada y contraportada:

Ilustraciones Martinete (*Nycticorax nycticorax*) y Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*) de Pep Cantó.
Ilustración Alcaudón Meridional (*Lanius meridionalis*) de Luis Sogorb.
Fotografía Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) de Toni Zaragoza.
Ilustraciones de contraportada de Luis Sogorb.
Diseño y composición de la portada y contraportada de Luis Sogorb.

Edita: SEO-Alicante

© 2001 SEO-Alicante y los autores de los textos

© 2001 Pep Cantó, Luis Sogorb, Alfonso Lario, Germán López y Óscar Aldeguer de las ilustraciones
Toni Zaragoza, Sergio Arroyo, Elías Gomis, Raúl González y Luis Fidel de las fotografías

Depósito Legal:

A-264-2001
I.S.B.N.: 84-607-2034-9



Martin pescador
Dibujo: ©Luis Sogorb

Chorlitejo patinegro
Foto: © Sergio Arroyo



Presentación


La persona que con los prismáticos o el telescopio escudriña el paisaje tras las aves ya no es tan inusual en nuestras tierras. La creciente afición al estudio y observación de las aves ha hecho que el ornitólogo se haya ido convirtiendo en algo habitual en las playas, campos, bosques, montes, y aguas alicantinas. Los cuadernos de campo de cada uno de estos ornitólogos, recogen datos de multitud de especies por todos los rincones de la provincia, anotaciones de gran valor pero que han visto limitada su difusión entre el propio colectivo y, más aún, fuera de él. Sería lamentable que esos registros se perdieran y quedarán ocultos por no aparecer publicados. Y para que eso no ocurra, en el Grupo local SEO-Alicante nos planteamos la idea de publicar este Anuario.

La Sociedad Española de Ornitología cuenta, a la hora de escribir esta presentación, con centenar y medio de asociados en Alicante pero, sin duda, hay otras personas que no pertenecen a SEO pero que también disfrutan de la contemplación y el estudio de las aves. A todos ellos, el Grupo local SEO-Alicante planteó, a finales de 1999, la posibilidad de editar este Anuario que ahora tienes en las manos, con el objetivo de evitar la pérdida de los registros sobre avifauna realizados y permitir aproximarnos a la realidad de cuál es la situación actual de las diferentes especies de aves presentes en nuestra provincia. Muchas de estas personas han respondido a aquel llamamiento y han enviado los datos de sus observaciones recogidos tras muchas horas pasadas tras unos prismáticos. Entonces comenzó otra tarea, la de organizar el trabajo y plasmarlo en una publicación. Ese pequeño comité de redacción ha estado buceando durante meses entre cientos de registros, buscando aquellos de interés para el resto de ornitólogos que permitieran conocer más a fondo la riqueza natural que aún alberga Alicante. Fechas, número de ejemplares, reproducción, migración, parajes, observadores... todo ha ido buscando su lugar correcto en este puzzle que ya está a disposición de todos los amantes de las aves.

La recopilación de registros de observaciones es una cuestión que SEO-Alicante se plantea como de necesaria continuidad en el futuro, con el objeto de seguir disponiendo de una información valiosísima sobre las especies de aves, sus poblaciones y tendencias, así como de los parajes que les son vitales, todo ello aportado voluntaria y desinteresadamente por personas entusiastas que han hecho de la ornitología una pasión y casi una forma de vida. Por estos motivos, aprovechamos para seguir solicitando a todos ellos su importantísima colaboración para poder continuar con este camino que comenzamos al borde del milenio, al editar este Anuario.

Por ello, queremos agradecer a todos esos enamorados de las aves su colaboración y ayuda prestada, que permite que ya vea la luz el Anuario Ornitológico de Alicante 1999, a la vez que les animamos a que continúen con ese entusiasmo y que mantengan ese amor hacia las aves y la Naturaleza, esperando su colaboración en el futuro para seguir con esta línea que estamos iniciando.

El Comité Editorial.



Abejaruco común. Ofrenda nupcial.
Dibujo: ©Luis Segorb

Agradecimientos

El Comité Editorial desea expresar su agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que han colaborado para hacer posible la publicación del Anuario Ornitológico de Alicante 1999.

Queremos destacar la colaboración de todos aquellos ornitólogos que nos han remitido sus datos, sin los cuales sería imposible sacar una publicación de estas características. Agradecemos especialmente la contribución de nuestros compañeros y magníficos dibujantes Pep Cantó, Luis Sogorb, Alfonso Lario, Germán López y Óscar Aldegue por sus excelentes aportaciones gráficas que sirven para ilustrar este Anuario. De igual forma que las fotografías aportadas por Toni Zaragoza, Sergio Arroyo, Elías Gomis, Raúl González y Luis Fidel. La labor de maquetación que ha desarrollado Luis Sogorb merece ser especialmente destacada y fruto de ella es lo agradable y elegante que ha quedado esta publicación.

Por último, pero no menos importante, queremos hacer público el agradecimiento a todos los socios de SEO/BirdLife en Alicante por su defensa constante en la conservación de las aves y sus hábitats y, en concreto, por su colaboración con este Anuario.

El Comité Editorial:

Antonio Jacobo Ramos Sánchez

Antonio Zaragoza Llenes

Elías Gomis Martín.

Germán López Iborra

Pep Cantó Corchado

Luis Fidel Sarmiento

Luis Sogorb Mallebrera



Lista Sistemática

Comentarios a los registros publicados en el Anuario Ornitológico de Alicante

DESCRIPCIÓN DE LAS CITAS

Las citas recogidas en este Anuario se ofrecen mediante el siguiente método:

1 Colimbo Chico **2** *Gavia stellata* **3** Agullat petit.

4 Estatus: Invernante raro.

5 Baix Vinalopó **6** P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/XI **7** (LFS,EGM), 2 ex. el 27/XI.
A partir de esa fecha 1 ex. habitual hasta el 29/XII en el litoral entre las salinas y la desembocadura del río Segura (LFS,AJR,AQG), 1 ex. el 26/XII (OAP).

1 Nombre en castellano de la especie (**negrita**).

2 Nombre científico (*cursiva*).

3 Nombre valenciano (normal).

4 Estatus de la especie en la provincia de Alicante.

5 Comarca (ordenadas de Norte a Sur y de Este a Oeste).

6 Paraje (o municipio), ordenados de Norte a Sur y de Este a Oeste. Se utiliza la lengua más utilizada para su denominación.

7 Código de los observadores de la cita.

Para algunos de los parajes se han realizado divisiones para mejorar su descripción. Por ejemplo, el Parque Natural de la Laguna de la Mata-Torre Vieja se divide en P.N. de La Mata y P.N. de las Salinas de Torre Vieja, aún tratándose del mismo espacio natural protegido. Las fechas aparecen en números árabes los días y en cifras romanas los meses (p. ej. 20/III, 29/V). De no indicarse otra cosa, todas las fechas corresponden a 1999.

ESTATUS

Para la descripción del estatus de las aves en la provincia de Alicante, el comité editorial del AOA, con colaboración de otros ornitólogos, ha definido la situación actual para cada una de las especies, empleándose la siguiente clasificación:

- R. Residente. Presente todo el año y además nidificante (si no se indica lo contrario).
- N. Nidificante. Reproductor (al menos presente de Abril a Septiembre).
- I. Invernante. Presente durante la invernada (básicamente de Octubre a Marzo).
- M. Migrante. Presente durante la migración primaveral u otoñal.
- D. Divagante. Especie accidental, derivada de su trayectoria migratoria normal.
- V. Visitantes. Especie no migrante o dispersiva, con poblaciones próximas cuya presencia puede relacionarse con su área marginal de extensión geográfica.
- E. Escapado de Cautividad. Presencia debida al hombre, por sueltas o escapes.
- ?. Dato sin confirmar o sin información suficiente.



ABUNDANCIA

Para algunas especies no ha sido posible determinar el grado de abundancia con un nivel aceptable de fiabilidad por lo que aparece únicamente la clasificación del estatus. Sin embargo, en otras especies si se ha podido realizar una apreciación de los efectivos en Alicante. Para éstas se ha empleado la siguiente nomenclatura, acompañando a la clave de estatus:

a.	Abundante. (+10.000)	e.	Escaso. (11-100)
c.	Común. (1.001-10.000)	r.	Raro. (1-10)
m.	Moderado. (101-1.000)	o.	Ocasional.

(Cifras referidas a número de ejemplares en censos o parejas en caso de citas sobre nidificación)

ABREVIATURAS EMPLEADAS

Se han empleado las siguientes abreviaturas:

ad.	Adulto (s)	máx.	Máximo (s)
c.	Cifra aproximada	mín.	Mínimo (s)
ex.	Ejemplar (es)	pp.	Pareja (s)
fo, fc	Fase oscura, fase clara	pull.	Pollo (s)
inm.	Inmaduro (s)	subesp.	Subespecie (s)
juv.	Juvenil (es)		

Otras abreviaturas usadas, referidas a espacios naturales protegidos, son:

P.N.	Parque Natural.
R.M.	Reserva Marina.

Para facilitar el acceso a la información sobre las especies presentes y su estatus y abundancia se puede consultar la tabla elaborada a tal fin y que emplea las anteriores claves.




Lalcón común
Dibujo: ©Alfonso Lario

Colaboradores que han remitido sus citas al Anuario Ornitológico de Alicante · 1999

Código	Nombre
AIR	Alejandro Izquierdo Rosique
AJR	Antonio Jacobo Ramos Sánchez
ALA	Ángel Lozano Astray
ALD	Alfonso Lario Doylataguerra
ALH	Ángel López Hernández
APG	Aurelio Pérez Gómez
AQG	Adolfo José Quiles Gómez
ARF	Abilio Reig Ferrer
ASG	Andrés Severt Gassmann
BEC	Benedicto Campos
BDJ	Bosco Díes Jambrino
CFS	Cristina Fuentes Sendín
CRF	Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz
DL	David Lewis
EGM	Eliás Gomis Martín
EH	Einar Hugnes
EOT	Encarni Orts Tarí
FGO	Fernando González Ortega
GBP	Gustavo Ballesteros Pelegrín
GEM	Grupo Ecologista MaigmóGREMA - Ecologistas en Acción
GLI	Germán López Iborra
IGC	Ignacio Gómez Cardona
JA	J. Andrews
JAG	José Antonio Gómez Sánchez
JAR	José Aragoneses
JB	Javier Barona
JCD	Joan Carles Dolz
JCR	Jaime Cortés Redondo
JDL	José Domingo López Manchón
JDN	José Damián Navarro Medina
JGP	Juan Antonio Gómez Picazo
JGR	Juan Antonio Gómez Ríos
JIR	Juan José Izquierdo Rosique
JLE	José Luis Echevarrías
JMC	José Antonio Martínez Climent
JSR	José Santamaría Reos
JTR	Juan José Torregrosa Ruiz
JVS	José Francisco Vidal Sánchez

Código	Nombre
JZE	Javier Zubieta Esteban
LAF	Luis Albentosa Ferrer
LB	Luis Beneito
LFS	Luis Fidel Sarmiento
LH	Liv Hugnes
LSM	Luis Sogorb Mallebrera
MAP	Miguel Ángel Pavón García
MAR	Miguel Ángel Rodríguez Jerez
MER	Mercedes Alberdi Pozurama
MCJ	Mariám Campderrós Just
MFS	Marcos Ferrández Sempere
MJP	Malcolm J. Palmer
MLC	María Luisa Cortés
MLM	Mariano López Macía
OAP	Oscar Aldegue Peral
OTL	Olga Tortosa Luque
PAL	Pablo Adrover Liedó
PCC	Pep Cantó Corchado
PG	Paul Güntensperger
PMN	Paqui Molina Navarro
PMM	Pedro María Mojica
RGR	Raúl González Rodríguez
RMF	Rosana Martínez Fitor
ROM	Rosario Ortiz Moragón
SAM	Sergio Arroyo Morcillo
SCG	Servicio de Control y Educación Ambiental. Clot de Galvany. Ajuntament d'Elx.
SMJ	Sergio Morán Jover
TBO	Toni Bolea
TSR	Tomás Santamaría Reos
TZL	Toni Zaragoza Llenes

Charranes en Vuelo
Dibujo: ©Óscar Aldegue





Citas de mayor interés de aves en la provincia de Alicante durante 1999



Somormujo lavanco
Foto: © Toni Zaragoza



GAVIIDAE

Colimbo Chico *Gavia stellata* Agullat petit

Estatus: Invernante ocasional.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/XI (LF5, EGM), 2 ex. el 27/XI, a partir de esa fecha 1 ex. habitual hasta el 29/XII en el litoral entre las salinas y la desembocadura del Riu Segura (LF5, AJR, AQG) y 1 ex. el 26/XII (OAP).

Colimbo Àrtico *Gavia arctica* Aquellat gros

Estatus: Invernante ocasional.

Sin citas en 1999.

Colimbo grande
Dibujo: ©Luis Segorb

Colimbo Grande *Gavia immer* Aquilat àrtic

Estatus: Invernante ocasional.

L'Alacantí Cala de los Borrachos (Alacant) 1 juv. el 4/XII en la costa (AJR).
Playa del Saladar (Alacant) 3 ex. el 4/I (AJR,LFS), después 2 ex.
hasta el 10/II y 1 ex. hasta el 24/II (AJR).



PODICIPEDIDAE



Zampullín Común *Tachybaptus ruficollis* Cabussonet

Estatus: Residente, nidificante común, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarriés 56 ex. el 9/I, 6 ex. el 29/I, 3 ex. el 26/IV, 12 ex. el 12/VII, 2 ex. el 3/VIII, 3 ex. 19/VIII (PCC). Reproductor esporádico.

La Marina Baixa La Vila Jolosa 1 ad. alimentándose en el interior del puerto el 31/XII (AIR)
L'Alacantí Hondos de Rabasa (Alacant) 2 ex. el 7/II (GEM).

Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 6 ex. el 26/XI (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola al menos 120 ex. el 15/I (AJR) y 61 ex. el 8/III (SAM).
P.N. El Fondó 3.429 ex. el 29/I (MFS,LFS,JLE), 1.172 ex. el 26/II, 1.103 ex. el 29/III (CFS,JLE,LFS,MFS) y 1 ex. albino el 16/X (MJP).

Baix Segura El Mondo de Amorós (San Fulgencio) al menos 60 ex. el 2/IX (AJR).
Embalse de la Pedrera 2 ex. el 14/IV (LFS,AJR).



Somormujo Lavanco *Podiceps cristatus* Cabrellot

Estatus: Residente, nidificante escaso, migrante e invernante escaso.

El Comtat Embalse de Beniarrás 97 ex. el 9/I, 6 ex. el 29/I, 1 ex. el 6/III, 3 ex. el 23/III, 2 ex. el 7/IV, 2 ex. el 26/V, 19 ex. el 17/VI, 47 el 12/ VII, 52 ex. el 3/VIII, 40 ex. el 19/VIII, 6 ex. el 8/XI (PCC)

L'Alacantí Alacant 1 ex. al sur del puerto el 28/ XII (AJR).

Baix Vinalopó PN. Salinas de Santa Pola 31-33 ex. en la costa entre el 28/I y el 22/II (AJR), 1 ex. el 13/III (RGR,PMN). 45 ex. el 10/IX (AJR,MAP), 113 ex. el 21/X, 207 ex. el 13/XI, 22 ex. el 24/XI en la costa (AJR) y 5 ex. el 27/XII (OAP).

P.N. El Fondó 2 ex. el 29/I (JLE,LFS,MFS), 46 ex. el 26/II, 95 ex. el 29/III y 149 ex. el 29/IV (JLE,MFS,ROM,CFS).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 1 ex. el 22/I (SAM).

Embalse de la Pedrera 1 ex. el 14/IV (LFS,AJR).



Zampullín cuellinegro
Dibujo: ©Luis Segorb



Zampullín Cuellirrojo *Podiceps auritus* Cabussó gris

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.

Zampullín Cuellinegro *Podiceps nigricollis* Cabussó coll-negre

Estatus: Residente, nidificante escaso, migrante e invernante abundante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 11 ex. el 9/I; 5 ex. el 29/I y 2 ex. el 19/VIII (PCC)

L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) 11 ex. el 15/IV (ALD).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 2 ex. el 23/XII en la costa (AJR).

Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 26/XI (LFS).

P.N. El Fondó 4.394 ex. el 29/I (JLE,LFS,MFS), 3.911 ex. el 26/II y 3.868 ex. el 29/III (JLE,LFS,MFS,CFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 4 ex. el 11/X (OAP).

P.N. Laguna de la Mata + 500 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ), 2.000 ex. el 22/X y apenas unos 200 ex. el 13/XII (Estas bajas cifras invernales en estas salinas se corresponderían, en parte, con el incremento de aves invernantes que se ha producido en los últimos años en El Hondo) (AJR).

PROCELLARIIDAE

Pardela Cenicienta *Calonectris diomedea* Baldriga cendrosa

Estatus: Migrante escaso, invernante ocasional.

Baix Vinalopó Playa del Pinet (La Marina-Elx) 1 ex. el 13/II (MJP).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 42 ex. volando hacia el Sur, en media hora, el 27/VII (AJR).

Pardela Balear *Puffinus mauretanicus* Baldriga mediterránea

Estatus: Migrante, invernante común.

La Marina Alta Les Rotes (Dénia) +100 ex. el 31/XII (AJR).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Balsa de 92 ex. el 23/XII en la costa (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 200 ex. el 27/XI en la costa (AJR,LFS).

Playa del Pinet (La Marina-Elx) Balsa de 350-400 aves el 29/I (AJR).

Pardela Mediterránea *Puffinus yelkouan* Baldriga mediterránea

Estatus: Invernante escaso.

La Marina Alta Les Rotes (Dénia) 1-2 ex. con grupo de unos 100 ex. de P. Balear el 31/XII, (AJR).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. en grupo de 92 ex. de P. Balear el 23/XII, en la costa (AJR).

R.M. Illa de Nova Tabarca Obs. durante navegación hacia la isla de 4 ex. el 8/XII (JDL,PAL,ALH).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 1 ex. el 29/XII entre un grupo de unos 25 ex. de P. Balear (AJR,LFS).

HYDROBATIDAE

 Paíño Europeo *Hydrobates pelagicus* Escateret

Estatus: Nidificante moderado.

La Marina Baixa Isla de Benidorm 2 ex. el 23/V (RGR,PMN)

🦆 **Paíño de Swinhoe** *Oceanodroma monorhis*

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.

SULIDAE

 Alcatraz Atlántico *Sula bassana* Mascarell

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso.

La Marina Alta Les Rotes (Dénia) +25 ex. volando hacia el S (la mayoría ad.) el 31/XII (AJR).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elix) 10 ex. el 19/XI (9 juv. y 1 ad.)
siquiendo a pesquero (AJR).

Baix Vinalopó Santa Pola 7 ex. a 2 millas de la costa el 21/XI (OAP).

P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 27/XII (OAP).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 10 ex. (9 ad., 1 inm) el 29/I volando hacia el 5 (AJR) y 4 ex. el 3/II (AJR, LFS).

PHALACROCORACIDAE

 Cormorán Grande *Phalacrocorax carbo* Corba marina grossa

Estatus: Migrante, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarrés 121 ex. el 9/I, 37 ex. el 6/III (PCC), 4 ex. el 4/X (JTR) y 79 ex. el 8/XI (PCC).

La Marina Alta P. N. Marial de Pego-Oliva 5 ex. el 28/II (EGM).

Les Rotes (Dénia) bando de 20 ex. el 31/XII volando hacia el cabo de San Antonio (AJR).

La Marina Baixa Embalse de Amadorio (La Vila Joiosa) 16 ex. el 6/II (TSR,JSR).

L'Alacantí Hondos de Rabasa (Alacant) 1 ex. el 19/III (GEM: JDL,PAL,ALH).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 21 ex. posados en las boyas de los barcos butaneros el 13/I (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 250 ex. el 8/II, 1 ex. el 13/III (RGR,PMN), 1 inm. el 25/IV, 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 22/IX, 450 ex. el 28/XI (AJR); 70 ex. el 26/XI acuden al descarte de los pesqueros de S. Pola (LFS,EGM).

P.N. El Fondo 354 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 17 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE)
v 18 ex. el 9/X (LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 13 ex. el 19/I (SAM) y 7 ex. el 05/III (AJR, LFS).

Riu Secura (Guardamar) 8 ex. el 22/I cerca de la desembocadura (SAM).

P.N. Laguna de la Mata máx. de 56 ex. el 13/XII, posados en la orilla Oeste (AJR).

Cabo Cervera (Torrevieja) bando de 35 ex. volando hacia el N el 10/III (AJR).
Embalse de la Pedrera 5 ex. el 14/IV (AJR, LF5).





 Garcilla Bueyera *Bubulcus ibis* Esplugabous

Estatus: Residente, nidificante común, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 29/I (PCC).

La Marina Alta Barranco de Teulada 15 ex. el 5/I (EGM,TZL).

L'Alacantí Riu Monnegre 3 ex. el 30/IV (JDL,PAL,ALH).

Barranco de las Ovejas (Alacant) 2 ex. el 19/III (JDL,PAL,ALH).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 2 ex. el 11/V (AQG).

E.D.A.R. (Santa Pola) 7 ex. el 11/VI (LFS,AJR).

P.N. El Fondó 307 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 125 ex. el 19/I (SAM).

 Garceta Dimorfa *Egretta gularis* Garseta del escull

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.

 Garceta Común *Egretta garzetta* Garseta blanca

Estatus: Residente, nidificante común, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 12 ex. el 29/I, 2 ex. el 13/III, 3 ex. el 7/IV, 1 ex. el 6/V, 7 ex. el 12/VII y 9 ex. el 19/VIII (PCC).

Riu Serpis (L'Alqueria d'Asnar) 1 ex. en el cauce el 3/VII (PCC).

La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 20 ex. el 28/II (EGM).

P.N. Penyal d'Irac 1 ex. el 27/VI (RGR,PMN).

Salinas de Calp 11 ex. el 15/IV (EGM).

La Marina Baixa Callosa d'En Sarrià 1 ex. el 7/III (EGM,TZL).

Riu Algar (Altea) de 2 a 4 ex. del 9 al 16/I y + 15 ex. el 16/X (EGM,TZL).

Embalse de Amadorio (La Vila Joiosa) 2 ex. el 10/IV (RGR,PMN).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 23/XI (LFS).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 19/I (LFS).

Cabo de Santa Pola 2 ex. el 5/XII (LFS), pescando en la orilla del mar.

P.N. Salinas de Santa Pola 80 ex. el 13/I (AJR,AQG), 225 ex. el 13/X (AJR) y + 120 ex. el 14/XI (AJR) en charca semidesecada.

P.N. El Fondó 5 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS) y 341 ex. el 29/VI (CFS,JLE,LFS,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM).

 Garceta Grande *Egretta alba* Agró blanc

Estatus: Migrador raro, invernante raro.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. del 9/I al 6/III y el 8/XI (PCC).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 18/II (AJR), 1 ex. los días 3 y 19/XI en Canalets (AJR), 1 ex. el 17/XI (LFS) en la desembocadura del Vinalopó y 1 ex. el 26/XI en Canalets (LFS).

P.N. El Fondó 1 ex. el 28-29/X (LFS,SAM), 1 ex. en La Raja el 30/X (OAP), 1 ex. el 5/XI (SAM) y 1 ex. el 13/XI (LFS).

 Garza Real *Ardea cinerea* Agró blau

Estatus: Residente. Nidifica regularmente en el Embalse de Beniarrés y ocasionalmente en los humedales del sur de Alicante.



El Comtat	<u>Embalse de Beniarrés</u> 56 ex. el 9/I, 9 ex. el 13/III, 3 ex. el 7/IV, 8 ex. el 26/V, 11 ex. el 17/VI, 12 ex. el 12/VII, 21 ex. el 3/VIII y 9 ex. el 8/XI (PCC). 3 parejas reproductoras (PCC).
La Marina Alta	<u>P. N. Marjal de Pego-Oliva</u> 15 ex. el 28/II (EGM). <u>Salinas de Calp</u> 2 ex. el 14/XI (EGM).
L'Alcoià	<u>Alcoi</u> 1 ex. sobrevuela núcleo urbano en dirección oeste hacia el Riu Polop el 9/V (PCC). <u>Embalse de Tibi</u> 1 ex. el 16/V (EGM).
La Marina Baixa	<u>Riu Algar</u> (Altea) de 1 a 2 ex. del 9 al 16/I (EGM,TZL).
El Vinalopó Mitjà	<u>Carretera Monòver-Novelda</u> 1 ex. en vuelo el 29/IX (LSM).
L'Alacantí	<u>Riu Monnegre</u> 1 ex. el 30/4 (JDL,PAL,ALH). <u>Saladar de Agua Amarga</u> (Alacant-Elix) 5 ex. el 19/IX (JDL,PAL,ALH) y 14 ex. el 29/X (AJR), 15 ex. el 10/XI (MAP).
Baix Vinalopó	<u>Pantano de Elix</u> 1 juv. el 1-XI (OAP). <u>P.N. Salinas de Santa Pola</u> 80 ex. el 13/I (AJR) y 102 ex. el 18/X con centradas en charca semidesecada (AJR). <u>P.N. El Fondó</u> 65 ex. el 26/I (MFS,JLE,LF5), 103 ex. el 26/II y 13 el 29/III (LF5,CF5,MFS,JLE).
Baix Segura	<u>El Hondo de Amorós</u> (San Fulgencio) 2 ex. el 19/I (SAM), 5 el 05/III (AJR,LF5) y 20 ex. el 11/X (OAP). <u>Riu Segura</u> (Guardamar) 8 ex. el 22/I (SAM) y 14 ex. el 5/III (AJR). <u>P.N. Salinas de Torrevieja</u> 1 ex. el 14/IV (AJR,LF5).



Garza Imperial *Ardea purpurea* Agró roig

Estatus: Nidificante escaso, invernante ocasional.

El Comtat	<u>Embalse de Beniarrés</u> 2 ex. el 19/VIII (PCC).
L'Alacantí	<u>Barranco de las Ovejas</u> (Alacant) 1 ex. el 5-6/X (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó	<u>Clot de Galvany</u> (Elix) 3 ex. el 21/III (GBP,OTL,LF5), 1 ex. el 6/V y el 5/VI (AJR). <u>P.N. Salinas de Santa Pola</u> 1 ex. el 28/I (MAP), 12 ex. el 1/IV (AJR) y última cita postnupcial el 18/X (EGM). <u>P.N. El Fondó</u> 8 ex. el 29/III (LF5,CF5,MFS,JLE), 45 ex. el 29/VI (CF5,JLE,LF5,MFS,ROM) y 5 ex. el 31/X (EGM,TZL,LF5,ARF).
Baix Segura	<u>P.N. Laguna de la Mata</u> 18 ex. el 30/VIII (AQG,CF5). <u>Embalse de la Pedrera</u> 1 ex. el 29/V (AJR).



Garza real
Dibujo: ©Luis Sogorb

Cigüeña blanca
Foto: © Toni Zaragoza



✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

	Flamenco Común	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamenco
---	-----------------------	-----------------------------	----------

Estatus: Residente común, nidificante ocasional, migrador abundante.

La Marina Alta Salinas de Calp 25 ex. el 28/II, 30 ex. el 14/III (RGR,PMN), 22 ex. el 15/IV(EGM), 18 ex. el 18/IV(RGR,PMN), 40 ex. el 9/V (EGM,TZL), 95 ex. el 5/VI y 318 ex. el 25/VIII (MAP), 100 ex. el 27/VI (RGR,PMN) y 109 ex. el 14/XI (EGM).

L'Alacantí Saladar de Aqua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 20/IX (AQQ).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 2.372 ex. el 1/IX (AJR) y 941 ex. el 3/XI (AJR).
P.N. El Fondó 765 ex. el 29/I (MFS,JLE,LF5), 1.014 ex. el 26/II (JLE,MFS,CF5,LF5), 930 ex. el 29/III (LF5,CF5,MFS,JLE) y 2.044 ex. el 29/IV (CF5,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM), 72 ex. el 2/III (AJR) y 159 ex. el 9/IV (OAPJAG).

P.N. Laguna de la Mata 50 ex. el 22/VIII (EGM,LFS), 540 ex. el 22/X (AJR) y 115 ex. el 13/XII (AJR).

 Flamenco Enano *Phoenicopterus minor* Flamenc menut

Estatus: Divagante(?), escapado de cautividad (?).

Sin citas en 1999.

Flamenco común
Foto: © Toni Zaragoza



 Flamenco Chileno *Phoenicopterus chilensis*

Estatus: Escapado de cautividad.

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 1/IX con
Phoenicopterus ruber (IGC).

ANATIDAE

 Suirirí Piquirrojo *Dendrocygna autumnalis*

Estatus: Escapado de cautividad?, divagante?

Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 8/VII junto a varios ex. de Tadorna tadorna (LFS), 1 ex. el 9/ VII (LFS,AJR), 1 ex. el 25/VII (OAP) y 1 ex. el 27/VII (LFS).

 Ánsar Campestre *Anser fabalis* Oca praderença

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.

 Ánsar Común *Anser anser* Oca vulgar

Estatus: Invernante escaso.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 5 ex. del 5/XII (AJR,OAP,LFS) al 13/XII (LFS).

 Barnacla Cariblanca *Branta leucopsis* Oca de gelta blanca

Estatus: Escapado de cautividad.

Sin citas en 1999.

 Ganso del Nilo *Alopochen aegyptiacus* Oca egípcia

Estatus: Divagante(?), escapado de cautividad (?).

Sin citas en 1999.

 Tarro Canelo *Tadorna ferruginea* Ànec canyellat

Estatus: Divagante, escapado de cautividad (?).

Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 8/VII (LFS,AJR) nos sobrevuela, probablemente procedente de una urbanización cercana.

E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. 1/III y 22/V (AQG), 1 ex. hembra/juv. el 8/VII (AJR, LFS).

 Tarro Blanco *Tadorna tadorna* Ànec blanc

Estatus: Residente, nidificante escaso, invernante moderado.

La Marina Alta Dénia 6 ex. el 31/XII posados en el mar, a la salida del puerto (AJR).
Salines de Calp 1 ex. el 12/IX (TZL)

Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 3+1h. con 2 pull + 1 pp. con 2 pull el 11/VI (LFS,AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola 85 ex. el 16/I, 130 ex. el 24/II, 250 ex. el 18/IV (JGP,JGR), 95 ex. el 19/IV (AJR), 29 ex. el 19/V (AJR), 106 ad. y juv. el 1/VIII (AJR,LFS) y 39 ex. (máx. invernante) el 21/XII (AJR).

P.N. El Fondó 54 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 22 ex. el 26/II y 20 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE) y 87 ex. el 29/IV (JLE,CFS, MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 12 ex. el 22/I (AJR), 27 ex. el 17/II (AJR), 56 ex. el 5/III (LFS,AJR,SAM), 58 ex. el 1/IV(AJR), 31 ex. el 24/V varias pp. formadas pero no se observan pollos durante el periodo reproductor, 20 ex. el 3/VI, 15 ex. el 3/VII (AJR) y 21 ex. el 24/XII (AJR).

P. N. Laguna de La Mata 27 ex. el 22/X, 100 ex. el 15/XI y 789 ex. el 22/XII (AJR).

P. N. Salinas de Torre Vieja 10 ex. el 20/I (AJR).

Embalse de la Pedrera 4 ex. el 14/IV (AJR,LFS) y 9 ex. el 29/V (AJR).

 Pato Mandarín *Aix galericulata* Ànec mandarí

Estatus: Escapado de cautividad.

L'Alacantí Playa del Saladar (Alacant) 1 macho ingresa petroleado en el C.R.F. el 25/VII (C.R.F.).

 Silbón Europeo *Anas penelope* Piuló

Estatus: Invernante moderado.

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 1 ex. el 6/II (LFS,JCR).

P.N. El Fondó 150 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 107 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS), 18 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).

P.N. Salinas de Santa Pola 30 ex. el 13/XI (AJR).

 Ánade Friso *Anas strepera* Ascle

Estatus: Nidificante raro, invernante escaso.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 75 ex. el 18/XII (SAM).

P.N. El Fondó 36 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 33 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS), 32 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE), 1 pp. el 10 y 14/X (EGM,LFS,AJR,AQG).

 Cerceta Común *Anas crecca* Sarset

Estatus: Invernante común.

La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 15 ex. el 28/II (EGM).L'Alacantí Hondos de Rabasa (Alacant) 4 ex. el 18/XI (JDL,PAL,ALH).Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 5 ex. el 17/XII sobrevolando la costa hacia el sur, 2 ex. el 15/XI en la costa y 11 ex. el 23/XII en la costa (AJR).Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 20 ex. el 10/I (LF5,MAP) y 16 ex. el 5/II (AJR,MAP).P. N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 17/XI en el mar (LF5).P. N. El Fondó 285 ex. el 29/I (MF5,JLE,LF5), 1.029 ex. el 28/II (CF5,JLE,LF5,MF5) y 87 ex. el 29/III (LF5,CF5,MF5,JLE).Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 9/I (LF5,AJR), 2 ex. el 19/I (SAM) y el 22/II (AJR), 2 ex. el 7/X, 1 ex. el 28/XI y el 24/XII (AJR).Riu Segura (Guardamar) 6 ex. el 9/I (SAM) y el 5/III (AJR).P. N. Laguna de La Mata 9 ex. el 14/IX (MAP). **Ánade Azulón** *Anas platyrhynchos* Coll-verd

Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarrés 780 ex. el 9/I, 362 ex. el 6/III, 391 ex. el 7/IV, 233 ex. el 26/V, 198 ex. el 17/VI, 321 ex. el 12/VII y 774 ex. el 19/VIII (PCC).La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 2 hembras y 12 pull. el 2/V (TZL).L'Alacantí Riu Monnegre 2 ex. el 7/V (JDL,PAL,ALH).Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 2 ex. el 19/I (LF5), 6 ex. el 6/II, 4 ex. el 5/IV (LF5,JCR) y 18 ex. el 16/IV (SCG).Pantano de Eix 2 ex. el 12/IV (LF5,AQG).P. N. Salinas de Santa Pola 6 ex. el 13/III (RGR,PMN).P. N. El Fondó 313 ex. el 29/I (MF5,JLE,LF5), 264 ex. el 26/II (JLE,MF5,CF5,LF5), 127 ex. el 29/III (LF5,CF5,MF5,JLE) y 921 ex. el 30/XI (CF5,JLE,ROM,MF5).Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 5/III (AJR,LF5).Embalse de la Pedrera 55 ex. el 14/IV (AJR,LF5). **Ánade Rabudo** *Anas acuta* Cúa de junc

Estatus: Invernante moderado.

Baix Vinalopó P. N. Salinas de Santa Pola 52 ex. el 16/II y 122 ex. el 18/X (AJR).P. N. El Fondó 145 ex. el 29/I (MF5,JLE,LF5), 87 ex. el 26/II (JLE,MF5,CF5,LF5) y 18 ex. el 29/III (LF5,CF5,MF5,JLE).Baix Segura P. N. Laguna de la Mata 3 ex. el 22/XII (AJR). **Cerceta Carretona** *Anas querquedula* Roncadell

Estatus: Nidificante raro, migrante escaso.

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 1 hembra el 7/XI en Balsares (AJR).P. N. El Fondó 4 ex. el 29/III (LF5,CF5,MF5,JLE). **Cerceta Aliazul** *Anas discors* Sarset alablau

Estatus: Divagante.

Baix Vinalopó P. N. El Fondó 1 macho el 29/IV (JDN,JLE).Ánade azulón
Dibujo: © Germán López

🦆 **Cuchara Común** *Anas clypeata* Cullerot

Estatus: Nidificante raro, invernante abundante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 5 ex. el 9/I, 10 ex. el 29/I, 6 ex. el 6/III y 6 ex. el 13/III (PCC).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alcant-Elx) 3 ex. el 8/IX (MAP).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 4/I en la costa (AJR, LFS).

E.D.A.R. (Santa Pola) 3 ex. el 26/XI (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. en el mar el 17/XI (LFS).

P.N. El Fondó 13.568 ex. el 29/I (MFS, JLE, LFS), 17.987 ex. el 26/II (JLE, MFS, CFS, LFS), 2697 ex. el 18/III (LFS, CFS, MFS, JLE) y 5 ex. el 29/VI (CFS, JLE, LFS, MFS, ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 73 ex. el 18/III (SAM) y máximo invernial 221 ex. el 24/XII (AJR).

P.N. Laguna de la Mata 9 ex. el 22/VIII (EGM, LFS) y 100 ex. el 13/XII (AJR).

🦆 **Cerceta Pardilla** *Marmaronetta angustirostris* Rosseta

Estatus: Nidificante raro, invernante abundante.

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 pp. el 6/V (MAP).

Baix Vinalopó E.D.A.R. de Arenales del Sol (Elx) 2 ex. el 1/VI (AQG).

Clot de Galvany (Elx) 2 ex. el 10/I (LFS, MAP), 8 ex. el 5/II (AJR, MAP), 2 ex. el 26/III (AJR, LFS), 2 x. El 18/IV (JDL, PAL, ALH), 2 pp. el 22/IV (AJR) y 11 ex. (1 h. + 10 pull.) el 9/VI (LFS) y 17 ex. el 14/VI (SCG). Rep. 1 pp (SCG). Nº max. de ex. en Balsares 7 ex. el 5/II (SCG).

E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. en vertido de aguas residuales en el barranco el 28/VI (AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 8/III (SAM), 4 ex. el 19/IV, 8 ex. el 30/VII, 3 ex. el 14/VIII y 5 ex. el 30/IX (AJR).

P.N. El Fondó máximos mensuales:

Mes	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	62	50	56	103	151	312	750	387	291	200	350	150
➡ (CFS, JLE, LFS, MFS, ROM, LIF, JDN, RMF, MAP, MCJ, MER, JZE) ➡												

Baix Vinalopó P.N. Laguna de la Mata 7 ex. en Sector NO el 3/IX (¿posible 1ª cita para el PN.?) (MAP, AQG, MLC).

El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 12 ex. el 19/VIII y 1 ex. el 2/IX (AJR).



Cerceta pardilla
Dibujo: © Luis Sogorb

-  **Pato Colorado** *Netta rufina* Sivert
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante moderado.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 15 ex. el 10/I (LFS,MAP), 30 ex. en Balsares el 17/I (SCG) y 10 ex. el 26/III (AJR,LFS) y 11 ex. el 5/IV (LFS,JCR).
P.N. El Fondó 132 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 936 ex. el 28/II (JLE,MFS,CFS,LFS) y 914 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).
P.N. Salinas de Santa Pola 185 ex. el 12/II y 284 el 2/III (AJR).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 pp. el 22/III y el 1/IV (AJR).
-  **Porrón Europeo** *Aythya ferina* Boix
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 29/I (PCC).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 2 ex. el 10/I (LFS,MAP) y 68 ex. el 7-8/IX (AJR, SCG).
P.N. El Fondó 9.811 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 7.912 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS) y 2.764 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).
El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 35 ex. el 18/III (SAM), 52 ex. el 1/IV y 10 ex. el 4/IV (AJR).
-  **Porrón Pardo** *Aythya nyroca* Roget
Estatus: Nidificante ocasional, invernante raro.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 29/I (JLE,LFS,MFS), 1 ex. el 7/II (LFS,JCR,AQG), 1 ex. el 9/II (LFS), 1 ex. el 3/VI (LFS,JLE), 1 ex. el 28/X (CFS,JLE,ROM) y el 26/XII (MFS).
-  **Porrón Moñudo** *Aythya fuligula* Morell capellut
Estatus: Invernante escaso.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 40 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 17 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE) y 1 ex. el 5/IX (AQG,EH).
-  **Porrón Bastardo** *Aythya marila* Morell buixot
Estatus: Invernante ocasional.
Sin citas en 1999.
-  **Eider Común** *Somateria mollissima* Èider
Estatus: Invernante ocasional.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 hembra ingresa en el C.R.F. el 27/XI (MFS,SMJ,PMM).
-  **Negrón Común** *Melanitta nigra* Morell de mar negra
Estatus: Invernante escaso.
La Marina Baixa La Vila Joiosa 1 ad. hembra alimentándose en el puerto, buceando en repetidas ocasiones el 19/XI. (AIR y JIR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola (en la costa) 3-4 ex. hembras/juvs. el 17-18/XI (LFS,AJR) y 7 ex. del 24/XI al 5/XII (AJR,LFS,AQG,EGM).
-  **Negrón Especulado** *Melanitta fusca* Morell de mar fosc
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

☞ **Serreta Mediana** *Mergus serrator*

Serreta mitjana

Estatus: Invernante raro.

L'Alacantí

R.M. Illa de Nova Tabarca 2 ex. el 8/XII (JDL,PAL,ALH).

Baix Vinalopó

Saladar de Agua Amarca (En la costa) (Alacant-Eix) 1 ex. del 26/I al 26/III (LFS,AJR,JCR), 2-3 ex. el 22/XI al 5/XII y 4 hembras/juvs. hasta el 29/XII (LFS,AJR,EGM).

Cabo de Santa Pola 1 hembra/juv. el 5/II (LFS,AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola (en la costa) 3 hembras/juv. + 1 macho el 24/XI (AJR) y 1 hembra/juv el 28/XI (AJR,AQG).

☞ **Malvasía Canela** *Oxyura jamaicensis*

Ànec de Jamaica

Estatus: Divagante, escapado de cautividad, nidificante ocasional.

Baix Vinalopó

P.N. El Fondó 1 macho híbrido del 11-21/I (abatido) (LFS,JLE), 1 macho del 21/I al 4/III (JLE,LFS,AQG,MFS,APG,CFS), 2 machos: uno joven (se elimina) y otro adulto el 9/III (LFS,JLE), 1 macho el 10/III (LFS), 2 machos adultos (se elimina uno) el 11/III (LFS,JLE), 1 macho adulto del 29/III al 7/IV (desaparece) (LFS,JLE), 1 hembra híbrida del 6/V al 9/XI (LFS,JLE,MFS,CFS).

El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 hembra del 8 al 11/XI (AJR,LFS,JLE,MFS,SAM).

☞ **Malvasía Cabeciblanca** *Oxyura leucocephala*

Ànec capblanc

Estatus: Residente, nidificante escaso.

Baix Vinalopó

P.N. El Fondó máximos mensuales:

Mes	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	617	383	184	208	366	193				613	1199	1056

☞ (CFS,JLE,LFS,MFS,ROM,JCR,AQG) ☞

Malvasía cabeciblanca
Dibujo: ©Luis Segorb



Y **Zopilote Negro** *Coraqyps atratus*

Estatus: Escapado de cautividad.

Baix Vinalopó La Marina (Eix) 1 ex. con pihuelas el 28/IX (LFS), capturado y enviado al C.R.F.

Abejero Europeo *Pernis apivorus* Pilot

Estatus: Migrante moderado.

La Marina Baixa Alt del Sebastià (La Vila Joiosa) 15 ex. el 20/IX con direcció sur (T2L).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. sobrevuela la zona el 19/IX (LSM).

Baix Vinalopó Pantano de Elix 12 ex. el 23/IX y 1 ex. el 24/IX (OAP) y 4 ex. el 5/V (AQQ).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 16/IX (LFS).

Serra de Santa Pola 1 ex. el 16/IX (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 15 ex. volando hacia el norte el 4/V, 1 ex. el 26 y 29/IX (AJR, LF5), 7 ex. el 1/X (AJR, MAP) y 5 ex. el 1/X (MJP).

P.N. El Fondó 1 ex. sobrevolando palmeral advacente el 4/V (AJR).

Baix Segura El Hondó de Amorós (San Fulgencio) 5 ex. el 25/IX (MJP).

Serra de Albatera 5 ex. el 8/X (LFS).

Y Elanio Común *Elanus caeruleus* Esparver d'espattes negres

Estatus: Visitante.

Baix Vinalopó PN. El Fondó 1 ad. el 16/X (MJP), el 18/X (AQG), el 15/XI (LFS) y el 21/XI (AQG, EH).

Y Milano Negro *Milvus migrans* Milá negre

Estatus: Migrador raro.

Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 4/III (OAP,JCP).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 4/III (OAP).

	Milano Real	<i>Milvus milvus</i>	Milá reial
---	--------------------	----------------------	------------

Estatus: Migrador ocasional.

Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 15/IX (LFS).

Serra de Crevillent 1 ex. el 8/VIII (MJP).



Buitre Leonado
Dibujo: ©Luis Sogorb

 Buitre Leonado *Gyps fulvus* Voltor comú

Estatus: Migrante moderado.

La Marina Alta Castell de Castells 30 ex. 14/XI (E.Olivares & E. Treviño).

Serra de Mariola (Alcoi) 12 ex. Vuelan en círculos aprovechando térmica a la entrada del Barranc del Cint. 21/I. (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex. sobrevuelan la parte Oeste de la Serra con dirección S. 11/X (PCC).

Ibi 2 ex. observados a 2 km. al sur del núcleo urbano. Vuelan en dirección Sur. 19/X (EGM).

La Marina Baixa Isla de Benidorm 1 ad. el 9/XI volando sobre el mar, se acerca a la isla donde se le pierde de vista (AIR).

L'Alacantí Pla de Chirau (Alacant) 175-200 ex. 19/XII (MAR, ASG).

- El Vinalopó Mitjà Alacant 13 ex. sobrevuelan el parque de El Palmeral el 3/XI (EGM).
Serra del Coto (Monòver) 1 ex. juv. planeando sobre la zona el 7/XI (LSM).
Catí (Petrer) 1 ex. sobrevuela la zona el 17/IV. (LAF, JMC, AIR).
Rincón Bello (Petrer) 1 ex. sobrevuela la zona el 17/IV. (AIR, JIR).
Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ej el 15/X y 19 ex. el 17/XI (OAP).
La Marina (Elx) 200 ex. el 18/X (MJP, B. Conduit y J. Brown).

Y Buitre Negro *Aegypius monachus* Voltor negre

Estatus: Visitante.
Sin citas en 1999.

Y Culebrera Europea *Circaetus gallicus* Àguila serpera

Estatus: Nidificante.

- El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. fase oscura el 12/VII (PCC).
L'Alt Vinalopó Valle de Alorines (Villena) y Valle de Albaida (Fontaneres) 1 ex. el 23/III (MER).
Valle de los Alorines (Villena) 29/III. 25/V. 22/VI. 23/VI. 10/VIII (MER).
Serra del Morrón (Villena) 27/III (MER).
Biar 1 ex. el 1/III. 1ª cita primaveral; 1 ex. el 15/X. Última observación otoñal (JAR).
Lomas de Xixi (El Campello) 1 ex. el 5/IV (ALD).
L'Alacantí Pantano de Elx 1 ex. pálido el 14/VII; 2 ex. el 20/VII; 1 ex. el 31/VII; 2 ex. el 3/VIII, 1 ex. el 17/VIII, 2 ex. el 23/IX, 2 ex. el 1/X, 1 ex. el 4/X y 13/XI (OAP); 1 ex. el 19/III, el 25/IV, el 5/V y el 18/VIII (AQG).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 18/IV (OAP, JCP); 1 ex. el 28/XI (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 11/VI (MJP); 1 ex. el 6/IX (AJR, LFS); 1 juv el 16/IX (AJR, LFS); 1 ex. el 11/VI (EGM, TZL, LFS); 1 ex. el 4/IX (AQG, FGO).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 15/IX (LFS).

Culebrera europea
Philip. © Luis Sogorb



Y Aguilucho Lagunero Occidental *Circus aeruginosus* Arpellot de marjal

Estatus: Migrador, invernante escaso.

- La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 4 ex. el 28/II (EGM).
L'Alt Vinalopó Valle de Los Alorines (Villena) 1 macho el 19/III, 1 hembra el 16-20/IV, 2 hembras el 14/IX, 3 ex. (2 hembras + 1 macho) el 15/IX y 3 hembras y 1 macho el 21/IX (JZE, MER).
Laguna de Salinas 1 ex. el 27/III (AJR, JAR).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 juv. el 12/IX (LSM).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 18/IX y 3 ex. (2 machos) el 20/IX (MAP).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 10/I (LFS, MAP), 1 ex. el 10/II (LFS) y 2 ex. el 26/III (AJR, LFS).
Pantano de Elx 1 ex. los días 31/III y 1/IV (AQG) y 4 ex. (1 macho y 1 hembra) el 23/IX (OAP).
E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 2/IX (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 7 ex. el 17/I (OAP), 6 ex. el 21/II, 1 ex. el 10/IV (RGR, PMN) última cita primaveral de 3 ex. el 18/IV, 1ª postnupcial de 1 ex. el 24/VIII y máx. invernal de 10 ex. el 12/XII (OAP).
P.N. El Fondó 73 ex. en dormitorio el 19/I (LFS), 34 ex. el 26/II (JLE, MFS, CFS, LFS), 1 ex. el 6/III (RGR, PMN) 21 ex. el 29/III (LFS, CFS, MFS, JLE), 1 ex. el 11/VI (MJP), 1 ex. el 7/V (LFS), 9 ex. el 14/IX (LFS, AJR), 1 ex. el 28/X en palmeral (LFS, SAM), 63 ex. el 21/XII (LFS, MFS).



Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 3 ex. el 20/II (LFS).
Embalse de la Pedrera 2 ex. el 14/IV (AJR,LFS)

Y **Aguilucho Pálido** *Circus cyaneus* Arpellot pàl·lid

Estatus: Invernante raro.

La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 hembra el 28/II (EGM).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 macho el 17/I y 11/III (OAP) y 1 macho el 21 y 22/XII (SAM).
P.N. El Fondó 1 hembra el 1/III (AJR), 1 macho del 11-14/XI (AJR,LFS) y 1 hembra el 19/XI (AJR,LFS).

Baix Segura Serra Escalona (Orihuela) 1 ex. el 3/X (AQG).

Y **Aguilucho Cenizo** *Circus pygargus* Arpellot cendrós

Estatus: Nidificante escaso.

La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex. el 28/II (JGP,JGR).

L'Alt Vinalopó Valle de Los Alorines y Serra del Morrón (Villena) 1 macho el 31/III y 21/IV, el 21/IV 2 hembra y 2 machos (de ellos un jov. 2º año-cal.) duermen en campo de cereal (MER,BEC). Posteriormente un sólo ex. y el 17/VII se ven 2 pull. (MER,JZE). 1 macho jov. los días 2-14/IX (JZE, MER).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 17/IV (AQG).

Clot de Galvany (Elx) 1 pp. el 22/IV en Balsares, haciendo paradas nupciales, 1 macho el 26/IV en Balsares y el 19/V. ¿Posible reproducción de 1 pp.? (AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 macho el 15/III (MJP), 1 macho y 2 hembras (macho realizando vuelos nupciales) el 9/IV (OAP,JAG), 2 pp. realizando vuelos nupciales el 18/IV, 1 pp. el 23/V (macho cebando a la hembra en nido), 2 hembras y 2 machos (con hembras entrando y saliendo de los nidos) el 30/V, 4 ex. (3 juv. y 1 hembra) en nido y alrededores; 1 macho el 6/VII, 4 juv. el 7/VII, 4 ex. (3 juv. y 1 hembra el 18/VII). 1 macho el 19/VIII (AJR). Reprod. de 2 pp (OAP).
P.N. El Fondó 1 pp. realizando cortejo el 31/III, última cita de 3 ad. y un joven el 14/IX (LFS,AJR). Reproducción 2-3 pp.

Baix Segura P.N. Salinas de La Mata-Torrevieja 2 machos el 23/III, 7 machos + 5 hembras el 14/IV (AJR,LFS).

Y **Azor Común** *Accipiter gentilis* Astor

Estatus: Residente, invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 macho el 23/III. (PCC).

La Marina Alta Vall d'Alcalà 1 ex. el 28/V (PCC).

L'Alt Vinalopó Biar 1 ex. el 5/VI (JAR).

Baix Segura Embalse de La Pedrera 1 ex. el 3/10 (AQG, LFS).

Y **Gavilán Común** *Accipiter nisus* Esparver

Estatus: Residente, invernante.

El Comtat Serra de Mariola (Alfafara) 1 ex. el 13/XII (JTR).

L'Alt Vinalopó Biar 1 pp nidificante (JAR).

Laguna de Salinas 1 ex. el 13/III en proximidades (AJR).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. herido por arma de fuego 7/XI (PCC).

Riu Polop (Alcoi) 1 ex. macho intenta captura de páridos 11/XI (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex. el 22/XII. (PCC).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 9/X (EGM, TZL), 1 ex, intenta captura Avión roquero



Azor común
 Dibujo: ©Luis Sagarbi

el 19/XII (TZL); 1 ex. atacado por aprox. 50 estorninos los cuales forman un bando compacto haciéndole huir el 23/IX (TZL).

El Vinalopó Mitjà Monòver 1 ex. el 13/IX sobrevolando cultivos y pinar en El Chinorlet (AJR).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 23/IX (OAP); 1 ex. el 21 y 28/IX (AQG).

Cabo de Santa Pola 1 ex. el 19/X (AJR).

E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 16/XI (LFS).

Serra de Santa Pola 1 ex. el 16/IX (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 22/I, volando a media altura entre las Salinas y la pinada de El Pinet; 1 ex. el 30/IX; 1 ex. volando hacia el sur (AJR, MJP); 1 ex. el 1/X (MJP).

Serra de Crevillent 1 ex. el 25/VIII (MJP).

Baix Segura Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 28/XI cicleando muy alto (AJR).; 2 ex. el 25/VIII (MJP).

P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 3/IX (AQG, MAP).

Y Busardo Ratonero *Buteo buteo* Aligot comú

Estatus: Residente, Invernante escaso.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. 6/III (PCC).

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines y Albarizas (Villena) 1 pp. a partir de final de Feb. hasta mediados de Jun. (MER).

Biar 1-2 pp. nidificantes (JAR).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 3 ex. planeando sobre la zona el 29/VIII (LSM).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 2 ex. el 1/X (OAP); 1 ex. el 2/IX y el 13/X (AQG).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. entre enero y el 2/III; 1 ex. el 17/XI; 1 ex. el 15/XII (LFS).

Elx 1 ex. el 28/X (LFS, SAM).

P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. el 13 y 15/I; 1 ex. el 2/III; 1 ex. el 29/IX, y ya habitual durante el mes de diciembre; presencia invernal de 2 ex. el 4/I, 2 ex. el 13/III, 2 ex. el 25/III, cita postnupcial de 2 ex. el 17/X (OAP); 1 ex. el 18/IX (AQG, MAP y MLC).

Elx 1 ex. en cultivos el 28/X (LFS, SAM).

P.N. El Fondó 15 ex. el 27/I (LFS), 7 ex. el 26/II (JLE, MFS, CFS, LFS), 2 ex. el 31/III (LFS), 2 ex. el 7/IV (LFS, JLE), 1 ex. el 5/V (LFS) 1 ex. el 29/VII (AJR, LFS); 1 ex. el 6/IX (AJR, LFS); 3 ex. el 20/X; 6 ex. el 28/XI; 4 ex. el 21/XII; 1 ex. el 6/III (RGR, PMN).

Baix Segura Hondo de Amorós 2 ex. el 22/I; 3 ex. el 16/II; 1 ex. el 2/III; 2 ex. el 8/IX y el 25/X; 1 ex. habitual en Nov. y Dic (AJR). 2 ex. el 6/I (SAM).

P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 17/II (AJR).

P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 20 y 22/XII (AJR).

Embalse de la Pedrera 1 ex. el 14/IV (AJR, LFS).

Y Busardo Moro *Buteo rufinus* Aligot rogenic

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.

Y Busardo Calzado *Buteo lagopus* Aligot calçat

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.



Y Águila Moteada *Aquila clanga* Àguila cridanera

Estatus: Migrante ocasional, invernante ocasional.

Sin citas en 1999.



Águila real
Dibujo: ©Luis Sagarb

Y Águila Real *Aquila chrysaetos* Àguila reial

Estatus: Residente.

- L'Alt Vinalopó Mínimo de 3 pp. nidificantes en parajes confidenciales (JAR).
Valle de los Alorines (Villena) y Serra de La Solana (Villena y Fontaneres). 1 pp. desde el 20/II hasta 6/VII. A partir de Ago. sólo se observa 1 ex ad. (MER).
Serra del Morrón y Valle de los Alorines (Villena). 1 pp. ambos subad. (MER).
 El Comtat Serra de Mariola 1 pp con 1 ex. inmad. el 20/X (JTR).
 La Marina Baixa Puig Campana 2 ex. el 2/IV (EGM, TZL).
Serra de Aitana 1 pp. ad. el 15/V (MJP), 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).
 El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 pp. en vuelo el 7/XI (LSM).

Y Aguililla Calzada *Hieraaetus pennatus* Àguila calçada

Estatus: Nidificante, invernante escaso.

- L'Alt Vinalopó Biar 1 ex. el 28/IV y 1 ex. el 15/VI. (JAR).
 El Comtat Benifato 1 ex. de fase clara en vuelo el 18/III (TSR, JSR).
 El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. cruza la zona el 12/IX (LSM).
 Baix Vinalopó Clot de Galvaný (Elx) 1 ex. el 27/III (LFS). 1 ex. fase oscura el 5/IV (LFS, JCR) 1 ex. de fc el 17 y 23/XI (AJR, MAP).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. de fc el 7/II. (AJR); 1 ex. de FC el 7/III y 2/IV, 1 ex. de FC el 12/XII (OAP).
P.N. El Fondó Más de 7 ex. el 9/I (MJP), 20 ex. el 27/I (LFS), 5 ex. el 26/II (JLE, MFS, CFS, LFS), 2 ex. el 31/III (LFS), 6 ex. el 7/IV (LFS, JLE), 1ª observac postnupcial de 1 ex. de fc el 2/IX, y a partir de ahí ya habitual todo el otoño/invierno, con 6 ex. (2 fo y 4 fc) el 7/XII.; 2 ex. el 10/X (EGM, TZL); 1 ex. el 31/X (EGM, TZL, LFS y ARF), 4 ex. el 7/X (LFS), 2 ex. (1 de fase oscura) el 28/X (LFS, SAM).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 15/II (LFS).
Hondo de Amorós 1 ex. de fo el 22/I; 1 ex. el 16/III (SAM), 3 ex. (2 fo) el 30/IX; 1 ex. de fo el 11/XI (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. de fc el 20/I (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. de fc el 1/III (AJR).



Aguililla calzada
Foto: ©Sergio Arroyo

Baix Segura

Y Águila-azor Perdicera *Hieraaetus fasciatus* Àguila de panxa blanca

Estatus: Residente escaso.

- L'Alt Vinalopó 1pp. nidificante en paraje confidencial (JAR).
Sax - Villena 1 pp. con nido. 24/II (MER).
 L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1pp con 1 pull.
 El pull. fue herido por disparo en Ago. en paraje cercano (PCC).
Tibi 1 pp. con un pull. 16/V (EGM).
 Baix Vinalopó Pantano de Elx 2 ads el 13/XI (OAP).
P.N. El Fondó 1 ex. juv. hallado electrocutado en Dic. (MFS).



Águila-azor perdicera
Foto: ©Toni Zaragoza

PANDIONIDAE

Y Águila Pescadora *Pandion haliaetus* Àguila pescadora

Estatus: Migrante, invernante escasa.

L'Alt Vinalopó Valle de Alorines (Millena) y Valle de Albaida (Fontanares) 1 ex. ad. el 25/IX (TBO).

L'Alacantí Saladar de Aqua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 20/I (AJR).

la pescadora
©Tomí Zaragozi

PN. El Fondó 4 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), el 7/II (LFS,JCR,AQG), 6 ex. el 26-30/II (JLE,MFS,CF5,LFS, ROM), 1 ex. el 6/III (RGR,PMN), 2 ex. el 29/III(LFS,CF5,MFS,JLE), 1 ex. el 8/IV (LFS), 1 ex. atacado por un halcón peregrino el 18/VIII (TZL, GLI), 2 ex. el 15 y 17/IX (AJR), 3 ex. del 7 al 31/X (LFS,EGM,TZL,ARF) y 5 el 13/XII (LFS). Presencia de 2 ex. durante el periodo reproductor (CF5,JLE,LFS,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 28/I (SAM), 1 ex. el 9/IV (OAPJAR), 1 ex. el 6/IX (LFS,AJR) el 30/IX y el 2/XI (AJR).

Águila pescadora
Foto: © Toni Zaragoza



FALCONIDAE

Y Cernícalo Primilla *Falco naumanni* Xoriquer petit

Estatus: Visitante, nidificante reintroducido.

Dentro de un proyecto de reintroducción en L'Alt Vinalopó, nacen los primeros pollos en 2000, después de dos décadas de ausencia como nidif. en la Comunidad Valenciana.

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1 macho, dos años (reintroducido), 12/IV. A partir de esta fecha, llegan un mínimo de 25 ex. reintroducidos y salvajes, hasta el 18/X (MER).

 Cernícalo Vulgar *Falco tinnunculus* Xoriquer

Estatus: Residente.

El Comtat Serra de Mariola (Alfafara) 1 ex. el 6/XII y 1 ex. el 24/XII (JTR).

Embalse de Beniarrés 1 ex. hembra el 12/VII (PCC).

Benimarfull 1 ex. hembra el 29/VI (PCC).

La Marina Alta Serra de Bèrnia 1 ex. el 17/X (TZL,PG, RGR).

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 26/III; 1 ex. cazando el 14/XII (PCC).

Serra dels Plans 1 pp. (PCC).

La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).

L'Alacantí Riu Monnegre Reprod. en talud de tierra 7/V (GEM).

Alacant 1 ex. macho en la Finca Adoc-Serra Grossa el 5/IV; 1 ex. hembra en la Avda de la Naciones (playa de Sant Joan) el 25 y 26/IV; 1 ex. hembra entre la C/México y la Avda. Lorenzo Carbonell el 3/XI (EGM).

Saladar de Agua Amarga 1 ex. macho el 15/XII (EGM).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 3 ex. el 1 y 4/X (OAP).

Clot de Galvany (Eix) 1 ex. el 19/I (LFS), 1 ex. el 26/III (AJR, LFS).

P.N. El Fondó 1 ex. el 21/IV (LFS,JLE), 12 ex. el 17/IX en cultivos de la zona sur (AJR).

Elx 2 ex. en cultivos el 28/10 (LFS,SAM).

Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 2 ex. el 23/III (AJR,LFS), 5 ex. el 14/IV (LFS,AJR).

Y Cernícalo Patirrojo *Falco vespertinus* Falcó cama-roig

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.

Cernícalo vulgar
Dibujo: ©Luis Segorb**Y Esmerejón** *Falco columbarius* Esmerla

Estatus: Invernante escaso.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. el 28/XI (OAP).
P.N. El Fondó 2 ex. el 15/I (AJR, LFS), 1 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS), 1 ex. el 17/III (LFS), 2 ex. el 20/X (hembras/juvs); 3 ex. el 19/XI; 1-2 ex. en XII (MP), 1 ex. el 17/XII (LFS).

Y Alcotán Europeo *Falco subbuteo* Falconet

Estatus: Nidificante raro, migrante raro.

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) y Valle de Albaida (Fontaneres). 1 ex. ad. 14/IX. (MER).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. juv. el 26/IX (LSM).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex en el el 5/V (AQG).

E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex anillado el 3/V (AQG, FGO).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ad el 20/X en El Pinet (AJR).

P.N. El Fondó 1 ex. el 14/X (AJR,AQG); 1 ex. el 23/VIII (LFS).

Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 16/II (LFS).

Baix Segura Serra Escalona 1 ex. el 3/X (AQG).

Y Halcón de Eleonora *Falco eleonora* Falcó de la reina

Estatus: Visitante.

La Marina Alta Cala de Granadella (Benitatxell) 1 ex. el 28/VIII (JDL,PAL,ALH).

Y Halcón Peregrino *Falco peregrinus* Falcó pelegrí

Estatus: Residente, invernante escaso.

La Marina Alta Serra Bèrnia 1 ex. el 10/IV (TZL) y 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).

L'Alt Vinalopó Mínimo de 3 pp. nidificantes en parajes confidenciales (JAR).

Valle de los Alorines (Villena). 1 ex. el 26/II. (MER) y 1 pull. herido. 21/VIII (MER), 17/VII. 1 macho, ad. en Albarizas (JB, MER), 1 ad. el 21/IX en Valle de Albaida (MER).

Serra de la Solana hacia Villena, 1 ex. el 26/IV y el 2/VI (MER).

L'Alcoià Serra de Mariola Mín. 1 pp. 15/V (PCC).

Alcoi 1 ex. sobrevuela en círculos núcleo urbano. 23/IV y 9/V. (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja Repr. 2 pp. (PCC).

El Vinalopó Mitjà Término Mun. de Monòver 1 ex. el 22/V, con presa entre las garras; 1 ex. el 7/XII (LSM).

L'Alacantí Sant Vicent del Raspeig 2 ex. en vuelo de cortejo en paraje confidencial el 31/I (GEM).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 31/VII (OAP).

Serra de Crevillent 1 ex. el 25/IX (MJP).

P.N. El Fondó 1 ex. atacando a un avetorillo el 21/I (LFS,JLE,AQG), 1 ex. el 7/II (AQG,LFS, JCR), 1 ex. el 7/IV (LFS,JLE), 3 ex. el 7/X (LFS), 1 ex. el 2 y 15/XI (AJR); 1 ex. el 4/IX (EGM,TZL,LFS,LSM, ARF, AQG).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 28/I (SAM).

Sisión Común *Tetrax tetrax* Sisó

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 11/IX (AQG) y 4 ex. del 14/IX al 22/XI (AQG,AJR,LFS,SAM).

Avutarda Común *Otis tarda* Pioc salvatge

Sin citas en 1999.

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Ostrero Euroasiático *Haematopus ostralegus* Garsa de mar

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observación invernral de 2 ex. del 8 al 16/I (AJR,LF5,AQG) y 3 ex. el 13/I (AQG); después 1 ex. del 23/I al 5/III, con excepción de 4 ads el 28/II (AJR), 2 ex. en VII y VIII (MJP), 2 ex. el 19/VIII, 3 ex. el 25/VIII, 2 ex. el 28/VIII (AJR) y 1 ex. el 22/IX (SAM).

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ RECURVIROSTRIDAE

Cigüeñuela Común *Himantopus himantopus* Camallonga

El Comtat Embalse de Beniarriés 2 machos el 13/III, 1ª cita primaveral, 30 ex. el 7/IV, 11 ex. el 6/V, 14 ex. el 26/V, 10 ex. el 17/VI, 42 ex. el 12/VII, 59 ex. el 3/VII y 13 ex. el 19/VIII (PCC).


La Marina Baixa Embalse de Guadalest 20 ex. el 1/IV (TSR, JSR).

L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) 6 ex. el 15/IV(ALD).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 18 ex. el 10/III, costeanado; 43 ex. el 16/III y 4 ex. el 26/IV (AJR), 22 ex. el 14/V y 3 ex. el 18/V (MAP).

Avoceta común
Foto: © Toni Zaragozi

Cabo de Santa Pola 12 ex. el 8/III y 30 ex. el 16/IV (AJR).



Cigüeñuela común
Foto: © Toni Zaragoza



- La Marina Alta Salinas de Calp 5 ex. (1 pp. y 3 pull) el 18/IV y 2 ex. el 27/VI (TZL,EGM).
 L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 10 ex. el 23/I; Reprod: mín. de 4-5 pp (AJR), 11 ex. el 18/V (MAP), 2 ex. el 23/XI (LFS).
- Baix Vinalopó Dunas del Carabassí (Eix) 3 ex. el 5/II (LFS,AJR).
E.D.A.R. (Santa Pola) 12 ex. el 11/VI (LFS,AJR).
P.N. El Fondó 18 ex. el 26/II (CFS,JLE,LFS,MFS) y 36 ex. el 29/VI (CFS,JLE,LFS,MFS,ROM).
- Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM), 10 ex. el 5/III (LFS,AJR) y 36 ex. el 18/III (SAM).
Riu Segura (Guardamar) 2 ex. el 22/I en la desembocadura (SAM).



Chorlito Carambolo *Charadrius morinellus* Corriol pit-roig

Estatus: Migrante ocasional.

- Baix Vinalopó P.N. El Fondó 16 ex. el 4 y 6/IX en campos de Vistabella (3 ad. y 13 juv.) (AJR,LFS,IGC,EGM,TZL,LSM), 3-4 ex. el 14-15/IX (AJR,AQG,LFS,MAP); 6 ex. el 20 y 21/IX y última observ. de 2 ex. el 23/IX (AJR,LFS,AQG) en cultivos de Vistabella.



Chorlito carambolo
Foto: © Sergio Arroyo



Chorlito Dorado Europeo *Pluvialis apricaria* Fusell

Estatus: Migrante, invernante moderado.

- La Marina Baixa Playa de La Vila (La Vila Joiosa). 1 ex. posado sobre el espigón (TSR,JSR).
 Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 21 ex. el 22/XI en cultivos entre las salinas y El Hondo (AJR).
P.N. El Fondó 1 ad. el 4/IX con Chorlitos carambolos, en campo de cultivo, entre 9-23 ex. a lo largo de Nov. (LFS,AJR), 75 ex. el 20/XI (MJP).
- Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) de 1-3 ex. en cultivos próximos, del 17/II al 16/III (AJR,LFS).
P.N. Laguna de la Mata 100 ex. el 8/I (AJR) entre la orilla y el saladar, 70 ex. el 3/II en campos en barbecho y viña (LFS,AJR), 100 ex. el 1/III y 142 ex. el 22/XII (AJR).



Chorlito Gris *Pluvialis squatarola* Fusell de mar

Estatus: Migrante, invernante escaso.

- L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 1 ex. el 18/IX (MAP), 2 ex. el 9/XII (AJR) y el 14/XII, en la costa (EGM).
R.M. Illa de Nova Tabarca 5 ex. el 8/XII (GEM).
- Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 2 ex. el 5/XII (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 12 ex. el 6/II, 1 ex. el 19/IV, 3 ex. el 1/IX (AJR), 11 ex. el 17/XI (LFS) y máx de 22 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 1-2 ex. los días del 19 al 21/IX (LFS,AJR,AQG).
- Baix Segura Playa del Rebollo (Guardamar) 8 ex. volando hacia el N el 18/XII (AJR, EGM, ARF).
El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. del 28/I al 5/III, 1 ex. del 1-3/VI en plumaje estival (LFS,AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja) 2 ex. el 8/I y 24/XI (AJR).
P.N. Laguna de la Mata Apenas 3 ex. el 8/I, 8 ex. el 3/II (LFS,AJR), 19 ex. el 1/III, 1 ex. el 4 y 6/IX (LFS,AJR), 10 ex. el 10/X y 18 ex. el 3/XII (AJR).



Estatus: Migrante, invernante moderado.

El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 9/I; 26 ex. el 29/I y 1 ex. el 8/XI (PCC).

La Marina Alta P.N. Marjal de Pegó-Oliva 1 ex, el 28/II (JGP,JGR).

El Vinalopó Mitjà Laguna de Salinas 8 ex. el 6/XII (GEM).


Baix Vinalopó  Clot de Galvany (Eix) 45 ex. el 11/I (LFS), 20 ex. del 22-24/II y 37 ex. el 17/XI (AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 13/I (AJR,AQG), 1 ex. el 25/VIII (MJP) y 15 ex. el 8/XI (AJR).

PN. El Fondó 70 ex. en saldar el 3/I (AJR), 235 ex. el 27/I (LFS), 220 ex. el 28/II (OAP), 1ª observac postnupcial de 3 ex. el 17/IX (AJR), 58 ex. el 15/XI (LFS) y 236 ex. el 1/XII (AJR).

Baix Segura

El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 87 ex. el 9/I, 252 ex. el 22/I (AJR,LF5), máx. de 274 ex. el 28/I (SAM), 172 ex. el 167II, 175 ex. el 1/III (AJR), 50 ex. el 5/III (AJR,LF5) y 1 ex. el 22/III (AJR).

P.N. Laguna de la Mata 15 ex. el 1/III (AJR).



Territ gros

Estatus: Migrante escaso, invernante raro.

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Observación en la costa de 3 ex. el 4/V y 1 ex. el 6/V (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observac. invernall de 1 ex. el 13/I (AQG,AJR), 13 ex. el 24/IX (AJR,SAM), 1 ex. en plumaje nupcial el 3/X (MJP), 1 ex. los días 10/XI y 7/XII, 2 ex. el 28/XII (AJR).

P.N. El Fondó 2 juv. en la primera quincena de Sep. (IGC) y 1 ex. el 20/IX (MFS, SMJ).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 1 ex. el 24/XI (AJR) y el 29/XII (AJR,LFS).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 22/VIII (EGM,LFS).



Territ tres-dits

Estatus: Migrante, invernante moderado.

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) Observacs. en la costa, con máx en Ene. de 60 ex. el 28/II, 43 ex. el 18/II, 39 ex. el 16/III y 28 ex. el 19/XI (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Todavía 3 ex. el 20/V, 2 ex. el 19/VIII y 20 ex. el 15/XI en la costa (AJR).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 3 ex. el 22/I en la desembocadura (SAM).
Cabo Cervera (Torrevieja) 25 ex. el 217I, 28 ex. el 18/XI y 39 ex. el 9/XII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 70 ex. el 1/III (AJR), 1 ex. el 22/VIII (EGM),
 12 ex. el 6/IX (AJR.LF5) y 80 ex. el 10/X (AJR).



Territ minut

Estatus: Migrante, invernante moderado.

El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 19/VIII . Puntual migrante postnupcial apareciendo siempre durante el mes de Agosto (PCC).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 5 ex. el 23/I, 1 ex. en la costa el 25/I, 12 ex. el 6/IV, 53 ex. el 7/IX, 5 ex. el 26/X y 2 ex. el 12/XI en la costa (AJR), 16 el 8/IX (MAP).

- Baix Vinalopó Pantano d'Eix 2 ex. el 17/XI (OAP).
E.D.A.R. (Santa Pola) 50 ex. el 16/XI y 25 ex. el 26/XI (LFS).
Riu Vinalopó 9 ex. el 24/XI (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac postnupcial de 1 ex. el 29/VII y 14 ex. el 30/VII y al menos 36 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 26 ex. el 26/II (CFS,JLE,MFS,LFS), 96 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM), 20 ex. el 2/XI en parcela regada (AJR).
- Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 57 ex. el 5/I en campo regado, 49 ex. el 5/III (LFS,AJR), 100 ex. el 25/IV, todavía 1 ex. el 17/V, 4 ex. el 28/VIII (AJR).
Riu Segura (Guardamar) 2 ex. el 22/I en la desembocadura (SAM).
Embalse de la Pedrera 6 ex. el 29/V (AJR).

**Correlimos de Temminck** *Calidris temminckii* Territ de Temminck

Estatus: Migrante raro, invernante raro.

- Baix Vinalopó P.N. El Fondó 5 ex. el 20/IX (LFS,AQG), 2 ex. el 21/IX en campo regado (AJR,LFS,SAM), 1 ex. el 18/X (AJR).
- Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. en campo regado el 21/IX (AJR,LFS).
Riu Segura (Guardamar) Observac invernal de 1 ex. el 15/I (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 10/X en la orilla N (AJR).
Embalse de la Pedrera 1 ex. el 29/V (AJR).

**Correlimos Pectoral** *Calidris melanotos* Territ pectoral

Estatus: Divagante.

- Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 17/IX en campo regado (AJR,LFS,SAM).

**Correlimos Zarapitín** *Calidris ferruginea* Territ bec-llarg

Estatus: Migrante moderado.

- L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 8 ex. el 6/IX y 3 ex. el 7/IX (AJR), 1 ex. el 18/IX (MAP).
- Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac prenupcial de 1 ex. el 9/III, 1ª observac postnupcial de 5 ex. el 3/VII, 6 ex. el 24/VII, 683 ex. el 30/VII, 365 ex. el 25/VIII, 350 ex. el 1/IX, sólo 2 ex. el 25/X y última observac postnupcial de 1 ex. el 18/XI (AJR).
P.N. El Fondó 99 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).
- Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Observación invernal o prenupcial temprana de 3 ex. el 22/II (AJR,LFS), 3 ex. el 2/III, probablemente los mismos; 206 ex. el 25/IV, 252 ex. el 4/V, 60 ex. el 17/V, última observac. prenupcial de 1 ex. el 24/V; 1ª observac. postnupcial de 5 ex. el 12/VII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 4 ex. el 22/VIII (EGM,LFS), 25 ex. el 29/VIII (AJR), 150 ex. el 6/IX (AJR,LFS), observac. invernal de 2 ex. el 13/XII (AJR).

**Correlimos Oscuro** *Calidris maritima* Territ fosc

Estatus: Invernante ocasional.

Sin citas en 1999.

Correlimos en vuelo
Dibujo: ©Luis Segorb

- Correlimos Común** *Calidris alpina* Territ variant
Estatus: Migrante común, invernante moderado.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Máx de 52 ex. el 25/I, en la costa (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. en plumaje nupcial el 17/I (MJP), 353 ex. el 12/IV (SAM), 1ª observac postnupcial de 2 ex. el 30/VII, 221 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 228 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 10 ex. el 5/III (LFS,AJR), 3 ex. el 19/IV y de 8-10 ex. el 4/V; todavía 1 ex. el 17/V (AJR).
Desembocadura del Riu Segura (Guardamar) 6 ex. el 5/I (AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja) 3 ex. el 10/III y 20 ex. el 18/XI (AJR).

- Correlimos Falcinelo** *Limicola falcinellus* Territ becadell
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

- Combatiente** *Philomachus pugnax* Redonell
Estatus: Migrante moderado, invernante escaso.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 16/III y 1 ex. el 8/IX (AJR), 1 ex. del 8 al 21/IX (MAP).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. el 16/III, 12 ex. el 30/III (AJR), 25 ex. el 12/IV (LFS,AQG); de 1-3 ex. del 14/VIII al 3/IX (AJR).
P.N. El Fondó 20 ex. el 21/IV (LFS,JLE), 400 ex. el 26/IV en los campos de Vistabella (MJP); de 4-18 ex. en Nov., en cultivos regados (AJR,LFS,SAM), 26 ex. el 22/XI y 8 ex. el 1/XII en cultivo regado (AJR,LFS).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 5 ex. el 19/I (SAM), 9 ex. el 28/I (AJR), máx. de 88 ex. el 11/II (SAM), 13 ex. el 5/III (LFS,AJR), 24 ex. el 22/III, 28 ex. el 1/IV y todavía 1 ex. el 4/V; 1ª observac postnupcial de 1 ex. el 12/VII (AJR), 45 ex. el 15/VIII (MFS,EOT), 3 ex. en campo regado el 29/VIII (AJR), 4 ex. el 4/IX (EGM,LFS,TZL,LSM) y 1 ex. el 18/IX (EGM,LFS).
P.N. Laguna de la Mata 12 ex. el 10/X y 3 ex. el 22/X (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 3 ex. el 1/III (AJR).
Embalse de la Pedrera 5 ex. el 14/IV (LFS,AJR).

- Agachadiza Chica** *Lyminocryptes minimus* Bequet
Estatus: Invernante escaso.
La Marina Alta P. N. Marjal de Pegó-Oliva 1 ex. el 28/II (EGM).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 3/X (EGM).

- Agachadiza Común** *Gallinago gallinago* Bequeruda
Estatus: Migrante, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. del 9/I al 29/I; 2 ex. el 6/III y 4 ex. el (PCC).
La Marina Alta P.N. Marjal de Pegó-Oliva 1 ex. el 28/II (JGP,JGR).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 20/XI (TZL).
El Vinalopó Mitjà Alcaybies (Monòver) 1 ex. entre la vegetación palustre el 6/ XII (LSM).
L'Alacantí Riu Monnegre 2 ex. el 17/I y 1 ex. el 31/X (GEM).
Barranco de las Ovejas (Alacant) 2 ex. el 24/XI (GEM).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 4 ex. el 20/IX (MAP).



- Baix Vinalopó Pantano de Elix 2-3 ex. el 11/X, 4 ex. el 13/XI y 6 ex. el 17/XI (OAP).
Clot de Galvaný (Elix) 3 ex. el 9/X (AJR).
E.D.A.R. (Santa Pola) 1-2 ex. en Nov. (LFS).
- Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 4 ex. el 15/I (AJR), 18 ex. el 5/II, 24 ex. el 10/III (SAM) 26 ex. el 16/III y todavía 1 ex. el 25/IV (AJR).
Desembocadura del Riu Segura (Guardamar) 9 ex. el 5/I, 2 ex. el 5/III (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1ª observac postnupcial de 1 ex. el 29/VIII (AJR).

**Chocha Perdiz** *Scolopax rusticola*

Becada

Estatus: Invernante.

L'Alacantí Riu Monnegre 1 ex. en Nov. (GEM).Baix Vinalopó Penya de les Àguiles (Elix): 1 ex. accidentalment entregado por la Policía Local el 22/XI.Aguja colipinta
Foto: © Toni Zaragoza**Aguja Colinegra** *Limosa limosa*

Tètol cuanegre

Estatus: Migrante, invernante moderado.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 500 ex. en Ene.; 5 ex. el 13/III (RGR,PMH), observacs. estivales de 12 ex. el 28/VI y 64 ex. el 3/VII; máx. invernacional de 153 ex. el 21/XII (imuy escasa este año en Nov-Dic.!) (AJR).P.N. El Fondó 40 ex. el 28/II y 92 ex. el 29/III (CF5,JLE,LFS,ROM), 5 ex. el 11/VI (EGM,TZL,LFS).Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 155 ex. el 15/I, 228 ex. el 19/II (AJR), 414 ex. el 5/III (LFS,AJR), 300 ex. el 18/III (SAM), 102 ex. el 1/IV, 11 ex. el 17/V; 12 ex. el 24/XII (AJR).**Aguja Colipinta** *Limosa lapponica*

Tètol cuabarrat

Estatus: Migrante común, invernante escaso.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observaciones prenupciales de 1 ex. los días 25 y 30/III y el 19/IV; observacs postnupciales: 1ª observac de 2 ex. el 1/IX, 5 ex. el 10/IX, 22 ex. los días 14 y 24/IX, 4 ex. el 18/IX (MAP,AQG,MLC), 19 ex. el 4/X (AJR), 10 ex. el 9/X (MJP) y 13/X, 7 ex. el 10/XI e invernada de 7 ex. el 28/XII (AJR).P.N. El Fondó 3 ex. el 20/IX en campo regado (AJR,LFS,SAM) y 1 x. el 30/IX (AJR).Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 8/IX (AJR) y 14/IX (MJP).
P.N. Laguna de la Mata 4 ex. el 4/IX (AQG,LFS), 5 ex. el 5/IX y 13 ex. el 14/XI (MAP, AQG, MLC), 4 ex. el 6/IX (LFS,AJR), censo máximo de 60 ex. el 10/X, 43 ex. el 22/X y 4 ex. el 15/XI (AJR).**Zarapito Trinador** *Numenius phaeopus*

Siglot cantaire

Estatus: Migrador escaso, invernante raro.

La Marina Alta Cala de la Granadella (Benitatxell): 1 ex. el 28/VIII (GEM).L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 8/XII (GEM).Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elix) 1 ex. los días 2 y 23/IX, en la costa (AJR).Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 1 ex. entre el 5/II y 29/III (AJR,LFS), 1 ex. el 5/XII (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola Presencia continuada de 1 ex. del 9/I al 5/III, tanto en la costa como en Bras del Port (AJR,LFS,AQG), 1 ex. el 20/V (AJR); Durante el paso postnupcial 2 ex. el 11/VII (OAP), 5 ex. el 19/VIII (SAM), con

observac. de varios ex. de forma continuada hasta el 28/XII, 5 ex. el 22/IX, de 1-3 ex. en Oct., 2 ex. el 3 y 10/XI y 1 ex. el 28/XII (AJR).

P.N. El Fondó 2 ex. el 4 y 8/IX en campo de alfalfa (AJR,LFS,EGM,TZL,LSM), 2 ex. el 5/IX en campos de Vistabella (MAP).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 8/I (AJR), 1 ex. el 13/IX (MAP,AQG,MLC).
Cabo Cervera (Torrevieja) 3 ex. el 8/I (AJR), 1 ex. el 3/II (AJR,AQG) y 1 ex. el 24/XI y 9/XII (AJR).

Zarapito Real *Numenius arquata* Siglot becud

Estatus: Migrante, invernante escaso.

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 2 ex. el 14/I (SCG).

P.N. Salinas de Santa Pola Presencia continuada entre el 15/I y 30/III, con 3 ex. el 29/I y 19/II, y máx. de 7 ex. el 4/III (AJR) y 6/IV (SAM), 1 ex. el 3/VII y 14/VIII, 4 ex. del 28/IX al 5/X y 3 ex. el 21/X (AJR).

P.N. El Fondó 1 ex. el 3/VII en campo de cultivo, 1 ex. el 15/XI en campo de alfalfa (AJR,LFS).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 17/II en cultivos próximos, 5 ex. el 1/III (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 4 ex. el 20/I en cultivos próximos (AJR).

Archibebe Oscuro *Tringa erythropus* Xuït

Estatus: Migrante, invernante moderado.

Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. los días 16 y 26/XI (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola Invernada: 9 ex. el 16/I, 25 ex. los días 23 y 24/II. Observac. prenupciales: de 29/32 ex. en Mar., última observac. prenupcial de 5 ex. el 19/IV. Observac. postnupciales: 20 ex. el 3-VII, 3 ex. el 14-VIII (AJR), 22 ex. el 10-IX (AJR,MAP), 25 ex. el 8/XI y máx. invernante de 14 ex. el 28/XII (AJR).

P.N. El Fondó 2 ex. el 29/III y 13 ex. el 29/IV (LFS,CF5,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 4 ex. el 19/I (SAM), 25 ex. el 9/III, entre 78-81 ex. del 22 al 30/III, 59 ex. el 1/IV, 28 ex. del 19 al 25/IV, 3 ex. el 4/V (AJR); 7 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ).

Riu Segura (Guardamar) 1 ex. el 22/I (SAM).

P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 14/IX (MAP).

Archibebe Común *Tringa totanus* Tifort

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso, nidificante ocasional.

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 40 ex. el 4/V (AJR), 21 ex. el 14/V (MAP).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 15 ex. el 16/I, 51 ex. el 23 y 24/II, 6 ex. el 19/IV, 4 ex. el 3/VII, 5 ex. el 14/VIII (AJR), 8 ex. el 10/IX (AJR,MAP), 54 ex. el 18/X, 19 ex. el 13/XI y 38 ex. el 28/XII (AJR).

P.N. El Fondó 12 ex. el 26/II, 31 ex. el 29/III y 40 ex. el 29/IV (CF5,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 5/III (LFS,AJR), 6 ex. el 16/III, 3 ex. el 25/IV, 4 ex. el 4/V, 2 ex. el 24/V y 1 ex. del 3 al 12/VII (AJR).

P.N. Laguna de la Mata 14 ex. el 8/I, 7 ex. el 29/VIII, 85 ex. el 10/X, 35 ex. el 13/XII y 47 ex. el 22/XII (AJR).

P.N. Salinas de Torrevieja 5 ex. el 1/III (AJR).

Embalse de la Pedrera 1 ex. el 23/IV (AJR).



Archibebe Fino *Tringa stagnatilis* Siseta

Estatus: Migrante raro, invernante raro.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 10 y 16/III, 5 ex. el 5/IV y 3 ex. el 4/V (SAM), 2 ex el 29/VIII (AQG) y 1 ex. el 10/IX (AJR), 2 ex. el 11/IX (IGC), 1 ex. el 13/IX (IGC), 4 ex. 18/IX (AQG,MAP,MLC), 6 ex. los días 24 y 27/IX, 5 ex. del 28-30/IX (AJR), 5 ex. el 1/X (MJP) y 1 ex. del 5 al 6/X (AJR).

Baix Segura P.N. El Fondó 1 ex. el 17/IX en cultivo regado (AJR) y 1 ex. el 20/IX (LFS).
El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 3/VII (AJR).

P.N. Laguna de la Mata Observac. invernacional de 1 ex. el 8/I y los días 13 y 17/II (AJR), 1 ex. el 14/XI (MAP).

Archibebe Claro *Tringa nebularia* Picarot

Estatus: Migrante, invernante escaso.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex el 20/IV observado en la cola del embalse (PCC).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 3 ex. el 4/V y 1 ex. el 17/XI (AJR).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 29/IV (AJR) y el 17/XI (AJR,SCG).

E.D.A.R. (Santa Pola) 2 ex. el 22/V (AQG).

P.N. Salinas de Santa Pola Máx. invernacional de 17 ex. el 22/I (AJR,LFS,AQG), 21 ex. los días 6 y 8/II, 6 ex. el 30/III, 2 ex. el 19/IV (AJR), 2 ex. el 20/VI (OAP,JAP), 1 ex. el 29/VII, 2 ex. el 14/VIII, 10 ex. el 23/IX, 11 ex. el 15/X, 19 ex. el 11/XI y 9 ex. el 24/XII (AJR).

P.N. El Fondó 1 ex. el 29/III (LFS,JLE,MFS,CF5) y los días 17 y 20/IX (AJR,LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. los días 1 y 16/III, 2 ex. el 22/III y 1/IV, 1 ex. el 25/IV y 4/V, 1 ex. el 3/VII y 2 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ).

P.N. Laguna de la Mata 3 ex. en orilla N el 3/IX (MAP,AQG,MLC).

Archibebe Patigualdo Chico *Tringa flavipes* tifort groc petit

Estatus: Divagante.

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 20/IX (LFS).

Andarríos Grande *Tringa ochropus* Xerlovita

Estatus: Migrante, invernante escaso.

El Comtat Embalse de Beniarrés:

D/ Mes	9/I	29/I	6/III	16/III	23/III	7/IV	6/V	26/VI	17/VI	12/VII	3/VIII	19/VIII
Ex.	1	3	5	1					1	4		3
 (PCC) 												

El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 2 ex. el 12/IV, junto al Riu Vinalopó. (LSM) .

L'Alacantí Riu Monnegre 1 ex. el 17/I, máx. de 3 ex. el 28/VII (GEM).

Saladar de Fontcalent (Alacant) 1 ex. el 30/XI (GEM).

Hondos de Rabasa (Alacant) 2 ex. el 19/III y 3 ex. el 8/IX (GEM).

Barranco de Las Ovejas (Alacant) 5 ex. el 24/XI (GEM).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 13/I y el 12/XI (AJR), 5 ex. el 20/IX (MAP).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

Clot de Galvany (Elx) 6 ex. el 7/IX junto a la EDAR de Arenales (AJR).

E.D.A.R. (Santa Pola) 4 ex. el 28/VI en barranco con vertido de aguas residuales (AJR).

Riu Vinalopó (Elix) 1 ex. el 8/VIII (MJP).

P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 28/I (MAP), 1 ex. el 30/VII, 3 ex. el 25/VIII y 2 ex. el 30/X (AJR).

P.N. El Fondó 1 ex. el 5/I, 2 ex. el 29/II (AJR), 2 ex. el 21/X (LF5, AJR) y 3 ex. el 1/XII (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 3 ex. el 19/I (SAM), 3 ex. el 12/VII y 1 ex. el 17/XII (AJR).

Andarríos Bastardo *Tringa glareola* Xerlovita camagroga

Estatus: Migrante moderado, invernante raro.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).

L'Alcantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elix) 1 ex. el 14/V (MAP).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/I (AJR, AQG) y 1 ex. el 28/IX (AJR).

P.N. El Fondó 1ª observac. prenupcial de 1 ex. el 1/IV, 2 ex. el 27/IV, 1 ex. el 25/VIII, 30 ex. el 20/IX en campos regados (AJR, LF5), 10 ex. el 22/XI y 4 ex. el 1/XII en campo regado (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2-3 ex. entre el 5/I y 9/I (LF5, AJR), 5 ex. el 29/VIII y 3 ex. el 8/IX (AJR).

Andarríos del Terek *Xenus cinereus* Siseta cendrosa

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.



Andarríos chico
Foto: © Toni Zaragoza

Andarríos Chico *Actitis hypoleucos* Siseta de pit blanc

Estatus: Residente (no reproductor), migrante invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 5 ex. el 9/I, 2 ex. el 29/I, 5 ex. el 6/III, 1 ex. el 23/III, 1 ex. el 7/IV, 3 ex. el 6/V, 4 ex. el 12/VII, 20 ex. el 3/VIII, 20 ex. el 19/VIII (PCC).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 13/II (TZL).

L'Alcantí Riu Monnegre 2 ex. el 28/VII (GEM).

Saladar de Fontcalent (Alacant) 3 ex. el 21/IX en balsa de riego (GEM).

Barranco de las Ovejas (Alacant) 2 ex. el 19/III (GEM).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elix) 4 ex. el 4/V y 1 ex. el 6/V (AJR), 1 ex. el 18/V y 21/V (MAP).

Baix Vinalopó Pantano de Elix 1 ex. el 1/XI (OAP).

Clot de Galvany (Elix) 1 ex. el 6/V (AJR) y el 23/XII (AJR, MAP) junto a la EDAR de Arenales.

E.D.A.R. (Santa Pola) 4 ex. el 26/XI (LF5).

P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 26/I, 1/2 ex. entre el 22/II y el 19/V, 2 ex. el 14/VIII, 4 ex. el 25/VIII, 1/IX y 4/X, 2 ex. el 4/XI (AJR), 1 ex. el 28/XI (OAP), 1 ex. el 7/XII (AJR) y 27/XII (OAP).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 9 ex. el 19/VIII (AJR, BDJ).

Vuelvepiedras Común *Arenaria interpres* Remena-rocs

Estatus: Migrante, invernante escaso.

L'Alcantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elix) Observacs. en la costa: 20 ex. los días 26 y 28/I, 18 ex. el 16/III y 3 ex. el 6/V; 7 ex. el 2/IX, 16 ex. el 14/IX y 11 ex. el 29/XII (AJR).



- Baix Vinalopó R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 8/XII (GEM).
E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 16/XI (LFS).
Cabo de Santa Pola 4 ex. el 5/II (LFS,AJR) y 8 ex. el 5/XII (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 29 ex. el 8 y 13/I (AJR,MP), 36 ex. el 12/II, 2 ex. el 25/IV, 1ª observac. postnupcial de 1 ex. el 3/VII, 2 ex. el 30/VII, 18 ex. el 22/IX, 21 ex. el 4/X y 13 ex. el 28/XII (AJR).
- Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 1 ex. en la desembocadura el 22/I (SAM).
Salinas de La Mata 3 ex. el 6/IX (AJR,LFS) y 9 ex. el 22/X (AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja) 21 ex. el 21/I y 17 ex. el 9/XII (AJR).

 **Falaropo de Wilson** *Phalaropus tricolor* Escuraflascons de Wilson
 Estatus: Divagante.
 Sin citas en 1999.

 **Falaropo Picofino** *Phalaropus lobatus* Escuraflascons bec-fi
 Estatus: Migrante raro.
 Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 1 juv. el 19/VIII (BDJ,AJR), el 20/VIII (LFS) y 21/VIII (LFS,AQG).

 **Falaropo Picogrosso** *Phalaropus fulicarius* Escuraflascons bec-gros
 Estatus: Migrante, invernante ocasional.
 Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 13/I (AQG, AJR).

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ **STERCORARIIDAE**

 **Págalo Parásito** *Stercorarius parasiticus* Paràsit cuapunxegut
 Estatus: Migrante, invernante escaso.
 Baix Vinalopó Santa Pola 3 ex. en el puerto de la localidad, el 26/XI (LFS,EGM).

 **Págalo Grande** *Stercorarius skua* Paràsit gros
 Estatus: Migrante, invernante raro.
 Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) Playa del Carabassí 1 ex. el 7/II (AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. en El Pinet el 31/I y 28/II (AJR).

✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ **LARIDAE**

 **Gaviota Cabecinegra** *Larus melanocephalus* Gavina capnegra
 Estatus: Migrante, invernante escaso, nidificante ocasional.
 La Marina Alta Dénia 1 ex. de 1º inv el 31/XII en el puerto (AJR).
 L'Alacantí Alacant 1 ad. el 6 y 27/II, en la costa (AJR).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 2 ad. el 23 y 31/I, en Mar. máx. de 6 ex. (4 ad.) el 12/III, 3 (2 ads) el 3/IV (AJR); 2-3 ads el 8/IX (AJR, MAP) y 21/X, 34 ex. (18 ad.) el 12/XI, y 1 ex. de 1º inv. 28/XII (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ad. el 9/I (AJR,LFS), 4 ex. (2 ad.) el 16 y 28/II, 2 ad. el 16 y 18/III (AJR), 1 ex. el 18/IV (OAP), 7 ex. el 26/IV; 1ª observac. postnupcial de 11 ex. (3 ad.) el 3/VII. A partir de aquí presencia continuada, con cifras máximas de 19 ex. el 30/VII, 43 ex. el 14/VIII, 25 ex. el 16/IX, 20 ex. el 4/X, 18 ex. el 7/X (1 ex. de 2º inv. anillado en Holanda), 7 ex. (1 ad.)

el 11/XI, 2 ex. los días 19 y 20/XI (AJR).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 3 ex. de 1º ver. el 3/VII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 2 ex. (1 ad.) el 19 y 29/VIII (AJR,BDJ), 1 ex. en
sector N el 3/IX (MAP,AQG,MLC) y 1 ex. de 1º inv. el 22/X (AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja) 1 ex. el 3/II (AJR,LFS), 10/III y 3 ex. (1 ad.)
tras barca de pesca, el 22/XII (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ad. el 1/III y 3 ex. de 1º ver. el 10/III (AJR).

 **Gaviota de Franklin** *Larus pipixcan* Gavina de Franklin
Estatus: Divagante.
Baix Vinalopó Playa del Pinet 1 ex. de 2º invierno el 19/IX (IGC).

 **Gaviota Guanaguana** *Larus atricilla* Gavina capnegra americana
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

 **Gaviota Enana** *Larus minutus* Gavina menuda
Estatus: Migrante escaso, invernante regular.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 1 ex. de 1º inv. el 23/I (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 9/III (AJR).

 **Gaviota de Sabine** *Larus sabini* Gavina de Sabine
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

 **Gaviota Reidora** *Larus ridibundus* Gavina vulgar
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante abundante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex el 6/III; 1 ex. ad. el 12/VII (PCC).
La Marina Alta P.N. Penyal d'Irac 13 ex. el 14/III y 9 ex. el 27/VI (RGR,PMN).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) de 300-400 ex. el 12/XI (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Reprod: Al menos 302 pp. el 20/V (AJR).
P.N. el Fondó 5.951 ex. el 29/I (MFS, JLE, LFS), 3.163 ex. el 26/II y 1.563 ex. el 29/III (LFS,JLE,LFS,CF5).
Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 138 ex. el 22/I (LFS,AJR) y 169 ex. el 5/III (AJR).



Gaviota reidora
Dibujo: ©Luis Segorb

 **Gaviota Picofina** *Larus genei* Gavina capblanca
Estatus: Residente, nidificante moderado.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 39 ex. el 9/I (AJR,LFS), 60 ex. el 18/II, 174 ex. el 9/III, 60 ex. el 19/IV (AJR). Reprod: 170 pp. el 20/V (AJR,AQG), +200 ex. el 3/VII, 300 ex. al menos el 28/VIII (AJR), 234 ex. el 10/IX (AJR,MAP), de 200-300 ex. a lo largo de Oct., 400 ex. el 3/XI, 114 ex. el 7/XII. A partir de aquí cae en picado el nº de picofinas, por desplazamiento masivo hasta las salinas de La Mata; 26 ex. el 21/XII (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 26/V (CF5,JLE,LFS,MFS).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ad. el 3/VI y 2/IX (AJR).
P.N. Laguna de La Mata 257 ex. entre el 8 y 21/I (AJR), 210 ex. el 3/II (AJR,LFS) y 130 ex. el 27/II (MJP), 206 ex. el 1/III; entre 1-3 ex. entre el 19/VIII



y el 10/X (LF5,AJR); 300 ex. el 12/XII, debido al desplazamiento de las gaviotas que habían permanecido en las salinas de Santa Pola, 276 ex. el 22/XII (AJR).



Gaviota de Audouin *Larus audouinii* Gavina corsa

Estatus: Migrante, invernante común.

La Marina Alta Salinas de Calp 12 ex. el 28/II (EGM); 2 ex. el 9/V (TZL, EGM).

P.N. Penyal d'Illac 2 ex. el 27/VI (RGR,PMN).

La Marina Baixa Playa de La Vila (La Vila Joiosa) Máximo de 120 ex. el 5/III (TSR, JSR).

Cala del Xarco (La Vila Joiosa) 67 ad. en la, descansando, el 7/III (AJR).

L'Alacantí Bco. de Las Ovejas (Alacant) 1ª observac. de 1 pollo del año el 23/VII (AJR).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 14 ex. el 31/I, 135 ex. el 5/II (AJR,MAP), 143 ex. el 9/III, 10 ex. el 26/IV, 46 ex. el 3/V, 5 ex. el 25/V, 29 ex. el 6/IX, 99 ex. el 14/IX, 111 ex. el 21/X, 42 ex. el 12/XI y 2-3 ex. en la costa en Dic. (AJR), 92 ex. el 8/IX (MAP).

R.M. de Illa de Nova Tabarca 7 ex. el 8/XII (GEM).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 11 ex. el 31/I, 109 ex. el 28/II, 57 ex. el 9/III, 255 ex. el 28/VI, 239 ex. el 29/VII, 200 ex. el 19/VIII, 100 ex. el 8/X, 69 ex. el 4/XI y 35 ex. el 5/XII (AJR).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 11 ex. el 8/I, 35 ex. el 10/II y 22 ex. el 10/III (AJR). P. N. Laguna de La Mata 60 ex. el 3/II (AJR,LF5), 91 ex. el 17/II, 11 ex. el 1/III (AJR), 30 ex. el 6/IX (LF5,AJR) y 12 ex. el 22/X (AJR).

P. N. Salinas de Torrevieja 281 ex. el 10/III (AJR).



Gaviota Cana *Larus canus* Gavina cendrosa

Estatus: Migrante, invernante raro.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. de 2º inv. el 22 y 23/I (AJR), 1 ex. ad. o 2º inv. del 26-28/II (AJR,LF5), 1 ex. el 4/III (MJP).



Gaviota Sombria *Larus fuscus* Gavinot fosc

Estatus: Migrante, invernante moderado.

La Marina Baixa La Vila Joiosa Máximo de 20 ex. el 22/I (TSR, JSR).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 3-4 ex. el 10 y 16/III (AJR), 1 ex. el 8/IX y 3 ex. el 10/IX (MAP).

R.M. de Illa de Nova Tabarca 2 ex. el 8/XII (GEM).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 170 ex. el 16/I, 151 ex. el 26/II, 19 ex. el 9/III, 1 ad. el 24 y 30/VII (AJR), 1 el 29/VIII (LF5), 2 ad. el 7/IX, 8 ex. el 22/IX, 20 ex. el 20/X y 24 ex. el 1/XII (AJR).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 3 ex. el 22/I (SAM).

Cabo Cervera (Torrevieja) 23 ex. el 20/I, 40 ex. el 3/II y 54 ex. el 10/III (AJR).

P. N. Salinas de Torrevieja 264 ex. el 20/I y 216 ex. el 10/III (AJR).



Gaviota Patiamarilla *Larus cachinnans* Gavinot argentat mediterrani

Estatus: Residente, nidificante escaso, invernante abundante.

La Marina Alta P.N. Penyal d'Illac 2 ex. el 14/III (RGR,PMN).

La Marina Baixa Embalse de Amadoiro 8 ex. el 10/IV (RGR,PMN).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Reprod: Al menos 66 pp. a mediados de mayo (AJR).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 49 ex. el 22/I (SAM).



los días 19 y 25/VIII (AJR,BDJ), 125 ex. el 16/IX (AJR), 92 ex. el 22/IX (SAM), 60 ex. el 21/X, 14 ex. el 24/XI y 23 ex. el 3/XII (AJR).
 Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 32 ex. en la desembocadura el 22/I (SAM).
Cabo Cervera (Torrevieja) 7 ex. el 8/I (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 11 ex. el 1/III, 4 ex. el 10/III y 32 ex. el 22/XII (AJR).

 **Charrán Común** *Sterna hirundo* Xatrac d'albufera
 Estatus: Nidificante moderado, migrante común.
 L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 4 ex. el 22/III en la costa y 6 ex. el 10/V (AJR).
 Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac. prenupcial de 15 ex. el 16/III (AJR), 126 ex. el 25/III. Reprod. de al menos 226 pp; 62 ex. el 1/IX, 4 ex. el 24/IX, última observac. de 1 ex. juv. el 17/XI (AJR).
P.N. El Fondó 3 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).

 **Charrán Ártico** *Sterna paradisea* Xatrac àrtic
 Estatus: Divagante.
 Sin citas en 1999.

 **Charrancito Común** *Sterna albifrons* Mongeta
 Estatus: Nidificante moderado, migrante.
 L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 35 ex. en la costa el 27/IV, 44 ex. el 4/V, 55 ex. el 18/V en la costa (AJR), 24 ex. (algunos ex. en cortejo) el 14/V (MAP).
 Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observación prenupcial de 5 ex. el 1/IV (MJP), Reprod: +95 pp, 19 ex. el 24/IX, Observacs. invernales de 1 ex. el 27/XI y 11/XII (AJR,LFS) y 1 ex. de 1º invierno los días 26 y 28/XII (OAP).
P.N. El Fondó 113 ex. el 26/V (CFS,JLE,LFS,MFS).
 Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Reprod: 27 pp (AJR).

 **Fumarel Cariblanco** *Chlidonias hybridus* Fumarell de galta blanca
 Estatus: Nidificante moderado, invernante raro.
 Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observac. invernal de 1 ex. el 22/II pescando en la desembocadura del Riu Vinalopó (AJR); 1ª observac. prenupcial de 3 ex. el 6/IV (OAP), 1 ex. todavía el 3/X (EGM).
P.N. El Fondó 414 ex. el 29/III, 2.442 ex. el 26/V (CFS,JLE,LFS,MFS).
 Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Observacs. invernales de 1 ex. del 19-28/I (SAM,AJR), 3 ex. el 9/IV (OAP, JAG), +450 ex. el 17/IV (SAM), 311 ex. el 4/V, 1ª observac. de juv. volanderos el 12/VII, de 20-30 ex. el 2/IX, 1 ex. todavía el 18/X (AJR).
Embalse de la Pedrera 5 ex. en paso el 14/IV (AJR,LFS).

 **Fumarel Común** *Chlidonias niger* Fumarell negret
 Estatus: Migrante moderado.
 Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac. postnupcial de 2 ex. el 29/VII, 10 ex. el 25/VIII, 5 ex. los días 22 y 28/IX (AJR).
P.N. El Fondó 4 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM), importante concentración de estas aves el 14/IX en el embalse de Poniente (AJR,LFS,MFS).
 Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 6 ex. el 29/VIII (AJR), 35 ex. el

Embalse de la Pedrera 3 ex. el 14/IV (AJR,LFS).


Salinas de La Mata 1 juv. el 6/IX, con fumareles comunes (AJR, LFS).



Sin citas en 1999.

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 9 ex. el 18/XI; de 1-4 ex. entre el 24/XI y 22/XII (AJR).

Sin citas en 1999.



[Decorative flourish]

 Ganga Ortega *Pterocles orientalis* Xurra

Estatus: invernante raro.

L'Alt Vinalopó Villena 2 ex. el 4/XI y 1 ex. el 10/XII (JAR).

f f f f f f f f f f f f f f f f

✈ **Paloma Bravía** *Columba livia* Colom roquer

Estatus: Residente.

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. en el Palmeral el 8/VI (LFS,AQG,EH).

Paloma Zurita *Columba oenas* Xexella

Estatus: Residente

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). Una pareja con nido, el 4/V; otras 2 parejas y un pull.. 15/VII (MER).

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 2 ex. los días 20 y 21/X, en cultivos de la zona sur (AJR). Especie sumamente escasa en la zona!

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 7/X en labrantío adyacente (AJR).

 Paloma Torcaz *Columba palumbus* Tudó

Estatus: Residente, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex el 26/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola 2 ex. el 25/V (PCC).

Embalse de Tibi 1 ex. el 30/V (RGR,PMN).


El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) Pequeños bandos cruzan la zona a primera hora de la mañana el 21/VIII (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 3 ex. en la depuradora el 26/III (AJR,LFS).

P.N. El Fondó Pequeños bandos posados en los eucaliptos el 18/VIII (TZL, GLI).

Serra del Molar (La Marina-Eix) 1ex. el 19/IV (LFS,JFS).

Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 1ex. el 14/IV (AJR,LFS).



➔ **Tórtola Turca** *Streptopelia decaocto* Tórtora turca

Estatus: Residente.

El Comtat Alcocer de Planes 1 ex. el 11/V (PCC).

L'Alt Vinalopó Villena Común durante todo el año en la periferia del núcleo urbano (JAR).

El Vinalopó Mitjà Monòver 1 pp en pinada de El Chinorlet el 18/VIII y 13/IX (AJR).

Baix Segura P.N.Salinas de la Mata 2 ex. pasan volando el 15/XI, por la zona Oeste (AJR).

P.N.Salinas de Torrevieja 20 ex. el 1/III en el cementerio y cercanías (---).

 Tórtola Europea *Streptopelia turtur* Tórtora

Estatus: Nidificante, migrante.

El Comtat Planes de la Baronía 1 ex. el 28/V en paraie del Barranc de L'Encantada (PCC).

Benimassot 1 ex. el 28/V (PCC).

Margarida 1 ex. el 30/VI (PCC).

La Marina Baixa Sirventsa (Sella) 3 ex. el 30/V (LFS).

Estatus: Escapado de cautividad, nidificante?
Sincitas de interés.



Estatus: Escapado de cautividad.
Baix Vinalopó Elx 1 ex. el 10/X (LFS).



Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas de interés en 1999.

Estatus: Escapado de cautividad.
Baix Vinalopó P.N. El Fondo 1 ex. encontrado muerto en el embalse de Poniente el 28/IX (LFS).

Estatus: Escapado de cautividad, nidificante ocasional.

L'Alt Vinalopó Camp de Mirra 14 ex. el 8/X (JAR).

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 2 ex. (ad y juv) el 26/VIII (JLE, MFS); 2 ex. el 18/IX (MJP).
Dunes d'Elx 5 ex. el 28/IX (LFS)

Estatus: Escapado de cautividad, nidificante ocasional.

La Marina Baixa Altea 1 ex. en vuelo el 23/VI en la Partida Garganes (TSR, JSR).

L'Alacantí Alacant 11 ex. el 29/XII en el santuario de la Santa Faz (MFS, PMM).

El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 2 ex. el 12/IV (LSM)

Estatus: Escapado de cautividad.

Baix Vinalopó Serra del Molar (La Marina-Elx) 2 ex. cerca de la iglesia del Molar el 09/VI (LF5).



Estatus: Nidificante.

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) 1 pp. el 13/IV, 1 pull. El 18/VI (MER), 3 pull. volantones en nido de Pica Pica el 3/VII (MER, JZE).

Serra de la Solana 1 ad. el 23/V (MER).

Serra del Morrón 1 ad., 1 pp. y 1 pull. El 13/VI (MER).

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 2 ex. el 16/II (PNH), 1 ex. el 24/V (LFS).

Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 15/II (LFS).

C).

Guca camu
Dibuja. © Luis

Cuco común
Dibujo: ©Luis Sogorb

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 3 ex. el 20/IV (LFS,JLE).



✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Lechuza común
Foto: © Toni Zaragoza

Búho real
Foto: © Toni Z

Búho real
Foto: © Toni Zaragoza

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1ex. 21/IV; 1 ex. (diferente al anterior) el 3/VI(BEC, MER).

	Búho Campestre <i>Asio flammeus</i>	Mussol marí
Estatus: Invernante.		
Baix Vinalopó	<u>P.N. El Fondó</u> 1 ex. el 14/II (CFS,MFS).	
La Marina Baixa	Isla de Benidorm 1 ex. descansando durante el día en pequeño arbusto (AIR,JIR).	

 Chotacabras Europeo *Caprimulgus europaeus* Saboc

 Chotacabras Cuellirrojo *Caprimulqus ruficollis* Saboc coll-roig

 Vencejo Común *Apus apus* Falcia

 **Vencejo Pàlido** *Apus pallidus* Falcia pàl·lida

Estatus: Nidificante, migrante.

L'Alcoià	<u>Alcoi</u> 2 ex. el 3/V capturados en el interior de una vivienda (PCC).
La Maina Baixa	<u>Isla de Benidorm</u> Presencia de varias aves sin contabilizar cantidad el 23/V (EGM).
Baix Vinalopó	<u>Faro de Santa Pola</u> 1 ex. el 1/X (MJP). <u>P.N. El Fondó</u> 1 ex. el 27/II (MJP).



 Vencejo Real *Apus melba*

Apus melba

Falcia de panxa blanca

Estatus: Nidificante, migrante.

L'Alt Vinalopó Serra de la Solana (Villena) 2 ex. 25/IV (MER).

Biar 4 ex. el 8/VII (JAR).

El Comtat Embalse de Beniarrés 5 ex. el 19/VIII (PCC).

La Marina Alta Vall d'Alcalà (Alcalà de la Jovada) 3 ex. el 30/VI (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V (PCC).

La Marina Baixa Sirvent (Sella) 7 ex. el 30/V (LFS).

El Vinalopó Mitjà Peña La Zafra (Monòver) Colonia de cría. Observados de 12-15 ex. el 22/V (LSM).

Serra del Coto (Monòver) 1 ex. junto a golondrinas comunes y vencejos comunes el 12/IX (LSM).

L'Alacantí El Campello ex. sin determinar núm. el 23/III dentro del núcleo urbano (ALD).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 5 ex. el 26/III (AJR,LFS), 30 ex. el 21/IX (LFS,AJR).

Pantano d'Eix Abundante el 31/VI y el 3/VIII (OAP); 1 ex. el 18/VIII (AQG).

P.N. Salinas de Santa Pola 1ª cita de 1 ex. el 28/III (OAP).

P.N. El Fondó varios ex. el 14/IX (AQG, LFS, IGC).



Vencejo real
Dibuja: © Luis Segorb

ALCEDINIDAE

W **Martín Pescador** *Alcedo atthis* Blauet

Alcedo atthis

Blauet

Estatus: Nidificante, migrante, invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 29/I (PCC); 1 ex. el 4/X (JTR).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 27/XII (TZL).

El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 1 ex. cerca del Riu Vinalopó el 6/XII (LSM).

Baix Vinalopó P.N. Fondó 1 ex. el 6/III (RGR,PMN), 1 ex. el 27/IV (LFS), 1 ex. el 30/VII (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 30/VII (LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM).

MEROPIDAE

Abejaruco Común *Merops apiaster* Abellerol

n *Merops apiaster*

Abellerol

Estatus: Nidificante, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 34 ex. el 6/V (PCC).

L'Alt Vinalopó Biar 2 ex. el 10/IV. 1ª cita primaveral (JAR).

El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 20-25 ex. en vuelo, el 17/IV; 30-40 ex. el 11/IX. (LSM).

Serra del Coto (Monòver) 10-15 ex. el 29/VIII. Cruzan la zona durante toda la mañana (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 16/IX (LFS).

Pantano d'Eix 5 ex. el 12/IV(LFS,AQG)28 ex. el 14/VII, última cita otoñal de 1 ex. el 4/X (OAP).

Dunes d'Elx 5 ex. el 3/IV (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1ª cita prenupcial de 5 ex. el 2/IV, 1 ej el 5/VI y 18 ex. el 12/IX (OAP).

Elx 11 ex. el 18/IX, volando alto sobre el Parque municipal (OAP).

P.N. El Fondó Pequeños bandos posados en los eucaliptos el 18/VIII (TZL, GLI).

Baix Segura Villamartín (Orihuela) 20 ex. el 31/III (JA).

	Carraca <i>Coracias garrulus</i>	Cavaller
---	---	----------

Estatus: Nidificante.

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) 1 ad. del 22 al 25/IV (MER)

Baix Vinalopó Elx 1 ex. en cultivos el 4/VI (SAM, LFS).

P.N.El Fondó Número de aves sin determinar el 11/6 (MJP); 1 ex. en vuelo sobre el P.N. el 18/V (AIR).

Abubilla *Upupa epops* Puput

Estatus: Residente, invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex 9/I; 4 el 29/I;
2 ex. el 6/V; 12 ex. el 12/VII y 6 ex. el
8/XI (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. el 15/V y 3 ex. el 25/V (PCC).

Baix Vinalopó Cultivos de La Marina (Eix) Reprod. 1 ad. acude a cebar 1 pull. asomado en el nido, próximo a volar, el 5/XII. ien uno de los inviernos más largos y rigurosos que hemos conocido en las últimas décadas!(AJR).

Elx 7 ex. el cultivos el 28/X (LFS,SAM).



✂ ✂

Torcecuello *Jynx torquilla* Formiquer

Estatus: Nidificante, migrante, invernante.

L'Alt Vinalopó Serra de la Solana (Villena, Campo de Mirra). 1 ad. 25/IV (JZE, MER)
y 1 ad. 17/V(MER).

Biar 1 ex. el 2/VI (JAR).

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 23/III. 1ª cita primaveral; 2 ex. el 7/IV (PCC).

Muro 1 ex. el 11/V (PCC).

Benimassot 1 ex. el 28/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 15/V y 3 ex. el 25/V (PCC).

Alcoi 1 ex. cantando en parque urbano el 28/III. 1ª cita primaveral (PCC).

Baix Vinalopó Eix 2 ex. en cultivos el 28/X (LF5,SAM).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/IX (OAP); 1 ex. el 29/IX, posado en árbol seco. (AJR).

P.N. El Fondó Reprod. en palmeral adyacente al Fondó

(SAM, LFS, AJR); nidificación comprobada en palmeral cercano a El Hondo: encontrado 1 pull. muerto con plumón el 7/VI (AQG); 1 ex. el 21/X en cultivos adyacentes de la zona sur; 1 ex., probablemente el mismo de la cita anterior, atropellado el 30/XI en cultivos adyacentes de la zona sur; 1 ex. el 13/II (MJP); 1 ex. el 25/XI (LFS).

Baix Segura Desembocadura del Riu Segura 1 ex. el 5/I posado en cable de la



conducción eléctrica, sobre el río (AJR).

P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 8/I, en la zona noreste (AJR).

W Pito Real *Picus viridis* Picot

Estatus: Residente.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola 3 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex el 13/V (PCC).

L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) ex. sin determinar núm. el 25/III.
Reproducción probable (ALD).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1-2 pp residentes (AJR); 3 parejas el 21/III
(GBP,OTL,LFS).

Cabo de Santa Pola 1 ex. oído el 2/VII (AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 15/I, en zona Oeste; 1 ex.. el
12/VIII y 28/VIII, en zona Oeste (AJR).

Serra del Molar (La Marina-Elx) 2 ex. el 19/II (LFS).

Baix Segura Embalse de la Pedrera 5 ex. el 14/IV (AJR,LFS) 4 ads. vuelan juntos
del suelo, el 29/V (AJR).

W Pico Picapinos *Dendrocopos majoricus* Picot garser gros

Estatus: Residente escaso.

Sin citas en 1999.



Pito real
Foto: © Toni Zaragoza

ALAUDIDAE

- ✖ **Alondra de Dupont** *Chersophilus duponti* Alosa de Dupont
Estatus: Visitante.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) 1 ex ad. 15/VII (MER).
- ✖ **Calandria** *Melanocorypha calandria* Calàndria
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó Villena Varios ex. observados en el mes de diciembre (JAR).
Baix Segura P.N. Salinas de Torrevejea 1 pp el 23/III y 1 ex. el 14/IV (LFS, AJR).
- ✖ **Terrera Común** *Calandrella brachydactyla* Terrerola
Estatus: Nidificante.
L'Alt Vinalopó La Encina (Villena). 1 pp. construyendo nido. 8/V (MER).
Baix Vinalopó P.N. El Fondó Bando de 12 ex. en campos de Vistabella el 5/IX (MAP).
- ✖ **Terrera Marismeña** *Calandrella rufescens* Terrerola rogenca
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó Laguna de Salinas Varios ex. en época de reproducción (JAR).
Baix Segura Cabo Cervera (Torrevejea) 2 ex. el 24/XI, próximas al mar (AJR).
P.N. Salinas de Torrevejea 5 ex. el 23/III (AJR, LFS).
- ✖ **Cogujada Común** *Galerida cristata* Cogullada vulgar
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 4 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 4 ex el 13/V (PCC).
- ✖ **Cogujada Montesina** *Galerida theklae* Cogullada fosca
Estatus: Residente.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. el 25/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà La Solana (Monòver) 1 ex. cantando posado en la rama más alta de un matorral, 15/V (LSM).
- ✖ **Totovía** *Lullula arborea* Cotolius
Estatus: Nidificante, invernante.
L'Alt Vinalopó Biar Abundante y nidificante en pinares aclarados (JAR).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).
P.N. Carrascar de la Font Roja 8 ex el 13/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 3 ex. cantando en vuelo el 24/X (LSM).
- ✖ **Alondra Común** *Alauda arvensis* Alosa
Estatus: Nidificante, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Èix) Bando de 20-30 ex. en Torre Brisó, el 3/II (AJR).
P.N. El Fondó 200-300 ex. el 19/XI, en cultivos de la zona sur (AJR).



Cogujada común
Foto: © Toni Zaragoza

f f f f f f f f f f f f f f f f

✖ **Avión Zapador** *Riparia riparia* Parpalló

Estatus: Nidificante, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 8 ex. el 6/V; 30 ex. el 17/VI (PCC).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. acompanya a un bandó de Golondrina comú. 12/IX (LSM).

L'Alacantí El Campello colonia de 20 ex. aprox. el 23/III dentro del núcleo urbano.
Peligro de desaparición a causa de la urbanización del terreno (ALD).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 1 ex. el 26/III (AJR,LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 4 ex. el13/III (SAM).

x **Avión Roquero** *Ptyonoprogne rupestris* Roquer

Estatus: Residente, invernante.

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 6 ex. el 15/V y 7 ex. el 25/V (PCC).

La Marina Baixa Sirvent (Sella) 20 ex. el 30/V (LFS).

El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 5 ex. el 17/XII (LSM).

El Molins (Monòver) 4 ex. el 27/II junto a Aviones comunes y Golondrina dáurica (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 25 ex. el 19/I (LFS), 1 ex. en Balsares el 26/III (AJR,LFS).

Pantano d'Elx 1ª cita otoñal el 15-X (OAP).

P.N. El Fondó Varios ex. en La Raja el 13/VIII (MLM).

 Golondrina Común *Hirundo rustica* Oroneta

Estatus: Nidificante, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 8 ex. el 6/III. 1ª cita primaveral (PCC).

Port d'Albaida (Muro) 1 ex. macho el 25/XI (PCC).

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1ª cita primaveral 2 ex.11/III. (MER)

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 8 ex el 13/V (PCC).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 4 ex. el 14/III (RGR,PMN).

El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 1 ex. el 27/II. 1ª cita primaveral (LSM). Serra del Coto (Monòver) Bandos de cientos de ex. cruzan la zona. Bandos mixtos con algunos ex. de Vencejo común y Vencejo real. 12/IX (LSM).

Baix Vinalopó Pantano d'Eix última cita el 23/X (OAP).

Clot de Galvany (Elx) 100 ex. el 26/III (AJR,LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. 1ª observac prenupcial, el 18/II.(AJR); 1 ex. el 13/III (RGR,PMN), 2 ex. el 19/III (OAP), escasa el 17/X (OAP).

P.N. El Fondó 1 ex. el 29/I. 1ª cita anual (LFS,APG,JLE), 1 ex. el 17/II (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 27/II (MJP).

x Golondrina Dáurica *Hirundo daurica* Oroneta cua-rogenca

Estatus: Nidificante, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V; 2 ex. el 12/VII (PCC).

Alcocer de Planes 1 ex. el 11/V (PCC).

La Marina Alta Vall d'Alcalà 3 ex. el 28/V en los alrededores de Beniaia (PCC).

Xaló 2 ex. en la periferia del núcleo urbano el 1/V (TZL).

L'Alt Vinalopó Biar 2 ex. el 10/VI (JAR).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. ad. macho el 25/V (PCC).

- Alcoi Mín. 8 ex. posados en cable y en vuelo en parque El Romeral, 3/X (PCC).
Embalse de Tibi 1 ex. el 16/V (EGM).
- La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 7/VIII (EGM, TZL).
Riu Algar (Altea) 1 ex. en bando mixto de Golondrina común y Avión común el 27/II (TZL).
Puig Campana (Finestrat) 8 ex. el 2/IV y 2 ex. el 30/V (EGM, TZL).
- El Vinalopó Mitjà Monòver 1 ex. el 11/VIII en El Chinorlet (LSM).
El Molins (Monòver) 8-10 ex. el 27/II junto a Aviones comunes y Aviones roqueros (LSM).
Pinoso 3 ex. el 12/VIII sobrevolando el Monte Coto; 1 ex. el 21/VIII sobrevolando viñedos (LSM).
- L'Alacantí Aigües de Busot 8 ex. el 29/VI. Mín. 1 nido ocupado (EGM, TZL).
Alacant 1 ex. en el parque El Palmeral los días 29 y 30/VII (EGM).
- Baix Vinalopó Pantano d'Elx 1ª cita para la zona el 17/IV (AQG, MAJ, JCR). 1 ex. el 19/V y 1 pp. en la cola del pantano, con nido en casa el 23/V (MAP), 1 ex. el 14/VII, 20/VII y 2 ex. el 3/VIII (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 9/V en EDAR de Arenales (AJR).
EDAR de Santa Pola 1 ex. el 11/VI (LFS, AJR), 1 ex. el 3/V (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 13/II (MJP y John Brooks).
La Marina (Elx) 1 ex. sobrevolando la zona el 6/IX (AJR).
Canal del Trasvase (Crevillent) 12 ex. el 29/IV (LFS).
Embalse de Crevillent 2 ex. el 7/VI (LFS).
- Baix Segura P.N. Salinas de Torre Vieja 2 ex. el 14/IV en orilla O (LFS, AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 29/VIII (AJR).
Embalse de La Pedrera 1 ex. el 14/IV (AJR, LFS), al menos 4 ex. volando junto a la presa, el 23/IV; al menos 4 ex. en 3 sitios diferentes del embalse, viendo 1 pp. entrando en casa vieja, el 29/IV; 1 ex. el 7/VII (AJR).
Rebate (Pilar de la Horadada) 2 ex. el 3/IV (MJP).



Golondrina dáurica
Dibujo: ©Luis Segorb



Golondrina común
Dibujo: ©Luis Segorb



Avión común
Dibujo: ©Luis Segorb

✂ Avión Común *Delichon urbica* Oroneta cuablanca

Estatus: Nidificante, migrante.

- El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/III. 1ª cita primaveral (PCC).
L'Alcoià Alcoi 3 ex. el 11/III. 1ª cita primaveral (PCC).
- La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 2 ex. junto a bando de cerca de 100 ex. de Avión roquero el 27/XII (TZL).
- El Vinalopó Mitjà El Molins (Monòver) 8-10 ex. el 27/II junto a Golondrina dáurica y Aviones roqueros (LSM).
- Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 15 ex. el 26/III (AJR, LFS).
Pantano d'Elx Última cita el 23/X (OAP).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac prenupcial de 5 ex. el 25/II. (AJR).
P.N. El Fondó 3 ex. el 21/XI (AQG, EH).

x Bisbita Campestre *Anthus campestris* Titeta d'estiu

Estatus: Nidificante.

La Marina Alta Serra Bèrnia 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).

L'Alt Vinalopó La Encina (Villena). 1 ex. el 8/V. y 9 ex. agrupados el 3/VII. (JB, MER).

Biar 1 ex. el 1/VI en vuelo de exhibición (JAR).

La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 10/VII (TZL, GLI).



Bisbita común
Foto: © Toni Zaragoza

✖ Bisbita de Richard *Anthus novaeseelandiae*

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999.

 Bisbita Arbóreo *Anthus trivialis* Titeta dels arbres

Estatus: Migrante, invernante.

L'Alt Vinalopó Villena 1 ex. el 4/XI y 1 ex. el 1/XII (JAR).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. posado en un pino el 29/VIII (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 3 ex. los días 28 y 29/IV (AJR, LCR), 1 ex. el 18/IV (LJF, LF5), 1 ex. el 16/IX (LF5).

 Bisbita Común *Anthus pratensis* Titeta

Estatus: Invernante.

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx)4 ex. el 26/III (AJR,LFS).

Cabo de Santa Pola Primera observación postnupcial de 3 ex. el 17/IX (IGC).

x Bisbita Gorgirrojo *Anthus cervinus* Titeta gola-roja

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 5 ex. junto con Lavanderas boyeras el 26/IV(MJP,AT,HT).

 Bisbita Costero *Anthus petrosus* Titeta d'aigua

Estatus: Invernante, migrante.

Sincitas de interés en 1999.



Lavandera cascadeña
Foto: © Toni Zaragoza

x Bisbita Alpino *Anthus spinoletta* Titeta de muntanya

Estatus: Invernante, migrante.

Sin citas de interés en 1999.

 Lavandera Boyera *Motacilla flava* Cueta groga

Estatus: Nidificante, migrante.

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 8 ex. en la Depuradora el 26/III (AJR,LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 macho el 16/III (AJR).

P.N. El Fondó 1^a observac de 1 macho el 12/III; varios cientos de ex.

en cultivos de la zona sur el 23/IX; varios ex. en alfalfa segados el 13/X; todavía 1 ex. el 14/XI(AJR,LFS); 1 ex. de la subsp. *flavissima* entre las iberiae el 21/IX (LFS,AJR).

Baix Segura Hondo de Amorós Observac invernall de 2 ex. en campo regado el 5/I; 1ª observac prenupcial de 3 machos ibéricos el 2/III en cultivo regado (AJR).

 Alzacola Cercotrichas galactotes Cuaenlirat

Estatus: Nidificante.

La Marina Baixa La Vila Joiosa 1 ex. posado en un olivo en la Partida de L'Aigueta el 16/V (TZL).

L'Alacantí Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. el 9/V. 1^a cita primaveral (TZL, EGM, GLI).

Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 21/VII (LFS).

 Petirrojo *Erithacus rubecula* Pit-roig

Estatus: Residente, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 23/III. Última cita primaveral (PCC).

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja Reprodutor abundante (PCC).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. el 29/VIII (LSM).

L'Alacantí Alacant 1 ex. 26/IX. 1ª cita invernal (EGM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 1 ex. en la Depuradora el 26/III (AJR,LFS).

Santa Pola 1ª cita otoñal el 16/X (MJP).

Elx 7 ex. en campos de cultivos el 28/X (LFS,SAM).

x Ruiseñor Común *Luscinia megarhynchos* Rossinyol

Estatus: Nidificante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 15 ex. el 6/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 15/V y 19 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 25 ex el 13/V (PCC).

La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 2/IV. 1ª cita primaveral (TZL,EGM).

Sirventa (Sella) 1 ex. el 30/V (LFS).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 2 ex. el 18/IV (LJF).

 Pechiazul *Luscinia svecica* Pit-blau

Estatus: Migrante, invernante.

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 2 ex. anillados el 9/I; 1 ex. anillado el 6/II (TZL,EGM); 1 ex. macho el 13/III (TZL).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Eix) 1 ex. el
5/II (LFS,AJR.).

Baix Vinalopó P.N.El Fondó 1 hembra el10/X (EGM,LFS).



Pechiazul
Foto: © Toni Zaragoza

Colirrojo Tizón *Phoenicurus ochruros* Cua-roja fumada

Estatus: Residente, migrante, invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. (hembras) el 13/III; 5 ex. el 8/XI (PCC).

Serra de Mariola (Alfajara) 1 ex. el 9/XII en masía cercana al núcleo urbano (JTR).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 5 ex. ad. y 2 pull. el 15/V(PCC).

La Marina Baixa Sirventa (Sella) 5 ex. el 30/V (LFS).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 pp. con ceba en el pico el 23/V (LSM).

Baix Vinalopó Pantano d'Eix 1ª cita postnupcial de 1 hembra el 13/X (OAP).

✖ **Colirrojo Real** *Phoenicurus phoenicurus* Cua-roja real

Estatus: Migrante escaso.

- L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1 macho, 13/IV y 15/IV (MER).
 El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 pp. posada en pino el 12/IX (LSM).
 L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 2 ex. el 16/IX (MJP).
 Baix Vinalopó Pantano d'Elx 1 ex. anillado en el 28/IX (AQG).
EDAR de Arenales del Sol 1 ej. el 1/V (AQG).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 18/IV (LJF,LFS).
Cabo de Santa Pola 1 ex. el 16/IV (AJR,LFS); 1 ex. el 18/IV (LJF,LFS).

✖ **Tarabilla Norteña** *Saxicola rubetra* Bitxac rogenic

Estatus: Migrante.

- L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) 1 macho, en paso el 24/IV; 1 macho, en paso el 4/V (JB, MER).
 L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 3 ex. el 16/IX (MJP).
 Baix Vinalopó EDAR de Arenales del Sol 1 ex. el 13/V (AQG).
Serra de Santa Pola 1 ex. el 16/IX (LFS).
P.N. El Fondó 1 ex. el 14/IX (AQG, AJR, LFS).
Vistabella 2 ex. el 16/IX (MJP).
 Baix Segura Embalse de La Pedrera 1 ex. el 3/X (AQG).



Tarabilla común
Foto: © Toni Zaragoza

✖ **Tarabilla Común** *Saxicola torquata* Cagamànecs

Estatus: Residente.

- El Comtat Embalse de Beniarriés 13 ex. el 6/V. (PCC).
 La Marina Alta Serra Bàrnia 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).
 L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 15/V y 5 ex. el 25/V (PCC).
P.N. Carrasgar de la Font Roja 6 ex el 13/V (PCC).
 La Marina Baixa Sirventà (Sella) 4 ex. el 30/V (LFS).
 Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 5 ex. el 26/III (AJR,LFS).

✖ **Collalba Gris** *Oenanthe oenanthe* Còlbit gris

Estatus: Nidificante, migrante, invernante.

- La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. 24/VIII (EGM,TZL).
 L'Alacantí Aigües de Busot 1 ex. macho el 7/IV posado en almendro con 1 ex de Collalba rubia (TZL).
R.M. Illa de Nova Tabarca 6 ex. el 16/IX (MJP).
 El Vinalopó Mitjà Pinoso Reproducción. 1 pp acude repetidamente a cebar en nido situado en un ribazo de piedras situado entre un erial y campo de olivos, a escasos metros del pueblo, el 23/V (AJR).
 Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª cita de 1 macho el 6/IV (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 17/IX (LFS).

✖ **Collalba Rubia** *Oenanthe hispanica* Còlbit ros

Estatus: Nidificante, migrante.

- L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1ª cita 1 macho, ad. 31/III (MER).
 L'Alcoià P.N. Carrasgar de la Font Roja 1 ex el 4/VI (PCC).
 La Marina Baixa Sirventà (Sella) 2 ex. el 30/V (LFS).
 L'Alacantí Aigües de Busot 1 ex. macho el 7/IV posado en almendro con 1 ex



de Collalba gris (TZL).
Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. 24/IV (EGM, TZL).
 Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 macho el 26/III (AJR, LF5).
Serra de Santa Pola 1 ex. el 11/IV (LF5).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac prenupcial de 2 machos el 25/III, en cultivos adyacentes (AJR).

✕ **Collalba Negra** *Oenanthe leucura* Còlbit negre

Estatus: Residente.

L'Alt Vinalopó La Encina (Villena) 1 pp. el 26/V. 2 pp. y un pull. 3/VII. (JB, MER).
Valle de los Alorines (Villena) 1 pp. el 11/VI y otra el 15/VII (JB, MER).
 L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 15/V y 2 ex. el 25/V (PCC).
 La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).
 L'Alacantí Aigües de Busot 1 ex. el 20/IX (TZL).
Serra de Ballestera (El Campello) 2 ex. el 25/III. Reproducción segura (ALD).
R.M. Illa de Nova Tabarca 6 ex. el 16/IX (MJP).
 Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 5 ex. el 16/IV (AJR, LF5).

✕ **Roquero Rojo** *Monticola saxatilis* Merla roquera

Estatus: Nidificante escaso.

L'Alcoià P.N. Carrasgar de la Font Roja 1 macho emitiendo canto territorial; 13/IV.
 La Marina Baixa Tàrbena 1 pp. posada en cultivos de vid el 23/IV en la Partida Bixauca (TSR, JSR).
Serra de Aitana 6 avistamientos tanto de machos, hembras y jóvenes entre el 6/VI y el 11/VII (TSR, JSR); 1 pp. con ceba en el pico el 3/VII (TZL, ARF), 1 ex. el 24/VIII (EGM, TZL).



Roquero rojo
Foto: © Toni Zaragoza

✕ **Roquero Solitario** *Monticola solitarius* Merla blava

Estatus: Residente, invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 macho el 6/V (PCC).
Benimarfull 1 ex. el 29/VI (PCC).
Planes de la Baronia 1 ex. el 28/V en paraje del Barranc de L'Encantada (PCC).
 La Marina Alta Serra de Bèrnia 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).
 L'Alcoià Alcoi 2 ex. machos cantando desde los tejados de antiguas fábricas dentro del núcleo urbano (PCC).
Serra de Mariola (Alcoi) 7 ex. el 15/V y 1 ex. el 25/V (PCC).
P.N. Carrasgar de la Font Roja 1 ex el 13/V (PCC).
Embalse de Tibi 1 ex. el 30/V (RGR, PMN).
 La Marina Baixa Sirventà (Sella) 2 ex. el 30/V (LF5).
 El Vinalopó Mitjà Peña La Zafra (Monòver) 1 macho con ceba en el pico el 22/V (LSM).
Serra del Coto (Monòver) 1 macho con ceba en el pico el 4/VII (LSM).
 Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 2 ex. en el barranco al lado de la cantera el 11/VI (LF5, AJR).

✕ **Mirlo Capiblanco** *Turdus torquatus* Merla de pit blanc

Estatus: Migrante.

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex en finca de Pardinetes, parte O. del Parc Natural. 11/XI (PCC).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 8-10 ex., algunos con plumaje de primer invierno el 24/X (LSM).

Serra del Fraile 4 ex. el 6/XI acudiendo a beber a una fuente, con zorzaes charlos y 1 alirrojo (JAR,AJR).



Mirlo capiblanco
Dibujo: ©Luis Segorb

✕ **Mirlo Común** *Turdus merula* Merla

Estatus: Residente,

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 25 ex. el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 10 ex. el 15/V y 11 ex. el 25/V (PCC).

La Marina Baixa Sirvent (Sella) 5 ex. el 30/V (LFS).

L'Alacantí Alacant 1 ex. macho emite canto en parque urbano el 19/II (TZL).

Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 8 ex. el 16/IV (AJR,LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 10 ex. el 17/I (OAP).

✕ **Zorzal Real** *Turdus pilaris* Tordanxa

Estatus: Divagante.

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 2 ex. el 1/XI (LSM).

✕ **Zorzal Común** *Turdus philomelos* Tord

Estatus: Migrante, invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 23/III.

Última cita primaveral (PCC).

L'Alt Vinalopó Serra de Salinas 6 ex. el 15/II (MJP).



Zorzal común
Dibujo: ©Luis Segorb

✕ **Zorzal Alirrojo** *Turdus iliacus* Tord ala-roig

Estatus: Invernante.

El Vinalopó Mitjà Serra del Fraile 1 ex. el 6/XI, que acude a fuente en compañía de Mirlos capiblancos y Zorzaes charlos (JAR,AJR).

✕ **Zorzal Charlo** *Turdus viscivorus* Griva

Estatus: Residente.

La Marina Alta Vall d'Alcalà 1 ex. el 28/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 3 ex. el 6/V; 1 de ellos con ceba (AJR).

EDAR de Santa Pola Reproducción. 1 pp con nido en eucalipto el 6/V (AJR).

Baix Segura Guardamar 7 ex. en cultivos el 28/II (MJP).

SYLVIIDAE

✖ **Ruiseñor Bastardo** *Cettia cetti* Rossinyol bord

Estatus: Residente, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarrés:

D/ Mes	9/I	29/I	6/III	13/III	23/III	7/IV	6/V	26/V	17/VI	12/VII	3/VIII	19/VIII
Ex.	3	6	2	4	3	5	7		2	1	1	
✖ (PCC) ✖												

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 14/III (RGR, PMN).Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. en la Depuradora el 26/III (AJR, LFS).Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 23/III (AJR, LFS).✖ **Buitrón** *Cisticola juncidis* Trist

Estatus: Residente.

El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 6/V (PCC).L'Alqueria d'Asnar 3 ex. en el cauce del Riu Serpis el 3/VII (PCC).Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. emite cantos territoriales el 5/IV (LFS, JCR).✖ **Buscarla Pintoja** *Locustella naevia* Boscarler pintat

Estatus: Migrante escaso.

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 5/V (GLI).✖ **Buscarla Unicolor** *Locustella luscinioides* Boscarler comú

Estatus: Nidificante escasa.

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. anillado el 30/VIII (FGO, AQG); 1 ex. anillado el 14/X (AQG).✖ **Carricerín Real** *Acrocephalus melanopogon* Xitxarra mostatxuda

Estatus: Residente, invernante común.

La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex. el 28/II (JGP, JGR).Baix Vinalopó Pantano d'Elx 1 ex. anillado el 24/XI (AQG).P.N. El Fondó 1 ex. cantando el 7/II (AQG, LFS, JCR); 1 ex. anillado el 17/II (GLI); 1 ex. anillado el 24/XI (GLI).✖ **Carricerín Cejudo** *Acrocephalus paludicola* Xitxarra d'aigua

Estatus: Migrante escaso.

Sin citas en 1999

✖ **Carricerín Común** *Acrocephalus schoenobaenus* Xitxarra dels joncs

Estatus: Migrante escaso.

Baix Vinalopó Pantano d'Elx 2 ex. anillados el 5/X (AQG).P.N. El Fondó 1 ex. 1ª cita primaveral el 11/III; última cita primaveral 1 ex. el 14/IV (GLI).✖ **Carricero Agrícola** *Acrocephalus agricola* Boscarla dels arrossars

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999

✖ **Carricero Polígloa** *Acrocephalus palustris* Xitxarra mentjamosquits

Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999

✖ **Carricero Común** *Acrocephalus scirpaceus* Xitxarra de canyar

Estatus: Nidificante común, migrante.

El Comtat L'Alqueria d'Asnar 2 ex. en el cauce del Riu Serpis. 3/VII (PCC).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 27/III. 1ª cita primaveral (TZL).

Baix Vinalopó Embalse d'Elx 1 ex. el 12/IV (LF5, AQG).

P.N. El Fondó 1 ex. cantando el 25/III (GLI).

✖ **Carricero Tordal** *Acrocephalus arundinaceus* Xitxarrot

Estatus: Nidificante común, migrante.

Baix Vinalopó Embalse d'Elx 3 ex. el 12/IV (LF5, AQG).

P.N. El Fondó 1 ex. el 17/III. 1ª cita primaveral; 1 ex. el 18/IX, última cita otoñal (GLI).

✖ **Zarcero Pálido** *Hippolais pallida* Bosqueta pàl·lida

Estatus: Migrante escaso.

L'Alcoià Serra del Maigmo 1 ex. el 8/V (EGM, TZL, LSM).

L'Alacantí Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. el 24/IV (EGM, TZL, ARF, LSM).

Baix Vinalopó EDAR de Arenales del Sol (Elx) 1 ex. el 25/V (AQG, AJR).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 20 y 25/V (AJR, AQG).

✖ **Zarcero Común** *Hippolais polyglotta* Bosqueta vulgar

Estatus: Nidificante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 26/V (PCC).

Planes de la Baronia 2 ex. el 28/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V (PCC).

La Marina Baixa Sirventa (Sella) 1 ex. el 30/V (LF5).

El Vinalopó Mitjà Monòver 1 ex. el 18/VIII, en olmeda de El Chinorlet (AJR).

L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 16/IX (MJP).

Baix Vinalopó Pantano d'Elx 1 ex. anillado el 10/VI (hembra con placa incubatriz) (AQG).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. cantando el 6/V (AJR), 7 ex. el 6/II (LF5, JCR).

Palmeral de P.N. El Fondó 1-2 pp en Jun y Jul. (SAM, AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 19/V en zona mixta de saladar con carrizo joven (AJR).

Baix Segura Embalse de La Pedrera 2 ex. el 23/IV; 3 ex. el 29/V, en sectores con tarajes, juncos y carrizal, 1 ex. el 7/VII (AJR).

✖ **Curruca Sarda** *Sylvia sarda* Busquereta sarda

Estatus dudoso.

Las citas podrían corresponder a otras *Sylvia*, especialmente a *S. undata*. Sólo hay una cita de *Curruca sarda* homologada por el CIR para la Península Ibérica.

✖ **Curruca Rabilarga** *Sylvia undata* Busquereta cuallarga

Estatus: Nidificante, invernante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 26/V (PCC).



- L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. el 15/V y 1 ex. el 25/V (PCC).
 La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).
Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL).

✕ **Curruca Tomillera** *Sylvia conspicillata* Busquereta trencamates

Estatus: Nidificante.

- La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. macho el 6/VI (TZL).
Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL).
 Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 1 pp en saladar el 23/III (AJR, LFS); 10 ex. entre saladar/cultivos el 14/IV (AJR, LFS).
Embalse de La Pedrera 3-4 ex. en matorral cerca de la orilla el 14/IV; 3 machos cantores el 23/IV (AJR, LFS); 5 ex. jóvenes por matorral perlagunar el 7/VII (AJR).

✕ **Curruca Carrasqueña** *Sylvia cantillans* Busquereta de garriga

Estatus: Nidificante, migrante.

- La Marina Alta Vall d'Alcalà 3 ex. el 28/V en los alrededores de Beniaia (PCC).
 L'Alt Vinalopó Serra de Salinas 1 ex. macho el 30/V (LSM).
 L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).
P.N. Carrasgar de la Font Roja 1 ex. el 13/V (PCC).
 La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 2 ex. el 30/V (EGM, TZL).
 El Vinalopó Mitjà Monòver 1 macho en olmeda de El Chinorlet el 13/IX (AJR).
 Baix Vinalopó EDAR de los Arenales del Sol (Eix) 1 ex. el 9/X (AJR).
Clot de Galvaný (Eix) 1 macho el 29/IV (AJR); 1 ex. en los Saladares de Balsares el 26/III (AJR, LFS).
Cabo de Santa Pola 2 ex. el 29/III (AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola 4 juvs el 24/IX, comiendo los rojos frutos del cambrón (*Lycium intricatum*), en la costa (AJR); 1 ex. el 1/IV en El Pinet (MJP).
 Baix Segura P.N. Salinas de la Mata 2 ex. el 10/x en zona arbustiva.
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 23/III (AJR, LFS).

✕ **Curruca Cabecinegra** *Sylvia melanocephala* Busquereta capnegra

Estatus: Residente.

- El Comtat Embalse de Beniarrés 12 ex. el 6/V (PCC).
 L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 9 ex. el 15/V y 18 ex. el 25/V (PCC).
P.N. Carrasgar de la Font Roja 9 ex el 13/V (PCC).
 La Marina Baixa Sirventà (Sella) 6 ex. el 30/V (LFS).
 Baix Vinalopó Embalse d'Eix 1 ex. el 12/IV (LFS, AQG).
Cabo de Santa Pola 10 ex. el 16/IV (AJR, LFS).



Curruca cabecinegra
Foto: © Toni Zaragoza

✕ **Curruca Mirlona** *Sylvia hortensis* Busquereta enmascarada

Estatus: Nidificante escaso, migrante.

- L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. hembra. 15/V (PCC).
 La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL).
 El Vinalopó Mitjà La Solana (Monòver) 1 ex. macho en bancales de almendros, 15/V (LSM).

✂ **Curruca Zarcerilla** *Sylvia curruca*

Estatus: Dudoso, información insuficiente.

✂ **Curruca Zarcera** *Sylvia communis*

Busquereta vulgar

Estatus: Nidificante, migrante.

L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1 macho cantando el 12/IV. Otro el 11/VI. (JB,MER).
Serra del Morrón (Cañada) 1 ad. macho. 13/VI. (JZE,MER).

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 13/V (PCC).

Embalse de Tibi 1 ex. el 30/V (EGM).

Baix Vinalopó Pantano d'Elx 1 ex anillado el 25/IV (FGO, AQG), 1 ex. anillado 5/V (AQG).
EDAR de los Arenales del Sol (Elx) 3 ex. el 3/V; 2 ex. el 18/V, incluso emisión de canto suave desde un olivo. Todas ellas aves en paso (AJR).
Clot de Galvany (Elx) 3-4 ex. en el 28/IV (AJR, JCR).
Cabo de Santa Pola 1 ex. el 16/IV (AJR,LF5); 6-7 ex. el 3/V, en zona próxima al faro de Santa Pola, donde se habían sedimentado diversas especies de passeriformes migrantes (AJR).

✂ **Curruca Mosquitera** *Sylvia borin*

Busquereta mosquitera

Estatus: Nidificante ocasional, migrante escasa.

L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 16/IX (MJP).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 2 ex. en almendro el 28/IV, cerca de la EDAR de los Arenales del Sol (AJR).

EDAR de Santa Pola 3 ex. en pinos y algarrobo el 3/V(AJR).

✂ **Curruca Capirotada** *Sylvia atricapilla*

Busquereta de casquet

Estatus: Residente, invernante.

La Marina Alta Teulada 2 ex. en el Barranc de Teulada el 5/I (EGM, TZL).

El Vinalopó Mitjà Monòver 2 ex. el 13/IX en olmeda de El Chínorlet (AJR).

L'Alacantí Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL, ARF, LSM).

Baix Vinalopó Pantano d'Elx 1ª cita otoñal el 1/X, siendo abundante (OAP).

Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el 18/IV (LJF,LF5), presencia invernal hasta el 18/V (AJR).

Cabo de Santa Pola 2 ex. el 16/IV (AJR,LF5).

P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 19/III (OAP).

Elx 7 ex.en cultivos el 28/X (LF5,SAM).

P.N. El Fondó 1ex. el 6/III (RGR,PMN); 1ª observac postnupcial de 1 ex. en palmeral adyacente al humedal, el 27/IX (AJR).

Dunes d'Elx (La Marina) 1 ex. comiendo flor de aloe el 10/II (LF5).

✂ **Mosquitero Papialbo** *Phylloscopus bonelli*

Mosquiter pàl·lid

Estatus: Nidificante, migrante.

La Marina Alta Vall d'Alcalà (Beniaia) 1 ex. el 30/VI (PCC).

L'Alt Vinalopó Serra de Salinas 3 ex. el 30/V (LSM).

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 41 ex. el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 5 ex. el 15/V y 31 ex. el 25/V (PCC).

La Marina Baixa Serra de Aitana Mínim. 10 ex. el 6/VI, varios ex. el 3/VII en los alrededores de la Font de Forata (TZL, ARF).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. macho emite canto el 6/VI; 1 ex. el 12/IX (LSM).



✕ Mosquitero Silbador *Phylloscopus sibilatrix*

Mosquiter xiulador

Estatus: Migrante.
Sin citas en 1999.

✕ Mosquitero Común *Phylloscopus collybita*

Mosquiter comú

Estatus: Invernante abundante migrador abundante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 23/III. Última cita primaveral (PCC).
L'Alcoià Alcoi 3 ex. en cultivos dentro del núcleo urbano. 1ª cita otoñal. 4/X (PCC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 4 ex. el 14/III (RGR, PMN).
El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 30 ex. capturando insectos en el Riu Vinalopó el 6/XII (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. entre el 25/V y 5/VI (AJR, AQG).
P.N. Fondó 9 ex el 6/III (RGR, PMN), 1 ex. ad con muda completa el 13/VIII (GLI, JGR).

✕ Mosquitero Ibérico *Phylloscopus brehmii*

Estatus: Dudoso. Algunas de las citas de *P. collybita* podrían corresponder a esta especie, recientemente diferenciada de la anterior.

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 2 ex el 13/V (PCC).

✕ Mosquitero Musical *Phylloscopus trochilus*

Mosquiter de passa

Estatus: Migrante.

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 9 ex. anillados el 16/X (EGM, TZL).
Baix Vinalopó Embalse d'Elx 1 ex. el 12/IV (LFS, AQG).
Clot de Galvany (Elx) 1ª observac de 1 ex. el 26/III (AJR, LFS); 5 ex. el 18/IV (LJF, LFS), citas de 1-4 ex. entre el 26/III y 6/V; 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 3/IX. (AJR).
Cabo de Santa Pola 3 ex. el 16/IV (AJR, LFS), 5 ex. el 18/IV (LJF, LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac de 2 ex. juvs el 28-VIII. (AJR); 1ª cita prenupcial de 1 ex. el 28/III (OAP).
P.N. el Fondó 1 ex. anillado el 24/XI (AQG), ex. anillados el 5/V, el 11/IX y el 25/IX (GLI).
Baix Segura Embalse de la Pedrera 2 ex. el 14/IV (AJR, LFS).

✕ Reyzeuelo Sencillo *Regulus regulus*

Reiet comú


Estatus: Invernante.
Sin citas de interés en 1999.

✕ Reyzeuelo Listado *Regulus ignicapillus*

Reiet safraner.

Estatus: Residente, invernante.

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. en bando mixto con algunos páridos el 24/X (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 23/XI (AJR, MAP).
Serra de Santa Pola 3 ex. el 19/X en barranco (AJR).



Mosquitero común
Dibujo: ©Luis Segorb



Reyzeuelo listado
Dibujo: ©Luis Segorb

Papamosques gris

Estatus: Nidificante, migrante.

El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 3/VIII. (PCC).

Gaianes 2 ex. el 29/VI (PCC).

Vall d'Alcalà (Beniaia) 2 ex. el 30/VI (PCC)..

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).

Alcoi 3 ex. en parque urbano. 3/X (PCC).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. el 23/V (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 1ª observac prenupcial de 1-2 ex. en EDAR de los Arenales el 28/IV (AJR, JCR), 1 ex. el 16/IX (LFS).



Papamoscas gris
Dibujo: ©Pep Cantó

Papamosques menut

Estatus: Divagante.

Sin citas en 1999

Papamosques blanquet

Estatus: Nidificante raro, migrante.

L'Alt Vinalopó Serra de la Solana (Villena). 1 macho, ad.. 26/IV (MER).

L'Alcoià Alcoi 2 ex. en parque urbano. 3/X (PCC).

Serra del Maigmo 1 ex. macho el 24/IV (EGM, TZL, ARF, LSM).

El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 1 ex. macho, el 18/IV. (LSM).

Serra del Coto (Monòver) 1 ex. macho, el 12/IX. (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 3 ex. el 18/IV (LJF,LFS); 1 ex. el 16/IX (LFS), entre 1-5 ex. del 22/IV al 20/V; 1ª observac postnupcial de 1 ex. el 3/IX, hasta el 9/X (AJR).

Serra de Santa Pola 1ª cita prenupcial de 2 ex. el 16/IV (AJR).

Cabo de Santa Pola 1 ex. el 16/IV y 1 ex. el 18/IV (AJR,LFS).

[Decorative flourish]

Serenet

Estatus: Residente.

Sin citas de interés en 1999

f f f f f f f f f f f f f f f f

Senyoreta

Estatus: Residente.

El Comtat Serra de Mariola (Alfara) 9 ex. el bosque de pinos del término municipal (JGR).

L'Alt Vinalopó Serra de Salinas Bando familiar el 30/V (LSM).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V y 8 ex. el 25/V (PCC).

La Marina Baixa Sirventa (Sella) 12 ex. el 30/V (LFS).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 19/I (LFS).

Cabo de Santa Pola 2 ex. el 16/IV (AJR,LFS).

Serra del Molar (La Marina-Eix) 25 ex. el 8/VI (LFS,AJR,AQG).

Agateador común
Foto: © Toni Zaragoza

f f f f f f f f f f f f f f f f f

Clot de Galvany (Eix) 3 ex. el 4/II (LFS, AJR), 7 ex. en Balsares el 6/II (LFS, JCR).

[Decorative separator consisting of a series of small bird-like icons]

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 16/IX (LFS).

f f f f f f f f f f f f f f f f f

Alcaudón (real) meridional
Dibuja: © Luis Sagarb

Sin citas en 1999.

Recientemente se han diferenciado dos especies de Alcaudón "Real": el Alcaudón Norteño y el Alcaudón Meridional. A éste deberían corresponder las citas de Alicante.

Alcaudón común
Dibujo: ©Luis Sogorb



Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 27/III (LFS).



Serra del Coto (Monòver) Varios ex. el 26/IX (LSM).



P.N. El Fondó 1 ex. el 7/I (LFS).

Arrendajo común
Dibujo: ©Luis Segorb

Sirventa (Sella) 2 ex. el 30/V (LFS).

San Isidro de Albatera 35 ex. el 17/XI, con garcillas bueyeras, en dormidero situado en balsa de riego (OAP).

El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 1 ex. en vuelo bajo y pausado. Se posa en unos grandes pinos de un chalet el 2/V (LSM).

S^a dels Castellets (Orcheta) 17 ex. en vuelo el 6/II (AIR, JIR).

Sin citas de interés.

Sin citas de interés.

Sin citas en 1999.



- 
- Garrido común
Dibujo: © Germán López

- Gorrión común
Dibujo: © Germán López

- ESTRILDIDAE

- 
- Pico de coral
Dibujo © Luis Segorb

Pico de coral
Dibujo: ©Luis Sogorb

Pinsà

Estatus: Residente, invernante.

La Marina Alta Serra Bèrnia 1 ex. el 17/X (RGR, TZL,PG).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 32 ex el 13/V (PCC).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Eix) 1 ex. en la Depuradora el 26/III (AJR, LFS).



Pinzón vulgar
Foto: © Toni Zaragoza

Pinsà mec

Estatus: Invernante escaso.

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 15-20 ex. el 1/XI (LSM).

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 3 hembras el 3/I en sembrado, con pinzones vulgares, en cultivos de la zona sur (AJR).

Baix Segura Rojales 1 ex. macho el 12/III (DL).

Gafarró

Estatus: Residente, migrante común, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarrés 13 ex. el 6/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 32 ex. el 15/V y 47 ex. el 25/V(PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).

La Marina Baixa Callosa d'En Sarrià 5 ex. el 17/X (TZL,RGR,PG).

Embalse Amadorio 3 ex. el 10/IV (RGR,PMN).



Verdecillo
Dibuja: © Luis Segorb

Canari

Estatus: Escapado de cautividad.

Sin citas de interés.

Verderolet

Estatus: Visitante (?).

Sin citas en 1999.



Jilguero
Dibuja: ©Luis Sogorb

Verderol

Estatus: Residente, migrante común, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 6/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 11 ex. el 15/V y 15 ex. el 25/V(PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex el 13/V (PCC).

Cadernera

Estatus: Residente, migrante común, invernante común.

El Comtat Embalse de Beniarrés 6 ex. el 6/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 27 ex. el 15/V y 29 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 12 ex el 13/V (PCC).

La Marina Alta Serra de Bèrnia Grandes bandos mixtos junto a pardillos y pinzones el 17/8 (TZL,RGR,PG).



✕ **Lúgano** *Carduelis spinus* Lluer

Estatus: Migrante, invernante.

Baix Vinalopó Serra de Santa Pola Santa Pola 3 ex. el 4/XII (LFS).

✕ **Pardillo Común** *Carduelis cannabina* Passerell

Estatus: Residente, migrante, invernante.

La Marina Alta Serra de Bèrnia varios bandos el 17/X (TZL, RGR, PG).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 14 ex. el 15/V y 22 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 29 ex el 13/V (PCC).

La Marina Baixa Serra d'Aitana Numerosos ejemplares cercanos a la Font de Forata el 3/VII (TZL, ARF).

L'Alcantí R.M. Illa de Nova Tabarca 6 ex. el 16/IX (MJP).

Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 2-3 ex. ad. cantando cerca de la EDAR de S. Pola el 3/V, iposible nidificación! (AJR,AQG).

✕ **Piquituerto Común** *Loxia curvirostra* Bec-tor

Estatus: Residente, invernante.

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 7 ex. el 15/V y 4 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 3 ex el 13/V (PCC).

Serra del Maigmo Mín. 10 ex. en bandos familiares acuden a bebedero artificial el 25/IV (TZL).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) Machos cantando en vuelo o posados copas de los árboles. Pequeños grupos en vuelo el 29/VIII (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvaný (Elx) 1 hembra/juv en vuelo, cerca del aula de la naturaleza, el 9/X (AJR).

Pinada de La Marina (Elx) 1 hembra en gran pino el 4/X (AJR).

✕ **Camachuelo Trompetero** *Bucanetes githagineus* Pinsà trompeter

Estatus: Nidificante (muy localizado), insuficientemente conocido.

Descubiertas en el año 2000 al menos dos zonas de cría de esta especie en la provincia.

✕ **Picogordo** *Coccothraustes coccothraustes* Trencapinyols

Estatus: Invernante ocasional.

L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex en finca de Pardinetes, parte O. del Parc Natural. 11/XI (PCC).



Picogordo
Foto: © Toni Zaragoza

Sin citas en 1999.

Riu Segura 1 hembra/juv en cultivos adyacentes el 8/l. (AJR, MAP).

La Marina Baixa Sirventa (Sella) 5 ex. el 30/V (LFS).

Sin citas en 1999.

Sin citas de interés en 1999.

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. cantando en palmera el 12/V (LFS).

L'Alcoià Embalse de Tibi 1 ex. macho el 15/VIII (TZL).

La Marina Alta Salinas de Calp 3 ex. (TZL, LAF, Gunnar & Olsson).





Bigotudo
Dibujo © Oscar Aldeguez



Listado de aves y su estatus

Elaborada por el equipo editorial del Anuario Ornitológico de Alicante 1999 y colaboradores

Nombre científico	Estatus Península	Estatus Com. Valenciana	Estatus Alicante	Otros datos e informaciones
<i>Gavia stellata</i>	I	Ir	Io	
<i>Gavia arctica</i>	I	Ir	Io	
<i>Gavia immer</i>	I	Ir	Io	
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	R	Rc Ic	R Nc Ic	
<i>Podiceps cristatus</i>	R	Rm! Im	R Ne M le	
<i>Podiceps auritus</i>	*i	+ D1	D	
<i>Podiceps nigricollis</i>	R	Nr!! Mm Im	R Ne M la	
<i>Calonectris diomedea</i>	E	Nm!! Mc Ir?	Me Io	
<i>Puffinus mauretanicus</i>	R	Mc Ic	M Ic	
<i>Puffinus yelkouan</i>	R		le	
<i>Hydrobates pelagicus</i>	R	Nm! Ir?	Nm	
<i>Oceanodroma monorhis</i>		D1	D	
<i>Sula bassana</i>	I	Mc Im	Mm le	
<i>Phalacrocorax carbo</i>	I	Ic	M Ic	
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	R	Nr!! Vm	R (no reprod)	
<i>Botaurus stellaris</i>	R	Mr	Io Mr	
<i>Ixobrychus minutus</i>	E	Nm M Ir	Nm le	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	E	Nm!! M	Ne le	
<i>Ardeola ralloides</i>	E	Nm!! Mm Ir	Ne Ir	
<i>Bubulcus ibis</i>	R	Rc (Nc!!)	R Na	
<i>Egretta gularis</i>	(2)?	+D2 No!!	D	
<i>Egretta garzetta</i>	R	Rc (Nc!!)	R Nc M	
<i>Egretta alba</i>	i	Mr Ir	Mr Ir	
<i>Ardea cinerea</i>	R	Nm!! M Ir?	R Nr Im	
<i>Ardea purpurea</i>	E	Nm!! M Ir?	Ne Io	
<i>Ciconia nigra</i>	E	Me	Mr	
<i>Ciconia ciconia</i>	E	Mm	Me	
<i>Plegadis falcinellus</i>	p	No!! Me Ir	R Nr	
<i>Platalea leucorodia</i>	E	Me Ir	M le	
<i>Phoenicopterus ruber</i>	R	No!! Rc M	Rc No Ma	
<i>Phoenicopterus minor</i>	(1)?	D1 E?	D? E?	
<i>Phoenicopterus chilensis</i>			E (homol?)	Pendiente homologación CIR
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	?		D? E?	
<i>Anser fabalis</i>	I	Io	D	
<i>Anser anser</i>	I	le	le	
<i>Branta leucopsis</i>	i		D? E?	
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	(0)?		D? E?	Citas homologadas CIR
<i>Tadorna ferruginea</i>	A?	D2 E?	D E	
<i>Tadorna tadorna</i>	R	Nr!! Im	R Ne Im	
<i>Aix sponsa</i>		D1 E	E	
<i>Aix galericulata</i>	A?	D1 E	E	
<i>Anas penelope</i>	I	Ic	Im	
<i>Anas strepera</i>	R	Nr!! Im	Nr le	
<i>Anas formosa</i>	(1)?	D1 E?	E	
<i>Anas crecca</i>	I	Ic	Ic	
<i>Anas platyrhynchos</i>	R	RcIc	RNmIc	

Nombre científico	Estatus Península	Estatus Com. Valenciana	Estatus Alicante	Otros datos e informaciones
<i>Anas acuta</i>	I	Ic	Im	
<i>Anas querquedula</i>	P	Nr!! Mm	Nr Me	
<i>Anas discors</i>	A		D	
<i>Anas clypeata</i>	I	Nr!! Ic	Nr Ia	
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	R	Ne! Ic	Io	
<i>Netta rufina</i>	R	Nm! Ic	R Nm Im	
<i>Aythya ferina</i>	R	Ne!! Ic	R Nm Ic	
<i>Aythya nyroca</i>	r	No!! Ir	Ir No	
<i>Aythya fuligula</i>	I	Im	Ie	
<i>Aythya marila</i>	i	Ir	Io	
<i>Somateria mollissima</i>	i	Ir	Io	
<i>Melanitta nigra</i>	I	Im	Ie	
<i>Melanitta fusca</i>	I		D	
<i>Mergus serrator</i>	I	Ie	Ir	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	A	D2 E? No!!	D E No	
<i>Oxyura leucocephala</i>	R	Re!!	R Ne	
<i>Coragyps atratus</i>			E	
<i>Pernis apivorus</i>	E	Mc	Mm	
<i>Elanus caeruleus</i>	R	Vo	V	
<i>Milvus migrans</i>	E	Mm	Mr	
<i>Milvus milvus</i>	R	Me	Mo	
<i>Gyps fulvus</i>	R	Rm!	Mm	
<i>Aegypius monachus</i>	R	Vo	V	
<i>Circus gallicus</i>	E	Ne Me	N	
<i>Circus aeruginosus</i>	R	Mm Im	M Ie	
<i>Circus cyaneus</i>	R	Me Ie	Ir	
<i>Circus pygargus</i>	E	Ne! Me	Ne	
<i>Accipiter gentilis</i>	R	Re Me I	R I	
<i>Accipiter nisus</i>	R	Rm?	R I	
<i>Buteo buteo</i>	R	Re Mm I	R Ie	
<i>Buteo rufinus</i>	(0)		Dudoso	No se homologan citas por el CIR
<i>Buteo lagopus</i>	(1)		D	
<i>Aquila clanga</i>	A	D2 Io?	Mo Io	Homologada CIR
<i>Aquila chrysaetos</i>	R	Re	R	
<i>Hieraetus pennatus</i>	E	Ne Me Ir	N Ie	
<i>Hieraetus fasciatus</i>	R	Rm	Re	
<i>Pandion haliaetus</i>	R	Me Ir	Me Ie	
<i>Falco naumanni</i>	E	Nr!! Mr	V Ne (reintrod.)	En 2000, primeros nidos del proyecto
<i>Falco tinnunculus</i>	R	Rm Mm I	R	
<i>Falco vespertinus</i>	p	Mr	D	
<i>Falco columbarius</i>	I	Ie? Me	Ie	
<i>Falco subbuteo</i>	E	Ne Me	Nr Me	
<i>Falco eleonorae</i>	E	Ne!! Mr	V	
<i>Falco peregrinus</i>	R	Rm M I	R Ie	
<i>Alectoris rufa</i>	R	Ra	Rc	
<i>Coturnix coturnix</i>	E	R M	N	
<i>Phasianus colchicus</i>	(R)	E No!!	E No	
<i>Rallus aquaticus</i>	R	Rm? I	R Ne Ic	
<i>Porzana porzana</i>	P	Nr!!? Me Ir	Mr	
<i>Porzana parva</i>	p	Mr	Mr	



Nombre científico	Estatus Península	Estatus Com. Valenciana	Estatus Alicante	Otros datos e informaciones
<i>Porzana pusilla</i>	E	Nr!!? Mr	Mr	
<i>Crex crex</i>	P	Mo lo	D	
<i>Gallinula chloropus</i>	R	Ra	R Nc	
<i>Porphyrio porphyrio</i>	R	Re!	R Ne	
<i>Fulica atra</i>	R	Rc la	R la	
<i>Fulica cristata</i>	R	Vo No!!	V No?	
<i>Grus grus</i>	I	Me Ir	Ir	
<i>Tetrax tetrax</i>	R	Nr!!? Ir	Ne	
<i>Otis tarda</i>	R		V	
<i>Haematopus ostralegus</i>	R	Me Ir	Me lo	
<i>Himantopus himantopus</i>	E	Nm le	Nc M le	
<i>Recurvirostra avosetta</i>	R	Rm! Me	R Nm le	
<i>Burhinus oedionemus</i>	R	R! M Im	R Nm lc	
<i>Glareola pratincola</i>	E	Ne! Mm	Ne	
<i>Charadrius dubius</i>	E	Ne Mm Ir	Ne Ir	
<i>Charadrius hiaticula</i>	P	Mm Im	Mc le	
<i>Charadrius alexandrinus</i>	E	Nc Im	R Nm	
<i>Charadrius morinellus</i>	P	Mr	Mo	
<i>Pluvialis apricaria</i>	I	Mm Im	M Im	
<i>Pluvialis squatarola</i>	P	Mm Im	M le	
<i>Vanellus vanellus</i>	R	No!! la	Im	
<i>Calidris canutus</i>	P	Me	Me Ir	
<i>Calidris alba</i>	P	Mm Im	M Im	
<i>Calidris minuta</i>	P	Mm Im	M Im	
<i>Calidris temminckii</i>	P	Me Ir	Mr Ir	
<i>Calidris melanotos</i>	A	D2	D	
<i>Calidris ferruginea</i>	P	Mm	Mm	
<i>Calidris maritima</i>	I	Mr Ir	lo	
<i>Calidris alpina</i>	I	Mm Im	Mc Im	
<i>Limicola falcinellus</i>	A	D1	D	
<i>Philomachus pugnax</i>	P	Mm le	Mm le	
<i>Lymnocyrtus minimus</i>	I	Me le?	le	
<i>Gallinago gallinago</i>	I	Mc lc	M lc	
<i>Scolopax rusticola</i>	R	Me le?	I	
<i>Limosa limosa</i>	P	Mc Im	M Im	
<i>Limosa lapponica</i>	P	Me Ir	Mc le	
<i>Numenius phaeopus</i>	P	Mm Ir	Me Ir	
<i>Numenius arquata</i>	I	Me Ir	M le	
<i>Tringa erythropus</i>	P	Me le	M Im	
<i>Tringa totanus</i>	R	No!! Mm le	Mm le No	
<i>Tringa stagnatilis</i>	i	Me	Mr Ir	
<i>Tringa nebularia</i>	P	Mm Ir	M le	
<i>Tringa flavipes</i>	A	D1	D(homol?)	Pendiente homologación CIR
<i>Tringa ochropus</i>	I	Mm le	M le	
<i>Tringa glareola</i>	P	Mm Ir	Mm Ir	
<i>Xenus cinereus</i>	A	D1	D	
<i>Actitis hypoleucos</i>	R	Nr!!? Mc le	R(no repr) M I	
<i>Arenaria interpres</i>	P	Me le	M le	
<i>Phalaropus tricolor</i>	A	D1	D	
<i>Phalaropus lobatus</i>	p	Mr Ir	Mr	

Nombre científico	Estatus Península	Estatus Com. Valenciana	Estatus Alicante	Otros datos e informaciones
<i>Falaropus fulicarius</i>	P	Mo lo	M lo	
<i>Stercorarius parasiticus</i>	P	Mm le	M le	
<i>Stercorarius skua</i>	I	Mm le	M Ir	
<i>Larus melanocephalus</i>	I	Mm la	M le No	
<i>Larus atricilla</i>	A		D(homol?)	Pendiente homologación CIR
<i>Larus minutus</i>	P	Mm Im	Me Ir	
<i>Larus sabini</i>	p	D1	D	
<i>Larus ridibundus</i>	R	Nm!! la	R Nm la	
<i>Larus genei</i>	E	Nr!! Me le	R Nm	
<i>Larus audouinii</i>	R	Nm!! Mc Im	M Ic	
<i>Larus canus</i>	I	Ir	M Ir	
<i>Larus fuscus</i>	R	Mc Ic	M Im	
<i>Larus cachinnans</i>	R	Nm!! Ma la	R Nm la	
<i>Larus marinus</i>	I	Mo lo	Mo lo	
<i>Rissa tridactyla</i>	R	Mm Im	M Ir	
<i>Gelochelidon nilotica</i>	E	Ne!! Me	No Mr lo	
<i>Sterna caspia</i>	I	Me Ir	Mr lo	
<i>Sterna maxima</i>	A	+D1	D	
<i>Sterna bengalensis</i>	p	Vr	Mo	
<i>Sterna sandvicensis</i>	R	Ne!! Mm Im	M Im No	
<i>Sterna hirundo</i>	E	Nm!! M Ir	Nm Mc	
<i>Sterna paradisaea</i>	P	Mo	D	
<i>Sterna albifrons</i>	E	Nm! Mm	Nm M	
<i>Chlidonias hybridus</i>	E	Nm! Mc Ir	Nm Ir	
<i>Chlidonias niger</i>	P	Mc Ir	Mm	
<i>Chlidonias leucopterus</i>	P	Mr	Mr	
<i>Uria aalge</i>	R	lo	D	
<i>Alca torda</i>	I	Mm Im	Im	
<i>Fratercula artica</i>	I	Me le?	D	
<i>Pterocles orientalis</i>	R	Re!!?	Ir	
<i>Columba livia</i>	R	R	R	
<i>Columba oenas</i>	R	R	R	
<i>Columba palumbus</i>		R I	R M	
<i>Streptopelia decaocto</i>	R	Rm!	R	
<i>Streptopelia risoria</i>		E Re!!	E N?	
<i>Streptopelia turtur</i>	E	N M	N M	
<i>Myiopsitta monachus</i>	(R)	E Re I	E No	
<i>Psittacula krameri</i>	(R)	E Re I	E No	
<i>Clamator glandarius</i>	E	Ne M	N	
<i>Cuculus canorus</i>	E	N M	N	
<i>Tyto alba</i>	R	R M	R I	
<i>Otus scops</i>	E	N M le	N le	
<i>Bubo bubo</i>	R	Rm	R	
<i>Athene noctua</i>	R	R I	R	
<i>Strix aluco</i>	R	R	R	
<i>Asio otus</i>	R	Ne I	R	
<i>Asio flammeus</i>	I	M le	I	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	E	N M	Me	
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	E	N! M	Ne M	
<i>Apus apus</i>	E	Na Ma	Na M	



Nombre científico	Estatus Península	Estatus Com. Valenciana	Estatus Alicante	Otros datos e informaciones
<i>Apus pallidus</i>	E	Nc! M	N M	
<i>Apus melba</i>	E	N M	N M	
<i>Alcedo atthis</i>	R	R I	N M I	
<i>Merops apiaster</i>	E	N M	N M	
<i>Coracias garrulus</i>	E	Nr!! Mr	N	
<i>Upupa epops</i>	R	N Im	R I	
<i>Jynx torquilla</i>	E	N M le	M I N	
<i>Picus viridis</i>	R	R	R	
<i>Dendrocopos major</i>	R	R	Re	
<i>Chersophilus duponti</i>	R	Rr!! ?	V	
<i>Melanocorypha calandra</i>	R	R! I	R	
<i>Calandrella brachydactyla</i>	E	N M	N	
<i>Calandrella rufescens</i>	R	R!	R	
<i>Galerida cristata</i>	R	Ra	R	
<i>Galerida theklae</i>	R	R	R	
<i>Lullula arborea</i>	R	R I	N I	
<i>Alauda arvensis</i>	R	R M I	N I	
<i>Riparia riparia</i>	E	Nc M	N M	
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	R	N Im	R I	
<i>Hirundo rustica</i>	E	Na Ma le	N M	
<i>Hirundo daurica</i>	E	Ne Me lo	N M	
<i>Delichon urbica</i>	E	Na Ma Ir	N M	
<i>Anthus novaeseelandiae</i>	*p	+D1	D(homol?)	No aceptada CIR
<i>Anthus campestris</i>	E	N M	N	
<i>Anthus trivialis</i>	E	Ma	M I	
<i>Anthus pratensis</i>	I	Ma la	I	
<i>Anthus cervinus</i>	p	Mr	D	
<i>Anthus petrosus</i>	i	Mr Ir	Ir Mr	
<i>Anthus spinoletta</i>	R	M Ic	M Im	
<i>Motacilla flava</i>	E	N Ma	N M	
<i>Motacilla cinerea</i>	R	R I	R M I	
<i>Motacilla alba</i>	R	Ra la	R M la	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	R	R I	N R I	
<i>Prunella modularis</i>	R	Re! M I	I	
<i>Prunella collaris</i>	R	Me le	I	
<i>Cercotrichas galactotes</i>	E	Nm Me	N	
<i>Erethacus rubecula</i>	R	R Ma la	R Ic	
<i>Luscinia megarhynchos</i>	E	N M	N	
<i>Luscinia svecica</i>	R	M Im	M I	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	R	N M la	R I M	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	E	Ne! M lo	Me	
<i>Saxicola rubetra</i>	E	M lo	M	
<i>Saxicola torquata</i>	R	R M la	R	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	E	N Ma	N M	
<i>Oenanthe hispanica</i>	E	N M	N M	
<i>Oenanthe leucura</i>	R	R	R	
<i>Monticola saxatilis</i>	E	N! M	Ne	
<i>Monticola solitarius</i>	R	R	R I	
<i>Turdus torquatus</i>	R	M le?	M	
<i>Turdus merula</i>	R	Ra	R	

Nombre científico	Estatus Península	Estatus Com. Valenciana	Estatus Alicante	Otros datos e informaciones
<i>Turdus pilaris</i>	I	Ir?	D	
<i>Turdus philomelos</i>	R	Rr!! Ma la	M I	
<i>Turdus iliacus</i>	I	M I	I	
<i>Turdus viscivorus</i>	R	R I	R	
<i>Cettia cetti</i>	R	R I	R Ic	
<i>Cisticola juncidis</i>	R	R	R	
<i>Locustella naevia</i>	E	Mr	Me	
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	R	Rm! M	R Im	
<i>Acrocephalus paludicola</i>	P	Mr	Mo	
<i>Acrocephalus agricola</i>			D	
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	P	Me	Me	
<i>Acrocephalus palustris</i>	*p	+ Mo ?	D	
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	E	N M	Nc M	
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	E	N M	Nc M	
<i>Hippolais pallida</i>	E	Ne! Me ?	Me	
<i>Hippolais polyglotta</i>	E	N M	N	
<i>Sylvia sarda</i>	(0)	+ D1 ?	¿?	Dudoso, confusión jov. <i>S. undata</i>
<i>Sylvia undata</i>	R	R I	N I	
<i>Sylvia conspicillata</i>	R	N M	N	
<i>Sylvia cantillans</i>	E	N M	N M	
<i>Sylvia melanocephala</i>	R	Ra	R	
<i>Sylvia hortensis</i>	E	Ne! Me ?	Ne M	
<i>Sylvia curruca</i>	p	Mr	D?	Información insuficiente
<i>Sylvia communis</i>	E	N M	N M	
<i>Sylvia borin</i>	E	Ne!! M	Me No	
<i>Sylvia atricapilla</i>	R	R Ma la	R I	
<i>Phylloscopus bonelli</i>	E	N M	N M	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	P	Me ?	M	
<i>Phylloscopus collybita</i>	R	Ma la	la Ma	Algunos ex. podrían ser <i>P. brehmii</i>
<i>Phylloscopus brehmii</i>	E		Dudoso	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	P	Ma	Ma	
<i>Regulus regulus</i>	R	I	I	
<i>Regulus ignicapillus</i>	R	R I	R I	
<i>Muscicapa striata</i>	E	N M	N M	
<i>Ficedula parva</i>	A	D2	D	
<i>Ficedula hypoleuca</i>	E	Ne! M	Nr M	
<i>Panurus biarmicus</i>	R	Rm!!	R	
<i>Aegithalos caudatus</i>	R	R I	R	
<i>Parus cristatus</i>	R	R	R I	
<i>Parus ater</i>	R	R	R I	
<i>Parus caeruleus</i>	R	R I	V No	
<i>Parus major</i>	R	Ra	R	
<i>Sitta europaea</i>	R	R! ?	V	
<i>Tichodroma muraria</i>	R	Mr Ir	Ie	
<i>Certhia brachydactyla</i>	R	R	R	
<i>Remiz pendulinus</i>	R	Ne!! M I	No M I	
<i>Oriolus oriolus</i>	E	N M	N M	
<i>Lanius collurio</i>	E	Mr	D	
<i>Lanius minor</i>	E	Mr	D	
<i>Lanius excubitor</i>	R	Recientemente diferenciado en 2 esp.: <i>L. excubitor</i> y <i>L. meridionalis</i>		



Nombre científico	Estatus Península	Estatus Com. Valenciana	Estatus Alicante	Otros datos e informaciones
<i>Lanius meridionalis</i>		R	R	
<i>Lanius senator</i>	E	Na M	N M	
<i>Garrulus glandarius</i>	R	R	R	
<i>Pica pica</i>	R	R	R	
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	R	R I	R	
<i>Corvus monedula</i>	R	R I	R	
<i>Corvus corone</i>	R	R	R No	
<i>Corvus corax</i>	R	R I	R	
<i>Sturnus vulgaris</i>	R	Ia	M Ia	
<i>Sturnus unicolor</i>	R	Ra	R	
<i>Sturnus roseus</i>	A	D1	D	
<i>Passer domesticus</i>	R	Ra	R	
<i>Passer hispaniolensis</i>	R		D	
<i>Passer montanus</i>	R	R	R Nm	
<i>Petronia petronia</i>	R	R	R	
<i>Estrilda melpoda</i>		E	E	
<i>Estrilda astrild</i>	(R)	E No!!	E	
<i>Estrilda troglodytes</i>	(R)		E	
<i>Amandava amandava</i>	(R)	E	E	
<i>Fringilla coelebs</i>	R	R Ia	N M I	
<i>Fringilla montifringilla</i>	I	Me le ?	Ie	
<i>Serinus serinus</i>	R	Ra	R Mc Ic	
<i>Serinus canarius</i>			E	
<i>Serinus citrinella</i>	R	Re!!	V?	
<i>Carduelis chloris</i>	R	Ra	R Mc Ic	
<i>Carduelis carduelis</i>	R	Ra	R Mc Ic	
<i>Carduelis spinus</i>	I	No!! Ia	M I	
<i>Carduelis cannabina</i>	R	R Ia	R M I	
<i>Loxia curvirostra</i>	R	R I	R I	
<i>Bucanetes githagineus</i>	R	Vr	Ne	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	R	Me le	Io	
<i>Emberiza citrinella</i>	R	Ie	Ir	
<i>Emberiza cirrus</i>	R	R I	R M I	
<i>Emberiza cia</i>	R	R	R M I	
<i>Emberiza hortulana</i>	E	N! M	M	
<i>Emberiza schoeniclus</i>	R	Nr!! M I	Ic	
<i>Miliaria calandra</i>	R	R	R	
<i>Aratinga fhanday</i>			E	
<i>Ploceus capitalis</i>			E	
<i>Euplectes afer</i>			E	



Alcaudón común
Dibuja: ©Óscar Aldeguez

✈ Estatus peninsular

Estatus	Comentarios
R	Residente: habitual a lo largo de todo el año
r	Residente, pero con efectivos sumamente reducidos
(R)	Residente, con poblaciones resultado de introducciones o escapes
E	Estival: habitual en primavera y verano
I	Invernante: habitual en otoño e invierno
i	Invernante, con cifras muy reducidas
P	De paso: habitual durante los pasos migratorios, normalmente en primavera y otoño
p	De paso, con cifras muy reducidas y quizá no todos los años
A	Accidental o divagante, con más de cinco registros fiables
(n)	Accidental, con cinco o menos registros fiables (n= número de los que han sido aceptados por el Comité Ibérico de Rarezas de la SEO hasta 1992)
?	Especies en las que buena parte de las citas podría tener origen artificial (aves transportadas o escapadas de cautividad)
*	Especies cuyas citas, al igual que las de todas las accidentales o las no señaladas todavía en la Península, es conveniente que sean estudiadas y aceptadas por el Comité Ibérico de Rarezas de SEO antes de su publicación




Curruca cabecinegra
Dibujo: ©Óscar Aldeguer

✈ Estatus en la Comunidad Valenciana* y para la provincia de Alicante

Estatus	Comentarios
R	Residente: especie nidificante (salvo indicado como "no repr.") y presente todo el año
N	Nidificante: especie nidificante no presente todo el año, pero si al menos entre el 21.V y el 20.VII
M	Migrante: especie presente al menos durante sus desplazamientos prenupciales (del 15.II al 20.V) y/o postnupciales (del 21.VII al 30XI)
I	Invernante: especie presente durante la invernada, al menos entre el 1.XII y 15.II
V	Visitante: especie dispersa, sin patrón fenológico concreto, desde poblaciones próximas a la CV
D	Divagante: especie fuera de su ámbito geográfico habitual (D1= citado menos de 5 veces desde 1980 y D2= citado más de 5 veces desde 1980)
E	Escapado de cautividad
?	Indica falta de información o estatus dudoso
+	Acompaña a las especies divagantes reclamadas por observadores pero no sometidas todavía al proceso de homologación del Comité de Rarezas de la SEO
o	Ocasional: especie que nidifica o se cita muy irregularmente, pudiéndose no verificarse su reproducción o presencia durante años
r	Raro: 0-10 parejas nidificantes o individuos censados anualmente
e	Escaso: 11-100 parejas nidificantes o individuos censados anualmente
m	Moderado: 101-1.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente
c	Común: 1001-10.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente
a	Abundante: más de 10.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente, aplicado también a especies paseriformes cuyas poblaciones no se han calculado pero se estiman como abundantes
!!	Muy localizado: especies nidificantes sólo en 1-3 localidades
!	Localizado: especie nidificante entre 4-10 localidades

(*) Datos para la Comunidad Valenciana de los Anuarios Ornitológicos de la Com. Valenciana





Águila pescadora
Dibujo © Oscar Aldeguez

 La Canastera (*Glareola pratincola*) en los humedales del Sur de Alicante, 1999

Sergio Arroyo Morcillo, Luis Fidel Sarmiento y Antonio Jacobo Ramos Sánchez

Introducción

La Canastera (*Glareola pratincola*) es un ave de mediano tamaño perteneciente al orden Charadriiforme, familia Glareolidae. Sus efectivos se distribuyen a lo largo del Mediterráneo (sur de Europa, Magreb y Oriente Próximo), llegando a Paquistán y Kazajistán por el este, y en África subsahariana desde Nigeria, en la zona más occidental, hasta Somalia y Kenia en el otro extremo del continente, aunque hay pocos datos sobre la dispersión de la especie al sur del Sahara (Cramp y Simmons, 1980).

En nuestro país, las poblaciones más importantes las encontramos en el sudoeste peninsular, con más de 3.000 parejas en Andalucía occidental y algo menos de 500 en Extremadura (Díaz, Asensio y Tellería, 1996).

Este original limícola proveniente de África, donde pasa el invierno, acude puntualmente cada primavera a las zonas húmedas del Baix Vinalopó y Baix Segura, utilizando éstas o los campos de cultivo aledaños para llevar a cabo su ciclo reproductor. En estos humedales satisface sus necesidades alimentarias con la gran cantidad de insectos, tanto voladores como terrestres, que ofrecen estos ecosistemas, y encuentra lugares adecuados donde instalar sus colonias de nidificación. Estas colonias de cría se sitúan preferentemente en zonas de saladar malo, sobre suelos salinos y secos, así como en los cultivos adyacentes a éstas, que históricamente fueron saladares antes de su puesta en cultivo.

Es una especie catalogada de "interés especial" en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Este estudio ha sido realizado por miembros de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (A.H.S.A.), en el marco del programa VOLCAM, subvencionado por la CAM.



Canastera
Dibujo: ©Luis Segorb

Ante los escasos, y preocupantes, datos recientes, que indicaban un importante descenso en el número de parejas reproductoras, se consideró la necesidad de realizar una revisión actualizada de la situación de la Canastera en los humedales del sur de Alicante. Con esta finalidad se plantearon los siguientes objetivos:

- *Localizar las áreas de cría.
- *Cuantificar el número de parejas reproductoras.
- *Conocer las zonas de alimentación.
- *Definir la problemática de la especie.
- *Realizar una campaña divulgativa para la protección de la Canastera.

Material y métodos

El área de estudio abarca los humedales del sur de la provincia de Alicante, desarrollándose el presente trabajo entre los meses de marzo a septiembre de 1999. Se utilizaron telescopios 20-60 x 80 y prismáticos 10 x 50. Se diseñó un cuestionario para facilitar la toma de notas de campo a los colaboradores, localizando las colonias en mapas 1:25.000. Todas las observaciones se realizaron desde las carreteras o pistas adyacentes para no molestar a las aves. A partir de la llegada de los primeros ejemplares, a finales del mes de marzo, se comenzó a prospectar diversas áreas para situar

las distintas zonas de cría. Una vez controladas éstas, se realizó una media de una visita semanal a cada colonia, aunque en un caso no se pudo llevar a cabo por hallarse dentro de un coto de caza de acceso restringido. Además, se recabaron datos sobre las zonas de alimentación, comportamiento (cortejo y estrategia anti-depredadores), especies asociadas y concentraciones postnupciales.

Este trabajo tendrá una continuidad en el tiempo para conocer la evolución de la especie en sucesivas épocas reproductoras.

Resultados

Se contabilizan 93 pp localizadas en 6 puntos de nidificación, situados en 3 humedales diferentes: El primero de ellos, El Hondo de Amorós (1), es un humedal sin figura de protección en la actualidad, salvo la que le confiere su inclusión en el Proyecto de Catálogo de Zonas Húmedas presentado por la Consellería de Medio Ambiente, actualmente en revisión. Los otros cinco puntos se ubican en dos Parques Naturales: El P.N. de El Hondo (3) y el P.N. de las Salinas de Santa Pola (2), destacando especialmente la población nidificante del P.N. de El Hondo.

HONDO DE AMORÓS

1. Colonia del Hondo de Amorós:

El Hondo de Ámoros es una pequeña zona húmeda situada en el término municipal de San Fulgencio, cuyo origen está ligado con los extensos dominios que antaño ocupaba la antigua Albufera de Elx. Se utiliza como coto de caza y pesca. Su agua proviene del azarbe del Convenio. Posee una superficie de 36 hectáreas aproximadamente, encontrándose en la actualidad dividida en dos grandes lagunas por unas motas de tierra. El perímetro de las charcas está densamente poblado de carrizo (*Phragmites communis*), y en sus inmediaciones existen huertas y cultivos cerealistas.

Las Canasteras iniciaron la reproducción a partir de mediados de abril, instalándose cinco parejas en una de las motas que separa las lagunas, completándola con éxito. Durante el mes de junio la charca sureste quedó prácticamente seca, lo que aprovecharon siete parejas más para emplazar sus nidos en el fondo de ésta. Cuando todavía estaban varias parejas incubando, los propietarios llenaron de nuevo las charcas frustrando el intento de reproducción de algunas de ellas.

TOTAL DE PAREJAS: 12

PARQUE NATURAL DE EL HONDO

2. Colonia de Vistabella:

Se localiza al sur del P.N. de El Hondo. Es una colonia de gran tamaño -y la más numerosa de todas-, ocupando un territorio aproximado de 5 km de largo por 1 km de ancho. Una carretera la atraviesa longitudinalmente, separando una extensa zona cultivada (alfalfa y cereales) de otra de más reducidas dimensiones, de saladar. Aquí hemos diferenciado tres subcolonias distintas; una de ellas se instala en el saladar y las restantes en los campos de cultivo cerealista (trigo y avena). Esta distinción se debe a la distancia que hay entre los distintos núcleos, pero a la vez la hemos considerado una gran colonia al observar con frecuencia grandes grupos formados por miembros de las distintas subcolonias, y al hecho de que el grueso de los ejemplares de esta colonia pueden variar su ubicación en uno u otro lugar en función de las diversas circunstancias interanuales. Durante la reproducción se cosecharon los campos de cultivo, que junto con el trasiego de rebaños, principalmente de cabras, malograron gran parte de las nidadas. Al otro lado de la carretera, en el saladar, las frecuentes incursiones de perros cimarrones diezmaron a pollos y huevos.

TOTAL DE PAREJAS: 50

3. Colonia de la Reserva:

Esta colonia se desplaza dentro del P. N., a lo largo

de los años, en distintas charcas o embalses que se encuentren secas coincidiendo con el periodo reproductor. Durante este año 1.999 se ha instalado en la Charca Sur Este (Reserva) del Parque. (José Luis Echevarría Escuder, Marcos Ferrández Sempere, Cristina Fuentes Sendín, com. pers.).

TOTAL DE PAREJAS: 10

4. Colonia de La Raja:

Situada al norte del coto de caza de La Raja (sector oeste del P.N.), la colonia se estableció en un principio sobre unos campos recién labrados. Cuando varias parejas estaban ya incubando sus huevos el terreno fue regado "a manta", trasladándose las aves a un cercano campo de pequeñas palmeras (50 cm de altura) y a una zona de saladar separadas por el azarbe Orones, donde realizaron una puesta de reposición, sin apreciarse más problemas a partir de ese momento.

TOTAL DE PAREJAS: 15

PARQUE NATURAL DE LAS SALINAS DE SANTA POLA

5. Colonia de Santa Fé:

Esta colonia se encontraba en una zona no inundada de saladar, en una de las charcas del coto Santa Fe, localizado al noroeste de las Salinas. No se detectaron problemas en esta colonia, aunque no se le pudo realizar un seguimiento continuado como al resto de núcleos nidificantes.

TOTAL DE PAREJAS: 6

6. Intentos fallidos de nidificación en "Colonia Oeste":

En saladares de la zona oeste de las Salinas se instalan de forma irregular un número variable de parejas, que además no ocupan -cuando nidifican- los mismos sectores de saladar, dificultando su detección así como su seguimiento. Como intentos fallidos de nidificación se han calificado: la presencia de cinco ejemplares y

un nido en la confluencia del río Vinalopó con el azarbe de D'Alt, que no tuvo continuidad, y la observación de concentraciones de hasta 16 aves en otra zona de saladar durante la primera quincena de Abril.

Discusión

Las conclusiones del estudio arrojan un balance agríndice, porque si bien el número total de parejas censadas supera ampliamente los datos que manejábamos con anterioridad (18 pp, SEO 97), la presión a la que se ve sometida la Canastera en la zona nos hace temer muy seriamente por su futuro en nuestras comarcas. Las limitaciones de este estudio nos impiden dar cifras exactas del éxito reproductor de la especie durante esta primavera/verano de 1999, pero los datos observados son realmente preocupantes. No obstante, es posible que se pueda detener el inminente declive de esta bella especie con medidas como: 1. Controlar la población de perros asilvestrados en el entorno del P.N. de El Hondo, 2. Cerrar el perímetro del saladar sureste en El Hondo, propiedad de la Consellería de Medio Ambiente, donde se instala una parte de la colonia más importante. 3. Localización y seguimiento de las colonias ubicadas en campos de cultivo, contactando con el/los propietarios de las parcelas para que se retrase su labranza el tiempo necesario y se evite el pastoreo en estas zonas, incluyendo aquí las medidas de indemnización precisas por parte de la CMA.

Agradecimientos

Por su colaboración en este estudio: José Luis Echevarría Escuder, Marcos Ferrández Sempere, Cristina Fuentes Sendín, Rosana Martínez Fitor, Adolfo J. Quiles Gómez, Miguel Ángel Pavón García, Estación Ornitológica de la Albufera.

Bibliografía

- ✦ BEAMAN, M. & MADGE, S. (1998). Aves de Europa, norte de África y próximo oriente. Ediciones Omega. Barcelona.
- ✦ CRAMP, S. SIMMONS, K. E. L. (Eds) (1982). The birds of Western Palearctic. Vol III.
- ✦ DIAZ, M.; ASENSIO, B.; TELLERÍA, J. L. (1996). Aves Ibéricas I No Paseriformes. J. M. Reyero Editor. Madrid.
- ✦ DIES, J. I. & DIES, B. (eds.). Anuarios ornitológicos de la Comunidad Valenciana años 1988 a 1994. Estació ornitològica L'Albufera. Valencia.
- ✦ DOLZ, J. C.; DIES, J. I. & BELLIVRE, J. (1990). Las colonias de Canastera en la Comunidad Valenciana. MEDI NATURAL. Volumen 1: 69 - 80.
- ✦ NAVARRO MEDINA, J. D. (1988). Estudio ornitológico de "El Hondo". Caja de Ahorros del Mediterráneo. Alicante.
- ✦ PALMER, M. (1993). A birdwatching guide to the Costa Blanca. Arlequin publications. Chelmsford, Essex.
- ✦ PUJOL FRUCTUOSO, J. A. & CALVO SENDIN, J. F. (1997). TORREVIEJA. Cuadernos para su estudio. I MEDIO NATURAL. Excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja. Alicante.
- ✦ RAMOS, A. J. & FIDEL, L. (1999). Las aves de los humedales del sur de Alicante y su entorno. Editorial Club Universitario. Alicante.
- ✦ SENDÍN GIL, CARLOS. (1996). Las poblaciones de aves acuáticas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola: Composición, diversidad y evolución. Bases para la gestión de la biocenosis. Inédito.
- ✦ SEO/BirdLife. Atlas de las aves de España (1975-1995). (1997). Lynx edicions. Barcelona.
- ✦ URIOS, V.; ESCOBAR, J.V.; PARDO, R.; & GÓMEZ, J.A. (1991). Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. Valencia.
- ✦ VARIOS AUTORES. Crónica Ornitológica de LA MATRUCA (Revista de la Asociación de los Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, números 1 al 10).



Canastera
Foto: ©Luis Fidel



Notas para una historia de la Ornitología Alicantina

Abilio Reig Ferrer



Las aves han asombrado desde siempre al hombre. No sorprende, pues, que el estudio y disfrute de las aves hayan sido actividades estrechamente ligadas al comportamiento del hombre y constituyan uno de los elementos nucleares de nuestra calidad de vida. Esta vinculación y atracción se debe a diversas razones; así, la capacidad única de las aves de escapar de la ley de la gravedad de los cuerpos físicos; la versatilidad, elegancia y eficacia de sus desplazamientos aéreos; su número y su conspicuidad; su potencial utilidad gastronómica, cinegética o felicitaria; sus misteriosas apariciones y desapariciones estacionales; o su notoria vocalidad, han sido aspectos más que suficientes para sorprendernos y fascinarnos.

Tradicionalmente, las aves han servido, desde un punto de vista antropocéntrico, a diversos fines desde los utilitarios, líricos, simbólicos, o místicos hasta los más recientes de estudio científico. El propósito de este trabajo consiste en pergeñar, a vuelo pluma, un bosquejo de algunos documentos u observaciones de posible interés para una historia de la ornitología alicantina. La tarea no es fácil. Disponemos de muy pocos testimonios históricos, desde pinturas o dibujos rupestres hasta documentos o joyas bibliográficas, que atestiguan esta poderosa atracción que desde el origen de los tiempos el hombre ha sentido por y con las aves. Más pobre, si cabe, son las referencias ornitológicas referidas a las tierras y aguas alicantinas. Con todo, concédasenos el atrevimiento de apuntalar estas pobres notas y hacerlas volar.

La avifauna alicantina, en esta línea, apenas ha sido estudiada desde un punto de vista histórico (Maluquer Sostres, 1986). A pesar de su antiguo pasado, disponemos de escasos documentos y de muy pocas publicaciones que ates-

*¿Cuál de todas las cosas que giran a su alrededor
debe apreciar más el hombre?
Se podría enamorar de un ave
que pasa volando y ya se ha marchado.
(Meditaciones, Marco Aurelio)*

tigüen lo que sin duda fue un rico y variado paraíso ornítico. Las vecinas Valencia y Murcia cuentan, no obstante, con un mayor número de testimonios escritos relativos a su avifauna, aunque también han sido pobremente estudiados y apenas publicados. Nuestro objetivo aquí, y a través de estas breves notas, va a consistir en mostrar unos cuantos trazos de su pasado, de su rico presente y de su prometedor futuro. Para ello, dividiremos estos apuntes en cuatro apartados. En el primero, abordaremos la ornitología alicantina anterior a la publicación de los considerados primeros trabajos científicos a mediados del siglo XIX. En el segundo apartado, exploraremos la ornitología alicantina hasta la creación de la Sociedad Española de Ornitología en 1954. En el tercero, describiremos brevemente la situación de la ornitología alicantina hasta la publicación del primer Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad Valenciana. Por último, haremos una breve referencia a la situación reciente. Atenderemos, quizás en exceso, a las citas bibliográficas más antiguas prestando atención especial a textos ilustrativos, y copiando preponderantemente el "espejuelo" más llamativo de los diversos documentos, por lo que hago propia aquella frase de Santa Teresa en su Castillo Interior o las Moradas: "...porque así como los pájaros que enseñan a hablar no saben más de lo que les muestran u oyen, y esto repiten muchas veces, soy yo, al pie de la letra".

Vorläufige Zusammenstellung
der Vögel Spaniens
mit kritischer Benützung der bisher von spanischen Ornithologen
herausgegebenen Verzeichnisse.

Von Dr. A. E. Reig.

TT. L. meridionalis, Temm. Der südliche Raubwürger.
Spanisch: Wie der vorige, in Aleria auch Castellan (cast.) in Andalusien Alcazón
brannt.
Überall in Süd- und Mittelspanien, wo er gefunden wird, selten
und einzeln; am häufigsten auch in ausgedehnten Olivenpflanzungen und
Gehäusen. Von uns wurde er zuerst bei Alicante, sodann bei
Aleria, Granada und Madrid gesehen und bestätigt belegt. Ein Exemplar,
welches bei Aleria geschossen worden war, fand sich in einer dortigen
Privatsammlung.

Los albores de la ornitología alicantina

La ornitología alicantina *avant-la-lettre*

La reconstrucción de la evolución histórica de la avifauna alicantina es una tarea todavía por hacer. El estudio del escaso registro fósil ornítico, de las diversas pinturas rupestres en abrigos y cuevas, o de los restos de los abundantes yacimientos arqueológicos, puede aportar en el futuro información de notable interés. Alrededor del 1500 antes de Cristo, y en el conocido ahora como yacimiento del Cabezo Redondo (Villena, Alicante), cerca de la antigua y desaparecida laguna de Villena, Soler (1985) nota la presencia de flamencos, zampullines, espátulas, ánsares, tarros, ánades, cercetas, fochas y agujas en la laguna y de lechuzas campestras, grullas y garzas en los pastizales del entorno de la laguna. Águilas, cuervos, palomas y milanos, serían otras aves presentes en aquellas tierras. Las escenas pintadas sobre vasos ibéricos testimonian, una vez más, la presencia de aves en la mirada humana.

Otra expresión de interés histórico-ornítico consiste en estudiar los diversos mosaicos romanos existentes en varias localidades alicantinas, y principalmente L'Alcudia de Elx. En alguno de estos mosaicos aparecen determinadas aves que pueden ayudar al conocimiento de los albores de la ornitología alicantina.

La mirada venatoria: la cetrería en las tierras alicantinas.

No deja de ser curioso comprobar cómo la primera mirada humana a las aves consiste en su captura y aprovechamiento como fuente de alimentación y de diversión. La caza de aves con todo tipo de trampas, lazos, ardides y con las propias aves, ha sido y es una práctica omnipresente en estas tierras. Aunque se ha escrito que en España, un ave es un ser comestible o no comestible, y si no lo es, resulta inconcebible que nadie se preocupe de él, parece ser, a la vista de la literatura y costumbres, que el español se lo comía todo.

Una de las actividades con las que el hombre parece haber experimentado mayor placer ha

sido la cetrería. La cetrería llegó a ser, para la clase alta y para los poderosos, la ocupación felicitaria por excelencia. La cetrería nace para tomar lo libre con lo encadenado. Y en las tierras alicantinas contamos con algunos documentos que prueban el arraigo de esta práctica y tradición entre nosotros. Según recoge el historiador Torres Fontes, un halconero del rey Jaime II, de nombre Oriol, vino a estas tierras ya en el año 1303 <<per aportar falcons polls>>. Un año después, Ramón Palau, otro halconero, realizaba un viaje a la ciudad de Alicante para obtener <<facolls novells>>. Mosén Pedro Bellot refiere en sus Anales de Orihuela las elevadas recompensas que recibían aquellos paisanos que hallaban los halcones perdidos de los señores oriolanos. Sigue mencionado Torres Fontes, basándose en el texto del Legajo 3726/9 del Archivo Municipal de Murcia, que:

<<El valor e importancia de estos halcones se pone también de manifiesto en una carta que en 1446 envió <<Pere de Rius donzell, surogat de governador del regno de Valencia dita Sixona>> al concejo de Murcia. Notificaba que se le había quejado el noble don Pedro de Rocafull, de que un escudero suyo había salido a cazar en el término de Orihuela <<ab hum falquo timicench>> y se le perdió. Supo después que lo tenía el regidor Ruy González de Arróniz, pues lo vió en su mano y reconoció, y aunque su escudero se lo había pedido, no quiso devolverlo. Rogaba la intervención concejil, pues el halcón de don Pedro de Rocafull había sido estimado en trescientos florines, lo que al cambio oficial en Castilla suponía unos 15.300 maravedís de dos blancas>> (Torres Fontes, 1961: 17-18).

Entretanto, el Infante y posterior Príncipe don Juan Manuel (1282 - 1349) aportaría en su Libro de la Caza (circa 1325) datos inequívocos de la importancia de las riberas del río Vinalopó como tierras apreciadas para la caza de aves con halcones:

<<En Villena hay el mejor lugar de todas las cazas de todo el reino de Murcia, y aun dice don Juan que pocos lugares vio él nunca tan buenos de todas las cazas, que desde la parte alta del alcázar se verá cazar garzas, ánades y grullas con

halcones y con azores perdices, codornices y otras aves que llaman flamencos, que son hermosas aves y muy fáciles de cazar, si no porque son muy difíciles de sacar del agua, pues nunca están sino en muy gran laguna de agua salada; y liebres y conejos. Además desde el mismo alcázar se verán correr montes de jabalíes, de ciervos y de cabras montesas. Y dice don Juan que todas estas cazas hizo él yendo a ojo del alcázar, y dice que tan cerca mataban los jabalíes, que desde el alcázar podían muy bien conocer por la cara el que llegaba antes a él. Y dice que si no fuera porque hay muchas águilas y porque en algunos lugares de la huerta hay muy malos pasos, que él diría que era el mejor lugar de caza que él nunca viera.

En Yecla y en Sax no hay otra ribera sino la que viene de Villena y no es muy buena ni de buenos pasos, pero desde Villena hasta Sax en algunos lugares hay garzas y ánades. Desde Sax hasta Elda va el arroyo que viene de Villena, y va por lugares muy estrechos de sierras y de montes y no es buen lugar de caza para halcones; y de Elda hacia abajo, hasta la huerta de Novelda, no hay lugar de caza para halcones. Desde Novelda hasta Aspe, por ventura, hay algunas ánades y alguna garza.

En Nepod [Monforte] a veces hay garza y ánades en la fuente.

En Elche a veces acude la garza a la ribera y hay algunas ánades y hay muchas grullas y buen lugar para cazarlas.

En Alvente [Alicante] no hay otra ribera sino la mar, y en los almarjales en las lagunas cerca del puerto de Santa Pola, hay muchas garzas y muchos bítors, mas son muy difíciles de tomar y no se pueden tomar con halcones, sino la manera que dirá más adelante cómo caza don Juan las garzas en el mar del puerto de Cartagena.

Las lagunas y almarjales de Los Barcos, de Catral, de Almoradí, de Ladaxa y de Cabezueros, que dicen de don Manuel, y en la acequia que don Manuel mandó hacer, en Albatera, en todos estos lugares hay muchas garzas y muchos bítors, mas son muy difíciles de tomar con halcones. Y en las orillas de estos almarjales, hacia Crevillente, a veces se hallan ánades en lugares que se pueden cazar con halcones, y en todo ese campo hay muchas grullas y buen lugar para cazarlas.

En Guardamar no hay otra ribera sino la mar y el río Segura, y son muy difíciles de cazar las garzas con halcones, y no hay grullas ni ánades en lugar que se puedan cazar.

En Orihuela hay muchas garzas en el río Segura, y a veces se hallan en una acequia que está fuera de la villa, que está a la puerta hacia donde van a Murcia. Y dice don Juan que ya la halló él allí, y le costó muy cara, que queriendo acorrer a los halcones, cayó con él un mulo de modo que lo tuvo que matar.

De Orihuela hasta Murcia, el río Segura arriba, hay muchas garzas, mas son muy difíciles de matar con halcones porque el río es muy grande y no hay ningún paso y está muy arbolado y hay muchas acequias>> (versión de Fradejas Rueda, 1990: 142-144).

Esta mirada cetrera permitió, sin lugar a dudas, un primer estudio empírico de las aves. Repárese, como muestra palmaria de ello, *De Arte Venandi cum Avibus* del emperador Frederick II von Hohenstaufen (1194-1250), del cual la Biblioteca de la Universidad de Valencia posee uno de los escasísimos y primeros manuscritos de 6 libros (véase, Wood y Fyfe, 1943). Hay que notar que fue el empirismo y el contacto con la naturaleza, más que el estudio formal llevado a cabo por unos pocos, lo que inspiró la práctica de la historia natural en general y de la ornitología en particular.

Tampoco se le escapó al canciller Pedro López de Ayala la importante observación de la migración de codornices desde la isla de Ibiza al cabo de San Martín (Alicante). Así, en el *Libro de caça de las aves*, o *Libro de la caza de las aves*, et de sus plumages, et dolencias, et malecinamientos del canciller, traducción en gran parte del *Livro de Falcoaria* del portugués Pero Menino, podemos leer:

<<Otro sí, yendo el rey Don Pedro por la mar, habiendo guerra con el rey de Aragón, travesando del cabo de Martín á Iviza, que es travesa de doce leguas, ví que en la galea de un caballero que llamaban Orejon, bien á seis leguas de tierra, cayó una codorniz, non sé si iban otras, pero dicen que pasan la mar>> (Gutiérrez de la Vega, 1879: 327).

Posteriormente, siete siglos después, tanto Francisco Bernis, en sus *Aves migradoras ibéricas*, como España Payá, en *La Codorniz*, recogen el mismo testimonio de la migración de estas aves por esta misma ruta. Lamentablemente, la muerte de estas avejillas también se producía aquí. El Barón de Cortes, Pascual Frígola, escribe en *El cazador valenciano* al respecto de la codorniz: <<Pero en donde se hacen las grandes matanzas es en el cabo de San Antonio, junto al pueblo de Jávea>> (Barón de Cortes, 1856: 13).

La tradición cetrera por las tierras del antiguo reino de Valencia parece fue considerable hasta bien entrado el siglo XVI. En la extraordinaria biblioteca de caza de Schwerdt, existía una manuscrito del siglo XVI del Vicomte de Roquallbertim denominado *Libre de cetreria compost per lo bescompte de roquallbertim per lo Rmo. S. Lo S. Cadenal de valencia* que testimonia el interés de los nobles valencianos por este tipo de caza (Schwerdt, 1928; vol. II: 353). En este mismo orden de cosas, el valenciano Jerónimo Cortes recoge en un capítulo denominado "De las aves de rapiña que sirven à muchos señores de recreo, y holgança para caçar. Como son Açores, Halcones, Neblis, Baharis, Alfaneques, Bornis, Sacres, Girifaltes, esmerejones, Gavilanes, Alcotanes y Aletos", correspondiente a su libro *Tratado de los animales terrestres, y volatiles, y sus propiedades* (Valencia, 1613, 1615, 1672) las principales aves que se empleaban en la cetrería: Azores (*Accipiter gentilis*), tanto niegos como zahareños; Halcones Neblís (*Falco peregrinus peregrinus*), Baharis (*Falco peregrinus brookei*), Tagarotes (*Falco peregrinus pelegrinoides*), Alfaneques (*Falco biarmicus erlangeri*), Bornis (*Falco biarmicus feldeggii*), Sacres (*Falco cherrug*), Gerifaltes (*Falco rusticolus* y *Falco candicans*, el de roca), Esmerejones (*Falco columbarius aesalon*), Gavilanes (*Accipiter nisus punicus*), Alcotanes (*Falco subbuteo*), y Aletos (*Micrastur semitorquatus* y también *Falco femoralis*) llevados desde Perú y otros puntos de América en barcos hasta Sevilla. Como se ha podido demostrar, *Falco eleonora* no servía para la práctica de la cetrería (Walter, 1979).

Olvidada la práctica cetrera, es recuperada por la figura de Félix Rodríguez de la Fuente (1928-

1980) en el año 1953 cuando de la mano de José Antonio Valverde captura su primer Halcón peregrino en el castillo de Fuensaldaña. Sus primeros artículos aparecerán en 1954 en la revista *Calendario Mensual de Caza y Pesca*, y en 1956 publica otro artículo en el que comenta la práctica de este arte por un grupo de personas en Aspe (Alicante) dirigidos por Manuel Navarro Brufal y Gonzalo Cervera.

Aves de canto y encanto, y otras de recreación o aprovechamiento

Otra tradición antigua, poco conocida y menos pasada a libros, tiene que ver con la captura y tenencia en cautividad de determinadas aves, enjauladas debido a su canto, color u otra utilidad. Un objetivo básico de esta actividad ha consistido en su tenencia como entretenimiento, ocupación ociosa o felicitaria, o como medida para aflojar el arco del estrés y preocupaciones de la vida. El primer libro publicado específicamente para dar a conocer los pájaros de canto es el del italiano, natural de Roma, Cesare Mancini, el cual publica en Milán, en 1575, su delicioso librito *Ammaestramenti per allevare, pascere, et curare gli ucelli. Li quali s'in-gabiano ad uso di cantare*.

En la misma línea, tenemos en España otra muestra en otro maravilloso libro de Juan Bautista Xamarro (¿?-1623) publicado en Madrid en 1604 y titulado *Conocimiento de las diez aves menores de jaula, su canto, enfermedad, cura y cria*. Este autor napolitano, de profesión barbero de los pajes de su majestad y residente en la corte de Madrid, recoge muy bien el porque de la publicación de estos libritos de ornitología doméstica: para la recreación del ánimo y como pasatiempo útil.

Como dice en su prólogo al lector, el sumo hacedor de las cosas inclinó a Xamarro en el conocimiento de aves de jaula:

<<...fue servido de comunicarme a mí, una natural inclinacion al conocimiento de aves pequeñas, de que resultó un cuidadoso exercicio, padre desta cierta esperiencia, con que sirvo a los curiosos y aficionados a estas aves menudas, recreadoras del animo, para que conozcan su propiedad: el modo de sacarlos: el mantenimiento que comen, y el

remedio con que si enferman se curan; cosa no poco difícil de alcanzar, y disponer en este breve tratado, según la corta capacidad de mi ingenio. Solo en esta obra es grandioso el desseo que he tenido de acertar, y entretener al proximo con este honesto exercicio, por divertirle de otro mas inútil, y de entretener a los sabios, que cansados de los continuos estudios, suelen recrearse con el suave canto destas aves>> (Xamarro, 1604).

Las diez aves en cuestión, que se tenían para recreo del ánimo, eran: el ruiseñor, el pardillo, el jilguero, el canario, la calandria, el pinzón, el verdecillo, el lúgano, el verderón, y el roquero solitario. En la segunda edición de este librito (circa 1740) así como en la tercera (1775) se añadirían otras 4 más: el gorrión de Indias, el reyezuelo, el cardenal, y el malvís.

Francisco Suría, natural de Casas de Bárcena (Valencia) y fallecido en Ruzafa en mayo de 1813, publica en Madrid (1796; segunda edición de 1800 aumentada y añadida con los pájaros canarios) una *Instrucción y modo fácil é inteligible para coger y conservar el rey de las aves de cántico, llamado el Ruiseñor, con sus comidas mas propias, y otras circunstancias muy del caso para su duración en las Jaulas*, libro donde hace constar el gran gusto y práctica de los valencianos en la cría de estas aves. Jaulas para la conservación y mantenimiento con idénticas características de las dibujadas en los grabados de este libro, se encuentran todavía en algunas viejas casas de campo de La Vila Joiosa. En Xamarro y en Suría, como anteriormente en el capítulo dedicado al ruiseñor por Gregorio de los Ríos en su *Agricultura de Jardines* (1592), encontramos ya la presencia de variedades o castas en cada uno de los pájaros descritos. Diferencias de tamaño y en cuanto al color (*maneras o suertes de pluma* dirá Xamarro), hace que se describan variedades que tienen, como repercusión principal, diferente calidad de canto, y por tanto mayor o menor aprecio entre los aficionados.

Queda ya dicho que la tenencia de aves enjauladas fue omnipresente en toda la península ibérica y también en estas tierras. Los documentos, sin embargo, son escasos. Y, en ocasiones, son naturalistas u ornitólogos extranjeros

los que informan más pormenorizadamente de esta actividad. Reinaldo Brehm, por ejemplo, comunicaba a su hermano Alfredo para uno de sus libros, *Aves cautivas* (1872), las aves que comúnmente se vendían en los mercados españoles de pájaros. Son tan infrecuentes este tipo de datos que me van a permitir, una vez más, que reproduzca su traducción en este lugar:

<<Hay canarios, jilgueros, verdecillos, verdaderos y pardillos, gorriones comunes, molineros y chillones, pinzones comunes y pinzones reales, escribanos, las muy apreciadas calandrias, y terreras, gangas, muchas codornices y perdices que se utilizan como reclamos para cazar individuos silvestres, urracas, estorninos pintos y negros, mirlos, zorzales, ruiseñores, bisbitas, lavanderas blancas y boyeras. También hay aves del extranjero como papagayos, cardenales, aves del Senegal, sinsontes, y similares. También se venden muchas aves rapaces. Siempre se encontrará mochuelos porque -como en Italia- se les utiliza para cazar aves pequeñas; sus precios varían mucho dependiendo de si se trata de temporada de caza o de cría. Hay muchos gavi-lanes y cernícalos, algún que otro ratonero que siempre se venden como "águila", y a veces encontramos águilas calzadas y búhos; en primavera venden autillos que en la mayoría de los casos son crías que se han cogido directamente de los nidos. En primavera hay muchas especies en los mercados, en parte adultos cogidos en sus nidos, y en parte crías; ahora [1870] se ven muchos cucos y críalos, abubillas y trepadores, picos picapinos, cornejas y cascanueces, algunos rabilargos y, a veces, sisones pequeños. También hay gansos egipcios, patos domésticos y otras aves de parques así como varias especies de palomas. Las aves de España se cazan con varetas, y se meten en jaulas aisladas para venderlas después en los mercados. Sin embargo, les dan muy poco de comer y así solo una de cada diez aves sobrevive. Separan los machos y venden el resto a precios baratísimos, y supongo que este es el motivo por el que a los vendedores no les importa que muchas se mueran de sed. Las aves que no son vendidas en los mercados, se venden más tarde en las esquinas de las calles, aunque la gente que compra estas aves no está muy bien informada porque en la mayoría de los casos las

aves que compran se mueren al día siguiente. Todos los que venden aves españolas también las cazan, con redes, varetas, lazos, reclamos; viajan por todo el país, y los que venden aves no comunes de España o exóticas son extranjeros, en la mayoría de los casos de Savoya. Auténticos mercados de aves solamente existen en Madrid, Barcelona y Cádiz, siendo los dos primeros los más importantes. En Madrid hasta 1869 los vendedores tenían puestos en una plaza en el centro de la ciudad donde vendían las aves y donde las guardaban durante la noche. En las casas de alrededor de la plaza, también había muchas jaulas y en sus plantas bajas había tiendas que vendían aves. En el mencionado año, la Plazuela de Santa Ana fue convertida en un jardín público y quitaron los puestos. Las tiendas en las casas siguen vendiendo aves, pero los vendedores ambulantes tuvieron que retirarse a las afueras de la ciudad, y en el "mercado de la paja" encontraron un sitio donde se les permitió vender sus aves. La cría de aves aún no está muy desarrollada y en los mercados no venden cosas especiales. Algunos aficionados crían canarios, otros tienen otras especies esperando que se reproduzcan, pero, en general, nadie piensa en la reproducción de las aves cazadas, sobre todo porque los españoles no tienen la paciencia necesaria>>.

Esta ornitología doméstica de recreo y solaz era práctica frecuente en todas las clases sociales. Desde la pasión del rey Felipe II por los ruiseñores hasta el más humilde artesano u obrero, la afición a las aves de jaula fue una constante de la vida cotidiana. El ya citado Reinaldo Brehm recoge en su librito *Los canarios, ruiseñores, frailecillos, mirlos negros, pardillos, mirlos roqueños y calándrias*. Su cría, procreación, cuidado y enseñanza, con breves noticias sobre la manera de conocer y curar sus enfermedades (Barcelona, 1890), para el tipo de persona a la que va dirigida la tenencia y cuidado de los pájaros:

<<...á aquellas personas, que no se ven agobiadas por sus ocupaciones diarias, á las que están solas en el mundo, así como también á los matrimonios sin hijos, para que encuentren en el cariño, que les demostrarán sus diminutos pero agradecidos pupilos, alguna recompensa, que

lleve á su corazón las alegrías, que les han sido negadas.

No escribimos estas páginas para el hombre de negocios, que no tiene tiempo para pensar en pájaros y menos aún en cuidarlos: las escribimos para los arriba mencionados, los amigos de los canarios, ruiseñores y otros diminutos cantores, lo mismo que para el artesano, á quien su oficio obliga á permanecer en su casa, sin permitirle observar á nuestros favoritos, libres en la Naturaleza, ni deleitarse escuchando en los campos ó bosques su melodioso canto. El artesano, esclavo del rudo trabajo con que gana su subsistencia, encontrará menos pesadas las horas, que en él emplea, si se rodea de esos alegres y móviles seres, que con sus cantos le distraerán de continuo, haciéndole olvidar con frecuencia, que pasa también como ellos su vida en estrecha jaula>> (pág.11).

Y cierra Reinaldo Brehm este párrafo con una recomendación a los aficionados a la ornitología:

<<De mucha importancia es para el verdadero aficionado á los estudios ornitológicos, tener junto a sí numerosos pájaros vivos, de diferentes especies, y conseguir la procreación de ellos. Así tendrá la ocasión de estudiar cualidades de su naturaleza, que en estado de libertad no le será dado poder observar jamás. Sin embargo, deberá saber distinguir bien, lo que debe atribuirse á la influencia de la domesticación y lo que es innato en ellos>> (pág. 11).

Un claro testimonio de esta pasión lo encontramos en la Alicante del siglo XVIII en la correspondencia entre dos cultos ciudadanos como se puede leer en el *Epistolario* Manuel Martí, deán de Alicante y Felipe Bolifón (Pérez Durá, 1979). La correspondencia epistolar sería entre estos dos protagonistas da paso también a algunos diverticola que aparecen en las cartas VI y XIX.

Manuel Martí (1663-1737) escribe desde Alicante, con fecha de 21 de febrero de 1728 a su amigo el abogado italiano Felipe Bolifón y residente en Madrid, lo siguiente:

<<...Con todo tenemos, para que la naturaleza incapaz de resistir su estudio no desmaye, algu-

nas distracciones honestas de trabajo; ¿cuáles son estas? preguntará. Los ingeniosísimos cantos de las aves hábiles en el trino, las cuales trinando dulcísicamente a instigación de la naturaleza, casi cogidas para este menester, endulzan nuestros oídos con sus sonos. ¿Te ríes? Ya conoces aquello: Los viejos son dos veces niños. Nuestra edad ya va aumentando y por esto de los continuos esfuerzos inclinada al descanso, se recrea maravillosamente con estos entretenimientos. Y no obstante no he llegado con todo a tal grado de locura en la que suelen caer los apasionados por los pájaros. Tengo un graciosísimo ruiñero ciego de nacimiento; el año pasado dejé libre otro que trataba a las mil maravillas, enfermo de una duradera podagra; los ruiñeros suelen enfermar muchas veces de este mal. También tengo tres pajarillos que derivan su nombre de las Islas Canarias, y dos jilgueros; uno de estos, por su exquisito trinar, lo tengo en gran aprecio; el otro por su extraordinaria habilidad y actividad, con la que se prepara la bebida. Maravíllate ante los misterios de la sabia naturaleza. Aquel está unido a un cierto aparato por medio de una cadenita de plata pasada por el pecho (ya que no está encerrado en una jaula): un utensilio en forma de pozo le cuelga a unos dos palmos, con tres hilos de seda. Lo denominaré, si te parece, pozillo. Realmente una taza que usamos para beber chocolate; dentro de ésta hay un pequeño cubo de plata que también está colgado de una cadenilla; en realidad un dedal de los que se usan para coser. Cuantas veces la sed le constriñe, cogiendo la cadenilla con su pico, la lleva hacia arriba, y unida al pie izquierdo de nuevo la empuja hacia sí poco a poco con su piquito; hace tantas veces esto hasta que consigue colocar el dedal en el lugar donde pueda saciar cómodamente su sed. Una vez saciada ésta, lo suelta de sus uñas como el que ha cumplido con su propio trabajo. Realmente éste cae en rápido deslizamiento hacia abajo como si se precipitara en un pozo. ¡Qué admirable habilidad en un pajarillo tan pequeño! Efectivamente esto mismo es lo que afirma Plinio: Los más pequeños de los pájaros, hacen lo que se les manda. Y no solamente con su voz, sino también con sus pies y con su pico que les sirve de manos. Soy un poco impertinente cuando te escribo estas cosas que son muy fútiles; con todo espero que las juzgarás

como tonterías, aunque no desprovistas de gracia, si no a causa de mi estilo tosco y rudo, al menos por la novedad y encanto de lo que te digo...>> (Pérez Durá, 1979:101-102).

Felipe Bolifón contestaba a este trozo de la carta de Martí el 6 de marzo de 1728 lo siguiente: <<...Con todo no sólo no me extraño de que intentes moderar estas austeridades y las restantes prácticas de tu espíritu con esta ornitología tuya, con el tranquilo cuidado de las avecillas y con la muy apacible armonía de las mismas, más aún apruebo y alabo en gran manera tu decisión. Puesto que, como muy bien sabes, también el célebre Catón, por no citar a otros, hombre muy instruido y el más esforzado de todos los romanos y él mismo de costumbres muy austeras, aunque atareado en los grandes y gravísimos asuntos de la República, robustecía su ancianidad con diversiones parecidas...>> (pág. 110-111).

El otro tipo de aves de diversión fueron las palomas. Nuevamente, el valenciano Gerónimo Cortés dedica en su *Libro y Tratado de los Animales terrestres y volátiles, con la historia y propiedad dellos* una historia de los palomos, informando que "las diferencias de Palomos de recreo, y gusto, acerca de los colores, y posturas dellos, son quinze, aunque se hallan muchos más: pero las frequentes, y que mas se usan son las siguientes", presentando a continuación no sólo sus nombres sino describiendo las características de cada uno de ellos. Según este antiguo testimonio los palomos más apreciados eran: Gavianos veros (y tostados), Palomos Vayos, Filacotones, Açafranados, Azules, Blancos, pelo de Rata, o de Raton, Negros, Tenados, Royos, pelo de Canes, Overos, Botafogos, Argentados, Xalandrinos, y Monginos. También comenta los Palomos Bolteadores, recién llegados de Argel (Cortés, 1672: 415-419).

Esta antigua tradición de las tierras valencianas la recogerá posteriormente Antonio Joseph Cavanilles (1745-1804) quien publica una *Historia natural de las palomas domésticas de España y especialmente de Valencia en los Anales de Historia Natural* (1799). En este trabajo

explica las costumbres, enfermedades y aprovechamiento económico de las palomas, las épocas en que éstas se fecundan, ponen y están aptas para reproducirse, así como las clases, órdenes y castas de las palomas domésticas. Tanto este trabajo como otro que publicó en la misma revista y titulado *De la cigüeña blanca* (1802) recibió un estudio detallado de Francisco Bernis que lo publicó en *Ardeola* (Bernis, 1955). No es lugar aquí presentar la extensa bibliografía de colombicultura, por lo que remitimos al lector interesado a las referencias aportadas por Rafael Buch Brage, en el libro de Guillaumón, Gea y Ortega (1995).

En Alicante, lamentablemente persiste todavía la rancia tradición de la captura de aves con diversos tipos de trampas, constituyendo el denominado *parany* un método que provoca una masiva mortandad de especies, fundamentalmente de zorzales (Peiró y Candela, 1995) y de estorninos.

La vieja tradición del ave al servicio del hombre ha perdurado, como podemos comprobar, desde milenios. Como último ejemplo, notemos la conclusión de José de Acosta (1540-1600), en su obra *Historia Natural y Moral de las Indias* (1590), sobre los grandes aprovechamientos que se derivan de las aves:

De manera que de los pájaros no sólo la carne para comer y el canto para deleite, y la pluma para ornato y gala, sino el mismo estiércol es también para el beneficio de la tierra, y todo ordenado del Sumo Hacedor para servicio del hombre, con que el hombre se acordase de ser grato y leal a quien con todo le hace bien (pág. 205).

Los precursores de la ornitología científica

Entre los precursores de la ornitología científica española nos topamos con algunos valencianos. En la Lista de nombres de aves, manuscrito de 128 páginas escritas por el valenciano, natural de Titaguas, Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827), encontramos una serie de denominaciones de aves referidas a poblaciones de las tierras valencianas aunque ninguna recogida en tierras alicantinas. Por su interés apuntare-

mos una breve nota. En este manuscrito que se conserva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y que lleva por título *Nomenclador ornitológico español y latino. O sea Nombres españoles y latinos sistemáticos de Abes*, aparecen como ejemplos de nombres valencianos, "abantol" (Balenzia, tal como lo escribe Clemente y Rubio), "pajaro de la zereza" o "pájaro zerecero" (en Chelba, para *Parus major*), "Tordeja gabacha" (en la sierra de Javalambre para *Turdus visciborus* [sic]) o "Tordencha" (en Titaguas, Buñol, para la misma ave), "trençalós" (en Balencia, para quebrantahuesos, idéntica denominación que utilizara Agnesio en el siglo XVI), "Tordo de peñas" (en Alpuente, para *Turdus rupestris* sp. nov., al que considera especie nueva y que podría ser el Roquero rojo), "Guitre royisco" o "Buitre royisco" (en Titaguas, para *Vultur fuscus* o Buitre leonado), o "Guitre negro" o "Guitre pardo" (en Titaguas para *Vultur niger* o Buitre negro). Como bien señalaba Bernis (1955b), "*como recopilación de nombres vulgares, la obra de Rojas continúa teniendo un gran valor*" (pág.157), añadiendo después que "*el Nomenclador de Rojas Clemente constituye el primer ensayo metódico de avifauna general española, anterior en sesenta años a las obras de Arévalo Baca y Reyes Prósper*" (pág. 161). El manuscrito de Clemente y Rubio -como se le debería llamar y no Rojas Clemente, según el atinado estudio de Luis Pardo (Pardo, 1927)- se encuentra en la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y sería deseable una publicación del mismo.

Un valioso antecedente de estos vernáculos para las tierras valencianas, lo encontramos unos siglos antes en la *Apologia in Venatores, pro avibus*, de Agnesio, publicada, junto con otras, en Valencia en 1543, y en la que encontramos los primeros vernáculos valencianos publicados, y que después recogerán otros autores como Gaspar Escolano, Marcos Antonio Orellana o Ignacio Vidal para las aves de la Albufera de Valencia. Entre ellos, mencionaré los siguientes: Gayo, Fulvia, Avantol, Bitor, Miloch, Smirla, Cugullada, Reyet, Agró (Garza ruvia), Cabuzó, Gavina, Corba marina, Fulica, Flamench, Splugabou (-aquí dice Agnesio:..*quae vulgo à nostris Valentinis dicitur Splugabou. Quam frequentissimam vidi in palude Xarachi Olivam quoties petii-*), Boxet, Sarcet,

Rossa, Papafigo, Abellerol, Carranch, Curuca, Busquereta (...suburbii viae Sagunthi...), Tudon, Coheta, Gafarda, Luer, Pitsroigs, Ferrerolet, Estiverol, Totestiu, Roscignol, Muzol, Oliba, Gafarró, Gallineta cega, Crebalós, Capcigrany Gruer, Falzia, Papallonets, Cardenera, Luer, y Sauram (Agnasio, 1543: folios 42-47).

Si el libro de Agnesio es impecable y bellísimo tipográficamente, una auténtica joya bibliográfica, no tuvo tanta suerte la *Ornitología general* del valenciano Tomás Villanova y Entraigües (1769-1837), obra manuscrita en tres tomos y un atlas de 81 láminas y concluida en 1824. Al igual que el Nomenclator de Simón de Rojas, tampoco se publicaría este magnífica obra. Parece ser que de esta obra que Villanova compuso después de un trabajo de veinte años y de haber visitado los principales museos de Europa, y en la que se describían ochocientas cincuenta y ocho especies de aves de todo el mundo, se conserva una copia en la Biblioteca Ducal de Luca (Italia). Justo Pastor Fuster copia en su Biblioteca Valenciana (1827) un impreso, no publicado, del propio Villanova en donde expone el *Plan en compendio de la obra general de Ornitología* presentada á su Majestad por su autor el Dr. D. Tomas Villanova.

Gran parte de la explicación de esta penuria de publicaciones, la encontramos en la situación española durante el primer tercio del siglo XIX. Antonio Chinchilla escribe en su *Historia de la Medicina Española* (1846):

<<Si recordásemos los lamentables trastornos de toda especie que se han sucedido en España durante la época que vamos á recorrer, acaso parecería que la España había sido abandonada de la Providencia á sufrir todos los males que arruinan hasta los imperios mas florecientes. El hambre, la miseria, las guerras, la peste y las escisiones políticas interiores, tales han sido los elementos que han dominado nuestro país. Tranquila apenas la España de las guerras que desde últimos del siglo pasado sostenia; devorados sus pueblos mas ricos y comerciales por la peste; amenazada y dominada muy luego por una invasión extranjera tan injusta como tiránica, el pueblo español se lanza al campo del honor, y los médicos mas distinguidos abandonan sus hogares, unos para asistir á los pueblos

apestados, otros para huir del azote de sus enemigos, y otros por fin para alistarse en los ejércitos.

Ved aquí otras tantas causas capaces de anondar y retraer de cualquier empresa literaria, aun el genio mas atrevido y emprendedor; y ved tambien confirmada la sentencia de Tácito, "de que en el país de las guerras no pueden vivir las ciencias">> (Chinchilla, 1846: 252).

Casi más lamentable todavía aún era la situación de los estudios zoológicos:

<<No ha habido un ramo mas abandonado y desconocido que el de la zoología. Este estudio tenido en otros países, mas cultos que el nuestro, como un manantial de riquezas para las artes y la medicina, ha sido considerado en España como un estudio de puro lujo y de pasatiempo para entretener á curiosos ó empleados cesantes.

El gabinete de historia natural de Madrid, recuerdo de nuestras glorias y de nuestras conquistas, ha llegado á convertirse en un osario ó almacén de objetos que deberían estar en desecho, y no ofrecen interés ni inspiran gusto al estudio de la naturaleza.

A la entrada en dicho gabinete del catedrático y maestro mio D. Tomas Villanova, la mayor parte de las colecciones habían ya sufrido todas las averías del tiempo por falta de reposición. A su celo y desinterés debió el gabinete el poseer muchos objetos que aun en el día figuran.

En 1837 decía el doctor Villanova, que en quince ó mas años que llevaba de cátedra, solo había visto asistir á ella empleados cesantes que concurrían para entretener el tiempo.

El estudio de la zoología es aun y será entre los españoles de puro lujo, y creo que pasará este siglo sin que en España se le haya dado toda la importancia que merece, ni reportado de él todos los beneficios que las ciencias, y con especialidad la medicina, debieran obtener de su aplicación">> (Chinchilla, 1846: 260).

Un panorama similar al descrito se traza en el trabajo *Über den gegenwärtigen Zustand der Naturwissenschaften in Spanien* del botánico y viajero Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895), publicado en 1846 en la revista *Allgemeine deutsche Naturhistorische Zeitung*, en el que el

autor siente no poder presentar un cuadro agradable del estado actual aunque reconociendo los progresos que los españoles hicieron en otros tiempos.

Con la publicación de los primeros catálogos de aves, al estilo del *Zeitgeist* científico del momento, nos adentramos en los comienzos de la ornitología científica española. El eminente ornitólogo alemán Carl August Bolle (1821-1909) se hizo eco de ello traduciendo al alemán el *Catálogo de las aves observadas en las cercanías de Santiago y otros puntos de Galicia de Francisco de los Ríos Naceyro* (1850), y el *Catálogo de las aves de la Albufera* de Ignacio Vidal Cros (1854), publicándolos en el *Journal für Ornithologie* con el título de *Die Erstlinge moderner spanischer Ornithologie* (1855) [La primera ornitología española moderna]. Hasta entonces, dirá Bolle, España era uno de los países europeos más desconocidos desde el punto de vista ornitológico:

<<Spanien war bisher in ornithologischer Hinsicht eines der unbekannstesten von allen Ländern Europas, ja vielleicht das am meisten in Dunkel verhüllt gebliebene>> (Bolle, 1855: 295).

La ornitología alicantina desde mitad del siglo XIX hasta la creación de la Sociedad Española de Ornitología (1954)

Por Real Decreto de 12 de enero de 1849 se instaba tanto a los profesores de instituto como a los de las universidades a recolectar las producciones naturales que se encontraban en su distrito. Ello estimuló la formación de colecciones e inventarios especializados de los distintos grupos faunísticos y el paulatino olvido de los gabinetes dieciochescos, verdaderos gabinetes de curiosidades, conformados por las más variopintas producciones naturales y objetos de valor (Josa Llorca, 1992).

La tarea científica consistía en posibilitar una primera catalogación de la fauna y flora de España y de sus posesiones. La llamada de Joseph Torrubia, en su *Aparato para la Historia Natural española* (1754), de ir formando sucesivamente muchos catálogos de los objetos del

suelo hispano para formar el índice de la Historia Natural española fue desoída durante muchos años. Mariano de la Paz Graells Agüera (1809-1898) cogerá el testigo de Torrubia y así comenzará su *Catálogo de los moluscos terrestres y de agua dulce observados en España* (1846), señalando que:

<<Si todos los naturalistas españoles hubiesen publicado los descubrimientos científicos hechos por cada uno de ellos en su tiempo, la Flora, Fauna y mineralogía de la Península, serían en el día mucho mejor conocidas; y los secretos que bajaron con ellos al sepulcro, al paso que enriquecido la ciencia, hubieran perpetuado la memoria de hombres beneméritos, sumidos en el olvido por su propio silencio. Las causas de éste pueden haber sido varias, y entre ellas el especial deseo de hacer una obra completa, difiriendo su publicación hasta considerarla perfectamente acabada. Pero como la vida del hombre es tan corta y tan inmenso el número de seres que pueblan nuestro globo, si la ambición de aquel le lleva á quererlo decir todo de una vez, el término de su existencia se anticipa al que se propuso para dar principio á la historia de sus observaciones. Este inconveniente se evitaría contentándose con adquirir menos gloria y depositar sucesivamente en los anales de la ciencia los datos que se vayan adquiriendo, para que llegue el día en que todos reunidos, pueda una mano privilegiada, concluir la obra á que otras muchas hubieran contribuido>> (pág. v).

No puede ser más actual este certero análisis de Graells. Pero esta importante tarea fracasó, entre otras cosas, por el escaso número de estudiosos de la naturaleza y su limitada dedicación a la investigación (Fraga, 1998).

Espigar en las topografías médicas y otros documentos de las distintas localidades de la provincia de Alicante al objeto de localizar los índices o catálogos de las aves de la zona es una tarea todavía por hacer. Lo más habitual, no obstante, en esta aproximación al conocimiento ornitológico es encontrar unas mínimas referencias tan genéricas que apenas sirve, Vaya como ejemplo lo que dice el médico Ildefonso Bergez, al tratar sobre los baños minerales sulfurosos de las Salinetas de Novelda (Bergez, 1858):

<<En este comarca [Novelda] se encuentran

todos los animales domésticos, y se cria ganado lanar y cabrio; hay caza de perdices, liebres y conejos; muchas clases de pájaros y aves de rapaña>> (pág. 12).

En la descripción de la laguna de la Mata que hace José de Montesinos en 1795 dice:

<<Se encuentra mucha y abundante caza de perdices, palomos silvestres (...), que aunque medianos son muy dulces; conejos y liebres habiendo muchísimas de estas últimas en unas calas o cortados que hay a las orillas del mar, que las baten sus olas en lo más bajo; y hay tantas que en una media hora que estuve sentado a la parte de arriba en varias tardes que estando convalesciendo de unas crueles tercianas me solía ir allí por recreo en el agosto de 1786 llegué a contar más de ciento; crecen poco y tanto los conejos como las liebres son animales medianos, pero muy tiernos y sabrosos(...)

(...) En su monte que está vestido de lentiscas, chaparros, romeros, y atochas, se crían en abundancia caracoles serranos, que guisados con arroz, es un plato muy delicado. Hay también mucha caza de conejos, y de liebres (...) por lo que acuden innumerables aficionados a cazar; hay perdices en abundancia, tordos, grajas, palomas silvestres y muchas zorras; se crían algunos lobos, pero son medianos. No faltan algunas víboras, especialmente donde hay más bosque, como también lagartos muy grandes cuales no se hallan de esta naturaleza en ninguno de los campos de la Gobernación de Orihuela>> (tomado de Pujol y Calvo, 1997: 9).

La ornitología europea del siglo XIX surge fundamentalmente a partir de las colecciones de aves tanto públicas como privadas. Entonces la ornitología, como hasta mucho tiempo después, era una *scientia amabilis*. La necesidad de conseguir ejemplares para su medición y catalogación impulsó frecuentes expediciones financiadas bien con dinero público, bien, más frecuentemente, a través de dinero privado reembolsado posteriormente con la venta de los materiales colectados. La formación de colecciones ornitológicas de utilidad científica no era, sin embargo, una empresa fácil o sencilla.

Colectar aves fue una empresa de enorme rele-

vancia científica durante el siglo XIX y gran parte del XX. Hasta 1859, año en el que se inventan los prismáticos (muy caros y escasísimos), el único modo de observar un ave era cazarla o matarla. Pero coleccionar aves no era sólo matarlas, sino el proceso completo de matar, preservar, etiquetar y guardar adecuadamente las aves preservadas de esta manera (Barrow, 1998; Mearns y Mearns, 1998;). No obstante, coleccionar, ni era una empresa fácil ni era una tarea grata. Colectar aves era una actividad dura y peligrosa. A los caminos inseguros e incómodos se unía los potenciales envenenamientos debidos al arsénico empleado para las pieles de las aves, a los accidentes de las escopetas poco seguras, la incompreensión y desconfianza de los paisanos acerca de esta actividad, etc. Nadie como Alfredo Brehm lo ha expresado mejor. En su *Sinopsis provisional de las Aves de España* (Brehm, 1857), sin duda el mejor y más importante trabajo ornitológico publicado en el siglo XIX acerca de la avifauna ibérica (Reig y Fraga, 2000), escribe:

<<Nadie reconoce más la diligencia y el celo de los ornitólogos españoles que yo. No es ningún placer andar vagando por el campo y los bosques, cazar aves, recoger insectos, buscar plantas, y tener que aguantar el calor y las privaciones sin la esperanza de ser elogiado, sino al contrario, poder estar seguro de que la gentuza que quiere parecer inteligente te llame idiota o loco. No es divertido coleccionar cosas, y según mi experiencia no existe ningún lugar donde esto es más difícil que en España, y todo esto sin poder contar con el apoyo de nadie>> (pág. 431).

Los primeros colectores científicos, como muy bien han escrito los Mearns, estaban motivados básicamente por la necesidad de descubrir, nombrar y clasificar especies, constituyendo la taxonomía la base de cualquier ciencia biológica. El progreso fue posible gracias tanto a la mejora de las armas de fuego como de las técnicas taxidérmicas, y recibió un inmenso ímpetu con las numerosas exploraciones geográficas (Mearns y Mearns, 1998: 1).

A todas estas incomodidades del trabajo del colector, hay que añadir el escaso número de libros en los que las aves aparecían ilustradas y

coloreadas correctamente para su adecuada determinación. Pero este es un apasionante tema que abordaremos en otro lugar.

En su excelente trabajo sobre las aves de España (Brehm, 1857), Alfredo Brehm menciona una única vez Alicante, donde consiguen ver, por primera vez en la naturaleza, el Alcaudón Meridional (*Lanius meridionalis*).

Otra importante observación la encontramos en una carta de Reinaldo Brehm dirigida a su padre Christian Ludwig Brehm desde Murcia con fecha de 15 de agosto de 1856. En ella escribe que durante el trayecto desde Alicante a Murcia, y a su paso por la población de Orihuela, observan varios Alimoches sobrevolando las montañas de los alrededores (Brehm, 1856).

Una última cita de enorme interés se refiere al Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*), la única que he podido encontrar en toda la bibliografía y otras fuentes documentales para Alicante. En un trabajo sobre este ave publicado por los Brehm, tanto el padre Christian Ludwig Brehm (1787-1864), como dos de sus hijos, Alfred Edmund Brehm (1829-1884) y Reinhold Bernhard Brehm (1830-1891), se cita la presencia del quebrantahuesos en las montañas de Valencia, Murcia y Alicante (Brehm, Brehm, y Brehm, 1858/1859: pág. 37). Sin embargo, la cita de su presencia en Alicante (y en Orihuela concretamente) procede de otros informadores, ya que ellos mismos no lo observaron aunque sí pudieron encontrarlo en Xàtiva (Valencia), donde cazaron además 1 ejemplar macho joven el 25 de julio de 1856, y en Murcia, en la Sierra de la Fuensanta, en agosto de ese mismo año y durante el año siguiente. La presencia de Quebrantahuesos en Alicante durante aquella época es, por lo tanto, muy probable.

Tampoco se debe olvidar a este respecto la notable tarea de los intercambios. España era muy pobre en colecciones y museos y sin éstos no se podía hacer ciencia ornitológica. Con la salida al extranjero de los naturalistas españoles se aprende a apreciar, en su justo precio, los ejemplares nativos y a intercambiarlos más ven-

tajosamente. En carta a Mariano de la Paz Graells (1809-1898), con fecha del 6 de octubre de 1850, le comunicaba desde Alemania uno de sus discípulos, el valenciano Juan Vilanova y Piera (1822-1893):

<<Adjunta es la esquelita de Schimper, al cual bien puede Ud. mandarle lo que pida, pues el Museo de Estrasburgo es extraordinariamente rico y estoy seguro de que siempre hemos de ganar en los cambios, lo que en mi concepto debe Vd. hacer es poner precio a los objetos que remita como a su vez lo hace Schimper, partiendo del principio que todo lo de nuestro país, es muy buscado particularmente las especies nuevas, como la *Capra hispanica*, que se vende a 400 y 500 francos y el *Garrulus* o *Pica andalusica*, por la que ha pagado Schimper en Londres 40 francos y así en lo demás>> (Barreiro, 1992: 224).

Laureano Pérez Arcas (1824-1893), natural de Requena (Valencia) y autor de un célebre *Elementos de Zoología*, terminaba su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias de Madrid con el tema de la apreciación de los trabajos zoológicos más notables, notando, "la necesidad de estudios serios, la imposibilidad de prosperar sin ellos, y el convencimiento de que el rango que una nación tiene en el mundo, depende del lugar que en ella ocupa la ciencia" (Pérez Arcas, 1868: pág. 37).

Pero, como estamos apreciando, el estado de la cuestión muestra la débil institucionalización de la Ciencia española y las limitaciones e incapacidad de la universidad de la época. Serán los numerosos especialistas extranjeros, principalmente británicos y alemanes, los que suplirán la casi ausencia de naturalistas españoles en la publicación de trabajos ornitológicos.

Apenas nada conocemos de los antiguos establecimientos valencianos dedicados al estudio de la fauna. Tanto Celso Arévalo (Arévalo, 1935) como Luís Pardo (Pardo, 1949) recogen que el rey Juan I de Aragón, de sobrenombre *El Cazador* por su extremada inclinación cinegética, disponía en Valencia de un parque de animales salvajes en el que no faltaba el rinoceronte. No es hasta mediados del siglo XIX cuando en nuestra actual comunidad se establece un pri-

mer y notable Gabinete de Historia Natural, el de la Universidad de Valencia. De su colección ornitológica Howard Saunders llegó a decir que era la mejor de España: "*The Museum at Valencia contains decidedly the best local collection in Spain*" (Saunders, 1871: 55).

Esta excelente colección de aves que poseía el gabinete se debió fundamentalmente al catedrático de zoología de la Universidad de Valencia Ignacio Vidal Cros y al catedrático de historia natural del Instituto Provincial José María Arigo. Además de la colección ornitológica de las aves de la Albufera de Valencia, el citado museo poseía otras muchas de la península ibérica. Lamentablemente, el mejor ornitólogo español de la época, el valenciano Ignacio Vidal falleció el 29 de diciembre de 1859. Vidal sólo pudo publicar dos trabajos ornitológicos: el primero de ellos, *Catálogo de las aves de la Albufera*, terminado el 10 de noviembre de 1851 y publicado tres años más tarde en 1854, y una segunda edición corregida y aumentada de este catálogo, *Catálogo de las aves que frecuentan el lago de la Albufera y sus alrededores, en la provincia de Valencia*, publicado en 1857. En ambas ediciones no existe referencia alguna a la provincia de Alicante. Al profesor Ignacio Vidal le sustituyó en la cátedra Rafael Cisternas Fonseré (1818-1876). Cisternas redactó un manuscrito sobre las aves de España, principalmente de las que se encontraban en el museo de la universidad, que no llegó a publicar. Este manuscrito sería utilizado posteriormente a su muerte por su sucesor, el malagueño José Arévalo Baca (1844-1890) que ocuparía nuevamente la cátedra de la Universidad de Valencia. Esta utilización del manuscrito de Cisternas en la redacción de su libro *Aves de España* (1887), sin mencionarlo, fue interpretada por algunos de los que conocían su existencia como una apropiación indebida, y ello le supuso alguna crítica sobre la usurpación de los datos de Cisternas, entre las más duras de las cuales fue la del naturalista gallego Víctor López Seoane (1834-1900) en su trabajo *Sur deux nouvelles formes de perdrix [sic] d'Espagne* (1894). Esta información se la había proporcionado a Seoane Mariano de la Paz Graells en carta de 19 de diciembre de 1893. Mi amigo Xosé A. Fraga de A Coruña me comunica que en esta carta,

Graells llama "danzante" a Arévalo Baca y comenta que le robó a la esposa de Cisternas los manuscritos. Y añade que cuando Graells leyó, junto con Hidalgo, los textos presentados al premio de la Academia los reconocieron como de Cisternas y vieron que estaban presentados por Arévalo. Decidieron no darle el premio por ello, pero, por su interés, le concedieron un accésit y publicaron el libro.

A pesar de esta última digresión, el libro *Aves de España* tiene su importancia porque además de utilizar buena parte de la información publicada, existe una buena cantidad de observaciones personales de Arévalo así como algunas informaciones adicionales fruto de su amistad con el ornitólogo inglés Lord Lilford (1833-1896). Las excursiones ornitológicas de Arévalo Baca comprendieron también algunas comarcas de la provincia de Alicante. Así, al tratar sobre el Halcón Peregrino, Arévalo escribe como localidades donde lo ha visto, Jalón, Denia y demás pueblos de la Marina (Valencia) (Arévalo Baca, 1887: 73). Como podemos apreciar en este ejemplo, algunos autores denominan Valencia a todo el conjunto de lo que en la actualidad comprende la Comunidad Valenciana. Con todo, el libro *Aves de España* es mucho más importante que el deleznable trabajo y burda copia del *Catálogo de las aves de España, Portugal é Islas Baleares* (1885), de Ventura de los Reyes y Prosper.

Alicante, como *Tachybaptus ruficollis*, buceaba sin aflorar la cabeza. Tenía Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, creado por el Real Decreto de 5 de agosto de 1845, y en el que se existía una cátedra de elementos de Historia natural. Desafortunadamente, ninguno de sus catedráticos más distintivos, Manuel Ausó y Monzó (1814-1892), Francisco Garcerán Sánchez Solís, o Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás (1863-1941), se ocuparía de la ornitología. El Gabinete de Historia Natural contaba en el año 1882, según la Memoria del curso 1882-83, con 415 ejemplares de aves. No existe, sin embargo, ninguna relación de las mismas, pero no debió de ser de importancia puesto que ningún naturalista español o extranjero lo menciona.

Bien distinto fue el caso del Instituto Provincial de Murcia, donde el catedrático de Historia natural, Angel Guirao Navarro (1817-1890) poseía uno de los gabinetes ornitológicos privados más notables de la España del siglo XIX, visitado, entre otros, por los hermanos Alfredo y Reinaldo Brehm en el año 1856, o por el ornitólogo británico Howard Saunders (1835-1907) en 1867 y en 1868. El contenido del mismo aparece en su *Catálogo metódico de las aves observadas en una gran parte de la provincia de Murcia* (1859; *addenda et corrigenda* manuscritas de 1867).

De uno de los ornitólogos británicos que hemos mencionado, Thomas Littleton Powys, cuarto barón Lilford, sabemos que pasó por Alicante en su segundo viaje a España en la primavera de 1864. Interesado por determinadas especies de aves, entre ellas, por el Águila del Príncipe (*Aquila adalberti*), -denominación que prefiero por respeto y en honor a su descubridor en el año 1860, Reinaldo Brehm-, nota que ésta debía ser rara en el este de España pues no se encuentra, por ejemplo, en el Museo de Valencia, ni oyó nada de ella en Barcelona, Alicante o Cartagena. Sin embargo, en el museo de la Universidad de Valencia sí habían ejemplares de *Aquila adalberti*, pero juveniles y confundidos y etiquetados como *Aquila clanga*. En otro de sus frecuentes viajes a España, Lord Lilford (1833-1896) decide ir a Alicante en el mes de abril de 1879, pero a última hora y a la vista del estado de la mar, decide ir directamente a Valencia bordeando la costa que era "very wild and barren". Durante la travesía por mar en su yate apunta en su manuscrito *Mediterranean Notes*: "*Curious Gibraltar-like rock, near Calpe*" y observa un Alcatraz Atlántico (*Sula bassana*) notando que es "*the first I ever recollect to have seen in the Mediterranean, except at the back of the rock of Gibraltar. We did not see more than three or four gulls during the last days, or any other sea birds, though some parts of the coast seem well suited for them*".

Apuntemos, finalmente, que para escribir su *Fauna Valenciana* (1918), el valenciano Ántimo Boscá Seytre (1874-1950) visitó y consultó las colecciones formadas por su padre, Eduardo

Boscá Casanoves, las del Colegio de San José de Valencia (formada por el padre Vicent, S.J.), Instituto General y Técnico de Castellón (colección de Ántimo Boscá), Instituto Provincial de Valencia (José María Arigo), y sobre todo para las aves las del Gabinete de la Universidad. Gracias a la publicación de esta obra en 1918 (y no en 1916 como se afirma), Boscá Seytre obtuvo la cátedra del Instituto provincial de Valencia en agosto de 1919. Lamentablemente, un incendio acaecido en la noche del 12 de mayo de 1932 destruyó el Gabinete y sus valiosas colecciones ornitológicas.

En el apartado de *Aves de la Fauna Valenciana* deseamos resaltar un breve apunte que escribe Boscá Seytre en el que menciona por primera vez al Paiño Europeo (*Hydrobates pelagicus*) como nidificante en la provincia de Alicante y concretamente en la Isla de Benidorm, donde lo sigue haciendo en la actualidad:

<<Otra especie palmípeda del grupo Proceláridas es la pequeña *Thalassidroma* (*Procelaria*) pelágica L., ave nocturna llamada escateret por los marineros alicantinos; se la encuentra criando, especialmente en la primavera, en la Illa de Benidorm y vecinos islotes. Como yo mismo he tenido ocasión de observar, pone cada hembra un solo huevo blanco y sin más nido que la roca viva, y son tan mansas, que se dejan agarrar como atemorizadas, constituyendo toda su defensa en vomitar un cierto líquido amarillento que, por su mal olor, recuerda al del aceite rancio de las latas de sardina>> (Boscá Seytre, 1918: 516-517).

Una vez más, la presencia de aves colectadas en la provincia de Alicante en las instituciones públicas o en colecciones privadas importantes, ha sido prácticamente inexistente. Sólo una ave de tierras alicantinas aparece en la Colección de Aves del Museo de Historia Natural del Instituto de Valencia, la Calandria, un ave escasa por estas tierras en la actualidad (Pardo, 1925: 44). Y como en uno de sus rápidos aleteos, nos trasladamos a la gestación de la Sociedad Española de Ornitología.

No se ha destacado suficientemente el papel de los aficionados cazadores en la creación de la

hiciera de la *Guía de Campo de las Aves de España y demás Países de Europa* de Roger Peterson, Guy Mountfort, y P.A.D. Hollom (publicación original en inglés de 1954). La corta tirada que la Editorial Omega de Barcelona hizo de esta guía se agotó en muy poco tiempo, constituyendo un ejemplar de esta primera edición en castellano un verdadero tesoro bibliográfico para el aficionado a las aves.

Gran parte de las observaciones orníticas de interés para las tierras alicantinas aparecerán en los primeros volúmenes de *Ardeola*, y serán recogidas en el libro *Els ocells de les terres catalanes* de Joaquim Maluquer Sostres (1956) y ediciones sucesivas (segunda edición, 1973; tercera, 1981; cuarta, 1987), así como su continuación en el volumen 12, *Ocells, de la Història Natural dels Països Catalans* (Ferrer et al., 1986). Diversos ornitólogos o aficionados a la ornitología de otros países europeos dejarán sus observaciones impresas también en *Ardeola*. Así, los Moreau refieren sus avistamientos en Jávea (Xàbia), Denia, Calpe, acantilados de San Antonio, Benidorm, y Alicante (Moreau y Moreau, 1953, 1954); otras especies observadas por los alrededores son comunicadas por Deetjen (1955; Deetjen y Jahn, 1955); y durante una ascensión al monte Mongó en el mes de julio de 1959, Gerald Th. Corley Smith observa *Sylvia sarda* (Corley Smith, 1960). Posteriormente, la observaría también Navarro Medina en la Dehesa de Campoamor en julio de 1968 así como otros autores, a pesar de las reservas actuales de su correcta determinación. Unas notas invernales del pantano de Elche (Hondo), de las salinas de Alicante y de Santa Pola, y de la Explanada y paseo de Alicante, relativas a diciembre de 1959 y enero de 1960 son comunicadas por José Julio Tato Cumming (Tato Cumming, 1960); observaciones de *Larus audouinii* en las salinas de Calpe en agosto de 1970 (Tato Cumming, 1971), o en la playa de La Mata en marzo de 1969 (Navarro Medina) son otras anotaciones interesantes para la época. En julio de 1970, G. Lathbury observa *Falco vespertinus* en las cercanías de Jávea; y Trigo de Yarto (1993) anota la caza de una avutarda en tierras alicantinas en el año 1970 (Trigo, 1993). De los años 60 es, también, el primer trabajo de

la avifauna hondeña del pastor adventista Manuel Martorell Sanz, fruto de sus visitas durante los veranos de 1964 y 1965 (Martorell, 1966).

A partir de los años 70, se produce un nuevo empuje a la ornitología alicantina con el nacimiento de los primeros grupos organizados de naturalistas (ANSE), la consolidación de S.E.O., y la reaparición de la tradición universitaria en nuestra provincia en 1979 con la Universidad de Alicante, tradición universitaria de más de dos siglos, iniciada en 1610 en la ciudad de Orihuela e interrumpida tras la desamortización en 1834. La Universidad de Alicante fue creada en octubre de 1979 sobre la estructura del Centro de Estudios Universitarios (CEU) que había comenzado a funcionar en el curso 1968-69 con 230 alumnos y está liderando en la actualidad los trabajos de ornitología científica de mayor calidad de la mano del profesor Germán López Iborra. El departamento de Biología y Geología del CEU de Alicante editaría una nueva publicación, *MEDITERRANEA, Serie de Estudios sobre Biología Terrestre Mediterránea*, en cuyo primer número, en septiembre de 1976, aparece publicado un artículo sobre la dieta de *Tyto alba* y *Bubo bubo* en 15 localidades de la provincia de Alicante (Vericad, Escarré, y Rodríguez, 1976) y algunos datos de aves de la isla de Tabarca (Seva y Escarré, 1976).

De Seva y Escarré (1976) son las primeras noticias conocidas de la avifauna tabarquena, y que fueron copiadas, sin mencionar a estos autores, por González Arpide en su libro *Los Tabarquinos. Estudio etnológico de una comunidad en vías de desaparición* (González Arpide, 1981). El texto es el siguiente:

<<Hay muy pocas especies que aniden en la isla, sin duda por la falta de arbolado. Estrictamente lo hacen: el gorrión (*Passer domesticus*), en lugares cercanos a la población, en las mismas casas viejas; la totovia (*Lullula arborea*) y la alondra (*Alauda arvensis*), en los dos tercios restantes de la isla; un limícola, posiblemente el correlimos común (*Calidris alpina*) en los pequeños acantilados; y por otra parte, la golondrina (*Hirundo rustica*), el avión común (*Delinchoa urbica*) y el vencejo común (*Apus apus*).

El resto de las aves que se observan son visitantes, ya que con facilidad atraviesan los pocos kilómetros que separan la isla del cabo de Santa Pola, y son las mismas que forman la avifauna litoral. Incluso las dos especies de gaviotas (*Larus argentatus* y *Larus ridibundus*), prefieren salvo alguna excepción, anidar en las costas del cabo. Junto a ellas puede verse en los meses de septiembre-octubre algún charrancito (*Sterna albi-frons*) o fumarel común (*Chlidonis niger*), así como alguna bandada de patos.

La abubilla (*Upupa epops*) es un ave común de la isla, y procedente al parecer de la pequeña meseta superior del cabo, hace su aparición gran parte de los días. En su tiempo se dejan ver igualmente el mirlo (*Turdus merula*) y el zorzal charlo (*Turdus philomelos*).

En los meses de abril y mayo suelen llegar, procedentes de las costas cercanas, algunos ejemplares de tórtola (*Streptopelia turtur*). No es difícil ver en Nueva Tabarca en estos mismos meses ejemplares de collalba gris (*Oenanthe oenanthe*), collalba negra (*Oenanthe leucura*), colirrojo tizón (*Phoenicurus oschurus*), petirrojo (*Erithacus rubecula*), ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*), curruca sarda (*Sylvia sarda*), lavandera blanca (*Motacilla alba*), lavandera boyera (*Motacilla flava*), y alcaudón común (*Lanius senator*).

Mención aparte merecen el verdicillo (*Serinus serinus*), el verderón común (*Carduelis chloris*) y el jilguero (*Carduelis carduelis*), que son los representantes con mayor número de individuos después de los alaudidos y golondrinas, aunque no aniden en la isla.

De rapaces, esporádicamente suele verse algún halcón (*Falco peregrinus*), procedente de los roquedos del cabo de Santa Pola; y la lechuza común (*Tyto alba*), que era elemento permanente en las bóvedas de la iglesia hasta hace unos cuantos años, en que desapareció totalmente>> (Seva y Escarré, 1976: 75-76; González Arpide, 1981: 13-14).

Quince años después, Peiró y López (1992) publicarán una contribución al conocimiento de la avifauna del entorno de la Reserva Marina de la Isla Plana o Nueva Tabarca, con datos más fiables y seguros (véase, también, Urios et al., 1991).

Diversos trabajos ornitológicos aparecerán en la revista *Mediterránea*. Entre los más importantes, los de Navarro Medina en colaboración con su padre sobre la avifauna hondeña (Navarro Medina y Navarro García, 1982, 1984), un primer análisis de la distribución de la avifauna nidificante en la provincia de Alicante (Gil-Delgado et al., 1989), la selección de hábitat de la perdiz roja (Peiró, Seva y Almiñana, 1992/93), o un estudio de las comunidades orníticas en áreas alicantinas degradadas (Peiró, 1995).

De esta primera época son algunos proyectos de notable trascendencia, aunque inconclusos, del alicantino y miembro fundacional de SEO, el coronel de aviación José Julio Tato Cumming (1918-1989). Así, un ambicioso estudio de catalogación de la avifauna alicantina en 1972, *Estudio Faunístico-Ecológico de la provincia de Alicante*. Lista nº 1: Aves con estancia probable, más o menos prolongada, en la Provincia y sus costas (manuscrito con fecha de 27 de octubre de 1972), y con abundante material recogido, y un *Anteproyecto para un estudio monográfico del HALCON DE LA REINA (Falco eleonorae) y repoblación, con aves marroquíes, de un islote de la costa española*. Este último proyecto, muy adelantado, se iba a llevar a cabo en la Illa del Portitxol y en la Illa d'Ambolo con aves procedentes de la isla de Mogador (Tato Cumming, 1972, 1975).

No menos interesantes serán las aportaciones de otro ornitólogo casi olvidado, el norteamericano James Mac Ivor (1933-1991). Jimmy, como todos sus amigos le llamaban, fue un naturalista excepcional, de enorme concienciación ecologista y un magnífico escritor. Desafortunadamente, publicaría muy pocas cosas a pesar de su gran experiencia de campo y de sus numerosas observaciones recogidas. Un buen trabajo, *El Hondo, un biotopo acuático en el Sudeste*, aparecería publicado en la revista de ANSE, y algunas pocas cosas más sobre censos de aves acuáticas y sobre la reproducción del Flamenco en Alicante (Mac Ivor, 1974; Mac Ivor, 1975-76; Ibáñez et al., 1975). Además, Mac Ivor fue el primer naturalista alicantino en registrar la presencia del Aguilucho Cenizo, en la primavera de 1968, en la Laguna de La Mata. Numerosas observaciones de interés se recogen en sus cuadernos manuscritos, entre los que

habría que destacar sus *Apuntes por un Prontuario de la Región Sud-este o hacia una Avifauna alicantina* (Mac Ivor, 1968-1971), y sus *Aves salineras de Torrevieja y La Mata* (Mac Ivor, 1970-1991). Este mismo ornitólogo supervisaría el trabajo de uno de los miembros más activos de ANSE, Juan Manuel Ibáñez González, quien publicaría *Aspectos ecológicos de las zonas húmedas del sur de la provincia de Alicante* (Ibáñez, 1978).

Fundamental durante este período será el trabajo de concienciación social y política para la atención a zonas de gran interés ecológico, y que daría lugar a los parques naturales y reservas marinas alicantinas: los parques naturales del Penyal d'Iffach, del Montgó, de la Font Roja, del Hondo, de Las Salinas de Santa Pola, de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, del Marjal de Pego-Oliva, las Reservas Marinas de Tabarca y del Cabo de San Antonio, y otros muchos espacios de enorme interés ecológico tanto del litoral como del interior. La publicación de libros como *Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans* (1976), con referencias a la Serra Mariola, Serra d'Aitana, La Font Roja, y el Fondó (con datos proporcionados por Bolós, Villar, Centro de Estudios Universitarios de Alicante, y Navarro Medina), el de los *Los Espacios Naturales de la Provincia de Alicante* (1984), *Humedales y áreas lacustres de la provincia de Alicante* (Box Amorós, 1987), o la obra *El Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana* (1987), servirán para informar a la sociedad de la rica y variada naturaleza alicantina a proteger.

No se puede olvidar en el feliz alumbramiento de la ornitología actual de Alicante el trabajo de diversos grupos con la denominación de naturalista y/o ecologista. Los años 70 son el origen del ecologismo moderno en Alicante y su tarea un modo de vida vigilante que evite que se robe el presente y el futuro.

El más importante históricamente de estos grupos ha sido la *Asociación de Naturalistas del Sureste* (ANSE; ahora ANSE-CODA). Fundada legalmente en mayo de 1973, y con un ámbito territorial que comprendía las provincias de Alicante, Murcia y Almería, es la veterana de

Alicante y la cuarta en España. Su nacimiento, con todo, fue dos años antes, en 1971, a partir de un grupo de aficionados a la ornitología que después de asistir a las *II Jornadas Ornitológicas Españolas* (Pamplona, 1971) se organizan en el "*Grupo Ornitológico del Sureste*" (GOSE), constituido en febrero de 1972. Como tantos grupos sufre en poco tiempo cambios, escisiones, reagrupamientos y nuevas delegaciones. La Delegación Local de Orihuela (ANSE-Orihuela), por ejemplo, fue el resultado de la fusión desde 1987-1989 del *Grupo Oriolano para el Estudio de la Naturaleza* (GOEN) con ANSE. La conservación del Águila-azor Perdicera y los estudios del Embalse de la Pedrera en Torremendo, o de la Sierra de Escalona, han sido sus actividades más notables. Otro grupo activo de gente joven trabajaba desde los comienzos de 1980 como agrupaciones locales de ADENA/WWF en Alicante ("*Grupo Los Gavilanes*") y en Elche. *Panda*, cuyo primer número apareció en enero de 1983, era la revista trimestral de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza cuya finalidad consistía en ser el órgano oficial de comunicación entre ADENA y sus miembros. En 1985, la gente de Adena-Alicante constituye el *Grupo Alicantino para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza* (GADEN), el cual organiza diversas actividades, entre ellas, la I y II Semana de la Naturaleza (1987 y 1988), con la participación de diversos naturalistas alicantinos y de otros puntos de España.

El *Grupo Ecologista Maigmó* (GREMA) nace en 1985 a partir de un grupo de estudiantes del Instituto de Bachillerato de San Vicente del Raispeig aunque su mayor peso lo tiene desde 1991. Legalizado en 1992, llevan a cabo las I Jornadas de Medio Ambiente, y se interesan principalmente por velar, proteger y estudiar los valores naturales de la Sierra del Maigmó. Otros grupos ecologistas, *Xoriguer de La Vila Joisa*, los *Ecologistas en Acció de San Vicente*, la *Coordinadora Ecologista del Vinalopó*, la *Coordinadora Ecologista del Sud del País Valencià*, la *Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental* (CODA), *Ecologistas en Acció*, etc., resultado de fusiones o de coordinación de grupos, suponen un revulsivo social para velar por la naturaleza alicantina de las agresiones humanas.

La actividad del movimiento ecologista en Alicante ha hecho posible la paralización de la actividad frenética y destructora de la urbanización déspota e irracional. Gracias también a este movimiento se celebró en 1982 el *I Symposium de las Zonas Húmedas del Sureste* en el Centro Educativo del Medio Ambiente Los Molinos (Crevillente, 28-30 de mayo de 1982).

Con la finalidad de promover actividades para la mejor conservación de los paisajes, elementos y sistemas naturales de los humedales del sur de Alicante y de la naturaleza en general se constituye en 1995 la *Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante* (AHSA). Esta asociación lidera, en la actualidad, la vigilancia y protección de nuestros humedales y alerta de los gravísimos peligros ambientales de los modelos de desarrollo urbanísticos insostenibles (léase, como ejemplo, Pavón García, 2000).

La publicación en 1991 del primer Atlas de la distribución de las especies de aves que nidifican en la Comunidad Valenciana supuso un importante hito para la madurez de la ornitología alicantina (Urios *et al.*, 1991). Para el período 1985-1991 se comprobó la nidificación de un total de 177 especies para la Comunidad Valenciana. Seis coordinadores y 19 observadores de campo prospectaron la provincia de Alicante básicamente durante el año 1987. Se comprobó la notable riqueza en biodiversidad de determinadas zonas poco conocidas, como el P.N. de la Font Roja (90 especies), el P.N. del Montgó (82 especies), o la Sierra de las Salinas (82 especies). Con este Atlas se cierra y se abre, a la vez, el cuarto y último apartado.

La ornitología alicantina de los años 90

La ornitología alicantina de la década de los noventa se caracteriza por una serie de aspectos entre los que deseamos destacar los siguientes: (1) un creciente interés general por las aves y su estudio; (2) una intensificación de las observaciones, debido a un mayor número de ornitólogos y naturalistas; (3) una mayor preparación de los ornitólogos aficionados en la identificación de especies, sobre todo de las raras, lo que ha permitido "descubrir" especies nuevas para nuestra avifauna; (4) una mayor

concienciación social, fruto de programas de educación ambiental, para cambiar la escopeta por los prismáticos y una tendencia al asociacionismo como método para agrupar y coordinar esfuerzos; (5) un predominio del papel del aficionado -aficionado en su doble significado orteguiano de amateur y de aquel que ama verdaderamente algo-, frente al ornitólogo profesional, y que está presente en la casi totalidad de los aproximadamente 140 miembros con que cuenta SEO-Alicante en 1999; y (6) por un destacado interés en el estudio del estatus actual de las aves lo que contribuye a variaciones de las áreas de distribución ya conocidas en otros trabajos publicados.

Las áreas de interés se centran preponderantemente en los registros fenológicos de aves estivales, invernantes, primeras y últimas citas de migrante, los registros de distribución (nuevas localidades de presencia, o lugares inusuales de distribución), los censos y estimaciones poblacionales, los registros de reproducción, así como otras áreas relativas a alimentación y comportamiento, a la presencia de aves raras o divagantes, atención a áreas geográficas poco estudiadas o desatendidas (interior frente a humedal), o a la observación y seguimiento de especies exóticas y su posible efecto sobre nuestros ecosistemas (Aragoneses y Echevarría, 1998; Aragoneses y Ramos, 1997; Dolz, Díes y Benlliure, 1990; Font y Miguel, 1997; García Peiró, 1996; López, 1983; Martínez *et al.*, 1999; Navarro Medina y Robledano, 1995; Navarro Medina *et al.*, 1993; Ramos y Fidel, 1999; Sánchez Zapata, 1996; Societat Valenciana d'Ornitologia, 2000; Zaragozaí, Gomís, y Fidel, 1999). Fruto de estos esfuerzos ha sido, por ejemplo, los observaciones recientes de Correlimos Falcinelo, Elanio Azul, Falaropo Picofino, Chorlito Carambolo, Treparriscos, Verderón Serrano, Roquero Rojo, Cernícalo Patirrojo, Cigüeña Negra, Avetoro, Cerceta Aliazul híbrida y un largo etcétera como testimonio este Anuario, o la reproducción de nuevo del Cernícalo Primilla, gracias al tesón de Mercedes Alberdi, y la localización de colonias reproductoras de Camachuelo Trompetero en la provincia de Alicante. De *Bucanetes githagineus zedlitzi*, se conocían ya varias capturas realizadas por pajareros de red y señuelo partir de los

años 80, e inclusive la reproducción con éxito en Alicante de aves híbridas con machos de Camachuelo Trompetero y Canarias hembra.

Una característica fundamental de la ornitología alicantina más conocida es su apego casi total a la ornitología de humedal. Cada vez más, sin embargo, el estudio ornitológico se extiende a otras áreas desatendidas, desconocidas o escasamente estudiadas. Todo este interés se ha plasmado en publicaciones más o menos recientes donde se presentan las observaciones de las aves alicantinas en general (Ferrer *et al.*, 1986; Urios *et al.*, 1991; SEO-Birdlife, 1997), las aves nidificantes de la provincia (Rico y Gil-Delgado, 1986; Gil-Delgado *et al.*, 1989; Urios *et al.*, 1991; SEO-Birdlife, 1997), o estudios centrados en comarcas, humedales concretos, o determinadas zonas de interés. Así, se han realizado estudios referidos a los humedales del sur de Alicante (Ramos y Fidel, 1999), Balsares-Carabassí y Clot de Galvany (Sansano, 1992), la laguna de la Mata y salinas de Torreveja (Calvo e Iborra, 1986; Pujol y Calvo, 1997; De la Vega *et al.*, 2000), el Hondo (Navarro Medina, 1972, 1978, 1988; Navarro Medina y Navarro García, 1982, 1984), embalse de la Pedrera (Peiró *et al.*, 1996), tramos costeros rocosos e islas (Díes *et al.*, 1989), isla de Tabarca (Peiró y López, 1992), comarca de Alacant (López, Rico y Martín, 1992), comarca de la Marina (Gomís y Zaragoza, 1998), Dehesa de Campoamor y Sierra Escalona (Sánchez Zapata, 1996), Cabo de la Nao (Gil-Delgado *et al.*, 1985, sin publicar), núcleos urbanos como Alcoy (Cantó, 1998), y diversos itinerarios de interés ornítico de la Costa Blanca (Palmer, 1994) o de 14 parajes recogidos en los *Itinerarios ornitológicos de la provincia de Alicante* (Zaragoz, Gomís y Fidel, 1999). No se ha descuidado tampoco el estudio y recogida de los vernáculos valencianos de las aves alicantinas, tradición que se remonta a la obra de Agnes (1543), y que tiene su actualización en varias publicaciones (Font y Miguel, 1997; Llorens, 1995; Martín Cantarino, 1993; Miguel y Font, 1989; Ramos y Fidel, 1999; Tato y Pechuán, 1970; Tormo Colomina, 1991; Tormo Colomina, 1993), ni los trabajos de fotografía naturalista (Ruiz Limiñana, 2000).

Otra área de especial mención aquí es la perse-

verante labor del anillamiento científico de aves. La creación del Grupo de Anillamiento del Limonero Alicantino (GALA), hace ya más de quince años, supuso un paso notable para la coordinación de datos y anilladores. Miles de horas han dedicado diversos ornitólogos alicantinos (Germán López, Antonio Zaragoza, Helmut Doeffer, Francisco Galán, Juan Antonio Gómez, Luis Albentosa, Fernando González, o José Antonio Martínez Climent, entre muchos otros) a la tarea de anillamiento y recuperación de aves. Gracias a esta callada, dura y constante labor, se conoce, por ejemplo, la fidelidad de un pechiazul holandés a su área de invernada en el Pantano de Elche, el comportamiento reproductor de una hembra de Martín Pescador anillada repetidas veces en el Hondo durante varios inviernos y que se desplaza a la provincia de Barcelona para su holganza amorosa, que las dos únicas recuperaciones lejanas de Aviión Roquero obtenidas a partir de anillas ICONA en España son recuperaciones de aviones anillados por A. Zaragoza en la desembocadura del río Algar, o la presencia por estas tierras de especies raras como el Acentor Común. Gran parte de estos datos están siendo informatizados en la actualidad, e incluso se han diseñado programas específicos para ello que facilitan enormemente la tramitación de esta valiosa información. Las recuperaciones de aves en Alicante son periódicamente publicadas en un informe anual en la revista *Ecología*, editada por el Ministerio de Medio Ambiente. El anillamiento constituye, pues, no sólo un método imprescindible para el conocimiento de la avifauna local, sino un recurso necesario hoy en día para el conocimiento y avance de la ornitología, permitiendo, por ejemplo, la identificación de especies imposibles de diferenciar mediante la mera inspección visual con los más sofisticados instrumentos ópticos, y posibilitando el estudio de las diferencias intraespecíficas en los patrones fenológicos en función de edad y sexo.

La participación de ornitólogos alicantinos en la confección del *Atlas de las Aves de España* (1975-1995), ha sido otro mérito de la ornitología alicantina. Este Atlas ordena sistemáticamente la información distributiva, de hábitat y poblacional de las 285 especies de aves que han nidificado en España desde 1975 hasta



1995 (SEO-Birdlife, 1997). Cada vez más, los ornitólogos alicantinos se están esforzando por presentar puntualmente sus observaciones, y de las que este libro es un ejemplo palmario. Desde la aparición del Atlas de la Comunidad Valenciana, diversas publicaciones recogen los trabajos de observación de los ornitólogos alicantinos. Así, los *anuarios ornitológicos* (1988-1994) coordinados por Ignacio Bosco Díez, las *crónicas ornitológicas* publicadas desde el primer número de *La Matruca*, el Boletín de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (verano de 1995), o los *noticiarios ornitológicos* publicados por *El Serenet*, el Butlletí de la Societat Valenciana d'Ornitologia (S.V.O) desde 1995 hasta el más reciente del *Noticiario Ornitológico de 1998* (SVO, 2000). En este último documento se presentan un total de 262 especies informadas por un total de 54 observadores y 5 grupos de trabajo. Como ha señalado recientemente Navarro Medina (1999: 9), los ornitólogos alicantinos conforman en la actualidad "un valioso elenco de personas, la mayoría jóvenes, que no sólo están situando la ornitología de la zona en un brillante lugar, sino que -lo que quizá sea más importante- están profundamente comprometidos con la conservación de las aves" y de nuestros valiosos ecosistemas.

Epílogo

Las aves representan gran parte de nuestra calidad de vida y constituyen uno de los indicadores más seguros de la salud de nuestro planeta. Por ello y para ello, todos debemos trabajar conjuntamente, como ha escrito Alejandro Sánchez (Sánchez, 1996: 34) en un plan estratégico que contemple: (1) prevenir la persecución y sobreexplotación de especies a través del reforzamiento y efectivo cumplimiento de la legislación de protección de especies y del desarrollo de planes cinegéticos y normativas que garanticen una utilización sostenible; (2) la protección de los enclaves prioritarios para la conservación de las aves y en particular de las Áreas de Importancia Internacional para las Aves, mediante el desarrollo y aplicación de planes de ordenación, uso y gestión de cada uno de estos espacios; y (3) la conservación general del medio ambiente, mediante una

regulación más estricta de la contaminación y la integración de objetivos medioambientales en las políticas de desarrollo, especialmente aquellas relacionadas con la agricultura, la pesca, las actividades forestales, y la gestión del agua.

Sin este compromiso y lucha nos aseguramos un mundo sin aves, es decir, un mundo sin vida. Y la vida sin aves es tan espantosa, tan infernal, que la Grecia clásica y, posteriormente los romanos, no encontraron una palabra mejor para describir el Infierno que denominarlo Averno en latín, o Aornos en griego. Y yo ya les dejo con el testimonio estremecedor del infierno, de un mundo sin aves, del poeta Virgilio en el libro sexto de la Eneida:

<<Había cerca de allí una profunda caverna, que abría en las peñas su espantosa boca, defendida por un negro lago y por las tinieblas de los bosques, sobre la cual no podía ave alguna tender impunemente el vuelo; tan fétidos eran los vapores que de su horrible centro se exhalaban, infestando los aires, de donde los griegos dieron a aquel sitio el nombre de Aorno>>



Referencias bibliográficas

✦ AGNES, IOAN. BAPT. (1543). Apologia in Defensionem Virorum Illustr. Equestrum, bonorumque civium Valentini. In civilem Valentini populi seditionem. Quam vulgo Germaniam olim appellarunt. Secunda Apologia, In laudem Illustriss. Magnimique Domini Rhoderici Zeneti quondam Marchionis. In que laudem omnium Equitum Valentinarum. Apologia in Venatores, pro avibus, ad Illustrem Olivae Comitem, cum expositione multarum avium, sermone Graeco, Latino atque Valentino. Et alia non iniucunda lectu, quae in indice praenotantur. Valentiae, Mey Socios.

✦ ALVAREZ LANDETE, I. (1984A). Introducción a un estudio de los vertebrados terrestres de las comarcas alicantinas. En: Espacios naturales de la provincia de Alicante. Alicante, Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 237-256.

✦ ALVAREZ LANDETE, I. (1984B). Fauna de los espacios húmedos del sur. En: Espacios naturales de la provincia de Alicante. Alicante, Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 257-266.

✦ ANÓNIMO (1953). Circular sobre la creación de una Sociedad Española de Ornitología. Calendario Mensual de Caza y Pesca, nº 130 (octubre): 604.

✦ ANUARIO ORNITOLÓGICO - COMUNIDAD VALENCIANA (1988-1994). 7 volúmenes. Valencia: Estación Ornitológica Albufera-SEO.

✦ ARAGONESES, J., Y ECHEVARRÍAS, J.L. (1998). El Flamenco vuelve a criar en los humedales del sur de Alicante. Quercus 144: 16-18.

✦ ARAGONESES, J., Y RAMOS, A.J. (1997). Invernada del Correlimos de Temminck en los humedales del sur de Alicante. Quercus 140: 17-19.

✦ ARÉVALO, C. (1935). La Historia Natural en España. Aplicación del método histórico al estudio de las Ciencias Naturales. Primera Parte. Madrid: Talleres de Unión Poligráfica, S.A..

✦ ARÉVALO BACA, J. (1887). Aves de España. Madrid: Imprenta de los Sres. Viuda é Hijo de Aguado.

✦ AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1982). La Font Roja. Guía del carrascol. Alcoy: Gráficas Ciudad, S.A.

✦ BARÓN DE CORTES (1856). El cazador valenciano. Valencia: Imprenta de José Rius.

✦ BARREIRO, A.J. (1992). El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1771-1935). Madrid: Doce Calles.

✦ BARROW, M. V. (1998). A Passion for Birds. American Ornithology after Audubon. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

✦ BERGES, I. (1858). Apuntes sobre los baños minerales sulfurosos de las Salinetas de Novelda. Alicante: Imprenta y litografía de José Marcili.

✦ BERNIS, F. (1954). Prontuario de la avifauna española (Incluyendo Aves de Portugal, Baleares y Canarias). Ardeola, 1: 11-85.

- ✂ BERNIS, F. (1955). La ornitología. Sus problemas nacionales y generales. La Sociedad Española de Ornitología. Madrid: S.E.O.
- ✂ BERNIS, F. (1955). Dos facetas ornitológicas del botánico Cavanilles. *Ardeola*, 11: 147-174.
- ✂ BOLLE, C. (1855). Die Erstlinge moderner spanischer Ornithologie. *Journal für Ornithologie*, 111: 295-316.
- ✂ BOSCÁ Y SEYTRE, A. (S.A., PERO 1918). Fauna Valenciana. En *Geografía General del Reino de Valencia*. Vol. I. Barcelona: Alberto Martín.
- ✂ BOX AMORÓS, M. (1987). Humedales y áreas lacustres de la provincia de Alicante. Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Dioutación Provincial de Alicante.
- ✂ BREHM, A. (1857). Vorläufige Zusammenstellung der Vögel Spaniens mit kritischer Benutzung der bisher von spanischen Ornithologen herausgegebenen Verzeichnisse. *Allgemeine Deutsche Naturhistorische Zeitung*, 3: 431-448, 449-489.
- ✂ BREHM, R. [1856]. Carta desde Murcia, dirigida a su padre C. L. Brehm, con fecha 15 de agosto de 1856. Biblioteca del autor.
- ✂ BREHM, C.L., BREHM, A., Y BREHM, R. (1858/1859). Die Geieradler und ihr Leben. Ein Beitrag zur genaueren Kenntniss der edelsten Räuber des Hochgebirges. Besser, L., Brehm, C.L., Brehm, A., Brehm, R., et alia (Editores). *Mittheilungen aus der Werkstätte der Natur*. 1. Frankfurt am Main: Meidinger Sohn & Comp., 32-41; 61-66.
- ✂ CALVO, J.F. E IBORRA, J. (1986). Estudio ecológico de la laguna de La Mata. Introducción a la ecología de una laguna litoral. Alicante: Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert».
- ✂ CALVO SENDÍN, J.F., CASTANEDO GARCÍA, J.L., GARCÍA GIMÉNEZ, F.J., IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J.M., MAS HERNÁNDEZ, J., REBOLLO CASTELLÓN, I.D., Y ROBLDANO AYMERICH F. (1987). El Tarro Blanco Tadorña Tadorña (L.) en el sureste español. *Añales de Biología*, 11: 3-30.
- ✂ CANTÓ, P. (1998). Fauna urbana d'Alcoi. Alcoi. Gerència de Medi Ambient. Ajuntament d'Alcoi
- ✂ CHINCHILLA, A. (1846). Anales históricos de la medicina en general, y biográfico-bibliográfico de la española en particular. Tomo IV. Valencia: Imprenta de D. José Mateu Cervera.
- ✂ CORLEY SMITH G.TH. (1960). La Curruca sarda en Jávea (Alicante). *Ardeola*, 6: 390-391.
- ✂ CORTÉS, G. (1672). Tratado de los animales terrestres, y volátiles, y sus propiedades. Valencia: Imprenta de Benito Mace.
- ✂ DEETJEN, H. (1955). Observaciones sobre la avifauna de Valencia. *Ardeola*, 2: 13-21.
- ✂ DEETJEN, H. Y JAHN, E. (1955). Notizen über die Vogelwelt der Provinz Valencia (Spanien). *Ornithologische Mitteilungen*, 7: 84-87.
- ✂ DE LA VEGA DE ORDUÑA, A., ROMÁN SANCHO, J., GUTIÉRREZ EXPÓSITO, C., PEDRAZA ESCUDER, O., Y HERVÁS BENGOCHEA, I. (2000). Guía práctica del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Torrevieja: Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja e Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapapieta Torregrosa.

- ✦ DIES, J.L., GIMÉNEZ, M., MARTÍNEZ, A., DOLZ, C. Y HUERTAS, J. (1989). Localización y censo de los núcleos coloniales reproductores de aves marinas en tramos costeros rocosos e islas de la Comunidad Valenciana (años 1988 y 1989). *Medi Natural*, 1: 53-59.
- ✦ DOLZ, J.C., DIES, J.L. Y BELLIVRE, J. (1990). Las colonias de Canastera en la Comunidad Valenciana. *Medi Natural* 1: 69-80.
- ✦ FONT TEN, J.V., Y MIGUEL GIL, J.B. (1997). Els anàtids valencians: Nomenclatura, característiques i evolució de les poblacions. Valencia: Fundació Bancaixa.
- ✦ FRADEJAS RUEDA, J.M. (1990). Príncipe don Juan Manuel. Libro de la Caza [Cetrería]. Los paramientos de la caza o reglamentos sobre la caza en general. Madrid: Editorial Casariego.
- ✦ FRAGA, X.A. (1998). Aportación al estudio de la obra del naturalista Graells. En: J.L. García Hourcade, J.M. Moreno Yuste y G. Ruiz Hernández (Coords.). Estudios de Historia de las Técnicas, la Arqueología Industrial y las Ciencias. Tomo II. Junta de Castilla y León: Consejería de Educación y Cultura: 840-848.
- ✦ GARCÍA PEIRÓ, I. (1996). Migración e invernada del Pechiazul en el sureste de España. *Quercus* 122: 18-21.
- ✦ GIL-DELGADO, J.A., BARBA, E., MERTÍNEZ R., GARRIGUES R., Y RICO L. (1985). Ornitocenosis del Cabo de la Nao. [Informe sin publicar]. Alicante: Instituto Gil-Albert.
- ✦ GIL-DELGADO, J.A., LÓPEZ, G., RICO, L., SIRVENT, M.I., VILLAPLANA, J., Y ALBENTOSA, L. (1989). Análisis de la distribución de la avifauna nidificante en la provincia de Alicante. *Mediterránea*, 11: 77-119.
- ✦ GOMIS MARTÍN, E. Y ZARAGOZÍ LLENES, A. (1998). Les aus i l'home. Dades sobre ocells de la Marina. *Sarrià. Revista d'investigació i assaig de la comarca*, 0: 35-41.
- ✦ GONZÁLEZ ARPIDE, J. L. (1981). Los Tabarquinos. Estudio etnológico de una comunidad en vías de desaparición. Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos, Diputación Provincial de Alicante.
- ✦ GUILLAMÓN, A., GEA, M., Y ORTEGA, D. (1995). Relatos de Colombicultura y otras historias. Murcia: Federación Regional Murciana de Colombicultura.
- ✦ GUTIERREZ DE LA VEGA, J. (1879). Libros de Cetrería de el Príncipe y el Canciller. Madrid: M. Tello.
- ✦ IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J.M. (1978). Aspectos ecológicos de las zonas húmedas del sur de la provincia de Alicante. *Testudo* 1: 1-113.
- ✦ IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J.M., LÓPEZ, L.F., MAC IVOR, J.A., Y TALAVERA, P. (1975). Primer dato de reproducción de Flamenco (*Phoenicopterus ruber*) en Alicante. *Ardeola* 20: 328-330.
- ✦ JOSA LLORCA, J. (1992). La Historia Natural en la España del siglo XIX: Botánica y Zoología. En: José M. Lopez Piñero (ed.). La Ciencia en la España del siglo XIX. Madrid: Marcial Pons, 109-152.
- ✦ LÓPEZ, G. (1983). Datos sobre la nidificación del Alzacola (*Cercotrichas galactotes*). *Alytes* 1: 373-391.
- ✦ LÓPEZ, G., GIL-DELGADO, J.A. (1988). Aspects of the breeding ecology of the Rufous Bush Robins *Cercotrichas galactotes* in southeast Spain. *Bird Study* 35: 85-89.

- ✚ LÓPEZ, G., RICO, L. Y MARTÍN, C. (1992). Els vertebrats terrestres de la comarca d'Alacant. Alacant: Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant.
- ✚ LLORENS, F. (1995). Diccionari dels ocells valencians. Levante. El Mercantil Valenciano. [38 fichas publicadas desde el 23 de enero hasta el 14 de marzo].
- ✚ MAC IVOR, J. [1968-1971]. Apuntes por un Prontuario de la Región Sud-este o hacia una Avifauna alicantina (PASE). The birds of the salinas, dunes, moorland, orchards, pinewoods, coastal rocks, etc. of Torrevieja & nearby Lomas del Mar, Torrelamata & Guardamar as well as those identified in certain other localities of the provinces of Alicante and Murcia, Spain. Manuscrito inédito.
- ✚ MAC IVOR, J. [1970-1991]. Aves salineras de Torrevieja y La Mata. Manuscrito inédito.
- ✚ MAC IVOR, J. (1974). El Hondo, un biotopo acuático en el Sudeste. ANSE, Circular Informativa nº2: 11-16.
- ✚ MAC IVOR, J. (1975-1976). Nuestras aves acuáticas en el Censo nacional de 1975. Circular Informativa A.N.S.E.: 12-18.
- ✚ MALQUER SOSTRES, J. (1986). Aspectes històrics dels estudis ornitològics als Països Catalans. En: Ferrer, X., Martínez, A., y Muntaner J. Historia Natural dels Països Catalans. Vol. 12: Ocells. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A.
- ✚ MARTÍN CANTARINO, C. (1993). El nom popular dels animals vertebrats terrestres a la comarca d'Alacant. Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià, 1: 161-168.
- ✚ MARTÍNEZ, J.A., LÓPEZ, G., FALCÓ, F., CAMPO, A., Y DE LA VEGA, A. (1999). Habitat de caza y nidificación del Aguilucho Cenizo *Circus Pygargus* en el Parque Natural de la Mata-Torrevieja (Alicante, SE de España): Efectos de la estructura de la vegetación y de la densidad de presas. *Ardeola*, 46: 205-212.
- ✚ MARTORELL, M. (1966). Nota sobre la avifauna de la laguna del Hondo, en Elche. *Ardeola* 11: 129-136.
- ✚ MEARNS, B. AND MEARNS, R. (1998). The Bird Collectors. San Diego: Academic Press.
- ✚ MIGUEL GIL, B. Y FONT TEN, J.V. (1989). El non valencià dels ocells d'Europa. *Medi Natural*, 1: 103-112.
- ✚ MOREAU, R.E. AND MOREAU, W.M. (1953). Migrants on the east coast of Spain. *Ibis*, 95: 372-375.
- ✚ MOREAU R.E. Y MOREAU W.M. (1954). Notas otoñales sobre aves de Levante e Islas Pityusas. *Ardeola*, 1: 86-115.
- ✚ NAVARRO MEDINA, J.D. (1971). Notas preliminares sobre aves acuáticas de las Salinas de Santa Pola (Alicante). *Ardeola* 15: 91-93.
- ✚ NAVARRO MEDINA, J.D. (1972). Panorama ornitológico de los embalses de El Hondo (Alicante). *Ardeola* 16: 228-239.
- ✚ NAVARRO MEDINA, J.D. (1978). El Hondo, pequeño paraíso palustre. *Vida silvestre*, 25: 50-61.
- ✚ NAVARRO MEDINA, J.D. (1988). Estudio ornitológico de El Hondo. Alicante: Caja de Ahorros del Mediterráneo.

- ✦ NAVARRO MEDINA, J.D. (1999). Prólogo. En A.J. Ramos y L. Fidel. Las aves de los humedales del sur de Alicante y su entorno. Alicante: Editorial Club Universitario.
- ✦ NAVARRO MEDINA, J.D. Y NAVARRO GARCÍA, J. (1982). La avifauna de los embalses de El Hondo (I). *Mediterránea* 6: 109-139.
- ✦ NAVARRO MEDINA, J.D. Y NAVARRO GARCÍA, J. (1984). La avifauna de los embalses de El Hondo (II). *Mediterránea* 7: 117-137.
- ✦ NAVARRO MEDINA, J.D., Y ROBLEDANO AYMERICH, F. (COORDS.) (1995). La Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*) en España. Madrid: ICONA.
- ✦ NAVARRO MEDINA, J.D., ROBLEDANO, F., ARANDA, J.C., MARTÍNEZ, E., BALLESTEROS, G.A., PICAZO, H., Y GONZÁLEZ, G. (1993). Biología, ecología y distribución de la Cerceta Pardilla en España. *Quercus* 87: 12-17.
- ✦ PALMER, M. (1994). A birdwatching guide to the Costa Blanca. Revised edition. Chelmsford, Essex: Arlequin Press.
- ✦ PARDO, L. (1925). Las colecciones de anfibios, reptiles, aves y mamíferos del Museo de Historia Natural del Instituto. Anales del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Valencia. Trabajo del laboratorio de Historia Natural, núm.13: 1-95.
- ✦ PARDO, L. (1927). Simón de Rojas Clemente y Rubio y el primer centenario de su muerte. Anales del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Valencia. Trabajo del laboratorio de Historia Natural, núm.15: 1-16.
- ✦ PARDO, L. (1949). Zoología cinegética española. Tomo I: Mamíferos (Fauna de caza de pelo). Madrid: Librería Internacional de Romo.
- ✦ PAVÓN GARCÍA, M.A. (2000). El Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santa Pol: Un modelo de desarrollo urbanístico insostenible. *La Matruca*, XI: 6-7.
- ✦ PEIRÓ, V. (1995). La comunidad ornítica estival en un área degradada de maquía litoral en el este de la provincia de Alicante. *Mediterránea*,: 5-96.
- ✦ PEIRÓ, V. Y CANDELA, M. (1995). Analyse des prélèvements cynégétiques des grives dans la province d'Alicante (Sud-Est de l'Espagne). Office National de la Chasse. Bulletin Mensuel n° 205: 22-31.
- ✦ PEIRÓ, V. Y LÓPEZ, G. (1992). Contribución al conocimiento de la avifauna del entorno de la Reserva Marina de la Isla Plana o Nueva Tabarca. En: Estudios sobre la Reserva Marina de la Isla de Tabarca. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General de Pesca Marítima, 125-135.
- ✦ PEIRÓ CLAVELL, V., SÁNCHEZ ZAPATA, J.A., FERRÁNDEZ VERDÚ, T. Y MARTÍNEZ MANZANO, M. (1996). La comunidad de aves de embalse y zona colindantes en el sur de la provincia de Alicante (El embalse de la Pedrera). Alicante: Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert».
- ✦ PEIRÓ, V., SEVA, E., Y ALMIÑANA, M. (1992/1993). Selección de hábitat de una población de Perdiz Roja (*Alectoris rufa*) en una zona de sierra del sur de la provincia de Alicante. *Mediterránea*, 14: 5-22.

- ✦ PÉREZ ARCAS, L. (1868). [...] la apreciación de los trabajos zoológicos más notables...] Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en la recepción pública del Sr. D. Laureano Pérez Arcas. Madrid: Eusebio Aguado, 5-37.
- ✦ PÉREZ DURÁ, F.J. (1979). Epistolario Manuel Martí, deán de Alicante, y Felipe Bolifón. Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos. Diputación Provincial de Alicante.
- ✦ PUJOL FRUCTUOSO, J.A. Y CALVO SENDÍN J.F. (1997). Torreveja: Cuadernos para su estudio. I. Medio Natural. Alicante: Ayuntamiento de Torreveja.
- ✦ RAMOS SÁNCHEZ, A.J., Y FIDEL SARMIENTO, L. (1999). Las aves de los humedales del sur de Alicante y su entorno. Alicante: Editorial Club Universitario.
- ✦ REIG, A., Y FRAGA, X. (2000). La contribución de Alfredo y Reinaldo Brehm a la ornitología ibérica en su viaje científico a España de 1856-1857. (En prensa).
- ✦ RICO ALCARAZ, L. Y GIL-DELGADO, J.A. (1986). Aves nidificantes de la provincia de Alicante. Alicante: Instituto Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante.
- ✦ RICO ALCARAZ, L., VIDAL VAYÁ, A. Y VILLAPLANA, J. (1990). Datos sobre la distribución, reproducción y alimentación del Águila Perdicera *Hieraaëtus fasciatus* Vieillot, en la provincia de Alicante. *Medi Natural*, 2: 103-112.
- ✦ RUIZ LIMIÑANA, J.B. (2000). Alicante. Paisaje Vivo. Alicante: Diputación Provincial de Alicante. Área de Medio Ambiente.
- ✦ SÁNCHEZ, A. (1996). El largo declive de las aves en Europa. *La Garcilla*, nº 96: 32-34.
- ✦ SÁNCHEZ ZAPATA, J.A. (1996). Valores ecológicos de la Dehesa de Campoamor y Sierra Escalona. *Alquibla. Revista de Investigación del Bajo Segura*, 2: 179-215.
- ✦ SANSANO, V. (1992). Regeneració ecològica i utilització pública de le zones humides: El Clot de Galvany d'Elx. Actes del I seminari de gestió ambiental de la I.C.H.N. Elx, Ajuntament d'Elx.
- ✦ SANTOS, T. El papel del aficionado en la ornitología científica. Perspectiva histórica y futuro. *La Garcilla*, nº 73: 16-20.
- ✦ SAUNDERS, H. (1871). A List of the Birds of Southern Spain. *Ibis*, 1: 54-68; 205-225; 384-402.
- ✦ SCHWERDT, C.F.G.B. (1928). Hunting, Hawking, Shooting. Illustrated in a catalogue of books, manuscripts, prints and drawings. Vol. II. London: Privately printed for the author by Waterlow & Sons Limited. S.E.O./Birdlife (Ed.) (1997). Atlas de las Aves de España. Barcelona: Lynx Edicions.
- ✦ SEVA, E., Y ESCARRÉ, A. (1976). El eslizón ibérico (*Chalcides bedriagai*) en el medio insular de Nueva Tabarca (Prov. De Alicante). *Mediterrànea*, 1: 61-115.
- ✦ SOCIETAT VALENCIANA D'ORNITOLOGIA (2000). Aves de la Comunitat Valenciana. Valencia: Societat Valenciana d'Ornitologia.

- ✚ SOLER, J.M. (1985). La fauna villenense y la desecación de la laguna. *Revista Anual*. Villena.
- ✚ TATO CUMMING, J.J. (1960). Notas invernales en la zona costera del sureste de España. *Ardeola* 6: 362-363.
- ✚ TATO CUMMING, J.J. (1969). Más sobre *Sylvia sarda* en Alicante. *Ardeola* 14: 226-227.
- ✚ TATO CUMMING, J.J. [1972]. Estudio Faunístico-Ecológico de la Provincia de Alicante. Lista nº 1: Aves con estancia probable, más o menos prolongada, en la Provincia y sus costas. Manuscrito inédito, fechado a 27 de octubre de 1972.
- ✚ TATO CUMMING, J.J. [1975]. Anteproyecto para un estudio monográfico del Halcón de la reina (*Falco eleonorae*) y repoblación, por aves marroquíes, de un islote de la costa española. Manuscrito inédito.
- ✚ TATO CUMMING, J.J. Y PECHUÁN, L. (1970). Lista de nombres valencianos de la Avifauna Ibérica. Valencia: Sección Regional Valenciana, S.E.O.
- ✚ TORMO COLOMINA, J. (1991). Ornitonímia murera. El nom popular dels ocells a Muro del Comtat. *Revista de Festes, Muro del Comtat*: 31-32.
- ✚ TORMO COLOMINA, J. (1993). Ornitonímia alacantina. El nom popular dels ocells a la ciutat d'Alacant. *Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià*, 1: 205-214.
- ✚ TORRES FONTES, J. (1961). El halconero y los halcones de Juan II de Castilla. *Murgetana*, 15: 9-20.
- ✚ TORRES FONTES, J. (1974). Ornitología medieval murciana. *Murgetana*, 39: 41-62.
- ✚ TRIGO DE YARTO, E. (1993). España, tierra de caza. (Escritos cinegéticos de Eduardo Trigo de Yarto). Madrid: Libercaza.
- ✚ URIOS, V., PARDO, R., ESCOBAR, R. Y GÓMEZ, J.A. (EDS.) (1991). Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana. Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura.
- ✚ WALTER, H. (1979). Eleonora's Falcon. Adaptations to Prey and habitat in a Social Raptor. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- ✚ WOOD, C.A. & FYFE, F.M. (1943). The art of falconry being *De Arte Venandi Cum Avibus* of Frederick II of Hohenstaufen. Stanford, California: Stanford University Press.
- ✚ XAMARRO, J.B. (1604). Conocimiento de las diez aves menores de jaula, su canto, enfermedad, cura y cria. Madrid: Imprenta Real.
- ✚ ZARAGOZÍ, A., GOMÍS, E., Y FIDEL, L. (COORDS.) (1999). Itinerarios ornitológicos en la provincia de Alicante. Año 1999. Edición limitada para los miembros de SEO-Alicante participantes en el proyecto.



Búho real
Dibujo: ©Luis Sagarb

Diez años de anillamiento en el río Algar

Antonio Zaragoza Llenes

En primer lugar hay que destacar que el lugar de anillamiento, cerca de la desembocadura del río Algar (UTM 30SYH568785), es uno de los pocos ríos de la provincia alicantina que sobrevive con un caudal aceptable casi todos los meses del año. En efecto, el Algar, nace en las Fonts de l'Algar con sus propios aportes y los de varios riachuelos de la umbría de la Serra del Ferrer, de la Serra del Carrascal y de Serra Almedia. A estos aportes hídricos hay que añadir las aguas tratadas que provienen de la estación depuradora. El río recorre unos 15 Km. hasta su desembocadura, formando una amplia rambla, en el mar.

Río Algar
Foto: ©Raul Gonzalez



El clima es claramente mediterráneo, con veranos e inviernos templados, si bien las precipitaciones varían notablemente según progresemos por el cauce. En los tramos más altos pueden llegar a los 800 mm., mientras que en la desembocadura apenas sobrepasan los 400 mm. Las temperaturas medias en verano son de 22º C y en invierno de 12, 8ºC.


La vegetación está muy condicionada a la fuerte antropización del medio y presenta los rasgos típicos de los cursos fluviales del área mediterránea. Se observan carrizales compuestos de carrizo, anea y junco (*Phragmites* comunis, *Typha angustifolia* y *Scirpus lacustris*), cañaverales (*Arundo donax*) de moderada extensión.

Otras especies vegetales frecuentes son la zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y la adelfa o baladre (*Nerium oleander*). Algunos árboles aparecen en varios tramos del río, especialmente sauces y álamos. Entre las especies cultivadas en los alrededores podemos señalar diversos cítricos.

La localización de este punto, en el cauce de un río, rodeado de zonas de cultivos y relativamente próximo a zonas de montaña y al mar, permiten disponer de un amplio abanico de especies para su anillamiento.

Para la captura de las aves se emplean generalmente de dos a cuatro redes del tipo "japonesa" instaladas sobre los diversos cauces que confluyen en el punto de anillamiento. El número de las redes depende de las condiciones atmosféricas, siendo los días con mejores resultados aquellos que aparecen nublados y sin viento, lo que hace más difícil que los pájaros puedan ver las redes. Todos los ejemplares capturados son anillados en el mismo lugar.

Desde que empecé a anillar en esta zona, conocida como "Sogay" dentro del cauce de este río y en el término municipal de Altea, no era del todo consciente de la gran cantidad de datos que se iban a generar sobre las aves que por allí pasan.



Hoy, diez años después y con más de cinco mil aves anilladas, conocemos muchos aspectos de la fenología de las especies migradoras más frecuentes en la zona. En ocasiones apreciamos la sucesión de las estaciones a través de la paulatina llegada de una determinada especie que además coincide con la marcha de otras. Por ejemplo, me atrevo a decir que hacia el 15 de agosto es muy probable que me caiga en la red el primer mosquitero musical de la migración postnupcial, al tiempo que comienzan también a caer los carriceros comunes de áreas más nortañas de Europa, en especial de Francia y Suiza, a juzgar por las recuperaciones de individuos anillados en estos países y recapturados en el río Algar, como ejemplo cito un carricero anillado en Suiza y que en diecinueve días recorrió una distancia de 1075 kilómetros.



Foto: © Raúl González

Otro dato que nos puede orientar sobre la velocidad con la que se desplaza una pequeña ave migradora y que me es muy grato recordar es el de una golondrina común que capturamos al amanecer en el cauce y fue recuperada por nuestro compañero Joan Castany en el Prat de Cabanes (Castellón) al caer la tarde. Ya puestos a enumerar citas tenemos la de un avión zapper anillado en Inglaterra y que fue capturado en plena migración prenupcial en marzo de este año y del cual no tenemos información más detallada. Por cierto, algunos anilladores ingleses nos han confirmado que ellos suelen colocar las redes en las salidas de agua de las depuradoras, al igual que en nuestro caso, sólo que ellos no disponen de la soberbia vigilancia de la Serra de Bernia a sus espaldas.

Con estas líneas pretendo dar a conocer la utilidad del marcado de aves de manera continuada en un determinado lugar. Así se genera una gran información sobre estas aves, que luego podrá ser aprovechada conociéndolas mejor. Al mismo tiempo se siente una gran satisfacción al cooperar con compañeros de este y otros países a los que no conocemos y a los que probablemente nunca llegaremos a conocer, aunque en ocasiones me entra un no sé qué de ir a Marruecos y saludar al anillador que recuperó a una de las dieciséis golondrinas que anillé un caluroso verano en el riachuelo de Xaló y que creo que se trata del mismo anillador que recuperó un collalba rubia que habíamos capturado y anillado en Agües.

Pero me parece que tendré que limitarme a tener estos datos en mi ordenador y colaborar someramente en la realización de los mapas de las rutas de migración de las distintas especies de aves que un ornitólogo puede llegar a anillar a lo largo de su vida.

Sólo una línea más para agradecer a todos los que me ayudan en esta tarea, en especial a mis hijos, a Toni Mulet y Vicent Ferrer, a Elías Gomis y Alfonso Lario que me han echado una mano con este artículo, y también con las redes, y a una larga serie de personas que ruego me disculpen si no les cito por falta de espacio, pero a quienes les agradezco sinceramente su colaboración.



Foto: © Elías Gomis



El Grupo Local de socios de SEO - Alicante

SEO - Alicante

SEO-Alicante nace en el invierno de 1994, con el objeto de crear un mayor acercamiento de los ornitólogos alicantinos, bastante desconectados entre sí hasta entonces. Desde ese momento ha ido desarrollando una serie de actividades para sus miembros y para el público en general, dentro de las líneas básicas de SEO/BirdLife: investigación, divulgación y conservación. En algunas ocasiones, esas tareas responden al mero disfrute de la observación de las aves mientras que en otras se trata de reivindicar públicamente su protección y la conservación de aquellos parajes que les son vitales.

Actividades que se realizan regularmente

Tertulias sobre Ornitología, charlas sobre aves y parajes que desde Noviembre de 1997 se vienen realizando cada mes con la colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y, actualmente, con el Consell de la Joventut d'Alacant y la Junta de Distrito núm. 1. En Diciembre de 1999 ya se habían realizado 25 tertulias a cargo de 17 conferenciantes distintos. Además del gran valor informativo y divulgativo, se han convertido en un punto de encuentro para todos los aficionados alicantinos a la ornitología.

Celebraciones como la del Día Mundial de las Aves (más de 144 especies observadas en 1999 y unos 700 asistentes entre la exposición, conferencia y la concentración para observar aves) así como otras para reivindicar la protección de las salinas de Calpe o la limpieza del P. Natural de las Salinas de Santa Pola.

Excursiones para la observación de aves por la provincia (Parque Natural de la Font Roja, P.N. de la Marjal de Pegó-Oliva, P.N. de El Hondo, Sierra de Salinas, Isla de Benidorm...) y por otros lugares próximos (Estepas de Bonete, Lagunas de Pétrola y de Corral Rubio, P.N. de L'Albufera...) con gran participación.

Itinerarios ornitológicos en la provincia de Alicante es un proyecto en el que se han descrito en su primera parte, realizada en 1999, 220 Km. de rutas para ver

aves en 14 parajes y el estatus y problemas de la avifauna, esperando finalizarlo en el otoño del 2000. Cuenta con la colaboración de una veintena de socios de SEO-Alicante y el apoyo económico del Programa de Voluntariado Ambiental (VOLCAM) de la CAM.

También se realizan otras actividades como las que organiza **SEO/BirdLife (SACRE y NOCTUA)** y **charlas** sobre aves para centros educativos o asociaciones deportivas y culturales en varias localidades (Alicante, Alcoy, Villajoyosa, Denia, El Campello, Xàtiva o Murcia). Otras tienen un carácter más continuo y regular como las tareas de los anilladores y de los responsables de censos de aves y de seguimiento de poblaciones de determinadas especies. Otras veces son socios a título personal, los que se involucran en otras actividades, como es el caso de "Las Aves Urbanas. Iniciación a la Ornitología" que ya va por su cuarto año y por la que han pasado más de 3.000 escolares alicantinos y que cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

En el aspecto menos lúdico, SEO-Alicante también ha planteado alegaciones y denuncias ante actuaciones que han supuesto amenazas para las aves y sus hábitats. Estas alegaciones han sido variadas y han ido desde unas obras de restauración en las murallas del castillo de Santa Pola, en época de reproducción de Vencejos comunes (acusados de ser los causantes del deterioro de la construcción), a proyectos de urbanización en las Salinas de Calpe. También se están iniciando actuaciones sobre el penoso tema de la captura de fringílidos, especialmente cuando se aprovechan las fuentes en época estival para atraerlos.

También la **publicación** de este Anuario ha sido una labor desarrollada por SEO-Alicante gracias a la colaboración y entusiasmo de socios y simpatizantes que permite que podamos llevar adelante todos nuestros proyectos.

Aprovechamos para invitarte a compartir nuestras actividades en defensa de las aves.

ACTIVIDADES PREVISTAS OCTUBRE 2000/JUNIO 2001

	OCTUBRE 2000 Tertulias sobre Ornitología: Día 19. <i>Nuestras aves: aves de los palmerales</i> , por Sergio Arroyo
	NOVIEMBRE 2000 Tertulias sobre Ornitología: Día 16. <i>2 años en el Centro de Recuperación de Fauna</i> , por Marcos Ferrández Excursiones: Día 19. <i>Estepas de Bonete y Laguna de Pétrola</i> (Albacete)
	DICIEMBRE 2000 Tertulias sobre Ornitología: Día 14. <i>El Parque Natural de El Montgó</i> , por Joan Sala Otras actividades: Confección del resumen de las Tertulias.
	ENERO 2001 Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. <i>Nuestras aves: la canastera</i> , por Luis Fidel Excursiones: Día 14. <i>Embalse de Beniarrés</i>
	FEBRERO 2001 Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. <i>El Parque Natural de la Font Roja</i> , por Pep Cantó
	MARZO 2001 Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. <i>Aves marinas y actividad pesquera</i> , por José Santamaría Excursiones: Fecha por confirmar. <i>Valle del Guadalentín</i> (MU) Otras actividades: Programa SACRE
	ABRIL 2001 Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. <i>Pequeños mamíferos carnívoros</i> , por Alejandro Izquierdo
	MAYO 2001 Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. <i>Anillamiento de aves en el río Algar</i> , por Toni Zaragozí Otras actividades: Programa SACRE
	JUNIO 2001 Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. <i>Proyectos realizados y en ejecución</i> , por Elías Gomis

Todas las Tertulias sobre Ornitología son en el Centro 14 (C/. Labradores, 14. Alicante. Tel. 965 144 375) y cuentan con la colaboración del Consell de la Joventut d'Alicant y la Junta de Distrito nº 1. Las Tertulias de 2001 no tienen fecha concreta a la hora de redactar esta nota por lo que los interesados deben informarse en SEO-Alicante o en el Centro 14.

Para las excursiones hay que contactar con SEO-Alicante.



Aguiluchos cenizas
Dibujo: © Oscar Aldeguer



DIRECCIONES DE INTERÉS

A continuación exponemos algunas direcciones de asociaciones naturalistas y organismos públicos que pueden resultar de interés para el ornitólogo en nuestra provincia.

ASOCIACIONES ORNITOLÓGICAS Y NATURALISTAS

✈ **Grupo local de socios de Alicante (SEO-Alicante)**
C/ Colón, 114, 1º D. 03570 Villajoyosa (Alicante)
Tlf. 965-890 919-627 237 219
Web: www.ctv.es/USERS/elgomis
Correo electrónico: seo-alicante@ctv.es

✈ **Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)**
C/ Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid
Tlf. 91-434 09 10 Fax 91-434 09 11
Web: www.seo.org
Correo electrónico: seo@seo.org

Delegación Comunidad Valenciana:

✈ **Estació Ornitològica de l'Albufera**
Avda. de los Pinares, 106. 46012 Valencia
Tel/Fax 96-162 73 89
Correo electrónico: valencia@seo.org

✈ **Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA)**
Apto. de correos 292. 03280 Elche (Alicante)
Web: www.geocities.com/RainForest/3249
Correo electrónico: ahsa@greentek.com
silene.fmrppv@xarxaneta2.org

✈ **Grup Ecologista i Naturalista "Xoriguer"**
C/ Camí Vell de València, 13
Apartado de Correos 43.03570 Villajoyosa (Alicante)
Tlf. 966 853 411
Correo electrónico: xoriguer@teletelne.es

✈ **Grupo Ecologista Maigmó-GREMA Ecologistas en Acción**
C/Balmes, 2, bajo. 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Tlf. 965 664 792
Correo electrónico: ciajsanv@arrakis.es

ORGANISMOS OFICIALES

✈ **Servicios Territoriales de la Conselleria de Medi Ambient de Alicante**
C/ Churruca, 29. 03071 Alicante
Tlf. 965 900 950. Fax 965 900 996

✈ **Agentes Forestales**

Viveros de la Conselleria de Medi Ambient en Santa Faz
Tlf. 965 150 810

Guardia Civil

✈ **Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)**
C/ San Vicente, 52. 03004 Alicante
Tlf. 062 y 965 216 611

PARAJES NATURALES PROTEGIDOS

Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Sin teléfono. Información en Deleg. Ttal.

Parc Natural del Montgó
Tel. 966 423 205

Parc Natural de la Serra del Carrascar de la Font Roja
Tel. 965 337 620

Parc Natural del Penyal d'Ilfach
Tel. 965 972 015

Parc Natural de el Fondó
Tel. 966 678 515

Parc Natural de les Salinas de Santa Pola
Tel. 966 693 546

Parc Natural de les Llacunes de La Mata-Torrevieja
Tel. 966 920 404

LOS VENENOS MATAN a nuestra fauna más amenazada Es un método ilegal que es necesario y urgente erradicar

Si encuentras un cadáver de un animal posiblemente envenenado o cebos supuestamente envenenados, **NO LOS TOQUES NI ALTERES NADA DE SU ENTORNO**. Avisa al Servicio de Protección de la Guardia Civil (SEPRONA) más próximo en el teléfono 062 para que sean ellos quienes levanten el cadáver y hagan un acta o un atestado que pueda ser efectivo judicialmente contra los autores.

En caso de que el **SEPRONA** no pueda acudir, otros agentes de la Guardia Civil pueden levantar un acta o atestado y hacer un informe del hallazgo del cadáver o cebos, concretando todos los datos disponibles del caso como fecha, hora, localización, testigos y sus firmas, hechos, etc. Recordamos que es preciso no mover el cadáver o el cebo hasta que se persone la autoridad. Se recomienda hacer fotografías del cadáver o cebo y de la zona, así como revisar el entorno para averiguar si existen más cebos o cadáveres, incluso de animales domésticos.

También puedes solicitar la ayuda al teléfono del **PROGRAMA ANTÍDOTO 900 713 182**

SOLICITAMOS TU AYUDA PARA EL ANUARIO ORNITOLÓGICO DE ALICANTE 2000

Esta publicación no sería posible sin el entusiasmo y colaboración de todos los ornitólogos que han remitido sus datos. Ahora, cuando ya nos ponemos en marcha para el Anuario del 2000, os volvemos a invitar a que participéis en él. Echad un vistazo a vuestros cuadernos de campo y remitidnos las citas más interesantes. Recomendamos usar el sistema que empleamos en este Anuario, utilizando las abreviaturas y códigos de los observadores que podéis ver al principio de esta publicación.

Siempre será necesario incluir los siguientes datos:

✂ **Paraje, localidad (municipio)**, ordenando las citas por comarcas de Norte a Sur y de Oeste a Este.

✂ **Nombre castellano y científico de la especie**, utilizando los que aparecen en Lista de las aves de España, de Juana, E., SEO, 1998.

✂ **Número de ejemplares, sexo, edad...**

✂ **Fecha** (utilizar cifras árabes para días y latinas para meses. Ej: 20/III, 29/V...).

✂ **Códigos de los observadores**. Si no aparece en este Anuario indicad claramente a quién corresponden las siglas. Persona que envía la cita (nombre, dirección, teléfono, e-mail...)

✂ **Otros datos de interés**.

Para evitar retrasos en la publicación se entreguen las citas al equipo editorial del Anuario o que se envíen por correo postal al coordinador de SEO-Alicante o la dirección electrónica seo-alicante@ctv.es antes del 30 de Marzo de 2001.

Muchas gracias por tu colaboración, sin ella no es posible editar este Anuario.

ESPECIES PROPUESTAS COMO DE MAYOR INTERÉS PARA EL PERIODO 2000/2001

El Comité Editorial del Anuario Ornitológico de Alicante ha considerado que algunas especies de aves deberían ser objeto de un mayor esfuerzo para su localización y registro, con el objeto de aumentar la información sobre su presencia, así como el número aproximado de sus efectivos y el estatus en la provincia.

Para el periodo 2000/2001 se han seleccionado cuatro especies que se relacionan a continuación. Las especies son:



✂ **Cernícalo primilla** (*Falco naumanni*)

✂ **Chorlito carambolo** (*Charadrius morinellus*)

✂ **Roquero rojo** (*Monticola saxatilis*)

✂ **Camachuelo trompetero** (*Bucanetes githagionus*)

Si los ornitólogos prestamos un poco de atención a la posible aparición de aves de estas especies, podremos obtener una importante información de su situación real en Alicante.

¡Ánimo!



Vencejo real
Dibuja: © Luis Segorb

ÍNDICE

Página

	Presentación	5
	Agradecimientos	7
	Lista sistemática. Descripción de las citas	8
	Abreviaturas empleadas	9
	Colaboradores que han remitido sus citas al Anuario Ornitológico de Alicante - 1999	10
	Citas de mayor interés de aves en la provincia de Alicante durante 1999	11
	Listado de aves y su estatus	83
	Artículos	
	La Canastera (<i>Glareola pratincola</i>) en los humedales del Sur de Alicante - 1999	93
	Sergio Arroyo Morcillo, Luis Fidel Sarmiento y Antonio Jacobo Ramos Sánchez	
	Notas para una historia de la Ornitología Alicantina	97
	Abilio Reig Ferrer	
	Diez años de anillamiento en el río Algar	125
	Antonio Zaragoza Llenes	
	Notas breves	
	El grupo local de socios de SEO-Alicante	127
	Actividades Previstas Octubre 2000 / Junio 2001	128
	Direcciones de interés	129





Requero rojo
Dibujo: ©Pep Cantó