

LAS AVES RAPACES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BORRIOL (CASTELLÓ), INTRODUCCIÓN A SU CONOCIMIENTO.

Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires –Ecologistes en Acció (GER-EA)

Josep Bort, Juan Luis Bort y Lledó Badenes (GER-EA)

Son varias y muy interesantes las especies de rapaces que se localizan en el término municipal de Borriol, debido a la combinación entre zonas de bosque (pinares y matorral), de barrancos con grandes cortados y zonas de cultivo de secano.



La especie de rapaz más importante es el **águila de Bonelli** (*Aquila fasciata*), especie nidificante en peligro de desaparecer en la provincia de Castellón y en peligro de extinción en Europa y parte septentrional de la Península Ibérica, considerándose solo la población de Andalucía y Extremadura como estable. Debido a esta escasez, las parejas de esta rapaz que existente en el término de Borriol, prácticamente el único término municipal de Castellón que alberga a **dos parejas nidificantes**, son seguidas y controladas continuamente por miembros del GER (*Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires*) y agentes medioambientales. Y **forman parte de unos estudios de investigación** realizados por la Universidad de Valencia y Universidad de Alicante, que se iniciaron en el 2015 y siguen en marcha, **estas cuatro águilas son seguidas minuto a minuto por telemetría**, ya que llevan instalado un diminuto GPS en la espalda.

Otras especies de **rapaces nidificantes** en el término son: **rapaces forestales**, el busardo ratonero (*Buteo buteo*), águila culebrera (*Circaetus gallicus*), azor (*accipiter gentilis*) y gavilán común (*accipiter nisus*), **rapaces rupícolas**: el halcón pelegrino (*Falco peregrinus*) y el cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*), aunque el término es visitado por una pareja **de águila real** (*Aquila chrysaetos*) que



nidifican en el P.N. Desert de les Palmes en término de Cabanes.



Otra especie importante que se ve en la zona entre final de junio y agosto es en **Halcón de Eleonor** (*Falco eleonore*), que viene al término de Borriol y La Pobla Tornersa al anochecer a alimentarse de insectos voladores (escarabajo de San Juan), esta especie de rapaz nidifica en les Illes Columbretes.

Respecto a las rapaces nocturnas nidificantes, están representadas en el término todas las que nidifican en la Comunidad Valenciana, el más importante el **búho real** (*Bubo bubo*) y el **búho chico** (*Asio otus*), además de mochuelo común (*Athene noctua*), lechuza (*Tyto alba*), autillo (*Otus scops*), y cárabo (*Strix aluco*).



Como especies de rapaces migradoras que pasan por el término, tenemos una gran variedad. Así, el más abundante es el halcón abejero (*Pernis apivorus*), seguido del milano negro (*Milvus migrans*), que desde finales de agosto hasta final de octubre pasan centenares hacia el continente africano.

Además, podemos observar otros que se ven migrando aunque nidifican cerca de Borriol, caso del aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*), que nidifican solo 3 parejas en el Prat de Cabanes y el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), con parejas nidificantes desde Cabanes hasta la provincia de Tarragona, estas



dos especies hacen sus nidos en el suelo entre la coscoja y juncareas, el águila calzada (*Aquila pennata*) y el alcotán (*Falco subbuteo*) que nidifica en zonas más interiores como Vilafranca y Penyagolosa, pero cada vez se localizan parejas nidificantes más cerca de los corredores interiores. Incluso podemos observar en paso a la escasa **águila pescadora** (*Pandion haliaetus*).

Las **aves rapaces carroñeras**, siendo muy escasas en la zona, pueden verse en buitre leonado (*Gyps fulvus*), con colonias de cría en el interior provincial, siendo las más cercanas, las ubicadas entre Torre d'En Domenech y Serratella, así como el **alimoche** muy escaso en toda la Comunidad Valenciana (*Neophron percnopterus*).



Como **rapaces invernantes**, destaca el **aguilucho pálido** (*Circus cyaneus*), que utiliza los campos de almendros y olivares para alimentarse de pequeños pájaros e insectos, procedente del Europa y el norte peninsular. El pequeño **esmerejón** (*Falco columbairus*), muy escaso y que se alimenta de insectos y pequeños roedores.



Como **rapaz nocturna invernante** se encuentra de forma accidental la **lechuza campestre** (*Asio flammeus*), aunque estas prefieren zonas más costeras como la desembocadura del riu Millars, Prat de Cabanes o Marjal d'Almenara y **búho chico** procedente del Europa, que se une a los búhos chico que nidifican en la zona, alimentándose de gran cantidad de roedores.



Agresiones más comunes:

Las principales agresiones que afectan a las rapaces, no solo en el término de Borriol sino en toda la provincia son: la **muerte por electrocución** en los postes de luz, seguido por la **muerte por disparo**, siendo la especie **más afectada el águila de Bonelli y el Búho real**.



Otras rapaces se ven afectadas por **ahogamientos** en balsas de riego al intentar beber.

Demás las especies de rapaces forestales se ven afectadas por **la pérdida y alteración del hábitat** especialmente por los **incendios forestales, talas abusivas** de árboles maduros donde colocan los nidos y la **falta de alimento**.

Además, en la zona y época de cría, las rapaces **son muy sensibles a las molestias** cercanas a los nidos, afectando los trabajos forestales, fotografía de la naturaleza y las excursiones y rutas de motor cercano a los nidos.

Medidas de Conservación:



El primer lugar debemos conocer a las aves rapaces del término municipal, su importancia y los motivos de su conservación. “Quien no conoce, no conserva”

Eliminar todas las muertes no naturales, como las muertes por electrocución, mediante la rectificación de las torres eléctricas y colocación de salvapájaros en los cables.

Concienciar a los cazadores y columbaires, para que no disparen a las rapaces, son demasiado valiosas, escasas

e importantes en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, para hacerlas desaparecer.

Hay que tener en cuenta que son el mejor controlador de las plagas naturales, consumiendo conejos afectados por la mixomatosis y hemorrágia vírica existentes en el término de Borriol, caso del águila de Bonelli o el águila real, o eliminando multitud de roedores por los mochuelos, búhos y lechuzas.

Respecto a los usuarios den monte, se deberían diseñar las rutas de senderismo o excursionismo lejos de la zona de nidificación y no utilizarlas durante el periodo reproductivo. Así mismo no se deberían realizar fotografía a las rapaces en sus nidos, ya que nuestras molestias pueden ocasionar la pérdida de las polladas. Así mismo los trabajos forestales (talas, limpiezas, reconstrucción de pistas forestales, etc..) fuera de la época de nidificación.

Evitar la alteración del hábitat, evitando las talas abusivas, y la tala de árboles con nidos. Unido a medidas de prevención de incendios forestales evitando el acumulo de basura (la basura realizada debe volver a los contenedores de casa) y no realizar fuego en el monte, ningún tipo de fuego.



Lledó, miembro del GER-EA.

Más información:

La información de cada especie de rapaz, puede consultarse en nuestra página web “*Internatura*”, donde está la información general de todas las especies que se ven en la Comunidad Valenciana (<http://www.internatura.org/>)



**GRUP D'ESTUDI I PROTECCIÓ
DELS RAPINYAIRES - EA**

VILA-REAL



GER-EA. 24/10/2017