

ON MIRAR / DONDE MIRAR V

Guía para identificación rapaces en Castellón. Guía per a la identificació de rapinyaires a Castelló.

RATONEROS

BUSARDO RATONEROS ([Buteo buteo](#))

Consultar: <http://blascozumeta.com/wp-content/uploads/aves-aragon/no-passeriformes/119.buteobuteo.pdf>

<https://es.scribd.com/document/355752633/Ficha-de-Identificacion-Buteo-buteo>



Envergadura: 110-132 cm

Macho:

Hembra:


Longitud: 46-58 cm / 51-57 cm

Peso:

Macho: 6,5 kg (rango= 500 – 800)

Hembra: 8 kg. (rango= 600 – 880)

Marjal Xilxes 13/12/2017. Herido en ala posible traumatismo.



Tamaño mediano y aspecto compacto. Cola más corta que anchura del ala y bordes externos puntiagudos
09/10/2015

Alas anchas y redondeadas, cola relativamente corta y ancha, cuerpo robusto, cuello corto y cabeza grande.




Mancha clara barreada en primarias internas y secundarias



JOVEN: Ojo marrón claro, cuanto más oscuro más adulto. Cera amarilla.



ADULTO: Ojo marrón oscuro



Alas bastante largas y anchas. Tarsos sin plumas.
21/12/2015. Vila-real

Tamaño mediano y aspecto compacto.

Diversidad en el color

Rapaz con mayor diversidad de colorido de todas las de Europa.

Sexos similares, las hembras un poco más pesadas. No dimorfismo respecto al colorido, hay ejemplares totalmente oscuros a prácticamente blancos.
El colorido varía tanto en la parte superior como inferior del ave.



Ratonero oscuro. 09/12/2013, Vila-real. Ratonero claro Pou Nules 14/11/2013



Ratonero blanquecino. Morella 26/02/2012. Foto Fernando Ramia. Peña Tastavin



"Coma" negra




Ratonero muy blanco posiblemente joven. Morella 26/02/2012. Foto Fernando Ramia. Penya Tastavin


Los individuos claros suelen proceder del norte europeo y suelen ser jóvenes.



Clot de la Mare de Deu. Grau de Borriana. 21/12/2006



Benlloch . 19/04/2015, dos ratoneros juvenes con plumajes distintos



Joven. Falta de líneas oscuras. Cabanes 13/10/2018.



Adulto. Vilanova d'Alcolea 26/12/2018

Cola corta, ancha, forma de abanico, extremos puntiagudos y uniformemente barreada. En **jóvenes** todas las barras son iguales y en **adultos** la barra subterminal es más ancha y negra.



Adulto. Vilanova d'Alcolea 25/09/2017.



Joven. Benlloch 19/04/2015




ADULTO.- Busardo ratonero oscuro 17/10/2015.

ADULTO: Banda más ancha y oscura subterminal de la cola y banda oscura en borde de fuga del ala.

Ojos marrón oscuros



Adulto.- B.ratonero 24/12/2018. Dehesa Soneja



ADULTO: 13/11/2018. Marjal d'Almenara



13/11/2018. Marjal d'Almenara


JOVEN: Partes superiores generalmente marrón oscuro. Cola redondeada y muy barreada entre 8 y 10 franjas. Parte final cola clara.



20/05/2018.



Riu Millars 27/12/2012



Zona blanca en forma de "U" debajo del pecho.

Joven: Fase normal Pou Nules 10/11/2015.



Adulto: Fase normal Almenara 02/01/2019

La técnica para alimentarse generalmente desde posaderos tanto naturales como artificiales, postes o apoyos eléctricos. Aunque en ocasiones se puede ver a la especie cernida como un águila culebrera o un cernícalo, lo que te puede hacer dudar si la distancia al observador es grande.



Oteadero desde una torre eléctrica 05/11/2015. Benlloch.



Oteadero de un poste teléfonos Vilanova d'Alcolea. 02/01/2017



Postura típica en el cernido para alimentarse. Alas abiertas y cola abiertas. Es utilizada principalmente en días de fuerte viento.


Ratonero cernido 02/10/2017. Marjal d'Almenara

Migración:

Suele ir en solitario aunque en ocasiones se pueden ver varios ejemplares juntos utilizando las corrientes térmicas con otras especies.



La Punta Vall d'Uixó. Cicleando cogiendo altura en corriente térmica



Migración activa. La Punta Vall d'Uixó 09/10/2013



Cuando planea alas planas o ligeramente curvadas.